



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.

NYPL RESEARCH LIBRARIES




3 3433 06633194 7













(Herz-1115)

PI





LEHRBUCH

der

C H E M I E

von

J. Jacob Berzelius.

Aus dem Schwedischen übersetzt

von

F. W ö h l e r.

Dritter Band, in zwei Abtheilungen.

Mit einer Kupfertafel.

DRESDEN,

in der Arnoldischen Buchhandlung.

1827.

LEHRBUCH

der

C H E M I E

von

J. Jacob Berzelius.

Aus dem Schwedischen übersetzt

von

F. Wöhler.



Dritten Bandes erste Abtheilung.

Mit einer Kupfertafel.

DRESDEN,

in der Arnoldischen Buchhandlung.

1827.

NOV 19 1964
LIBRARY
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Inhalt.

Dritten Bandes erste Abtheilung.

	Seite
Kurze Uebersicht der allgemeinen Erscheinungen der chemischen Verwandtschaft.	3
Versuch der Theorie von den chemischen Erscheinungen, d. h. Versuch einer theoretischen Ansicht von, den chemischen Proportionen und dem chemischen Einflusse der Elektrizität in der unorganischen Natur.	16
I. Geschichte der Entwicklung der Lehre von den chemischen Proportionen.	16
II. Ueberblick der Theorie von den chemischen Proportionen und ihrer Ursache.	28
III. Entwicklung der elektrochemischen Theorie, so wie sie aus der bisher gesammelten Erfahrung zu folgen scheint.	49
IV. Ueber die Bestimmung der relativen Anzahl von einfachen Atomen in chemischen Verbindungen.	87
V. Ueber die Art, die relativen Gewichte der einfachen Atome zu bestimmen und mit einander vergleichbar zu machen.	102
VI. Ueber die Art, durch Formeln die Zusammensetzung der Körper auszudrücken, sowohl hinsichtlich ihrer Elemente, als auch hinsichtlich der Anzahl ihrer Atome.	107
VII. Ueber das Gewicht der Atome der einfachen Körper.	112

Organische Chemie im Allgemeinen. 135

Unterschied zwischen der todtten und lebenden Natur.	136
Verbindungsart der Elemente in der organischen Natur.	138
Veränderung im ursprünglichen elektrischen Zustand der Elemente.	142

	Seite
Verbindungen von einfachen Körpern nach Art der organischen Natur, künstlich dargestellt.	146
Was die Chemie in der organischen Natur lehrt.	147
Zerlegung organischer Stoffe in ihre entfernteren Bestandtheile.	147
Bestimmung der Atomen-Anzahl.	149
Vollkommene Isolirung der organ. Stoffe vor der Analyse.	151
Befreiung derselben von Wasser.	152
Bestimmung der Sättigungscapacität.	154
Verbrennung organischer Oxyde.	157
Thénard's und Gay-Lussac's Methode durch rasche Verbrennung vermittelt chlorsauren Kali's.	158
Meine Methode durch langsame und progressive Verbrennung vermittelt chlorsauren Kali's.	161
Anwendung des Kupferoxyds, statt des chlors. Kali's.	166
Prout's Methode.	167
Bereitung des Kupferoxyds zu diesem Endzweck.	168
Feuchtigkeit im Kupferoxyd.	169
Vermeidung des Verlustes an Gas, welches im Apparate zurückbleibt.	169
Th. de Saussure's Methode, in Sauerstoffgas zu verbrennen.	172
Analysen von Stoffen, deren Sättigungscapacität unbekannt ist.	174
Eintheilung der organischen Körper.	174
Pflanzen-Chemie.	176
Unser Wissen in der Pflanzenphysiologie sehr unvollkommen.	176
Keimen.	178
Generation aus Saamen und Generatio aequivoca.	178
Cicatrix. Radicula. Plumula. Cotyledon.	180
Bedingungen des Keimens.	180
Innerer Verlauf desselben.	181
Wirkung des Wassers, der Luft und des Lichts dabei.	182
Die Wurzel geht nach unten, die Pflanze nach oben.	184
Herzblätter.	185
Das Wachsen und die Erscheinungen der Wirkungen der Pflanzen auf Erde, Wasser und Luft.	186
Mark. Holz. Splint. Rinde.	186
Aeste. Blätter. Blüten.	187
Ernährung der Pflanzen.	188
Absorbtion durch die Wurzel.	188
Wirkung verschiedener, von der Wurzel aufgenommener Stoffe.	189
Die Wurzeln wählen dabei die Stoffe aus.	190
Wirkung der unorganischen Bestandtheile der Erde.	192
Wirkung der Luft auf die Wurzeln.	192
Der Saft und seine Bewegung.	193

	Seite
Verrichtung der Blätter.	197
Abdunstung derselben.	197
Wirkung derselben auf die Luft.	198
Concentration des Saftes u. Aufbewahrung im Winter.	204
Mitwirkung des Lichts auf die grüne Farbe d. Pflanzen.	206
Absorbtiionsvermögen der Blätter.	207
Chemischer Einfluss der Blüthen auf die Luft.	207
Wärme bei den Geschlechtsverrichtungen der Pflanzen.	207
Wirkung der Früchte auf die Luft.	209
Quelle des Wasserstoffs in den Pflanzen.	210
Absorbtiion aus dem Humus.	211
Wärmeentwicklung bei der Vegetation.	212
Bewegung und Aufhören der Pflanzen.	213
Nähere Bestandtheile der Pflanzen.	214
1. Klasse. Pflanzensäuren.	216
Chinasäure.	217
Brenzliche Chinasäure.	220
Mekonsäure.	221
Lactucasäure.	224
Senfsäure.	225
Schwammssäure.	228
Boletsäure.	229
Igasursäure.	231
Stocklacksäure.	232
Gallertsäure.	233
Kramersäure.	236
2. Klasse. Vegetabilische Salzbasen.	238
Allgemeine Eigenschaften und Verhältnisse derselben.	238
Morphin.	243
Narcotin.	254
Strychnin.	257
Brucin.	264
Chinin und Cinchonin.	268
Chinin.	271
Cinchonin.	275
Veratrin.	279
Emetin.	281
Tabelle über die Zusammensetzung und Sättigungs-	
capacität der vorhergehenden Basen.	285
Delphinin.	286
Solanin.	287
Vegetabilische Salzbasen, die noch zu wenig untersucht	
sind, als das sie mit Sicherheit als solche anzunehmen	
wären.	288
Picrotoxin.	288
Daphnin.	291
Digitalin.	292
Jalappin.	292
Pariljin und Smilacin.	293
Rhabarbarin.	293

	Seite
3. Klasse. Indifferente Pflanzenstoffe.	294
A. Pflanzenstoffe, welche in einer grossen Anzahl Pflanzen von verschiedener Art vorkommen, und als die allgemeinen näheren Bestandtheile des Pflanzenreichs betrachtet werden können.	
1. Stärke.	296
<i>a)</i> Gewöhnliche Stärke.	297
<i>b)</i> Inulin.	308
<i>c)</i> Moosstärke.	310
2. Gummi und Pflanzenschleim.	314
A. Gummi.	315
Natürliche Gummiarten.	
<i>a)</i> Arabisches Gummi.	318
<i>b)</i> Kirschgummi.	320
Künstliche Gummiarten.	
<i>a)</i> Gummi von gerösteter Stärke.	320
<i>b)</i> Gummi von der freiwilligen Zersetzung des Stärkekleisters.	321
<i>c)</i> Gummi durch Behandlung von Leinen, Holz, Stärke oder arabischem Gummi mit Schwefelsäure.	321
B. Pflanzenschleim.	322
<i>a)</i> Traganthgummi.	323
<i>b)</i> Pflaumengummi.	324
<i>c)</i> Leinsaamenschleim.	324
<i>d)</i> Quittenschleim.	324
<i>e)</i> Salep.	324
<i>f)</i> Ringelblumenschleim.	325
3. Zucker.	326
A. Rohrzucker.	326
<i>a)</i> Aus dem Zuckerrohr.	327
<i>b)</i> Aus Ahorn.	328
<i>c)</i> Aus Runkelrüben.	329
Raffination des Rohrzuckers.	331
Krystallisirter Rohrzucker.	336
Nichtkrystallisirender oder Syrup.	338
Chemische Eigenschaften des Rohrzuckers.	339
B. Traubenzucker.	344
<i>a)</i> Aus Weintrauben.	345
<i>b)</i> Aus Stärke mit Schwefelsäure.	345
<i>c)</i> Aus Holz, Leinen u. dergl. mit Schwefelsäure.	347
<i>d)</i> Aus Honig.	348
C. Mannazucker.	353
D. Schwammzucker.	355
E. Süfsholzucker.	356
<i>a)</i> Von <i>Glycyrrhiza glabra</i> .	357
<i>b)</i> Von <i>Abrus praecatorius</i> .	360
Der süfse Stoff in <i>Polypodium vulgare</i> .	361

	Seite
4. Pflanzenleim und Pflanzeneiweiß.	362
1. Pflanzenleim u. Pflanzeneiweiß aus Weizen.	365
2. — — — — — aus Roggen.	375
3. — — — — — aus Gerste.	376
4. — — — — — aus Hülsenfrüchten.	377
5. Pflanzeneiweiß aus emulsionbildenden Saamen.	379
6. — — — — — aus der Milch des Kuhbaums.	380
7. — — — — — aus ausgepressten Pflanzensäften.	381
5. Pollenin.	383
6. Fette Oele.	384
Allgemeine Eigenschaften derselben.	385
α) Trocknende Oele.	
Leinöl.	396
Wallaufsöl.	397
Hanföl.	398
Mohnöl.	398
Ricinusöl.	398
Crotonöl.	399
β) Nicht trocknende Oele.	
Mandelöl.	400
Baumöl.	400
Rüböl.	402
Kolsaöl.	403
Senföl.	403
γ) Feste Oele.	
Cacaobutter.	404
Palmöl.	404
Pineytag.	404
Muskatbutter.	404
Lorbeeröl.	406
Gewöhnliches Wachs.	407
Myrthenwachs.	410
Palmwachs.	411
Wachs aus der Milch des Kuhbaums.	411
Wachs aus grünen Stengeln und Blättern (Chlo-	
rophyll, Blattgrün).	411
Seifenbildungsprozess und seine Producte.	412
A. Eigentliche fette Säuren, d. h. solche, welche bei	
der Destillation mit Wasser nicht mit übergehen.	
α) Talgsäure.	421
Talgsaure Salze.	424
β) Margarinsäure.	429
Margarinsaure Salze.	431
γ) Oelsäure.	433
Oelsaure Salze.	438
δ) Fette Säuren aus Ricinusöl.	441
B. Durch den Seifenbildungsprozess erzeugte flüchtige	
Säuren.	444
α) Sabadillsäure.	445
β) Crotonsäure.	445

	Seite
C. Oelzucker.	447
D. Seife.	448
1. Grüne Seife.	449
2. Harte Seife.	451
3. Bleipflaster und unauflösliche Seifen.	455
7. Flüchtige Oele.	458
A. Nicht sauerstoffhaltige flüchtige Oele.	
Terpenthinöl.	471
Citronenöl.	478
Bergamottöl.	480
Stearopten des Rosenöls.	480
B. Sauerstoffhaltige flüchtige Oele.	480
a) Aromatische Oele.	
Anisöl.	481
Cajeputöl.	482
Dillöl.	482
Wachholderöl.	482
Fenchelöl.	483
Fuselöle.	483
Hollunderblüthöl.	485
Hyssopöl.	485
Calmusöl.	486
Camillenöl.	486
Zimmetöl.	486
Krausemünzöl.	488
Kümmelöl.	488
Lavendelöl.	488
Wermuthöl.	489
Muskatnufsöl.	489
Nelkenöl.	490
Neroliöl.	491
Pfefferöl.	491
Pfeffermünzöl.	491
Petersilienöl.	492
Reinfarrenöl.	492
Rosenöl.	492
Rosenholzöl.	494
Rosmarinöl.	494
Safranöl.	494
Sassafrasöl.	495
Sevenbaumöl.	495
Thymianöl.	495
Tonka-Stearopten.	496
b) Scharfe und blasenziehende Oele.	497
Meerrettigöl.	497
Flüchtiges Senföl.	497
Knoblauchöl.	498
Löffelkrautöl.	498
c) Blausäurehaltige giftige Oele.	499
Bittermandelöl.	499

	Seite
Oele aus Vogelkirschrinde, Kirschchlorbeerblättern, Kirschen und Vogelkirschkernen.	500
d) Campher.	501
Anhang zu den flüchtigen Oelen.	505
Asar.	506
Helen.	506
Betul.	507
Nicotian.	507
Anemon.	508
8. Harze.	510
1. Flüssige Harze oder natürliche Balsame.	
Copaivabalsam.	515
Meccabalsam.	517
Perubalsam.	518
Flüssiger Storax.	520
Tolubalsam.	520
Terpenthin.	521
2. Trockne Harze.	
Anime.	525
Bensoë.	526
Colophon.	527
Copal.	530
Drachenblut.	534
Elemi.	535
Guajakharz.	535
Gummilack.	539
Jalappenharz.	546
Ladanum.	546
Mastix.	547
Sandarach.	547
Storax.	548
Takamahak.	549
Harzfirnisse.	549
Weingeistfirnisse.	549
Terpenthinirnisse.	551
9. Extracte und extractförmige Stoffe.	553
Absatz der Extracte.	554
A. Bittere Extracte.	561
α) Rein bittere.	561
β) Bittere Extracte.	562
Aloë.	562
Coloquinthenbitter.	564
Rhabarberbitter.	565
B. Adstringirende Extracte. Gerbstoffarten.	566
α) Gerbstoff, welcher die Eisenoxydsalze blau färbt, vorzüglich Eichengerbstoff.	569
Acide ellagique.	587
β) Gerbstoff, welcher die Eisenoxydsalze grün färbt.	588
Chinagerbstoff.	588
Catechu.	592

	Seite
Kino.	594
Tannengerbötfl.	596
C. Narcotische und giftige Extracte.	596
Belladonna-Extract.	597
Upasgift.	598
10. Skelett der Pflanzen.	600
A. Mark.	601
B. Holz. Pflanzenfaser.	602
a) Holz.	602
b) Pflanzenfaser.	606
c) Gewebe von saftigen Früchten.	608
d) Fungin.	609
C. Rinde.	610
a) Die lebende Rinde.	611
b) Die todte Rinde und Kork.	611
c) Oberhäutchen der Stengel, Blätter und Früchte.	613
Synoptische Tabelle über die Atomgewichte der einfachen Körper.	615

LEHRBUCH DER CHEMIE,

von

J. Jacob Berzelius.

Dritten Bandes erste Abtheilung.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Kurze Uebersicht

der allgemeinen Erscheinungen der chemischen Verwandtschaft.

Schon zu Anfange des ersten Theiles habe ich, bei Erwähnung der Verwandtschaften, den Leser im Allgemeinen mit unsern Kenntnissen von den Kräften, welche die Verbindungen der Körper bestimmen, bekannt zu machen gesucht; aber da die Verwandtschaftslehre nicht ohne Beispiele verstanden, und auch diese von Anfängern nicht begriffen werden können, so ist man gewöhnlich nicht eher im Stande, diese Lehre zu verstehen, als bis man sich mit einem großen Theile chemischer Erscheinungen auf dem Wege der Erfahrung hat bekannt machen können. Die Nothwendigkeit, bei dem Studium der Chemie etwas davon zu kennen, veranlaßte mich, diese Materie nur im Anfange des Lehrbuchs kurz zu erörtern, und die Gewisheit, nun besser verstanden zu werden, bewegt mich, die Aufmerksamkeit des Lesers hier wieder darauf zurückzuführen.

Wir können uns die chemische Verwandtschaft der Körper wie eine Begierde vorstellen, die sie, bis zur Befriedigung, unaufhörlich zu sättigen suchen. Sie streben dabei, in einer solchen Menge und in einem solchen Verhältnisse zusammenzukommen, daß sie gesättigt werden, das will sagen, aufhören, ihre Vereinigungsverwandtschaft zu äußern und in Ruhe kommen. Eine Verbindung mehrerer einfacher Stoffe, die entweder gänzlich oder größtentheils aufgehört haben, Vereinigungsverwandtschaft zu äußern, können wir völlig gesättigt oder indifferent nennen.

Wenn wir uns z. B. vorstellen, daß sich Baryum, Schwefel und Sauerstoff nach und nach treffen, so verbinden sie sich mit einander, bis sie endlich in dem Verhältnisse zusammengekommen sind, daß sie schwefelsaure Baryterde bilden, worauf die Vereinigungs-Verwandtschaft darin zur Ruhe gebracht und der Körper indifferent geworden ist. Die Aeufserung der Vereinigungs-Verwandtschaft geht also darauf hinaus, nach einer kürzeren oder längeren Thätigkeit in Ruhe zu kommen. Stellen wir uns die einfachen Körper als auf eine Stelle zusammengebracht, und alle im Stande, ihre Verwandtschaftskraft zu äußern, vor, so würden diese anfangen, sich mit einander zu verbinden, und die Masse käme in eine, kürzere oder längere Zeit, fortdauernde Thätigkeit, die sich nachher mit einer ewigen Ruhe schliessen würde, welche von keiner Kraft gestört oder aufgehoben werden könnte. Die Masse würde jetzt durch die Cohäsionskraft ein mechanisches Aggregat indifferenter Körper sein. Von dieser Beschaffenheit ist jedoch nicht die schöne Natur, welche uns umgiebt. Auf der kleinen Stelle des Universums, die wir bewohnen, wird eine organische Natur durch einen beständigen Wechsel in der unorganischen erhalten, und wir haben gegründete Veranlassung, einen ähnlichen Gang der Dinge in dem übrigen Theil des unermesslichen Ganzen zu vermuthen.

Die Umstände, welche die Ruhe der verbundenen Elemente unaufhörlich stören oder aufheben, sind: der Lichtstoff, der Wärmestoff und die Elektrizität, in Zusammenhang mit den verschiedenen Stufen der Vereinigungs-Verwandtschaft.

In dem Folgenden werden wir erfahren, welchen Theil die Elektrizität an allen Aeufserungen chemischer Verwandtschaft zu haben scheint; aber hier setzen wir alle Muthmaßungen über die inneren Ursachen bei Seite und bleiben nur bei der Betrachtung der Erscheinungen, die hervorgebracht werden, stehen.

Die Vereinigungs-Verwandtschaft zwischen einfachen Körpern besitzt verschiedene Grade,

sowohl bei verschiedenen Proportionen derselben Körper, als bei mehreren verschiedenen Körpern unter sich.

1. Wenn sich der Körper A mit dem Körper B in mehreren Verhältnissen, z. B. $A+B$, $A+2B$, u. s. w. verbinden kann, so geschieht es gewöhnlich, daß in $A+2B$ das eine B von A mit stärkerer Kraft als das andere gebunden gehalten wird, wodurch ein B von $A+2B$ durch eine Kraft, die das andere B nicht wegzunehmen vermag, abgeschieden werden kann. Bisweilen, obgleich seltener, geschieht es, daß A mit stärkerer Verwandtschaft $2B$ als $1B$ zurückhalten kann, so daß $A+B$ mit Leichtigkeit zersetzt wird, wenn hingegen $A+2B$ einer weit größeren zersetzenden Kraft widersteht.

Beispiel: Das Eisen verbindet sich mit Sauerstoff in zwei Verhältnissen, zum Oxydul und zum Oxyd; mehrere andere Metalle reduciren das Eisenoxyd zu Oxydul und nehmen die Menge Sauerstoff auf, welche letzteres zum Oxyd machte, ohne daß sie jedoch das Oxydul zum Metall reduciren können. Das Eisen hält folglich den Sauerstoff im Oxydul mit einer stärkeren Kraft zurück, als den Sauerstoff, der hinzukömmt und das Oxydul in Oxyd verwandelt. — Im Quecksilberoxydul hält das Metall den Sauerstoff mit einer so schwachen Affinität, daß das Oxydul sowohl im Tageslicht, als auch bei dem Erwärmen oder bei dem Reiben in der Hand, zu metallischem Quecksilber reducirt wird, da im Gegentheil die doppelte Menge Sauerstoff, welche das Metall im Oxyd aufnimmt, zu ihrer Abscheidung Glühhitze fordert. — Es ist sehr schwer, das Zinnoxid auf gewöhnliche Art zu Metall zu reduciren, aber das Oxydul wird sehr leicht wieder hergestellt.

2. Wenn zwei Körper, A und B, zu einem dritten, C, eine Verwandtschaft von ungleicher Stärke besitzen und der Unterschied in ihrer Verwandtschaft so beschaffen ist, daß A gerade eine doppelt so große Verwandtschaft hat als B, so entsteht (unter Voraussetzung einer gleichförmigen Berührung zwischen allen dreien, und daß

A und B gerade in der Menge vorhanden sind, die nöthig wäre, um jede für sich von C gesättigt zu werden) eine Theilung von C zwischen A und B, wobei $\frac{2}{3}$ von A und $\frac{1}{3}$ von B mit C gesättigt werden; und in dem rückständigen, ungesättigten Theile eines jeden, d. i. $\frac{1}{3}$ von A und $\frac{2}{3}$ von B, ist die Summe der Menge der Masse und die Größe des Verwandtschaftsgrades zusammengenommen, in beiden gleich, sie können also als zwei Kräfte, die einander das Gleichgewicht halten, angesehen werden. Da die Wirkung einer solchen schwächeren Affinität von einer anwesenden größeren Menge des schwächeren Körpers unterstützt wird, so sagt man, daß dieser durch seine chemische Masse wirke. Waren die Quantitäten von A und B nicht in dem angeführten Verhältniß zu C, sondern in einem anderen, aber von beiden zusammengenommen größer als es zur Sättigung von C nöthig ist, so bleibt eine so große Menge von einer jeden ungesättigt, daß die Verwandtschaftszahl eines jeden, mit seiner anwesenden Masse verbunden, eine gleiche Summe giebt; z. B. wenn von A bloß die halbe Quantität sich vorfindet, die nöthig ist, um C zu sättigen, aber von B die ganze Quantität, so theilt sich C unter sie auf die Art, daß $\frac{1}{2}$ einer jeden der da befindlichen Quantitäten A und B ungesättigt bleibt und $\frac{2}{3}$ von jeder gesättigt wird. Dies heißt mit wenigen Worten: Wenn zwei Körper, A und B, mit verschieden kräftiger Verwandtschaft streben, sich mit einer zur Sättigung beider unzulänglichen Menge eines dritten Körpers, C, zu verbinden, so theilt sich C zwischen diese in einem zusammengesetzten Verhältniß von ihrem ursprünglichen Verwandtschaftsgrade und von ihrer anwesenden Quantität.

So richtig diese Regel an sich ist, so trifft sie doch nie im buchstäblichen Sinn in der Natur ein, weil dazu nöthig wäre, was in der Wirklichkeit selten oder nie geschieht, daß die drei Körper A, B und C bei derselben Temperatur gleich leichtflüssig, gleich flüchtig, gleich

auf löslich oder gleich mit einander mischbar sein müssten, und daß die neuen Verbindungen, welche von ihnen hervorgebracht werden, dieselbe Leichtflüssigkeit, Flüchtigkeit, Auflöslichkeit und Mischbarkeit unter sich und mit ihren einfachen Bestandtheilen hätten; da aber dieses nicht der Fall ist, sondern da einer von diesen flüchtiger ist oder eine größere Neigung hat, eine feste Form anzunehmen, als ein anderer, so entsteht dadurch auf der einen oder der anderen Seite eine neue Kraft, welche das Gleichgewicht der streitigen Verwandtschaftsgrade stört, und welche in Zahlen muß bestimmt werden können, um die Veränderung des Resultats durch die Dazwischenkunft der neuen Kraft berechnen zu können. Es ist möglich, daß unsere Nachkommen Data zu solchen Berechnungen entdecken; wir vermissen sie bisher gänzlich. Wir haben keine Mittel zu einer sicheren Vergleichung zwischen den Affinitätsstufen, denn die Berechnung, die man einst für gegründet ansah, daß wenn eine größere Quantität eines Körpers nöthig sei, um einen anderen zu sättigen, dieser gegen den erstern einen um so größeren Verwandtschaftsgrad besitze, trifft gar nicht ein, weil z. B. eine beinahe gleiche Menge Sauerstoff nöthig ist, um 100 Th. Eisen in Eisenoxydul zu verwandeln, als 100 Th. Natrium in Alkali umzuändern, und doch hat der Sauerstoff eine unendlich vielmal größere Verwandtschaft zum letzteren als zum ersteren.

3. Wenn zwei Körper, A und B, beide zu einem dritten, C, Verwandtschaft haben, aber A zugleich zu B Verwandtschaft hat, so hat in den meisten Fällen AC Verwandtschaft zu BC, und es entsteht dabei nach den ungleichen Mengen, in welchen A, B und C anwesend sind, entweder nur eine Verbindung von AC mit BC, oder dieselbe Verbindung mit AB, AC oder BC gemengt. Z. B., wenn Schwefel, Blei und Sauerstoff sich treffen, so bildet sich, wenn die Menge des Sauerstoffs hinreichend war, schwefelsaures Bleioxyd; in einem anderen Fall entsteht ein Gemenge von schweflichtsaurem oder schwefelsaurem Bleioxyd mit Schwefelblei, u. s. w.

4. Wenn eine Verbindung, AB, eine andere, CD, trifft, und wenn A mit D und C mit B verbunden werden kann, und A und D die stärksten Verwandtschaften haben, so wechseln die Bestandtheile dieser beiden Verbindungen auf die Art um, daß die beiden stärkeren, A und D, AD hervorbringen, und die schwächeren, C und B, sich zu CB verbinden. Waren im Gegentheil A und B die stärksten, so geschieht keine Auswechslung. Beispiel: Wenn eine Auflösung von schwefelsaurem Kupferoxyd mit einer Auflösung von Chlornatrium gemischt wird, so verschwindet die schöne blaue Farbe des schwefelsauren Kupferoxyds, und das Gemenge nimmt eine grüne an, die dem Kupferchlorid angehört. Hier haben also die zwei stärksten Körper, die Schwefelsäure und die alkalische Basis, sich zu schwefelsaurem Natron verbunden, und die zwei schwächeren, das Chlor und das Kupfer, zu Kupferchlorid. Jedoch, so lange sie sich noch in der Auflösung befinden, geschieht keine vollständige Zersetzung, sondern es entsteht noch lange vorher eine Art von Gleichgewicht, so daß die Flüssigkeit noch unzersetzte Theile der ursprünglich vermischten Stoffe enthält; dadurch sind in dem eben angeführten Beispiele wirklich 4 Salze, statt 2, enthalten, nämlich Kupferchlorid, schwefelsaures Kupferoxyd, und Chlornatrium nebst schwefelsaurem Natron. Dies gilt ohne Ausnahme für alle Auflösungen, welche mehrere Körper mit einander gemengt enthalten. Löst man im Wasser z. B. 6 Salze von ungleichen Säuren und Basen auf, so entstehen daraus in der Auflösung 36 Salze, so lange sie sich nicht einander ausfällen, weil, ehe das Gleichgewicht der Vereinigungs-Verwandtschaft statt haben kann, eine Portion einer jeden Säure sich mit einer entsprechenden Portion einer jeden Base verbunden haben muß, welcher Portionen Größe ganz, nach dem in No. 2. Angeführten, auf dem ungleich starken Verwandtschaftsgrad der Bestandtheile, verbunden mit ihren vorhandenen relativen Quantitäten, beruht. Bei der Abdampfung einer solchen Auflösung setzen sich nicht 36 Salze, sondern nur gewöhnlich 6 ab, und zwar in der Ordnung,

in welcher eine Säure und Basis zusammen ein in der rückständigen Flüssigkeit unauflösliches Salz bilden kann, wie ich sehr bald weiter erklären werde. Das oben Angeführte enthält die Theorie der Mineralwasser oder anderer gemengter Salzauflösungen und der durch ihre Analyse erhaltenen Resultate.

Diese sind die allgemeinen Regeln für die Wirkungen der Vereinigungs-Verwandtschaft und ihrer verschiedenen Stufen, welche Regeln jedoch von Nebenumständen öfters so modificirt werden, daß das Resultat der Regel gänzlich entgegengesetzt zu sein scheint. Diese Nebenumstände, deren nähere Kenntniß wir beinahe nur den scharfsinnigen Forschungen Berthollet's über die Affinitätslehre zu verdanken haben, sind folgende: *a)* Der Einfluß der Temperatur zur Veränderung der Verwandtschaftsgrade. *b)* Die verschiedene Flüchtigkeit der Körper. *c)* Ihre verschiedenen Grade von Auflöslichkeit, und *d)* die verschiedene Art gewisser Körper, unter sich in Verbindung zu treten.

a) Modificationen durch Temperatur entstehen, wenn Körper bei verschiedenen Temperaturen ungleiche Verwandtschaftsgrade äußern. Wir haben gesehen, daß Quecksilber bei einer gewissen Temperatur in der Luft oxydirt, und bei einer anderen von seinem Sauerstoff getrennt und reducirt wird; daß Kobalt und Nickel bei einer gewissen Temperatur superoxydirt, und bei einer noch höheren zu Oxyden reducirt werden; daß Silber in der Siedhitze schwefelsaures Eisenoxyd zu Oxydulsalz reducirt und dabei aufgelöst wird, aber daß das Oxydulsalz in der Kälte seinen Sauerstoff wieder aufnimmt und das Silber niederschlägt, u. s. w.

b) Modificationen von der Flüchtigkeit der Körper. Wenn 2 Körper, A und B, streben, sich mit einem dritten, C, zu verbinden, und A, welcher der stärkste ist, sich schon im Besitz des ganzen C findet, so kann B dennoch A ausjagen, wenn dieser für sich allein flüchtig ist und abgedampft wird oder in Gasgestalt entweicht; denn in demselben Augenblick, als B anfängt in einem

zusammengesetzten Verhältniß seiner anwesenden Quantität und seines ursprünglichen Verwandtschaftsgrades zu wirken, so wird ein Theil von A frei und entweicht, wirkt also nicht dem Streben des Körpers B, sich mit neuen Mengen von C zu verbinden, entgegen. Wenn bei der gewöhnlichen Temperatur der Luft A nicht flüchtig ist, es aber bei einer höheren wird, so geschieht die völlige Zersetzung erst bei der Temperatur, die A zu verflüchtigen anfängt. Beispiel: Salpetersäure ist eine bei weitem stärkere Säure als die Borsäure, aber sie ist flüchtig; man kann sie daher bei einer höheren Temperatur aus ihren Verbindungen ausjagen, wenn sie mit Borsäure gemischt und destillirt werden. Das Eisenoxydul wird bei der gewöhnlichen Temperatur der Luft von Kalium zersetzt, aber Kali wird in umgekehrter Ordnung von Eisen zerlegt, bei einer Temperatur, die zur Verflüchtigung von Kalium hinreichend ist.

Wird das Entweichen des flüchtigen Körpers mechanisch verhindert, so hört die Zersetzung bei einem gewissen Grade von Pression auf. Z. B. wenn man in einem starken gläsernen Gefäße auf Stücke von kohlen saurem Kalk eine etwas verdünnte Säure gießt und das Gefäß darauf luftdicht zuschließt, so hört die Auflösung nach einer Weile auf, und der Kalk wird nicht weiter angegriffen, man mag ihn noch so lange in der Säure lassen; aber wenn der Pfropfen geöffnet wird, löst er sich in einigen Minuten wieder auf. Dasselbe geschieht, wenn Zink in einem starken und verschlossenen Gefäße in einer sehr verdünnten Schwefelsäure aufgelöst wird. Die Auflösung hört nach einer Weile auf, aber sie fängt wieder an, wenn das Gefäß geöffnet wird. Legt man ein Amalgam von Kalium in eine Auflösung von Salmiak, so werden das Wasser und der Salmiak zersetzt; verstopft man dagegen das Gefäß, so wird nur der Salmiak zerlegt, und das Amalgam wird endlich so ammoniumhaltig, daß es auf der Flüssigkeit schwimmt.

Wenn zwei zusammengesetzte Körper, AB und CD, vermischt und einer Temperatur ausgesetzt werden, die

eine Verbindung von A mit D verflüchtigen kann, so werden beide in dieser Temperatur zersetzt, wenn auch A und B den stärksten Verwandtschaftsgrad haben würde; AD wird verflüchtigt und CD bleibt zurück. Beispiel: Ein Gemenge von borsauerm Ammoniak und Kochsalz wird bei der gewöhnlichen Temperatur der Luft nicht zersetzt, aber einem höheren Wärmegrade ausgesetzt, wird Salzmik sublimirt, und es bleibt borsaures Natron zurück.

Wenn dagegen die 4 Körper, A, B, C und D, unter sich eine solche Verwandtschaft haben, daß sie zu einer einzigen Zusammensetzung, ABCD, verbunden werden können, aber eine Verbindung von B mit C bei einer höheren Temperatur flüchtig wäre, so wird ABCD in dieser Temperatur in BC, welches sich verflüchtigt, und zu AD, welches zurückbleibt, zersetzt. Beispiele hiervon geben alle diejenigen Körper, welche mit Hinterlassung der nicht flüchtigen Bestandtheile durch Destillation zersetzt werden. — Doppelsalze, worin Ammoniak und eine flüchtige Säure eingehen, werden durch Destillation auf die Art zerlegt, daß sich das Ammoniak mit der Hälfte der Säure sublimirt und die andere Basis in Verbindung mit der rückständigen Hälfte zurückbleibt. Zu dieser Modification gehören auch Knallgold, Knallsilber u. m. a., obgleich ihre explodirende Kraft sich nur durch elektrochemische Ansichten erklären läßt.

c) Modificationen von der verschiedenen Auflöslichkeit der Körper. Unsere Untersuchungen geschehen gewöhnlich mit Auflösungen, in welchen das Auflösungsmittel eine sehr wichtige Rolle spielt und öfters durch seine Affinität oder seinen Mangel an Affinität zu dem einen oder dem anderen von den Producten, ein ganz anderes Resultat bestimmt, als man nach der Regel erwarten sollte.

Wenn zwei Körper, A und B, zu einem dritten, C, Verwandtschaft haben, und streben, jeder für sich, damit verbunden zu werden, aber der eine oder der andere mit C eine im Wasser unauflösliche Verbindung giebt, so scheidet sich diese unauflösliche Verbindung ab, wenn

diese Körper, in Wasser aufgelöst, gemischt werden. Hat A zu C größere Verwandtschaft als B, aber ist BC unauflöslich, so schlägt sich, der Gegenwirkung des ursprünglichen Verwandtschaftsgrades ungeachtet, eine größere Quantität CB nieder, als sich nach der Regel würde gebildet haben, wenn CB auflöslich gewesen wäre, weil das niedergeschlagene sich der Einwirkung des aufgelösten entzogen hat, und weil die Verwandtschaft von A zum Auflösungsmittel seine Affinität zu C vermindert. Je mehr BC sich einer vollkommenen Unauflöslichkeit nähert, eine um so größere Quantität davon wird gebildet, und umgekehrt. Ist dagegen der Unterschied zwischen der Verwandtschaft von A und B zu C sehr groß, so entsteht kein BC, sondern B übt seine Verwandtschaft auf das Auflösungsmittel aus. Beispiel: Wenn eine Auflösung von salpetersaurer Kalkerde mit einer Auflösung von Weinsäure gemischt wird, so schlägt sich weinsaure Kalkerde nieder, obgleich die Weinsäure schwächer als die Salpetersäure ist, weil weinsaure Kalkerde im Wasser beinahe unauflöslich ist. Dagegen kann weder Borsäure, noch Kohlensäure die geringste Menge Kalkerde daraus niederschlagen, obgleich die Verbindung beider mit Kalkerde schwer auflöslich ist; denn die Verwandtschaft dieser Säuren ist viel schwächer als die der Salpetersäure.

Wenn zwei zusammengesetzte Körper, AB und CD, im Wasser aufgelöst und vermischt werden, und wenn A und B den stärkeren Verwandtschaftsgrad haben, aber A mit D eine unauflösliche Verbindung giebt, so wird AD sogleich niedergeschlagen, und CB bleibt in der Auflösung zurück. Ist AD nicht unauflöslich, aber nur schwer auflöslicher als AB, CD und CB, und dampft man die Auflösung ab, so schießt AD an; oder wenn AD die Neigung zu effloresciren hat, und das Gemenge sich selbst überlassen wird, so efflorescirt AD allmählich, und CB bleibt in der Auflösung zurück. Diese Modification der Regel hat sehr wenige Ausnahmen, und diese ausdrücklich nur bei solchen Gelegenheiten, wo der Unterschied zwischen den Verwandtschaftsgraden bei AB und CD

unendlich groß ist. Beispiel: Wenn eine Auflösung von Chlorcalcium mit borsäurem oder kohlen-säurem Ammoniak gemischt wird, so schlägt sich borsäure oder kohlen-säure Kalkerde nieder, weil diese Verbindung unauflöslich ist, und weil die Dazwischenkunft der Verwandtschaft des Ammoniums zum Chlor das bewirkt, was die Borsäure oder die kohlen-säure in dem oben angeführten Beispiele nicht allein zu Wege bringen konnte. — Wenn eine Auflösung von schwefelsaurer Talkerde mit einer Auflösung von Chlornatrium gemischt und die Auflösung abgedampft wird, so schießt Kochsalz während des Abdampfens an, obgleich das Natron die stärkste Basis, und die Schwefelsäure die stärkste Säure ist, weil das Kochsalz bei diesem Wärmegrade die schwerauflöslichste Verbindung ist. Wird aber das Gemenge einer Kälte von 3 Graden ausgesetzt, so krystallisirt schwefelsaures Natron, weil dieses in dieser Temperatur die schwerauflöslichste Verbindung ist. — Aus dem Gemenge von ein Wenig Kochsalz mit viel kohlen-saurer Kalkerde, welches bisweilen im Mörtel vorkommt, efflorescirt kohlen-saures Natron, welches öfters, in Form einer feinen Wolle, alte Mauern an solchen Stellen bekleidet, wo sie gegen Regen geschützt sind.

d) Modificationen eigenthümlicher Verbindungsarten der Körper, die auf einander zu wirken kommen. Wenn 2 Körper, A und B, streben, sich zwischen einem dritten, C, zu theilen, dessen Menge zur Sättigung beider nicht hinreicht, so geschieht es, daß, wenn A zu B Verwandtschaft hat, sich A zwischen C und B theilt. Beispiel: Wenn gewisse Metallsalze, z. B. Goldchlorid oder Eisenchlorid, mit überschüssigem kaustischen Ammoniak vermischt werden, so würde sich eigentlich das Chlor zwischen dem Metall und dem Ammonium theilen, welches auch geschieht, so lange das Ammoniak nicht vorwaltet; dann aber theilt sich dieses so zwischen dem Chlor und dem Metall, daß man Salmiak und Knallgold, oder ammoniakhaltiges Eisenoxyd bekommt.

Zu dieser Modification können auch die veränderten

Zersetzungserscheinungen gerechnet werden, die in der Neigung gewisser Säuren, saure Salze zu bilden, ihren Grund haben, wodurch ihre neutralen Verbindungen von den schwächsten Säuren öfters zu sauren zersetzt werden; z. B. phosphorsaure Kalkerde, welche unauflöslich ist und eine so große Vereinigungs-Verwandtschaft besitzt, daß sie von keiner der stärkeren Salzbasen zersetzt werden kann, wird von sehr schwachen Säuren mit großer Leichtigkeit zersetzt, indem sie sich in saure phosphorsaure Kalkerde verwandelt, welche dann nur von stärkeren Säuren, nach Verhältniß ihrer Masse, mit ihrem ursprünglichen Verwandtschaftsgrade zusammengelegt, zersetzt werden kann.

Hieher gehört auch sowohl die Neigung gewisser Basen, mit verschiedenen Säuren basische Salze zu bilden, als sich mit anderen Salzen zu Doppelsalzen, sowohl neutralen als basischen, verbinden zu können. So z. B. kann eine Verbindung von Schwefelsäure mit Manganoxydul, Kupferoxyd, Talkerde u. m. a., von kaustischem Ammoniak nicht vollkommen niedergeschlagen werden, weil diese, obgleich ein jeder Partikel, der sich aus seiner Verbindung scheidet, sogleich unauflöslich wird, und also aufhört, durch seine anwesende Masse der Zersetzung entgegenzuarbeiten, sich mit dem Alkali in einem gewissen Verhältnisse zum Doppelsalze verbindet, welches von mehr zugesetztem Ammoniak nicht verändert wird. Bei der Lehre von den Salzen haben wir solche Beispiele gesehen.

Unter dem Namen: prädisponirende Verwandtschaft, hat man eine andere, zu dieser Modification gehörige Veränderung der Vereinigungs-Verwandtschaft aufgeführt. Diese ist folgende:

Wenn man zu den Verbindungen, AB und CB, einen dritten Körper, D, setzt, welcher auch zu B Verwandtschaft hat, jedoch in geringerem Grade als A oder C, so müßte sich, der Regel nach, kein DB bilden. Dieses geschieht dessen ungeachtet unter folgenden Umständen:
 a) Wenn AB zu DB eine viel stärkere Verwandtschaft hat als zu CB, wobei D das stärkste C aus seiner Verbin-

dung mit B treibt, und dieses durch eine Verwandtschaft, zusammengesetzt aus der von D zu B und aus der von AB zu DB, deren Summe größer ist als die Summe der Verwandtschaft von C zu B und von AB zu CB. Beispiel: Die Zersetzung des Wassers bei der Auflösung von Eisen oder Zink in verdünnter Schwefelsäure. b) Wenn AB eine größere Verwandtschaft zu $C\frac{1}{2}B$ als zu CB hat, so verbindet sich die andere Hälfte von B mit D zu DB, durch eine Verwandtschaft, die aus der von D zu B und der von AB zu $C\frac{1}{2}B$ zusammengesetzt ist. Beispiel: Die Auflösung des Silbers in einer kochendheißen Auflösung von schwefelsaurem Eisenoxyd.

Es giebt gewiß noch mehrere Abänderungen der Verwandtschaftsgesetze, besonders bei der Zusammenwirkung mehrerer Körper; sie lassen sich jedoch alle auf die vorher angeführten einfacheren Beispiele zurückführen.

16 Geschichte der chemischen Proportionslehre.

Versuch der Theorie von den chemischen Erscheinungen, nämlich: Versuch einer theoretischen Ansicht von den chemischen Proportionen und dem chemischen Einflusse der Elektrizität in der unorganischen Natur.

I. Geschichte der Entwicklung der Lehre von den chemischen Proportionen.

Sobald man anfang, die Körper als aus einfachen Elementen zusammengesetzt zu betrachten, scheint man auch angenommen zu haben, daß in den zusammengesetzten Körpern gleiche äußere Charaktere und gleiche innere Eigenschaften eine Verbindung aus denselben Elementen in denselben Proportionen anzeigen. Schon von den Philosophen der ältesten Zeiten, wo die Erfahrung als Grundlage der Speculation noch unzureichend war, findet man diese Idee angenommen. Sie macht schon einen Theil der Philosophie des Pythagoras aus, und Philon, Verfasser des unter den apocryphischen Büchern der heiligen Schrift aufgenommenen und wahrscheinlich unter Caligula's Regierung geschriebenen Buches der Weisheit, sagt im Cap. II. v. 22.: *Gott hat Alles nach Maafs, Zahl und Gewicht geordnet.* Indessen hatten, bis auf unsere Zeit, die Philosophen nur eine dunkle Vorahnung von dieser Wahrheit; aber ohne Zweifel leitet sich von der Ueberzeugung der Richtigkeit einer solchen Idee der erste Versuch einer genauen chemischen Analyse her. Dieser Versuch ist nicht alt, und obgleich sich nicht mit Gewifsheit bestimmen läßt, welcher der

erste

erste Chemiker war, der, durch die Analyse eines Körpers, die Verhältnisse seiner Elemente zu bestimmen suchte, so ist doch so viel erwiesen, daß sich die Kunst, diese Versuche mit Genauigkeit anzustellen, erst aus der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts herschreibt; und nur ihrer Vervollkommnung verdanken wir die Theorie von den chemischen Proportionen.

Wenzel, ein deutscher Chemiker, scheint der erste gewesen zu sein, welcher seine Aufmerksamkeit auf diese Verhältnisse richtete und sie durch Versuche zu bestätigen suchte. Er unterwarf einer näheren Prüfung eine Erscheinung, welche den Chemikern schon aufgefallen war, daß nämlich zwei neutrale Salze ihre Neutralität beibehalten, nachdem sie sich gegenseitig zersetzt haben. Er legte die Resultate seiner Versuche in einer zu Dresden 1777 unter dem Titel: *Lehre von der Verwandtschaft*, herausgekommenen Schrift nieder, und zeigte, durch ungewöhnlich genaue Analysen, daß diese Erscheinung davon abzuleiten sei, daß die relativen Verhältnisse zwischen den Quantitäten von Alkalien und Erden, die eine gegebene Quantität von einer und derselben Säure sättigen, für alle Säuren dieselben sind; so daß, z. B. wenn salpetersaure Kalkerde durch schwefelsaures Kali zersetzt wird, das salpetersaure Kali und die schwefelsaure Kalkerde, welche dadurch entstehen, ihre Neutralität beibehalten, weil die Quantität von Kali, welche ein gegebenes Gewicht von Salpetersäure sättigt, sich zur Quantität von Kalkerde, welche dieselbe Menge von Salpetersäure sättigt, verhält, wie das Kali zur Kalkerde, die eine gegebene Quantität von Schwefelsäure sättigt. Die quantitativen Resultate von Wenzel's Versuchen sind genauer, als die von irgend einem andern Chemiker seiner Zeit, und der größte Theil davon ist durch die seitdem angestellten besseren Analysen bestätigt worden. Dessen ungeachtet wurden sie kaum beachtet, und man nahm, auf die Autorität bekannterer Namen, weniger genaue Resultate an, die übrigens mit der von Wenzel so gut erklärten Erscheinung im Widerspruche standen.

Bergmann, dessen Arbeiten eine so gerechte Berühmtheit erlangt haben, beobachtete ebenfalls die durch die chemischen Proportionen hervorgebrachten Erscheinungen, und setzte sie in einer zu Upsala 1782 unter dem Titel: *De diversa phlogisti quantitate in metallis*, herausgekommenen Dissertation aus einander. Er führt darin eine große Anzahl von Versuchen über die gegenseitige Fällung der Metalle an, und folgert daraus: *Phlogisti mutuas quantitates praecipitantis et praecipitandi ponderibus esse inversae proportionales*. Bergmann arbeitete viel an der Entwicklung der Affinitätslehre, und bemühte sich, die Beibehaltung der Neutralität neutraler Salze, nach ihrer gegenseitigen Zersetzung, zu erklären; allein seine Analysen, die nicht so genau waren, wie die von Wenzel, enthüllten ihm nicht die schöne, von letzterem gefundene Erklärung.

Aber es ist vorzüglich J. B. Richter, Chemiker zu Berlin, dem wir die erste positive Erklärung über die chemischen Proportionen verdanken, die er auf zahlreiche Versuche, welchen dieser Gelehrte einen großen Theil seiner Zeit gewidmet zu haben scheint, gegründet hatte. Er bestrebte sich, in seiner *chemischen Stöchiometrie*, einem Werke, worin sich freilich seine Einbildungskraft nicht immer durch die Erfahrung leiten ließ, der Chemie eine rein mathematische Form zu geben. Ohne seine Irrthümer hier weiter zu berühren, wollen wir uns bloß mit seinen wesentlichen Arbeiten über die chemischen Proportionen beschäftigen. Man findet sie in einem von ihm herausgegebenen periodischen Werke: *Ueber die neueren Gegenstände der Chemie*, mit dem oben angeführten Motto aus dem Buche der Weisheit, auseinandergesetzt. Vorzüglich enthalten das 7., 8. und 9. Stück, von 1796 bis 1798, Erfahrungen über diesen Gegenstand, welche alle Aufmerksamkeit verdienen. Er prüft darin die von Wenzel beobachtete Erscheinung, und erklärt sie auf dieselbe Art, wie letzterer. Er sucht darin die relative Sättigungscapazität der Basen und Säuren zu bestimmen. Er bemerkt ferner, daß bei der gegenseitigen

Fällung der Metalle die Neutralität der Flüssigkeit nicht verändert wird, und er giebt davon eine Erklärung, die wir noch jetzt als richtig anerkennen.

Wenn man die Arbeiten Richter's über die chemischen Proportionen liest, so ist man verwundert, daß das Studium dieses Gegenstandes auch nur einen Augenblick habe vernachlässigt werden können. Indessen findet sich in Richter's Werken ein Umstand vor, welcher dazu beiträgt, den Eindruck davon auf den Leser zu schwächen; daß nämlich die quantitativen Resultate seiner Versuche nicht sehr genau sind. In seinen Vergleichen geht er fast immer von der kohlen sauren Thonerde aus, einer Verbindung, von der wir jetzt wissen, daß sie nicht bestehen kann. Seine Versuche bedurften einer Wiederholung, um den bei dem Leser natürlicherweise entstehenden Verdacht zu vernichten, daß sein Wunsch, sein System dadurch bestätigt zu sehen, Einfluß auf ihre Resultate gehabt habe. Uebrigens ist sein Styl eigenthümlich; er nimmt die Entdeckungen der antiphlogistischen Schule an, ohne sich entschließen zu können, die Sprache der Phlogistiker gänzlich zu verlassen; und indem er die Mitte zwischen beiden Partheien zu halten suchte, mißfiel er beiden.

Man kann indessen annehmen, daß der Grund, warum die Chemiker eine Zeit lang den Arbeiten über die bestimmten Proportionen keine Aufmerksamkeit schenkten, vorzüglich in der großen Revolution lag, die um diese Zeit in der Theorie dieser Wissenschaft sich ereignete, und welche daraus zugleich mit dem Phlogiston alle schwankenden Speculationen verbannte, um an ihre Stelle das Resultat von Erfahrungen und Untersuchungen treten zu lassen. Das System von Lavoisier war fast, der alleinige Gegenstand des Nachdenkens der Chemiker, und der Kampf, welchen dieses System zu bestehen hatte, wandte ihren Geist von Allem ab, was nicht unmittelbar der neuen Theorie und ihrer Anwendung zur Erklärung der bekannten Thatsachen angehörte.

Dieses System wurde endlich allgemein angenommen,

seine entschiedensten Gegner erkannten seine Vorzüge vor denen von Stahl und Becher, und die meisten der jetzt lebenden Chemiker haben nach demselben die Wissenschaft studirt. Hierauf vertheilte sich die, lange auf diesen Punkt gerichtete Aufmerksamkeit, und man fing unter dem Geleite der neuen Theorie an, das Studium der Chemie auf alle Theile dieser Wissenschaft zu lenken. Man kann also sagen, daß die Entwicklung des Principes von den chemischen Proportionen eine Zeit lang durch die des antiphlogistischen Systemes, das zu derselben Zeit entstand, unterbrochen wurde.

Man findet in den Schriften von Lavoisier nichts Positives über die chemischen Proportionen, wenn man nicht dafür die von ihm gemachte Unterscheidung zwischen Lösung und Auflösung nehmen will; indem die eine in allen Verhältnissen statt haben kann, während die andere, die Natur des aufgelösten Körpers verändernd, nur bestimmte und unveränderliche Proportionen zuläßt.

Einige Zeit nach der Gründung des Systems von Lavoisier, machte Berthollet, einer seiner berühmtesten Mitarbeiter, ein Werk, unter dem Titel: *Essai de statique chimique*, Paris 1802, bekannt, worin er, auf eine wahrhaft philosophische Weise, die chemischen Affinitäten und die davon abhängenden Erscheinungen auseinandersetzte. Er suchte in dieser Schrift zu zeigen, daß die thätigen Kräfte nicht so zahlreich seien, wie man es nach der Mannigfaltigkeit der Erscheinungen voraussetzen könnte; er zeigte, wie wahrscheinlich es sei, daß letztere durch die Wirkung einer und derselben Grundkraft hervorgebracht würden; so wie, daß die Kraft, wodurch die Körper von der Erde angezogen werden, dieselbe ist, wie die, welche die Planeten in ihren Bahnen um die Sonne erhält. Er sah voraus, man werde einst dahin gelangen, die Wirkungen der ersteren dieser Kräfte eben so zu berechnen, wie man schon lange die Wirkungen der letzteren berechnet hat. Indem Berthollet diese Ideen entwickelte, bemühte er sich zu zeigen, daß der vorgegeb-

liche Unterschied zwischen Lösung und Auflösung in nichts anderem besteht, als in den verschiedenen Graden von Kraft einer und derselben Affinität, indem der Grad der ersteren viel schwächer als der der zweiten sei. Die Elemente, sagte er, haben ihr Maximum und Minimum, über welches hinaus sie sich nicht verbinden können; aber zwischen diesen beiden Grenzen können sie es in allen Proportionen. Wenn sich die Körper in bestimmten und unveränderlichen Verhältnissen verbinden, so hängen diese Erscheinungen von anderen Umständen ab, wie von der Cohäsion, wodurch eine Verbindung die Neigung hat fest zu werden, und von der Expansion, wodurch sie in den gasförmigen Zustand übergeht. Die bei ihrer Verbindung eine starke Condensation erleidenden Verbindungen vereinigen sich immer in bestimmten Proportionen; so z. B. verbinden sich Sauerstoffgas und Wasserstoffgas nie anders als in einem einzigen Verhältnisse; bleiben aber, auf der anderen Seite, die verbundenen Elemente in demselben Zustande von Dichtigkeit, so finden die Verbindungen in allen Proportionen zwischen dem Maximum und Minimum statt. Nach dieser Ansicht hängt die Unveränderlichkeit in den Verhältnissen der Elemente der Säuren, der Salze u. s. w., nur von der Krystallisation, der Niederschlagung, oder, wenn sie in gasförmigem Zustande sind, von der Condensation ab. Berthollet stellte eine Menge sinnreicher Versuche an, um die Wahrheit dieser Behauptung zu zeigen; und wenn wir auch jetzt finden, daß sie nicht hinreichend genügend die Menge der durch neuere Arbeiten entdeckten Thatsachen erklärt, so muß man doch gestehen, daß dieser Gelehrte seine Meinungen, so wie die Thatsachen, auf welche er sie stützt, mit einer Klarheit und einem Scharfsinne auseinandergesetzt hat, die zur Ueberzeugung hinreißen können. Bei Prüfung der Angaben von Richter über die Sättigungscapacitäten der Basen und Säuren, fand er andere Zahlen, wie letzterer.

Berthollet bewies auf eine entscheidende Art, daß die Intensität der chemischen Thätigkeit der Körper unter

einander nicht bloß von dem Grade ihrer Affinität herührt, sondern daß sie auch von der Quantität des sie ausübenden Körpers, das heißt von der Masse abhängt. Diese Erscheinung findet indessen nur statt, wenn die Körper, welche sich mit einander zu verbinden streben, und die daraus entspringenden neuen Verbindungen in gegenseitiger Berührung bleiben, d. h. wenn sie ihre flüssige Form oder ihren aufgelösten Zustand beibehalten*).

† Berthollet's *Statique chimique* veranlaßte zwischen ihm und Proust einen Streit über die bestimmten Proportionen mehrerer Verbindungen, merkwürdig sowohl durch die Gründlichkeit der Argumente beider Parteien, als durch den gemäßigten Ton, womit er geführt wurde. Man glaubte anfangs, daß die bei Flüssigkeiten constanten Wirkungen der Thätigkeit der chemischen Masse sich auch auf feste Verbindungen, wie auf die Metalloxyde, erstrecken könnten, indem man annahm, daß zwischen dem Maximum und Minimum der Oxydation eines Metalles eine unbestimmte Anzahl von Stufen statt finden könne. Proust bestrebte sich vorzüglich, die Unrichtigkeit dieser Idee zu beweisen, und zeigte, daß die Metalle sowohl mit dem Schwefel als mit dem Sauerstoff nur eine oder zwei Verbindungen in bestimmten und unveränderlichen Proportionen hervorbringen, und daß alle Zwischenstufen, welche man beobachtet zu haben glaubte, in der That nur Gemenge der beiden bestimmten Verbindungen seien. Berthollet vertheidigte sich mit einem Scharfsinne, welcher die Leser in ihrem Urtheile zweifel-

*) Dieser Umstand scheint dem Principe der allgemeinen chemischen Proportionen nicht günstig zu sein; er wäre sogar damit in völligem Widerspruche, wenn nicht erwiesen werden könnte, daß die Verbindung eines festen Körpers mit einer Flüssigkeit, welche denselben ohne Veränderung seiner chemischen Eigenschaften auflöst, verschieden ist von einer sogenannten chemischen Verbindung; z. B. der Salpeter verbindet sich mit dem Wasser in einer Auflösung dieses Salzes auf eine ganz andere Art, wie die gewöhnliche kohlensaure Talkerde mit einer gewissen Menge Wassers verbunden ist, das einen wesentlichen Bestandtheil davon ausmacht, das ihr aber keinen flüssigen Zustand und keine Auflöslichkeit ertheilt.

haft machte, selbst wenn eigene Erfahrung ihnen zu Gunsten der Meinungen von Proust sprach; aber die große Masse der nachher angestellten Analysen entschied endlich die Frage zu Gunsten der Ansicht des letzteren Gelehrten.

Einige Zeit vor den Arbeiten von Richter und Berthollet hatte Higgins, ein irländischer Gelehrter, ein Werk, unter dem Titel: *A comparative view of the phlogistic and antiphlogistic theories* (1789), herausgegeben, in welchem er unter einem neuen Gesichtspunkte die verschiedenen zwischen denselben Körpern möglichen Verbindungsgrade betrachtete. Er stellte darin die Idee auf, daß die Körper aus Partikeln oder Atomen zusammengesetzt seien. Nach ihm bringt ein neues Atom von Sauerstoff, wenn es einem Oxyde, d. h. einem, aus einem Atom Radikal, und einem Atom Sauerstoff zusammengesetzten Körper, noch zugefügt wird, eine neue Oxydationsstufe hervor. Indessen schien Higgins selbst wenig Gewicht auf diese Hypothese zu legen, deren Wahrheit er außerdem durch keinen analytischen Versuch zu erweisen suchte; er ahnete nicht einmal die multipeln Verhältnisse, welche davon eine nothwendige Folge sind. Sein Werk erregte wenig Aufmerksamkeit und gerieth bald in Vergessenheit *).

Funfzehn Jahre nachher stellte John Dalton dieselbe Idee wieder auf; er machte aber davon eine ausgedehntere Anwendung auf die chemischen Erscheinungen, und suchte sie durch die Resultate besserer Analysen zu bekräftigen. Die ersten, von Dalton über diesen Gegenstand herausgegebenen Schriften, setzten sie nicht so klar aus einander, daß sie große Aufmerksamkeit erregt hätten, und nur wenige Chemiker erkannten ihre Tendenz. In Nicholson's Journal lies Dalton 1807 eine kleine

*) Dreißig Jahre später bemühte sich Higgins zu erweisen, daß er durch diese Hypothese, von der er nur eine sehr beschränkte Anwendung gemacht hatte, Ansprüche habe als der Entdecker der multipeln Proportionen zu gelten.

Tabelle von den absoluten Gewichten einiger Körper, d. h. über die relativen Mengen, in welchen sich die Körper vorzugsweise verbinden, oder über die relativen Gewichte ihrer Atome, einrücken. In dem folgenden Jahre gab er den ersten Band eines neuen Systems der Chemie, unter dem Titel: *New System of chemical Philosophy*, wovon der zweite Band 1810 erschien, heraus. Nach diesem Systeme sind die Körper aus Atomen zusammengesetzt; und ein Atom eines Elementes kann sich mit 1, 2, 3 etc. Atomen eines anderen Elementes, aber nicht mit Zwischenstufen oder Brüchen von Atomen, verbinden. Eben so kann sich ein Atom eines zusammengesetzten Körpers mit 1, 2, 3 etc. Atomen eines anderen zusammengesetzten Körpers verbinden. Diese Hypothese wurde hernach durch zahlreiche Versuche bestätigt, und man kann ohne Uebertreibung sagen, daß dies einer der größten Schritte ist, welchen die Chemie zu ihrer Vervollkommnung gemacht hat. Dalton nimmt an, daß sich die elementaren Atome vorzugsweise eines mit einem verbinden, und so oft wir nur eine einzige Verbindung zwischen zwei Substanzen kennen, betrachtet er sie als aus einem Atom einer jeden zusammengesetzt. Giebt es mehrere, so betrachtet er die erste zusammengesetzt, z. B. aus $A+B$, die zweite aus $A+2B$, die dritte aus $A+3B$ u. s. w. In seinem neuen System der Chemie hat Dalton die oxydirten Körper untersucht, und giebt die, nach ihm darin enthaltene Anzahl von Atomen an. Indessen scheint dieser ausgezeichnete Gelehrte in dieser Arbeit zu wenig von der Erfahrung ausgegangen zu sein, und vielleicht ist er nicht mit hinreichender Vorsicht zu Werke gegangen, indem er die neue Hypothese auf das chemische System anwandte. Es hat mir geschienen, als könne man bei der kleinen Anzahl der von ihm angegebenen Analysen bisweilen das Bestreben des Operators, ein gewisses Resultat zu erhalten, bemerken; und gerade davor hat man sich nicht genug in Acht zu nehmen, wenn man Beweise für oder gegen eine vorgefaßte Theorie sucht. Dessen ungeachtet gebührt Dalton die Ehre der Entdeckung von diesem Theile der chemischen Proportionen,

welche wir die multipeln Proportionen nennen, und die keiner seiner Vorgänger beobachtet hatte. Sie machen, so zu sagen, die Basis der chemischen Proportionen aus; sie sind aber nicht die ganze Theorie davon, und reichen nicht aus, die Erscheinungen der chemischen Proportionen, so wie wir sie beobachtet haben, zu bestimmen, wie man weiter unten sehen wird. Zu derselben Zeit, als Dalton sein System herausgab, lehrte er es auch öffentlich in England, und dies, so wie eine von Wollaston über die multipeln Proportionen der Oxalsäure in ihren drei Verbindungen mit dem Kali in Nicholson's Journal, im November 1808 bekannt gemachte Abhandlung, lenkte die Aufmerksamkeit der Chemiker immer allgemeiner auf diesen Theil der Wissenschaft.

Bei einer Arbeit über die Eudiometrie fanden Humboldt und Gay-Lussac im J. 1806, daß sich ein Volum Sauerstoffgas mit zwei Volumen Wasserstoffgas zu Wasser verbinden. Bei Fortsetzung der Untersuchungen, welche diese Beobachtung veranlaßt hatte, entdeckte Gay-Lussac einige Zeit nachher, daß sich die gasförmigen Körper im Allgemeinen auf eine solche Weise verbinden, daß ein Maafs Gas 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3 u. s. w. Maafs eines anderen Gases absorhirt, das heisst, daß sich die Gase entweder zu gleichen Volumen verbinden, oder daß das Volum des einen ein Multipel von dem des anderen ist. Seine Abhandlung: *Sur la combinaison des substances gazeuses les unes avec les autres*, findet sich in den *Mémoires d'Arcueil*. T. 2. Paris 1809. Wenn man Atom statt Volum sagt, und man sich die Körper in festem, statt in gasförmigem Zustande vorstellt, so findet man in der Entdeckung von Gay-Lussac einen der unmittelbarsten Beweise zu Gunsten der Hypothese von Dalton. Gay-Lussac begnügte sich damit, die Verhältnisse, in welchen sich die gasförmigen Substanzen verbinden, gezeigt zu haben, welche Verbindungen, nach der *Statique* von Berthollet, immer in bestimmten Proportionen statt finden sollten, und machte keine allgemeinere Anwendung von dieser Entdeckung.

Dalton, statt mit der Bestätigung, womit die Ver-

suche Gay-Lussac's seine speculativen Versuche krönen, zufrieden zu sein, wollte zeigen, daß sich dieser Gelehrte geirrt habe, und daß sich die gasförmigen Körper nicht in gleichen Maaßtheilen verbänden. Indessen wurden Gay-Lussac's Versuche durch die anderer Chemiker bestätigt, und jetzt hält man die von ihm daraus abgeleiteten allgemeinen Resultate für völlig erwiesen. Auch bei den Untersuchungen über die gegenseitige Fällung der Metalle, erhielt er dieselben Resultate wie Bergmann und Richter.

Endlich, um diese kleine historische Aufstellung der auf die chemischen Proportionen Bezug habenden Arbeiten zu beschließen, muß ich noch hinzufügen, daß ich mich seit dem Jahre 1807 anhaltend mit ihrem Studium beschäftigt habe. Die aus meinen Arbeiten über diesen Gegenstand entsprungenen, verschiedenen Abhandlungen findet man in dem schwedischen Werke: *Afhandlingar i Fysik, Kemi och Mineralogi. T. 3, 4, 5 und 6.* so wie auch in den Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Stockholm, für das Jahr 1813.

Da ich beabsichtigte, ein Lehrbuch der Chemie herauszugeben, ging ich, unter anderen, nicht allgemein gelesenen Werken, auch die Abhandlungen von Richter durch, von denen oben die Rede war. Ich erstaunte über das darin verbreitete Licht hinsichtlich der Zusammensetzung der Salze und der gegenseitigen Fällung der Metalle, woraus man noch keinen Vortheil gezogen hatte. Aus den Untersuchungen von Richter geht hervor, daß man, vermittelst guter Analysen von einigen Salzen, mit Genauigkeit die Zusammensetzung aller anderen berechnen könne. Ich gab in meinem Lehrbuche Th. I. p. 398., der ersten Ausgabe von 1807, eine kurze Uebersicht davon, und nahm mir zugleich vor, die Analyse von einer Reihe von Salzen zu machen, wodurch die Analyse der anderen überflüssig werden würde. Es ist klar, daß wenn man alle von einer Säure, z. B. alle von der Schwefelsäure mit allen Basen, und alle von einer Base, z. B. von der Baryterde mit allen Säuren, gebildeten Salze analysirt, man

die nöthigen Data haben wird, um die Zusammensetzung aller, durch eine doppelte Zersetzung, mit Beibehaltung ihrer Neutralität, gebildeten Salze zu berechnen. Während der Ausführung dieses Vorsatzes entdeckte H. Davy die Zusammensetzung der Alkalien. Ich fand, so wie andere Chemiker, daß das Ammoniak an dem negativen Pole der elektrischen Säule einen mit den Eigenschaften eines Metalles begabten Körper gebe, und ich zog daraus den Schluß, daß dieses Alkali ebenfalls als ein Oxyd betrachtet werden müsse, dessen Sauerstoffmenge, wiewohl unmöglich durch einen unmittelbaren Versuch zu bestimmen, nach den oben erwähnten Fällungs-Erscheinungen der Metalle berechnet werden müsse. Das Studium dieser Erscheinungen mußte daher zu meinen Untersuchungen gehören, und als ich von Dalton's Ideen über die multipeln Proportionen Kenntniß hatte, fand ich in der Anzahl von Analysen, wovon ich schon die Resultate hatte, eine solche Bestätigung dieser Theorie, daß ich mich nicht enthalten konnte, die erwähnten Erscheinungen zu untersuchen; und auf diese Art vergrößerte sich der Plan meiner, über einen anfangs nur sehr begränzten Theil der chemischen Proportionen unternommenen Arbeit immer mehr und umfaßte endlich die Proportionen in ihrer ganzen Ausdehnung, von der ich, bei dem Anfange meiner Versuche, weit entfernt war, mir eine richtige Idee zu machen. Sie gaben anfangs ganz andere Resultate, als ich erwarten zu müssen glaubte. Bei Wiederholung derselben und durch Abänderung der dabei befolgten Methoden entdeckte ich die begangenen Fehler; durch die Kenntniß meiner eigenen Irrthümer aufgeklärt und mit Hülfe besserer Methoden fand ich endlich eine große Uebereinstimmung zwischen dem Resultate der Analysen und den Berechnungen der Theorie. Die Vergleichung dieser Resultate entwickelte stufenweise neue Ansichten, die erwiesen werden mußten, so daß die Arbeit an Umfang und vielleicht auch an Wichtigkeit zunahm.

II. Ueberblick der Theorie von den chemischen Proportionen und ihrer Ursache.

Jede Theorie ist nichts Anderes, als eine Art, sich das Innere der Erscheinungen vorzustellen. Sie ist zulässig und ausreichend, so lange sie die bekannten That-sachen erklären kann. Sie kann indessen unrichtig sein, obgleich sie in einer gewissen Periode der Entwicklung der Wissenschaft derselben eben so gut wie eine wahre Theorie dient. Die Anzahl der Erfahrungen vermehrt sich; man entdeckt That-sachen, die sich nicht mehr mit der Theorie vereinigen lassen, man ist genöthigt eine andere, auf diese neuen That-sachen passende Erklärung zu suchen, und so wird man wahrscheinlich von Jahrhundert zu Jahrhundert die Vorstellungsarten von den Erscheinungen in den Wissenschaften verändern, ohne vielleicht je die wahren zu treffen; aber selbst wenn es unmöglich wäre, dieses Ziel unserer Arbeiten zu erreichen, müssen wir uns nicht weniger anstrengen, uns ihm zu nähern.

Bei der, von jeder rein theoretischen Speculation unzertrennlichen Ungewissheit, geschieht es bisweilen, daß zwei verschiedene Erklärungen statt finden können; dann wird es nothwendig, sie beide zu studiren, und wenn auch unsere Ungewissheit dadurch vermehrt wird, so wird sie doch nicht die zur Auffindung der Wahrheit gemachten Anstrengungen vermindern, weil der wahre Gelehrte, der sich mehr bestrebt zu wissen, was ist, als zu glauben, die Wahrscheinlichkeiten studirt, und keiner Meinung den Vorzug giebt, wenn er nicht auf entscheidenden Beweisen beruht.

Die Wissenschaften erfordern immer eine Theorie, um unsere Ideen in eine gewisse Ordnung zu bringen, ohne welche die Einzelheiten zu schwer zu behalten wären. Wir haben eine Theorie, wenn sie alle bekannten That-sachen erklärt. Wenn sie einmal allgemein angenommen ist, so ist es für die Wissenschaft oft sehr nützlich, zeigen zu können, daß die Erscheinungen noch eine an-

dere Erklärung zulassen; aber daraus folgt nicht, daß die erste als unrichtig betrachtet werden müsse, und es ist immer eine tadelnswerthe Neuerung, eine schon angenommene Erklärungsart mit einer neuen zu vertauschen, deren Richtigkeit nicht auf größere Wahrscheinlichkeiten gegründet ist. Es ist daher nothwendig, zuvor zu beweisen, daß die allgemein angenommene unrichtig und daher eine andere nothwendig sei. Hinsichtlich der an ihre Stelle gesetzten läßt sich nichts Anderes beweisen, als daß sie mit den zur Zeit bekannten Thatsachen besser übereinstimme.

Die Entdeckungen über die chemischen Proportionen und über den durch die Elektrizität auf die chemischen Affinitäten ausgeübten Einfluß erfordern eine Aenderung in der jetzigen Erklärungsweise der Erscheinungen, und hierdurch wird der Versuch, eine neue, mit den Thatsachen besser im Einklange stehende zu finden, gerechtfertigt.

Nachdem man sich überzeugt hat, daß sich die Elemente, vorzüglich in der unorganischen Natur, in gewissen einfachen und bestimmten Proportionen, zwischen welchen keine Zwischenstufen statt finden, mit einander vereinigen, muß man eine Idee von der Ursache dieser merkwürdigen Erscheinung zu bekommen suchen.

Die speculative Philosophie gewisser deutscher Schulen schuf, als sie sich auf die Theorien der Naturwissenschaften auszudehnen anfang, nicht ohne ein gewisses Vorgefühl der Wahrheit, ein neues System, welches man das dynamische nannte, weil es als Grundsatz aufstellte, die Materie sei das Resultat zweier, einander in entgegengesetzter Richtung entgegenstrebender Kräfte, wovon die eine contractiv, und die andere expansiv sei, und wovon die erstere, wenn sie die andere gänzlich überwände, die Materie des Universums zu einem mathematischen Punkt reduciren würde. Diese Theorie nimmt an, daß sich die Elemente, im Augenblicke ihrer chemischen Vereinigung, gegenseitig durchdringen, und daß die Neutralisation ihrer chemischen Eigenschaften, welche meistens das Resultat

dessen alle Wahrscheinlichkeiten wohl beachten, so haben wir allen Grund, uns die elementaren Körper unter einer sphärischen Gestalt vorzustellen, weil diese diejenige ist, welche die Materie annimmt, wenn sie nicht mehr dem Einflusse fremder Kräfte ausgesetzt ist.

Von einer anderen Seite müssen wir uns die Atome der zusammengesetzten Körper unter einer bestimmten, nicht sphärischen Gestalt vorstellen, welche von der Zahl der elementaren Atome und ihrer gegenseitigen Stellung abhängig ist. Es ist möglich, daß die Atome der verschiedenen elementaren Körper verschiedene Größe haben, es ist aber auch möglich, daß sie gleich groß sind *).

Die

*) Was die relative Größe der einfachen Atome betrifft, so haben wir gewiß gar keine soliden Gründe, auf welche wir unsere Vermuthungen stützen könnten. Vielleicht haben sie alle eine gleiche Größe; aber in diesem Falle ist es schwer einzusehen, warum sie nicht alle gleich schwer sind, um so mehr, da die Pendel-Versuche von Newton zeigen, daß dieselbe Quantität von Materie immer gleich gravitirt; und bei den Atomen kann die Verschiedenheit nicht durch die Porosität der Materie erklärt werden. Vielleicht sind sie auch, innerhalb gewisser Grenzen, von verschiedenen Größen; und hieraus kann die Verschiedenheit in den regelmäßigen Gestalten, welche der größte Theil der unorganischen Verbindungen annimmt, kommen; denn wenn alle Atome absolut dieselbe Größe hätten, so müßte eine gleiche Anzahl verschiedener auf dieselbe Art verbundener Atome, eine der, der zusammengesetzten Atome ähnliche Form geben; so daß z. B. die integrierenden Molecule der wasserfreien schwefelsauren Kalkerde, der schwefelsauren Baryterde und schwefelsauren Strontianerde vollkommen dieselbe Form haben müßten, weil darin die Anzahl einfacher Atome wahrscheinlich dieselbe ist, und sie auch auf dieselbe Art verbunden sind. Mitscherlich hat gezeigt, daß dies in einem gewissen Grade statt findet, wodurch Verbindungen aus ungleichen Elementen entstehen, welche dieselbe Krystallform haben, wenn sie dieselbe Anzahl von Atomen enthalten. Wir werden weiter unten auf diesen wichtigen Gegenstand zurückkommen. — Zugleich kommt es darauf an, zu wissen, ob die Größe dieser Atome in umgekehrtem Verhältnisse zu ihrem Gewichte steht, was indessen nicht wohl annehmbar zu sein scheint; denn in diesem Falle müßte das Atom des Platins $182\frac{1}{2}$ Mal, und das des Sauerstoffs 16 Mal größer sein als das Atom des Wasserstoffs. Wir finden, im Gegentheile, daß bei der Krystallisation des Wassers (welches wir aus zwei Atomen Wasserstoff und einem Atom Sauerstoff zusammengesetzt

Die Größe der zusammengesetzten Atome dagegen muß sehr verschieden sein, wegen der Anzahl elementarer Atome, woraus sie bestehen; denn es ist klar, daß das aus $A + 2B$ zusammengesetzte Atom einen größeren Raum einnehmen muß, als das aus $A + B$.

Je mehr sich übrigens die Einbildungskraft, ohne die Erfahrung zu Rathe zu ziehen, freien Lauf läßt in dem Aufbaue ihrer Theorien, um so weniger verdienen sie Vertrauen. Man muß sich wohl hüten, sie weiter hinaus zu erstrecken, als zur Erklärung der Erscheinungen nothwendig ist; aus diesem Grunde werden wir von dieser Seite unsere hypothetischen Forschungen nicht weiter verfolgen.

Die Vorstellung von Atomen widerstreitet der von einer gegenseitigen Durchdringung der Körper. Nach derjenigen Vorstellungsart von den Atomen, welche wir die Corpusculartheorie nennen, besteht die Vereinigung in der Juxtaposition der Atome, welche von einer Kraft abhängig ist, die zwischen verschiedenartigen Atomen die chemische Verbindung, und zwischen gleichartigen Atomen den mechanischen Zusammenhang (Cohäsion) bewirkt. Wir werden weiter unten auf unsere Vermuthungen über diese Kraft zurückkommen. Wenn sich zwei Atome von verschiedenen Körpern verbunden haben, so entspringt daraus ein zusammengesetztes Atom, von dem wir annehmen, daß die die Vereinigung bewirkende Kraft unendlich viel Mal die Wirkung aller Umstände übertrifft, welche die verbundenen Atome mechanisch zu trennen be-

betrachten) die Gestalt, welche es annimmt, Winkel habe, welche denjenigen gleich sind, die aus der Juxtaposition dreier gleich großer Kugeln entspringen, oder welche man bei einer Krystallform findet, die aus der Vereinigung mehrerer aus gleichen Kugeln zusammengesetzter Molecule entsteht. Erwägt man daher die verschiedenen Gründe, auf welchen unsere Vermuthungen über diesen Gegenstand beruhen könnten, so findet man keinen von solchem Uebergewicht, um den Ausschlag auf einer Seite geben zu können. Das fortgesetzte Studium der Krystallotomie der primitiven Gestalten und der integrirenden Molecule wird ohne Zweifel mit der Zeit unsere Einsichten in der Hinsicht vermehren.

streben. Dieses zusammengesetzte Atom muß als eben so mechanisch untheilbar betrachtet werden, wie das elementare Atom.

Diese zusammengesetzten Atome verbinden sich mit anderen zusammengesetzten Atomen, woraus noch zusammengesetztere Atome entspringen. Verbinden sich diese mit anderen, so entstehen Atome von einer noch complicirteren Zusammensetzung. Es ist nothwendig, diese verschiedenen Atome unterscheiden zu können. Wir werden sie in Atome der ersten, zweiten, dritten u. s. w. Ordnung eintheilen. Die Atome der ersten Ordnung sind aus einfachen elementaren Atomen zusammengesetzt; sie sind von zweierlei Art, organische und unorganische. Diese enthalten nie mehr als zwei Elemente; jene enthalten, mit wenigen Ausnahmen, wenigstens drei. Die zusammengesetzten Atome der zweiten Ordnung entspringen aus zusammengesetzten Atomen der ersten Ordnung; die Atome der dritten aus denen der zweiten u. s. w. Zum Beispiel: Schwefelsäure, Kali, Thonerde und Wasser sind alle zusammengesetzte Atome der ersten Ordnung, weil sie nur aus dem Radical und Sauerstoff bestehen; schwefelsaures Kali und schwefelsaure Thonerde sind zusammengesetzte Atome der zweiten Ordnung; der trockene Alaun, welcher eine Verbindung dieser beiden letzteren Salze ist, bietet ein Beispiel von einem Atom der dritten Ordnung dar, und endlich kann der krystallisirte Alaun, der mehrere mit einem Atome vom Doppelsalze verbundene Atome Wasser enthält, als ein Beispiel von zusammengesetzten Atomen der vierten Ordnung angeführt werden. Man weiß noch nicht, bis zu welcher Zahl die Ordnungen steigen können. Die Affinität zwischen den zusammengesetzten Atomen nimmt sehr schnell ab, in dem Maasse als sich die Anzahl der Ordnungen vermehrt, und der Verwandtschaftsgrad, der sich noch bei den Atomen der dritten Ordnung findet, ist meistens zu schwach, um bei den schnellen und gestörten Operationen in unseren Laboratorien bemerkt werden zu können. Diese Affinität offen-

bert sich gewöhnlich nur in den Verbindungen, welche sich während des langsamen und ruhigen Ueberganges unserer Erde in den festen Zustand bildeten, das heißt in den Mineralien. Um ihre Natur recht zu kennen, wäre es wichtig zu wissen, bis wie weit die Vereinigung der zusammengesetzten Atome gehen könne, und welches die letzte Ordnung sei. Was die organischen Atome betrifft, so weiß man eben so wenig, in wie viel verschiedenen Ordnungen sie sich, sowohl unter sich als mit zusammengesetzten unorganischen Atomen, verbinden können.

Wenn es selbst hinreichend erwiesen wäre, daß die Körper, wie wir eben erwähnten, aus untheilbaren Atomen zusammengesetzt wären, so folgte daraus nicht, daß die Erscheinungen der chemischen Proportionen, zumal die, welche wir in der unorganischen Natur beobachtet haben, nothwendigerweise statt finden müssen. Es bedarf noch des Vorhandenseins gewisser Gesetze, welche die Verbindungen der Atome ordnen und ihnen gewisse Grenzen bestimmen; denn es ist klar, daß wenn sich eine unbestimmte Anzahl von Atomen eines Elementes mit einer ebenfalls unbestimmten Anzahl von Atomen eines andern Elementes verbinden könnte, es eine unendliche Anzahl von Verbindungen gäbe, zwischen welchen der Unterschied der relativen Menge der constituirenden Theile meistens zu klein wäre, um, selbst bei unseren genauesten Versuchen, bemerklich zu sein. Es sind also vorzüglich diese Gesetze, von welchen die chemischen Proportionen abhängen.

Wir wollen nun die Verhältnisse durchgehen, in welchen sich einfache und zusammengesetzte Atome in der unorganischen Natur, nach den bisher gemachten Erfahrungen, verbinden.

1. Verhältnisse, in welchen sich die Atome einfacher Körper verbinden.

1) Ein Atom von einem Element verbindet sich mit 1, 2, 3 etc. Atomen eines andern Elementes.

Welches die höchste Anzahl von Atomen ist, welche sich auf diese Weise mit einem Atom verbinden kann, ist unbekannt. Gehen wir von der mechanischen Vorstellung von sphärischen Atomen aus, so kann eine Kugel von nicht mehr als 12 gleich großen Kugeln berührt werden, die sie dann von allen Seiten umschließen. Betrachten wir die Sauerstoff-Verbindungen, welche am besten untersucht sind, so finden wir keine bestimmten höheren Verbindungsgrade als 1 Atom Radikal mit 3 Atomen Sauerstoff. Aber unter den Verbindungen des Schwefels haben wir einige, die höher gehen, z. B. mit Arsenik, und in den graphitartigen Verbindungen des Eisens, Mangans und Nickels mit Kohlenstoff, scheint der letztere in einer großen Anzahl von Atomen enthalten zu sein; aber alle diese Verbindungen, in welchen ein Atom vom einen Elemente mit mehr als 4 Atomen vom anderen verbunden ist, sind in der unorganischen Natur schon Seltenheiten, welche sich von den gewöhnlicheren Verhältnissen entfernen.

Bei diesen Verbindungen ist das elektropositive Element gewöhnlich Einheit, und das elektronegative ist darin zu mehreren Multipeln enthalten. Jedoch ist dies keine allgemeine Regel, denn wir haben Verbindungen von z. B. einem Atom Schwefel mit 8 Atomen Eisen (erste Schwefelungsstufe des Eisens, T. II. p. 363.), und von einem Atom Schwefel mit 12 Atomen Arsenik im schwarzen oder braunen Schwefelarsenik (ebendasselbst p. 44.), in welchen beiden der Schwefel das negative Element ist.

Bei unseren ersten Forschungen über die chemischen Proportionen in der unorganischen Natur, sah es anfangs aus, als wäre es der Hauptcharakter der unorganischen Verbindungsweise gewesen, daß in jede Verbindung ein Element nur zu einem Atom eingehen würde. Die Erfahrung hat uns nachher gelehrt, daß dem nicht so ist, daß aber die Anzahl der Verbindungs-Verhältnisse nur sehr geringe ist, und daß zu dem, was ich schon angeführt habe, nur Folgendes noch gefügt werden kann:

2) Zwei Atome eines Elementes können sich

mit 3 und mit 5 Atomen eines anderen Elementes verbinden, wobei es am gewöhnlichsten das elektropositive Element ist, welches die 2, und das elektro-negative, welches die 3 und die 5 Atome ausmacht.

Aber hierbei entsteht eine höchst interessante Frage, die wir zwar noch nicht mit voller Gewißheit beantworten können, deren Berührung aber doch von großer Wichtigkeit ist: Gibt es zusammengesetzte Atome, welche aus 2 Atomen vom einen Elemente und 2 Atomen vom anderen bestehen, oder aus 2 Atomen vom einen Elemente und 4 oder 6 Atomen vom anderen, welche nicht aus der geringeren Anzahl 1 Atom mit 1, 1 Atom mit 2 und 1 Atom mit 3 bestehen können?

Wasser besteht aus zwei Atomen Wasserstoff und einem Atom Sauerstoff. Wenn dasselbe ein Atom Sauerstoff aufnimmt, so wird das Wasserstoffsperoxyd gebildet. Entstehen nun 2 Atome Wasserstoffsperoxyd, zusammengesetzt aus einem Atom eines jeden Elementes, oder nur ein Atom, zusammengesetzt aus zwei eines jeden Elementes?

Ammoniak besteht, dem Gewichte nach, aus einem Atom Stickstoff und 3 Atomen Wasserstoff, welche, wie wir später sehen werden, dasselbe sind, wie 1 Volumen Stickstoff und 3 Volumen Wasserstoff, condensirt von 4 Volumen zu zwei (Th. I. p. 788.), so daß das Ammoniak $1\frac{1}{2}$ Mal sein Volum Wasserstoffgas enthält. Vergleichen wir die Quantitäten Ammoniaks, welche sich mit der einem Atomgewicht entsprechenden Quantität einer Säure, z. B. Schwefelsäure oder Kohlensäure, verbinden, mit wenigen Worten, die Quantität Ammoniaks, welche mit den Säuren neutrale Salze giebt, mit ihrem Atomgewicht, so finden wir, daß sie 2 Atome Stickstoff und 6 Atome Wasserstoff enthält, gleich wie die Quantität Salpetersäure, wovon das Atomgewicht der Basen gerade neutralisirt wird, 2 Atome Stickstoff und 5 Atome Sauerstoff enthält. Hat man dann nicht eben so gut Ursache, anzunehmen, 1 Atom Ammoniak bestehe aus 2 Atomen

Stickstoff und 6 Atomen Wasserstoff, als wir annehmen, daß das Atom der Salpetersäure aus 2 Atomen Stickstoff und 5 Atomen Sauerstoff bestehe, was nicht bestritten werden kann.

Oxydirte Chlorsäure. Betrachten wir die Verbindungen des Chlors, so finden wir, daß sich 2 Vol. Chlor mit 1, 3, 5 und 6 Vol. Sauerstoff verbinden, von welchen das letztere die oxydirte Chlorsäure ist. Ich habe im I. Th. p. 513. angeführt, daß Stadion annahm, sie enthalte 7 Vol. Sauerstoff; aber es ist leicht aus seinen eigenen Angaben zu bestimmen, daß sie nur 6 enthält. Ich habe gefunden, daß 100 Th. chlorsaures Kali 39,15 Th. Sauerstoffgas geben, d. h. daß 100 Theile Chlorkalium 64,339 Th. Sauerstoff entsprechen. Stadion fand, daß 100 Th. oxydirt chlorsaures Kali 44 Th. Sauerstoffgas und 56 Th. Chlorkalium geben, d. h. daß 100 Th. Chlorkalium 78,571 Th. Sauerstoff entsprechen. Die erstere 64,339 sind 5 Atome Sauerstoff, weil die Säure ihren ganzen Gehalt von Sauerstoff fahren liefs, und $64,339 : 78,571 = 5 : 6,11$, also so weit von 7 und so nahe an 6, daß die letztere Zahl dadurch vollgültig dargethan wird. Wir werden unten ausführlicher erfahren, daß das Product vom procentischen Sauerstoffgehalt einer Säure, dividirt mit ihrer Sättigungscapacität, die Anzahl von Sauerstoffatomen in der Säure ausdrückt, so daß eine Säure, welche in neutralen Salzen 3 oder 5 Mal den Sauerstoff der Basis enthält, auch 3 oder 5 Atome Sauerstoff hat. Dieses Verhältniß findet auch bei der oxydirten Chlorsäure statt; denn sie sättigt eine Quantität Basis, deren Sauerstoff $\frac{1}{4}$ von dem der Säure ist, und sie hinterläßt bei der Zersetzung des Salzes ein neutrales Chlormetall. Man muß daher diese Säure als aus 2 Atomen Chlor und 6 Atomen Sauerstoff zusammengesetzt betrachten, so wie die Chlorsäure aus 2 Atomen Chlor und 5 Atomen Sauerstoff besteht. — Ein gleiches Verhältniß findet sich bei der antimonichten Säure. Antimon hat 3 Oxyde, in welchen sich der Sauerstoff wie 3, 4 und 5 verhält, und in denselben sind, nach dem was ich später anführen werde,

wahrscheinlich 2 Atome Radical verbunden mit 3, 4 und 5 Atomen Sauerstoff. Das mittelste derselben, oder die antimonichte Säure, kann man zusammengesetzt betrachten entweder aus 1 Atom Antimon und 2 Atomen Sauerstoff, oder aus 2 von ersterem und 4 von letzterem. Die letztere Ansicht wird durch die Sättigungscapacität der antimonichten Säure gerechtfertigt, welche $\frac{1}{4}$ von ihrem Sauerstoffgehalt ist, so wie die der Antimonsäure $\frac{1}{2}$ von ihrem Sauerstoffgehalt ist.

Aber dies mag genug sein, um zu zeigen, daß in der Natur die Construction der zusammengesetzten Atome vielleicht nicht denselben Grad von Einfachheit hat, zu welcher sie durch die Vergleichung der relativen Gewichte der verbundenen Körper in der Berechnung reducirt werden kann, für welche die Zusammensetzung 1 : 3 oder 2 : 6 völlig einerlei ist.

Ob bei der Verbindung der elementaren Atome in zusammengesetzten Atomen der ersten Ordnung noch andere, als die beiden vorhin angeführten Verhältnisse, nämlich 1 Atom des einen Elementes zu 1, 2, 3 etc. Atomen eines anderen, und 2 Atome eines Elementes zu 3 und 5 Atomen eines anderen, in der unorganischen Natur vorkomme, ist von der Erfahrung noch nicht erwiesen. Je größer aber die Anzahl von Atomen wird, und je mehr die Atomenzahlen eines jeden Elementes sich einander nähern, um so mehr entfernt man sich von solchen bestimmten Verhältnissen, welche die binären Verbindungen der unorganischen Natur charakterisiren, und man gelangt endlich zu solchen, wie wir sie in der organischen Natur finden.

B. Verhältnisse, in welchen sich zusammengesetzte Atome verbinden.

Wenn sich zusammengesetzte Atome der ersten Ordnung zu einem zusammengesetzten Atom der zweiten verbinden, so folgen sie denselben Gesetzen, welche ich für die einfachen Atome angeführt habe, aber mit Einschränk-

kungen, welche verhindern, daß sie sich in so vielen Verhältnissen verbinden, als ohne jene denkbar wären. Diese Einschränkungen rühren davon her, daß wenn sich zusammengesetzte Atome verbinden, sie entweder den elektronegativen, oder seltener den elektropositiven Bestandtheil gemeinschaftlich haben, und die Verhältnisse, in welchen sich dann diese Atome vereinigen, werden von dem gemeinschaftlichen Elemente auf eine solche Weise bestimmt, daß sich die Quantität des gemeinschaftlichen Elementes in dem einen zur Quantität desselben Elementes in dem anderen auf eine der drei folgenden Arten verhält:

α) Wie sich 1 verhält zu 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc., d. h. das eine ist ein Multiplum mit einer ganzen Zahl von dem anderen.

Dieses ist das gewöhnlichste Verhältniß, und es findet in weit mehr als $\frac{2}{3}$ der bekannten Fälle statt. Als Probe, wie das gemeinschaftliche Element, welches gewöhnlich der elektronegativste Bestandtheil der Verbindung ist, die Anzahl der sich verbindenden zusammengesetzten Atome bestimmt, kann ich an die Veränderungen im Neutralitätsverhältniß erinnern, welche sich zeigen, wenn ein neutrales Oxydulsalz Gelegenheit hat, sich an der Luft zu oxydiren.

β) Wie 3 sich verhält zu 2, oder höchst selten wie 3 sich verhält zu 4.

Das erstere von diesen (3:2) findet statt, wenn sich niedrigere Säurestufen, die aus 2 Atomen Radikal und 3 Atomen Sauerstoff bestehen, mit Basen verbinden. Es trifft auch bisweilen, aber als seltene Ausnahme, bei den Verbindungen der Basen mit Säuren ein, die aus 1 Atom Radikal auf 3 Atome Sauerstoff bestehen. Das letztere dagegen (3:4) entsteht, wenn eine der erwähnten niedrigeren Säurestufen mit Basis übersättigt wird. Bis jetzt ist nur ein einziges Beispiel bekannt, nämlich Viertel salpêtres saures Bleioxyd (Th. II. p. 813.).

γ) Wie 5 sich verhält zu 2, 3, 4, $4\frac{1}{2}$ und 6.

Diese machen die neutralen und in mehreren verschiedenen Graden basischen Salze aus, die aus den Verbindungen von Basen mit Säuren entspringen, welche 2 Atome Radikal und 5 Atome Sauerstoff enthalten, oder aus den Verbindungen von Schwefelbasen mit solchen elektronegativen Schwefelmetallen, welche 5 Atome Schwefel enthalten.

Wenn diese bestimmten Verhältnisse zwischen den Quantitäten des gemeinschaftlichen, meistens elektronegativen Elementes verbundener Körper auf der einen Seite verhindern, daß sich zusammengesetzte Atome in gewissen einfachen Verhältnissen verbinden, daß sich z. B. ein Atom Schwefelsäure nicht mit 2 Atomen Eisenoxydul verbinden kann, so ist damit auf der anderen Seite gegeben, daß, zur Erhaltung eines solchen multipeln Verhältnisses, zusammengesetzte Atome sich in einer relativen Anzahl verbinden, welche für die einfachen noch nicht bekannt ist, nämlich 3 Atome des einen mit 4 Atomen des andern. Dieses Verhältniß ist indessen selten, und kommt meistens im Mineralreich da vor, wo während des langsamen Festwerdens der Erdmasse Verwandtschaften ungestört wirken konnten, die zu schwach sind, um sich bei dem tumultuarischen Gange der chemischen Prozesse in unseren Laboratorien äußern zu können.

Auch muß ich bei dieser Gelegenheit ein Verbindungsverhältniß anmerken, welches bis jetzt in der unorganischen Natur ganz allein steht, nämlich das der Kalkerde zur Phosphorsäure in demjenigen phosphorsauren Kalke, welcher in den Knochen der Thiere und in der Asche der Pflanzen vorkommt. Er besteht aus 8 Atomen Kalkerde, verbunden mit 3 Atomen Phosphorsäure, und kann auf künstlichem Wege mit größerer Leichtigkeit hervorgebracht werden, als das gewöhnliche basische Salz, das aus 3 Atomen Kalkerde mit 2 Atomen Phosphorsäure besteht. Ich habe schon bei der Beschreibung dieses Salzes unsere Vermuthung angeführt, daß diese Zusammensetzung mit der Anwendung dieses Salzes, welche die organische Natur davon macht, im Zusammenhange stehen könne.

Was ich von zusammengesetzten Atomen der ersten Ordnung aufgeführt habe, gilt auch allen Theilen nach, wenn zusammengesetzte Atome der zweiten Ordnung zusammengesetzte Atome der dritten hervorbringen. Als Proben führe ich folgende an:

1) In einer Verbindung aus zwei Atomen der zweiten Ordnung, die ein gemeinschaftliches elektronegatives Element haben, z. B. in einer Verbindung zweier Salze, von derselben Säure aber mit verschiedenen Basen, ist die Anzahl der Sauerstoffatome in der einen Basis ein Multiplum mit einer ganzen Zahl von derselben Zahl in der anderen, und die Säure in dem einen Salze folglich ein Multiplum mit einer ganzen Zahl von der Säure in dem anderen. In dem Alaun und in dem Feldspath ist die Anzahl der Sauerstoffatome der Thonerde die dreifache von der der Sauerstoffatome des Kali's; und eben so ist die mit der Thonerde verbundene Quantität von Schwefelsäure und von Kieselsäure die dreifache von der mit dem Kali verbundenen. In dem weinsäuren Kalinatrona enthalten die beiden Alkalien dieselbe Anzahl von Sauerstoffatomen, und sind folglich mit derselben Atomen-Anzahl von Weinsäure verbunden.

2) In Verbindungen aus zusammengesetzten Atomen der zweiten Ordnung, worin das elektropositive Element gemeinschaftlich ist, wie z. B. in den Verbindungen zweier Salze von derselben Basis und verschiedenen Säuren, ist die Anzahl der Sauerstoffatome in dem Theile des elektropositiven Körpers, das heißt, in der Basis, welche mit einer der Säuren verbunden ist, ein Multiplum mit einer ganzen Zahl von derselben Anzahl in der anderen, mit der zweiten Säure verbundenen Portion Basis, oder auch, es ist die Anzahl von Sauerstoffatomen in dem einen der zusammengesetzten Atome von der zweiten Ordnung (das heißt, der Sauerstoff der Säure gezählt zu dem der Base in dem einen der verbundenen Salze) ein Multiplum mit einer ganzen Zahl von der Anzahl von Sauerstoffatomen in dem anderen. Diese Art von Verbindung ist ziemlich selten; wir haben übrigens Beispiele

davon in dem Datholit, einer Verbindung von borsaurer mit kieselsaurer Kalkerde, worin letztere zwischen Borsäure und Kieselsäure gleich vertheilt ist; in dem blauen, kohlsauren Kupferoxyd und in der *Magnesia alba*, in welchen die Base zwischen die Kohlensäure und das Wasser so vertheilt ist, daß in dem ersteren Salze die Säure zwei Mal, und in dem letzteren drei Mal so viel davon aufnimmt, wie das Wasser; in dem Topas, einer Verbindung von basischem Fluoraluminium mit kieselsaurer Thonerde, worin der Sauerstoff im basischen Fluörür $\frac{1}{3}$ von dem im kieselsauren Salze ist.

Wir haben nun die bis jetzt entdeckten Gesetze durchgegangen, nach welchen die Verbindungen der sowohl einfachen als zusammengesetzten Atome in der unorganischen Natur begrenzt sind, und in der Kenntniß dieser Gesetze besteht die Theorie von den chemischen Proportionen. Um zu entdecken, ob es noch andere Modificationen dieser Gesetze, als wir eben angeführt haben, giebt, bedarf es einer noch ausgedehnteren Erfahrung, als wir bis jetzt haben.

Wir kennen nicht die Ursache der den Verbindungen der Atome unter sich angewiesenen Grenzen, und wir können in dieser Hinsicht nicht einmal eine zulässige Vermuthung äußern. Vielleicht mag in Zukunft diese Materie durch das Studium der geometrischen Form der zusammengesetzten Atome aufgeklärt werden.

Verbindungen der Gase; Volum-Theorie.

Die Erfahrung hat gelehrt, daß, gleich wie sich die Elemente dem Gewichte nach in bestimmten und multiplen Proportionen verbinden, sie sich auch auf analoge Weise dem Volumen nach vereinigen, wenn sie sich in Gasgestalt befinden; so daß sich ein Volumen eines Elementes entweder mit einem gleichen, oder mit 2, 3, 4 und mehr Volumen eines anderen gasförmigen Elementes verbindet. Wenn wir die von den Verbindungen der gasförmigen Körper bekannten Erscheinungen mi

der vergleichen, so entdecken wir dieselben Gesetze der bestimmten Proportionen, welche wir so eben aus ihren Proportionen dem Gewichte nach abgeleitet haben; hierdurch haben wir eine Vorstellungsart für die Körper, wenn sie sich in Gasgestalt mit einander verbinden sollen. Ich werde sie die Volumtheorie nennen, zum Unterschiede von der Corpusculartheorie, nach welcher man sich die Körper in festem Zustande vorstellt. Die Verbindungsstufen sind nach diesen beiden Theorien vollkommen dieselben, und was in der einen Atom genannt wird, heißt in der anderen Volum.

Mehrere Gelehrte haben Zweifel über die Identität der Atome und Volume erhoben; da aber die beiden Theorien nur Vorstellungsarten für die sich verbindenden Elemente sind, wodurch wir die Erscheinungen besser verstehen, und man nicht damit den wirklichen Vorgang in der Natur zu erklären bezweckt, so sind sie gut, wenn sie die einfachsten Erklärungen geben. Es würde also kein Vorzug von derjenigen sein, nach welcher man Atom und Volum als Brüche des einen vom anderen betrachtete. So hat man angenommen, das Wasser sei aus einem Atom Sauerstoff und einem Atom Wasserstoff zusammengesetzt; da es aber zwei Volume des letzteren Gases auf ein Volum des ersteren enthält, so schloß man daraus, in dem Wasserstoffe und den brennbaren Körpern überhaupt habe das Volum nur die Hälfte vom Gewichte des Atoms, während im Sauerstoff Volum und Atom dasselbe Gewicht haben. Da dies nur eine willkürliche Annahme ist, deren Richtigkeit nicht einmal geprüft werden kann, so scheint es mir viel einfacher und der Wahrscheinlichkeit angemessener zu sein, dieselbe Beziehung von Gewicht zwischen dem Volum und Atom in den brennbaren Körpern, wie im Sauerstoff anzunehmen, weil Nichts ist, was eine Verschiedenheit zwischen denselben vermuthen läßt. Betrachtet man das Wasser als aus zwei Atomen Radikal und einem Atom Sauerstoff zusammengesetzt, so fallen die Corpuscular- und die Volum-Theorie zusammen, so daß also ihre Verschiedenheit nur in dem Aggre-

stionszustand, in welchem sie uns die Körper vorstellen, besteht.

Obgleich auf den ersten Anblick die Volumtheorie richtiger scheint durch Thatsachen bewiesen werden zu können, so sind diese doch so selten, daß man aus einer sehr kleinen Anzahl alle anderen abzuleiten genöthigt ist. Wir kennen erst vier elementare Körper, deren Volum wir in Gasgestalt messen können, nämlich den Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und das Chlor. Das Volum anderer Körper, wie z. B. das des Kohlenstoffs, kann auf indirecte Weise gemessen werden. Wenn sich das Sauerstoffgas, um Kohlenoxydgas zu bilden, mit Kohlenstoff verbindet, so verdoppelt es sein Volum; woraus wir schließen, daß das hinzugekommene Volum das des Kohlenstoffs ist. Indessen werden wir weiter unten sehen, daß dieser Schluß nicht richtig sein könnte. Die Volume der meisten Gase können also nicht durch directe Mittel gemessen werden; man muß sie hypothetisch berechnen nach den Gewichten der Verbindungen dieser Körper mit dem Sauerstoff, dessen Volum uns als Basis der Vergleichung und des Maasses für alle übrigen Körper dient.

Die Gesetze für die gasförmigen Verbindungen müssen nothwendig dieselben sein, wie für die Verbindungen der festen oder flüssigen Substanzen, das heißt, es muß in den zusammengesetzten Volumen, der ersten Ordnung, ein Volum des einen Elementes mit 1, 2, 3 etc. Volumen eines anderen Elementes verbunden sein. Hierbei finden jedoch dieselben Verhältnisse von 2 Volumen mit 3 und 5 statt, deren wir eben bei der Atomtheorie erwähnt haben, und wovon die Sauerstoff-Verbindungen des Chlors und Stickstoffs wohlbekannte Beispiele geben.

Bei den Verbindungen der zusammengesetzten Volume der zweiten Ordnung kann es hinsichtlich der Volum-Verhältnisse Ausnahmen von der Regel geben, welche daher rühren, daß ein Theil der elementaren Körper dasselbe Volumen nach ihrer Vereinigung beibehalten, und andere sich so condensiren, daß ihr halbes oder selbst ihr ganzes Volum verschwindet. Folglich verbindet sich bis-

größerer Theil der Oberfläche der elementaren Atome in dem Inneren des zusammengesetzten Atomes verborgen und dadurch verhindert ist, einen entsprechenden Theil seiner Repulsivkraft auf die anderen Atome auszuüben. Es wäre sonst schwer einzusehen, warum die Condensation der gasförmigen Substanzen, außer ihrer Verbindung immer einer der einfachsten Brüche von ihrem ursprünglichen Volumen ist, wie es uns die Erfahrung zeigt *).

Nach-

*) Es ist oft recht interessant, die relative Anzahl von zusammengesetzten Atomen, welche nach diesen hypothetischen Gesichtspunkten ein zusammengesetztes Gas enthalten muß, zu untersuchen. Man findet dabei, daß, wenn sich zwei einfache gasförmige Körper verbinden, die Anzahl der zusammengesetzten Atome anfangs auf die Hälfte von der der elementaren Atome in demselben Volumen zurückgeführt ist; aber in dem Maße, als einfache Atome hinzukommen, und als folglich die zusammengesetzten Atome an Volumen zunehmen, stoßen sie sich auch in größeren Abständen ab, und es vermindert sich ihre Anzahl in einem gegebenen Volumen. Aber diese Vergrößerung der Abstände geht nicht in kleinen Abstufungen vor sich, sondern geschieht in großen Sprüngen von einem Verhältniß zu einem anderen vom anfänglichen Volumen. Von den Gasen, deren Condensation wir nun kennen oder zu kennen glauben, möchten folgende Beispiele hier angeführt zu werden verdienen:

1. Ein Volumen eines jeden Gases ohne Condensation verbunden: Stickstoffoxyd, Kohlenoxyd, Chlornwasserstoffsäure, Jodwasserstoffsäure, Cyanwasserstoffsäure.
2. Ein Volumen von einem jeden, condensirt zu einem Volumen (d. h. das Ganze zu $\frac{1}{2}$ reducirt): Cyanogas, Phosgen (aus 1 Vol. Chlor und 1 Vol. Kohlenoxyd).
3. Ein Volumen des einen und zwei Volumen des anderen, condensirt zu 2 Volumen (d. h. reducirt zu $\frac{2}{3}$): Wassergas, Stickstoffoxydul, Schwefelwasserstoff, Kohlensäure.
4. Ein Volumen von einem und zwei Volumen vom anderen, condensirt zu einem Volumen (reducirt zu $\frac{1}{3}$): ölbildendes Gas (2 Vol. Wasserstoff, 1 Vol. Kohlenstoff).
5. Ein Volumen von einem und drei Volumen vom einem anderen, condensirt zu zwei (reducirt zu $\frac{1}{2}$): Ammoniakgas.
6. Zwei Volumen von einem und drei Volumen vom einem anderen, condensirt zu drei Volumen (reducirt zu $\frac{2}{3}$): chlorichte Säure (aus 2 Chlorgas und 3 Sauerstoffgas).

Nachdem wir nun die ersten Grundzüge der mechanischen Ansicht von der Ursache der chemischen Proportionen entworfen haben, wollen wir übergehen zur Untersuchung der Kräfte, worauf die gegenseitigen Verbindungen der Körper beruhen; und da die Verbrennung diejenige Vereinigungs-Erscheinung ist, welche am meisten die Aufmerksamkeit der Chemiker erregt hat, und die am meisten studirt worden ist, so werden wir uns mit derselben vorzugsweise beschäftigen.

III. Entwicklung der elektrochemischen Theorie, so wie sie aus der bisher gesammelten Erfahrung zu folgen scheint.

Die Theorie von der Verbrennung und den sie begleitenden Erscheinungen ist immer die Basis der chemischen Theorie gewesen, und sie wird es auch wahrscheinlich für immer bleiben. In allen Entwicklungs-Perioden der Chemie hat man das Unzureichende unserer Begriffe davon erkannt, und indem man sie mit den beständig an Anzahl zunehmenden Thatsachen in Einklang zu bringen sich bestrebte, suchte man ihnen den höchsten möglichen Grad von Wahrscheinlichkeit zu geben; aber nie hat man mehr als jetzt gefühlt, wie unvollkommen in dieser Hinsicht unsere Kenntnisse sind, und nie war es nothwendiger zu untersuchen, bis zu welchem Grade die bis jetzt angenommenen Principien unrichtig und der Erfahrung widerstreitend sind. Aber obgleich wir nicht ohne Hoffnung sind, Materialien zur Vervollkommnung der Theorie erlangen zu können, so sind wir doch weit entfernt

-
7. Ein Volumen von einem und vier Volumen von einem anderen, condensirt zu zwei (reducirt zu $\frac{2}{3}$): Kohlenwasserstoffgas im Minimum (aus 1 Kohlenstoff und 4 Wasserstoff).

Von diesen einfachen Verhältnissen macht, nach H. Davy's Untersuchung, das Chloroxyd eine besondere Ausnahme. Es ist zusammengesetzt aus 2 Vol. Chlorgas und 1 Vol. Sauerstoffgas, condensirt zu $2\frac{1}{2}$ Vol. Chloroxydgas.

zu behaupten, daß die zur Zeit durch die Vermehrung unserer Kenntnisse herbeigeführten Veränderungen für die Zukunft beibehalten werden, zumal wenn die Wissenschaft fortfährt gleich rasche Fortschritte zu thun, wie es in diesen letzteren Zeiten der Fall war.

Werfen wir nun einen Blick auf die älteren Theorien von der Verbrennung. Stahl erklärte sie durch das Entweichen der Brennbarkeit; er machte aus dieser Eigenschaft eine Substanz, welche er Phlogiston nannte, welches, indem es entwich, das Feuer hervorbrachte. Es ist bekannt, mit welchem Scharfsinne er sich dieser Theorie zur Erklärung der zu seiner Zeit bekannten Erscheinungen bediente, so daß sie dem Bedarfe der Wissenschaft mehr als ein halbes Jahrhundert lang hinreichte. Bayen bemerkte endlich, daß es unmöglich sei, nach Stahl's Theorie die Reduction des Quecksilberoxyds ohne Zusatz einer brennbaren Substanz zu erklären; und Lavoisier, welcher den vollen Werth dieser Bemerkung auffasste, bewies hierauf durch bewundernswürdige Versuche, daß die Vernichtung der Brennbarkeit, statt von einem Verluste einer Substanz begleitet zu sein, in einer Verbindung mit einem wägbaren, aber gasförmigen Körper bestehe, welchem er den Namen Oxygène gab. Die Gewohnheit einer Meinung erzeugt oft die völlige Ueberzeugung von ihrer Richtigkeit; sie verbirgt die schwächeren Theile davon und macht uns unfähig, die Beweise dagegen anzunehmen. So erhielt auch die von Lavoisier gegebene neue Erklärung, obgleich sie eigentlich nur die Angabe einer Thatsache war, die jeder Chemiker selbst bestätigen konnte, im Anfange nicht allgemeinen Beifall. Es waren lange Streitigkeiten nöthig, um einen großen Theil der Zeitgenossen dieses Gelehrten von der Wahrheit der von ihm angegebenen Erscheinung und von der Richtigkeit der von ihm daraus gezogenen Schlüsse zu überzeugen. Jetzt hat man längst schon die Vorstellung vom Brennbarren, als einer Substanz, gänzlich verlassen; das Phlogiston hat in der Chemie nur noch eine historische Stelle, und für uns ist es entschieden bewiesen, daß

die Verbrennung in einer mit Erscheinung von Feuer begleiteten Verbindung des Sauerstoffs mit dem brennbaren Körper besteht.

Lavoisier suchte hauptsächlich durch Beweise seine neue Ansicht von der Natur der Verbrennung zu entwickeln und zu vertheiligen. Er liefs die Erscheinung von Feuer nicht aufer Acht; aber derjenige, welcher der Entwicklung seiner Ideen folgt, findet, dafs er sie nur als Nebensache behandelt. In vielen Fällen hatte das absorbirte Sauerstoffgas feste Gestalt angenommen, und sein in Freiheit gesetzter gebundener Wärmestoff hatte dann das Feuer hervorgebracht. Da aber in der antiphlogistischen Chemie Licht und Wärme verschiedene Substanzen sind, so entstand die Schwierigkeit, die Quelle des Lichtes zu finden. Aber die Wuth bürgerlicher Unruhen liefs Lavoisier nicht zum Ziele seiner großen Arbeiten gelangen. Er kam um in der Blüthe seiner Jahre, ohne das begonnene Werk vollenden zu können. Hätte ihm die Benutzung der Mittel zu Gebote gestanden, welche uns heute die zahlreichen Erfahrungen und erstaunenswürdigen Entdeckungen darbieten, welche Früchte hätte nicht die Wissenschaft von den Arbeiten dieses geistvollen Mannes erndten können, der zuerst beobachtete, was die meisten seiner Zeitgenossen erst nach langen Streitigkeiten erkennen konnten!

Gren wollte die Schwierigkeit, welche die Erklärung vom Ursprunge des Feuers in Lavoisier's Theorie hatte, dadurch heben, dafs er das Brennbare wieder zu einem materiellen Körper machte. Er nahm an, das mit einem Körper verbundene Licht mache ihn brennbar, es entweiche bei der Oxydation und verbinde sich mit dem vom absorbirten Sauerstoffgase frei gewordenen Wärmestoff. Diese Veränderung in der Theorie ist niemals weder allgemein angenommen, noch je bestritten worden.

Man machte bald die Beobachtung, dafs die Kohle bei dem Verbrennen im Sauerstoffgase das Volum des letzteren nicht verändert, indem sie es in Kohlensäuregas verwandelt; dafs aber, ungeachtet das Sauerstoffgas keine

Volum-Verminderung erleidet und die Kohle aus dem festen Zustande in den gasförmigen übergeht, dabei eine sehr starke Temperatur-Erhöhung entsteht. Es findet hier keine Consolidation statt, welcher das Freiwerden der Wärme zugeschrieben werden könnte; im Gegentheil verliert die Kohle ihre feste Gestalt und nimmt die gasförmige an. Man dachte sich dann, die spezifische Wärme des Kohlensäuregases sei geringer als die des Sauerstoffgases und der Kohle vor ihrer Vereinigung, und dieser Unterschied bewirke die Erhöhung der Temperatur. Man kannte damals nicht die spezifische Wärme dieser Körper, oder es waren vielmehr die Versuche, welche man zu ihrer Entdeckung anstellte, oft zu unvollkommen, als daß ihre Resultate Vertrauen verdient hätten. Da sie indessen nicht das Gegentheil bewiesen, so hielt man diese Erklärung für zulässig, und so viel man aus den Schriften der meisten noch lebenden Chemiker schliessen kann, hat sie ihnen bis jetzt als wahrscheinlich geschienen; aber unsere Erfahrung hat auch über diesen Punkt Aufklärungen erhalten, welche uns in den Stand setzen, diese Hypothese besser zu prüfen. Wir kennen jetzt die spezifische Wärme mehrerer gasförmigen Substanzen, und der Aggregationszustand setzt der Bestimmung des wahren Werthes in den Veränderungen dieser Wärme keine Hindernisse mehr entgegen. Nach den Versuchen von Delaroche und Bérard, die mit aller, Vertrauen erregenden Sorgfalt angestellt sind, ist die spezifische Wärme des Sauerstoffgases 0,9765, und die des Kohlensäuregases 1,2583, die Wärme der atmosphärischen Luft als Einheit angenommen. Hieraus folgt, daß das Kohlensäuregas, indem es eine größere spezifische Wärme als das Sauerstoffgas hat, Wärmestoff hat absorbiren müssen, um sich bei seiner eigenen Temperatur zu erhalten; es muß also der Unterschied zwischen der spezifischen Wärme der Kohle und der des Kohlensäuregases groß genug gewesen sein, um diese Erhöhung der Temperatur bis zur Feuer-Erscheinung zu bewirken. Aber die spezifische Wärme der Kohle (verglichen mit der eines als Einheit angenommenen Ge-

wichtiges Wasser) ist 0,26, die des Kohlensäuregases ist 0,221, und die des Sauerstoffgases 0,236. Die Kohlensäure ist, mit Weglassung der Brüche, zusammengesetzt aus 27 Kohlenstoff und 73 Sauerstoff. Unter Voraussetzung, daß bei der Vereinigung der beiden Elemente sie keine Veränderung in ihrer specifischen Wärme erleiden, muß die der Verbindung 0,232 sein; aber der Versuch gab 0,221. Außerdem, daß dieser Unterschied nicht so groß ist, daß er nicht von einem Beobachtungsfehler herrühren könne, scheint es einleuchtend genug zu sein, daß er nicht hinreicht, um die intensive Wärme zu erklären, die bei der Verbrennung der Kohle in Sauerstoffgas hervorgebracht wird.

Man könnte sagen, das Feuer sei hier durch eine, im Sauerstoffgase größere, als im Kohlensäuregase gebundene Wärme hervorgebracht; aber diese Erklärung stützte sich auf keinen besseren Grund, weil das Sauerstoffgas sein Volum ohne Veränderung beibehält, und die Kohle, die sich zu Gas ausdehnt, eine neue Quantität Wärmestoff binden muß. Man kann da kein Freiwerden von Wärmestoff annehmen, wo im Gegentheil eine Absorbition von gebundenem Wärmestoff statt findet.

Aber wir wollen ein anderes Beispiel wählen, dessen Resultat noch auffallender ist, nämlich die Verbrennung des Wasserstoffgases. Die specifische Wärme eines Theiles Wasser ist immer als 1,000 angenommen; in 100 Th. Wassers müssen also 100,000 specifische Wärme enthalten sein. Wir haben gesehen, daß die specifische Wärme des Sauerstoffgases 0,2361 ist; die des Wasserstoffgases, verglichen mit der eines gleichen Gewichtes Wasser, ist 3,2936. In 100 Th. Wasser sind 11,1 Th. Wasserstoff, deren specifische Wärme durch 36,55 vorgestellt werden kann, und 88,9 Th. Sauerstoff enthalten, deren specifische Wärme 20,99 ist. $20,99 + 36,55 = 57,54$, die specifische Wärme des zur Bildung von 100 Th. Wasser nöthigen Gemenges aus Wasserstoffgas und Sauerstoffgas. Nach der Vereinigung entsteht gasförmiges Wasser das durch die heftige Hitze zu einem viel Mal größeren

Volum, als das Gemenge der gasförmigen Elemente hat, ausgedehnt ist. Aber die specifische Wärme dieses erkalteten und flüssig gewordenen Wassers ist 100, das heißt, 42,46 mehr, als die seiner beiden Elemente im Gaszustande. Woher kommt nun diese außerordentliche Quantität entbundener Wärme bei der Verbrennung des Wasserstoffgases? Sie beruht nicht auf einer Veränderung in der specifischen Wärme, denn diese müßte einen hohen Grad von Kälte hervorbringen; auch nicht auf einem Freiwerden des Wärmestoffs, welcher dem Sauerstoffe und Wasserstoffe die Gasgestalt giebt, weil das Wasser, in dem Augenblick, wo es sich bildet, ein viel Mal größeres Volum hat, als seine beiden Elemente hatten, und die Condensation des Wassers nur die Folge der Abkühlung durch die umgebenden Körper ist. Wenn also die Versuche, die uns hier zur Grundlage dienen, nicht zu unrichtig sind, so müssen alle, bis jetzt über den Ursprung des Feuers gegebenen Erklärungen mangelhaft sein, und wir sind daher genöthigt andere aufzusuchen.

Kunkel hatte schon bemerkt, daß die Metalle, mit Schwefel erhitzt, sich mit demselben unter Feuer-Entwicklung verbinden, die er mit der durch Salpeter bewirkten verglich, woraus er schloß, daß der Schwefel in seiner Natur mit jenem etwas Aehnliches haben müsse. Auf diese, seit der ersten Periode der antiphlogistischen Chemie in Vergessenheit gerathene Erscheinung, wurde durch einige holländische Chemiker wieder aufmerksam gemacht, und sie erschien um so merkwürdiger, als diese Thatsache mit der Theorie im Widerspruche stand, welche das Feuer allein der Oxydation zuschreibt, und die Erscheinung doch hier durch die Vereinigung zweier festen Körper hervorgebracht wurde. Einige Gelehrte wollten zwar diese Erscheinung durch die Gegenwart einer gewissen Menge Luft oder Wasser zuschreiben, das durch die gegenseitige Einwirkung des Metalles und des Schwefels zersetzt würde; aber die Erfahrung entschied bald dahin, daß diese Annahme ungegründet sei; und jetzt wissen wir, daß die Vereinigung der Metalle mit Schwefel

von derselben Feuer-Erscheinung begleitet ist, wie bei ihrer Oxydation, und daß dieses Feuer dasselbe bleibe, wenn das erhitzte Metall der Einwirkung des flüssigen oder des, sei es durch Wärme oder Verbindung mit Wasserstoff, in Gas verwandelten Schwefels ausgesetzt wird. Die in diesen Fällen bewirkte Verbrennung ist durchaus dieselbe wie die bei der Oxydation, und der Unterschied liegt nur in dem Körper, womit sich das Metall verbindet. Ferner hat die Erfahrung gezeigt, daß die Vereinigung zweier Metalle unter sich von Feuer begleitet sein kann; und eben so sah man eine Base, in dem Gase einer Säure erhitzt, sich entzünden und einen Augenblick brennen, indem sie ein Salz bildete. Es ist schon längst bekannt, daß die rauchende Schwefelsäure, mit kaustischer Talkerde zusammengebracht, sich mit derselben unter einer Temperatur-Erhöhung verbindet, die das Gemische zum Glühen bringt. Kurz, die Erfahrung hat erwiesen, daß sich bei jeder chemischen Vereinigung, die unter Umständen vor sich geht, die zum Wahrnehmen von entwickelter Wärme günstig sind, Wärme frei wird, und daß bei der Sättigung der stärksten Verwandtschaften die Temperatur oft bis zu Weißglühhitze steigt, während die schwächsten sie nur um einige Grade steigen machen.

Aber die Erfahrung hat auch gezeigt, daß die Erscheinung des Feuers bisweilen durch schon vereinigte Körper hervorgebracht werden kann, ohne daß weder etwas hinzukommt, noch entweicht, und daß dann die Verbindung ihr Bestreben, sich mit andern Körpern zu vereinigen, verliert. Wir wissen, daß dies bei der Zirconerde, dem Chromoxyd, dem Eisenoxyd, einigen antimon-sauren und antimonichtsauren Metallsalzen, dem Gadolinit u. s. w. der Fall ist, und wir haben Grund zu glauben, daß das Widerstreben einiger Körper, sich, nachdem sie dem Feuer ausgesetzt waren, zu verbinden oder aufzulösen, von einer ähnlichen Veränderung abzuleiten ist, wenn auch die Temperatur-Erhöhung nicht stark genug war, um das Erglühen zu bewirken. Wir finden

diese Art von Unauflöslichkeit, nach der Calcination, bei der Thonerde, dem Eisenoxydul, der Titansäure u. s. w.

Die antiphlogistische Erklärung der Verbrennung muß demnach auf folgende Art modificirt werden: 1) daß, wenn man unter Verbrennung die von Feuer begleitete Vereinigung der Körper versteht, sie nicht allein den Verbindungen mit dem Sauerstoff angehört, sondern daß sie, unter günstigen Umständen, bei den Verbindungen der meisten Körper statt haben kann; 2) daß das Licht und die Wärme, welche dabei erscheinen, weder in einer Veränderung in der Dichtigkeit der Körper, noch in einer geringeren specifischen Wärme im neuen Producte ihren Grund haben, weil dessen specifische Wärme oft eben so groß oder selbst größer ist, als die der verschiedenen verbundenen Elemente zusammengenommen.

Es scheint nicht richtig zu sein, hierbei das Licht besonders zu unterscheiden. Bei der Beschreibung der Eigenschaften des Lichtes und der Wärme erleichtert man die Erklärung, wenn man sie als verschiedene Körper betrachtet; aber wir können nicht entscheiden, ob sie es wirklich sind; und wenn wir die Erscheinungen sorgfältig prüfen, finden wir, daß das Licht immer eine gewisse Temperatur begleitet, so daß man sagen kann, das Feuer, das heißt, die gleichzeitige Entwicklung von Licht und Wärme, sei nur ein höherer Temperaturgrad, als der des Wärmestoffs ohne Licht ist. Es ist bekannt, daß Vereinigungen, die gewöhnlich von Feuer begleitet sind, so vor sich gehen können, daß sich die Temperatur nicht bis zur leuchtenden Wärme erhöht; so werden z. B. Talkerde und concentrirte Schwefelsäure, die im Augenblicke ihrer Vereinigung sich oft bis zum Glühen erhitzen, nur eine mäßige Hitze hervorbringen, wenn die Säure mit Wasser verdünnt ist; und die Temperatur wird sich in dem Grade vermindern, als die Säure mehr verdünnt ist, weil der Wärmestoff, der im ersteren Falle das Feuer hervorbrachte, in dem anderen dazu dient, die Temperatur des hinzugefügten Wassers zu erhöhen. Es entsteht dann keine Entwicklung von Licht, obgleich es, wenn

es ein besonderer Körper wäre, doch wohl unserem Sinne sichtbar werden müßte, wiewohl in einem geringeren Grade, eben so wie sich die Wärme bei wenig erhöhten Temperaturen bemerkbar macht. Diejenigen, welche sich mit Löthrohr-Versuchen beschäftigen, werden oft bemerkt haben, daß es nicht immer der heißeste Theil der Flamme ist, welcher das meiste Licht giebt, daß aber in diesen Theil gehaltene feste Körper sogleich leuchtend werden, und manche darin einen so glänzenden Schein verbreiten, daß ihn das Auge kaum ertragen kann. Läßt man in einem dunkeln Zimmer einen Strom von Sauerstoffgas in die Flamme einer Weingeistlampe streichen, so werden die Gegenstände dadurch nicht erleuchtet werden; hält man aber in diese Flamme einen Platindrath, der zu dick ist, um zu schmelzen, so wird er nach einigen Augenblicken die intensivste Weißglühhitze erlangen und die umgebenden Gegenstände erleuchten. Die Ursache dieser Erscheinung können wir nicht erklären; es scheint aber, im Zusammenhange mit dem, was ich anführte, erwiesen zu sein, daß der Wärmestoff unter gewissen Umständen das Licht erzeugt oder zu Licht wird; und es scheint vollkommen ausgemacht zu sein, daß die bis zu einer gewissen Temperatur gestiegene Wärme immer von Licht begleitet ist, wenn auch diese Temperatur oft je nach den Körpern variirt, die übrigens, bei gleicher Temperatur, mehr oder weniger leuchten. Die Gase erfordern, um Licht hervorzubringen, eine bei weitem höhere Temperatur, als die festen Körper. Nach einigen, von Wedgwood angestellten, Versuchen glaubte man, die Gase könnten kein Licht geben; aber die Flamme des Kohlenoxydgases und des Wasserstoffgases zeigt das Gegentheil, denn sowohl der verbrennende Körper als das Product der Verbrennung sind gasförmig. Aber ungeachtet aller dieser Wahrscheinlichkeiten zu Gunsten des Angeführten, stoßen wir doch auf Schwierigkeiten, die sich nicht auf eine consequente Art auf dasselbe Princip bringen lassen. Denn es giebt Lichterscheinungen, die nicht von einer bemerkbaren Quantität von Wärme begleitet sind.

z. B. das Licht des Mondes, verschiedene durch organische Körper bewirkte Phosphoreszenzen u. s. w. Dessen ungeachtet könnte man annehmen, daß die Erklärung der Verbrennung, die vollständig den Ursprung der Wärme erklären wird, zu gleicher Zeit die Quelle des Lichtes nachgewiesen haben wird. Es bleibt also übrig zu untersuchen, woher bei den chemischen Vereinigungen die Wärme kommt.

In den Lehrbüchern der Chemie und Physik hat man bei Darstellung der das Feuer erregenden Umstände, die durch die elektrische Entladung hervorgebrachte Feuer-Erscheinung, welche in ihrem reinsten Zustande der elektrische Funke ist, gewöhnlich übergangen oder nachlässig behandelt, und dieß ist der Grund, warum man wenig Aufmerksamkeit darauf verwendet hat, bis daß endlich die Entdeckung der elektrischen Säule die Elektrizität mit in die chemische Theorie verwebte. Dieses elektrische Feuer ist indessen von gleicher Natur, wie das durch chemische Verbindungen bewirkte *). Der elektrische Funke entzündet das Wasserstoffgas, den Aether, das Knallsilber u. s. w. Der elektrische Schlag entzündet alle brennbare Körper, erhitzt, schmilzt und verflüchtigt die Metalle. Die anhaltende Entladung der elektrischen Säule erhitzt das Wasser bis zum Kochen und die festen Körper bis zum Rothglühen; eine im luftleeren Raume durch

*) Einige Physiker haben die Entstehung des elektrischen Funkens dem schnellen Durchgange der Elektrizität durch die Luft zugeschrieben, die dadurch heftig comprimirt und durch die bei dieser Compression frei werdende Wärme erhitzt werde. Aber die Erklärung des elektrischen Feuers soll nicht allein mit den Erscheinungen des Durchganges der elektrischen Entladung durch die Luft übereinstimmen, sie soll auch auf alle Licht- und Wärme-Erscheinungen anwendbar sein, die durch die Elektrizität, im luftleeren Raume, bei den flüssigen und den festen Körpern hervor gebracht werden. Es ist schwer zu begreifen, wie bei dem interessantesten Versuche von Davy, wobei sich das Wasser durch die Wirkung der Voltaschen Säule bis zum Kochen erhitzt, eine Compression statt finde, oder welches der Körper ist, der durch seine Compression Wärme frei werden läßt. Man kann also diese Erklärung durch eine Menge später entdeckter Thatsachen als widerlegt ansehen.

die elektrische Säule bis zum Glühen erhitze Kohle ist, hinsichtlich der Feuer-Erscheinung, in demselben Zustande, wie eine in Folge der Oxydation brennende Kohle. Der Unterschied besteht nicht in dem Zustande des Glühens, sondern in der Art, wodurch es hervorgebracht wird. Aber wir haben immer Grund, ähnliche Erscheinungen gleichen Ursachen zuzuschreiben, und da alle die anderen Erklärungsarten von der Ursache des Feuers nicht richtig sind, so bleibt uns noch übrig, zu untersuchen, ob nicht die Vereinigung der entgegengesetzten Elektricitäten die Ursache des Feuers eben so gut bei der chemischen Verbindung, als bei der elektrischen Entladung sein könne.

Diese Idee entstand bei den meisten Naturforschern, welche den gemeinschaftlichen Fortschritten der Chemie und der Elektricitätslehre seit 1802 gefolgt sind, einer Epoche, in welcher der Einfluß der Elektricität auf die chemischen Verwandtschaften ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen anfang.

Selbst lange vor Entdeckung der elektrischen Säule ahnete man die Beziehung zwischen Feuer und Elektricität. Wilke äußert schon (1766), daß man mit der Zeit wohl Aufschlüsse erwarten könne *über die Verwandtschaft, welche die neuere Physik zwischen Feuer und Elektricität zu entdecken angefangen habe* *), und später verwebte auch Winterl die Elektricität in seine chemisch-theoretischen Fiktionen. Einige seiner Ideen darüber haben sich in der Folge bestätigt; er läßt aber den Leser immer in Ungewißheit, ob das Wahre von ihm nicht eben so gut zu seinen Phantasien gehöre, wie die große Menge von Irrthümern und selbst Ungereimtheiten, die man in seinen Schriften findet.

Volta hatte durch viele mit Sorgfalt angestellte Versuche beobachtet, daß zwei mit einander in Berührung gesetzte Metalle elektrisch werden, und daß dieß die Ur-

*) Abhandl. der schwedischen Akademie der Wissenschaften, 1766. p. 90.

sache der Erscheinungen der elektrischen Säule sei. Davy zeigte hierauf, daß dieser elektrische Zustand sich in Verhältnisse mit der Stärke der gegenseitigen Verwandtschaften der angewandten Körper vermehre, und daß er, mittelst gewisser Vorsichtsmaßregeln, in allen Körpern, welche zu einander Verwandtschaft haben, hervorgebracht und wahrgenommen werden könne. Aus den Versuchen von Davy ging ferner hervor, daß durch die Temperatur, welche, wie wir wissen, die Verwandtschaft erhöht, auch die Intensität des elektrischen Zustandes der sich berührenden Körper sich vermehre, daß, wenn aber dieser mechanische Contact in die chemische Vereinigung übergehe, alle Zeichen von Elektrizität augenblicklich aufhören, das heißt, daß in dem Augenblick, wo unter günstigen Umständen Feuer erscheint, die elektrische Vertheilung oder Entladung, die man wahrnehmen könnte, verschwindet. Diese Thatsachen harmoniren also sehr gut mit der Vermuthung, daß die entgegengesetzten Elektrizitäten in den sich vereinigenden Körpern sich in dem Augenblicke der Vereinigung gegenseitig neutralisiren, und daß alsdann auf dieselbe Weise, wie bei der elektrischen Entladung, Feuer entsteht. Auch spätere von Becquerel, mit Anwendung des elektromagnetischen Multiplicators angestellte Versuche können wohl zu den positiven Beweisen für die Theilnahme der Elektrizität an der chemischen Verbindung gezählt werden; er zeigte, daß auch die geringste chemische Wirkung eine elektrische, auf die Magnetnadel wirkende Entladung hervorbringt. Einer dieser Versuche war folgender: An dem einen Enddrathe des elektromagnetischen Multiplicators befestigte er eine Zange von Platin, die einen mit Papier umwickelten Goldlöffel hielt. An den andern Drath wurde ein kleines Stück Platin befestigt. Als beide in ein Glas mit Salpetersäure getaucht wurden, entstand keine elektrische Wirkung, und die Nadel blieb unbewegt. Als aber dann ein Tropfen sehr verdünnter Chlorwasserstoffsäure zugesetzt wurde, wich die Nadel sogleich ab, es ging eine Verbindung vor sich, und die Flüssigkeit färbte sich gelb von Chlor-

gold. Wurde in die Platinzange in Papier gewickeltes Kupfer statt Gold befestigt, so entstand die chemische Wirkung ohne Chlorwasserstoffsäure, und die Magnetnadel declinirte.

Indessen, wenn wir alle diejenigen Umstände, welche für die Richtigkeit dieser Vorstellungsweise von dem Ursprunge des Feuers sprechen, erwähnen, dürfen wir nicht für solche blind sein, die nicht auf gleiche Weise erklärt werden können. Von solcher Beschaffenheit ist das Feuer, das sich zeigt, wenn sich Wasserstoffsperoxyd, Chloroxyd, chlorichte Säure, Chlorstickstoff und Jodstickstoff unter Explosion in ihre Bestandtheile trennen. Wird Wasserstoffsperoxyd mit Wasser und Silberoxyd vermischt, so geräth die Flüssigkeit in's Sieden, und wir entdecken bei dieser Wärme-Entwicklung keine andere chemische Erscheinung, als daß sich aller Sauerstoff vom Silber, und die Hälfte des Sauerstoffs vom Wasserstoff im Superoxyde trennt. In diesen Fällen entsteht Feuer und Wärme, also gerade bei dem Gegentheile von der chemischen Vereinigung, das heißt, bei der Trennung der Elemente und dem Uebergange derselben in ihren ursprünglichen, isolirten Zustand, wobei man, nach der angenommenen Ursache des Feuers zu schließen, eher eine Absorbtion von Wärme und Entstehung von Kälte erwarten sollte. Denn wenn Feuer und Wärme durch Vereinigung der entgegengesetzten Elektricitäten erzeugt wird, so müßte auch, durch ihre plötzliche Trennung, Wärme absorbirt und Kälte erzeugt werden, was indessen nicht durch Thatsachen hat erwiesen werden können. Leitet man z. B. durch die Kugel eines guten Luftthermometers einen Metalldrath, der sich außerhalb der Kugel an jedem Ende mit einer Spitze endigt, und entladet mit diesem Drath eine elektrische Batterie in einem solchen Abstände, daß kein Funke entsteht, so strömen die entgegengesetzten Elektricitäten, von denen die freien der Batterie gesättigt werden, vom Drathe aus; aber die Temperatur im Luftthermometer bleibt unverändert. Diese Umstände scheinen demnach zu zeigen, daß in der Entstehung der

noch etwas liege, wovon wir uns noch keine Rechnung geben können, und daß unsere Erklärung, durch die Vereinigung der Elektricitäten, möglicherweise noch eine Vorstellungsart enthält, die von dem wirklichen Verlaufe noch sehr verschieden ist. — Indessen wollen wir versuchen, die erwähnte Hypothese zur Ausmittelung der Erscheinungen anzuwenden, bis sich eine mit den letzteren noch besser übereinstimmende darbietet.

Wenn die Körper, welche sich verbunden haben und nun nicht mehr elektrisch sind, getrennt werden, und ihre Elemente in ihren isolirten Zustand mit ihren ursprünglichen Eigenschaften zurückgeführt werden sollen, so müssen sie in den, durch die Verbindung vernichteten, elektrischen Zustand wieder versetzt werden; oder, mit anderen Worten, wenn diese verbundenen Körper durch irgend eine Ursache ihren ursprünglichen elektrischen Zustand, der durch die Vereinigung aufgehört hat, wieder erlangen, so müssen sie sich trennen, und sich wieder mit ihren ursprünglichen Eigenschaften darstellen. Auch ist es bekannt, daß, bei der Einwirkung der elektrischen Säule auf eine leitende Flüssigkeit, die Elemente dieser Flüssigkeit sich trennen, daß der Sauerstoff und die Säuren von dem negativen Pol zu dem positiven, und die brennbaren Körper, so wie die salzbildenden Basen, von dem positiven zu dem negativen abgestoßen werden.

Wir glauben daher nun mit Gewißheit zu wissen, daß die Körper, wenn sie nahe daran sind sich verbinden zu wollen, entgegengesetzte freie Elektricitäten zeigen, deren Stärke in dem Maasse steigt, als sie sich der Temperatur, wobei die Verbindung vor sich geht, nähern, bis, in dem Augenblicke der Vereinigung, die Elektricitäten mit einer Temperatur-Erhöhung verschwinden, die oft bis zum Ausbrechen von Feuer geht. Auf der anderen Seite haben wir gleiche Gewißheit, daß die verbundenen Körper, in einer dazu passenden Gestalt, der Wirkung des durch die Entladung der Säule entstehenden elektrischen Stromes ausgesetzt, von einander getrennt werden, und ihre ersten chemischen und elektrischen Ei-

enschaften wieder erlangen, während zu gleicher Zeit die darauf wirkenden Elektricitäten verschwinden.

Bei dem jetzigen Zustande unserer Kenntnisse ist die wahrscheinlichste Erklärung der Verbrennung und der dadurch entstehenden Feuer-Erscheinung: dafs bei jeder chemischen Verbindung eine Neutralisation der entgegengesetzten Elektricitäten statt findet, und dafs diese Neutralisation das Feuer auf dieselbe Weise hervorbringt, wie sie es bei der Entladung der elektrischen Flasche, der elektrischen Säule und dem Blitze erzeugt, ohne dafs sie bei diesen letzteren Erscheinungen von einer chemischen Vereinigung begleitet ist.

Es stellt sich indessen hier eine Frage auf, die durch keine analoge Erscheinung der gewöhnlichen elektrischen Entladung gelöst werden kann. Nachdem sich die Körper durch die Wirkung einer elektrochemischen Entladung und unter Feuer-Erscheinung verbunden haben, bleiben sie in dieser Verbindung mit einer Kraft, welche, wie erwähnt wurde, gröfser ist, als alle die, welche eine mechanische Trennung bewirken können. Die gewöhnlichen elektrischen Phänomene erklären wohl die Wirkung der Körper auf gröfseren oder geringeren Abstand, ihre Anziehung vor der Vereinigung, und das durch diese Vereinigung entstehende Feuer; aber sie geben uns über die Ursache der mit einer so grofsen Kraft, nach Vernichtung des entgegengesetzten elektrischen Zustandes, fort dauernden Vereinigung der Körper keinen Aufschluß. Ist dies die Wirkung einer besonderen, den Atomen be wohnenden Kraft, wie die elektrische Polarisation, oder ist dies eine Eigenschaft der Elektricität, welche bei den gewöhnlichen Erscheinungen nicht wahrnehmbar ist? Versucht man, diese Frage zu entscheiden, so findet man, dafs, im ersteren Falle, wenn es nämlich die Folge der Wirkung einer fremden Kraft wäre, die Fortdauer der Verbindung nicht dem Einflusse der Elektricität unterworfen sein dürfte, und dafs, in dem anderen Falle, die Wiederherstellung der elektrischen Polarität selbst die

stärkste chemische Verbindung aufheben müßte. Auch wissen wir, daß die Entladung der elektrischen Batterie die chemische Verwandtschaft übertrifft und die verbundenen Körper trennt, das heißt, daß sie die Kraft, wodurch die Atome, nach der elektrochemischen Entladung, verbunden blieben, überwindet oder vernichtet. Man kann z. B. mittelst einer kleinen elektrischen Batterie von 8 oder 10 Paaren Zink- und Silber-Scheiben, von der Größe eines Thalers, das Kali, bei Gegenwart von Quecksilber, zersetzen; dies zeigt, daß das, was wir Vereinigungs-Verwandtschaft, chemische Verwandtschaft nennen, eine nothwendige und unveränderliche Beziehung mit den elektrochemischen Erscheinungen habe, obgleich wir sie nicht durch die bis jetzt bekannten Entladungs-Erscheinungen der durch Reibung erregten Elektrizität erklären können.

Die über die gegenseitigen elektrischen Beziehungen der Körper gemachten Versuche haben uns gezeigt, daß jene in zwei Klassen getheilt werden können: in elektropositive und in elektronegative. Die zur ersten Klasse gehörigen einfachen Körper, so wie ihre Oxyde, nehmen immer positive Elektrizität an, wenn sie mit einfachen Körpern oder Oxyden der zweiten Klasse in Berührung kommen; und die Oxyde der ersten Klasse verhalten sich immer zu den Oxyden der zweiten, wie die Salzbasen zu den Säuren.

Man glaubte, die elektrische Reihe der brennbaren Körper sei von der ihrer Oxyde verschieden; aber, obgleich die verschiedenen Oxydationsstufen einiger Körper Ausnahmen zeigen, so stimmt doch die elektrische Ordnung der brennbaren Körper im Allgemeinen mit der der Oxyde auf die Weise überein, daß die mit den stärksten Verwandtschaften begabten Oxydationsstufen der verschiedenen Radikale sich zu einander verhalten, wie die Radikale selbst.

Werden die Körper nach ihren elektrischen Dispositionen geordnet, so entsteht ein elektrochemisches System, welches, nach meiner Meinung, am besten von allen sich eignet,

eignet, eine Idee von der Chemie zu geben. Ich werde weiter unten darauf zurückkommen.

Der Sauerstoff ist der elektronegativste Körper. Da er niemals, in Beziehung auf irgend einen anderen, positiv ist, und da es, nach allen bis jetzt bekannten chemischen Erscheinungen, wahrscheinlich ist, daß kein Element unserer Erde elektronegativer sein kann, so legen wir ihm eine absolute Negativität bei. Auch ist er in dem elektrochemischen Systeme der einzige Körper, dessen elektrische Beziehungen unveränderlich sind. Die anderen sind in dem Sinne veränderlich, daß ein Körper, in Beziehung auf einen anderen, negativ, und in Beziehung auf einen dritten, positiv sein kann; so sind z. B. der Schwefel und der Arsenik in Beziehung auf den Sauerstoff positiv, und in Beziehung auf die Metalle negativ. Die Radikale der fixen Alkalien und der alkalischen Erden sind dagegen die elektropositivsten Körper; sie sind es aber in wenig verschiedenen Graden, und an dem positiven Ende der elektrischen Reihe ist kein Körper so elektropositiv, wie der Sauerstoff elektronegativ ist.

In der Meinung, es müsse einen solchen Körper geben, vermutheten zwar einige Chemiker, es sei dieß der Wasserstoff, und es rührten die elektropositiven Eigenschaften der Körper immer von einem Antheile Wasserstoff her, den sie enthielten; aber diese Vermuthung, welche sich auf keine andere Thatsache, als auf die große Sättigungs-Capacität des Wasserstoffs stützt, hat niemals allgemeinen Beifall erhalten, und man braucht nur einen Blick auf die Eigenschaften des Wasserstoffs und der anderen elektropositiven Körper zu werfen, um sie unwahrscheinlich zu finden. Auch weiß man nun, daß sich der Wasserstoff mit dem Kalium verbinden zu können scheint, worin er das elektronegative Element wäre, und daß das Wasser in seinen Verbindungen mit den Salzbasen die Stelle der Säure spielt, weil, bei Zersetzung von Kalkerde- oder Baryterde-Hydrat durch die Säule, sich das Wasser am positiven Pole ansammelt, während die Erde zum negativen geht.

Wenn man die Körper nach dem Zunehmen ihrer positiven Eigenschaften ordnet, so findet man in der Mitte dieser Reihe Körper, deren spezifische elektrochemische Eigenschaften wenig ausgezeichnet sind, und die man eben so gut in die eine wie in die andere elektrische Klasse setzen könnte. Diesen Körpern fehlen indessen nicht die elektrochemischen Eigenschaften; sie sind, in Beziehung auf die ihnen vorhergehenden, elektropositiv, und in Beziehung auf die nach ihnen folgenden, negativ.

Folgende ist ungefähr die Ordnung, in welcher die einfachen Körper hinsichtlich ihrer allgemeinen elektrochemischen Eigenschaften und derjenigen ihrer stärksten Oxyde auf einander folgen:

Sauerstoff
 Schwefel
 Stickstoff
 Chlor
 Jod
 Fluor
 Phosphor
 Selen
 Arsenik
 Chrom
 Molybdän
 Wolfram
 Bor
 Kohlenstoff
 Antimon
 Tellur
 Tantal
 Titan
 Kiesel
 Osmium
 Wasserstoff

Gold
 Iridium

Rhodium
 Platin
 Palladium
 Quecksilber
 Silber
 Kupfer
 Uran
 Wismuth
 Zinn
 Blei
 Cerium
 Kobalt
 Nickel
 Eisen
 Cadmium
 Zink
 Mangan
 Zirconium
 Aluminium
 Yttrium
 Beryllium
 Magnesium
 Calcium
 Strontium
 Baryum
 Lithium
 Natrium
 Kalium.

Ich sagte, diese ist ungefähr ihre Ordnung. Bis jetzt hat man diese Materie so wenig untersucht, daß sich noch nichts ganz Gewisses hinsichtlich dieser relativen Ordnung bestimmen läßt, die wohl nicht mehr dieselbe bleiben möchte; wenn man alle, auf diesen Gegenstand sich beziehende Umstände besser kennen wird.

Es ist natürlich, sich vorzustellen, daß die elektrochemischen Eigenschaften der Körper sich unter andrer verhalten würden, wie ihre Verwandtschaft

stoff, und daß diese Reihe zu gleicher Zeit ihre Ordnung nach dieser Verwandtschaft anzeigen werde. Indessen verhält es sich nicht so; Schwefel, Phosphor und Kohlenstoff sind sehr elektronegative Körper; gleichwohl reduciren sie mehrere der elektropositiveren. Außerdem steht die Verwandtschaft eines Körpers zum Sauerstoff nicht in einem unveränderlichen Verhältnisse; sie verändert sich nach der Temperatur. Bei einem gewissen Hitzgrade reducirt das Kalium das Kohlenoxydgas, bei einem andern Grade wird das Kali von der Kohle reducirt. Das Quecksilber oxydirt sich bei dem Kochpunkt, und bei einer höheren Temperatur hat es zum Sauerstoff keine Verwandtschaft mehr, u. s. w. Ferner werden oft bei unsern Versuchen die Körper durch eine zusammengesetzte Verwandtschaft oxydirt oder reducirt, nach welcher man nicht ihre relative Verwandtschaft zum Sauerstoff beurtheilen darf. Es ist also dieser Umstand, daß die gegenseitigen elektrischen Beziehungen der Körper nicht gleichen Schritt halten mit dem Grade ihrer relativen Verwandtschaft zum Sauerstoff, nicht dem elektrischen Systeme entgegen, obgleich er auf den ersten Anblick einen Widerspruch zu enthalten scheint; und weiter unten werde ich zu zeigen versuchen, wie man dieses Verhältniß erklären kann.

Lange vorher, ehe man die elektrischen Beziehungen der brennbaren Körper ahnete, hatte man ihre Oxyde in Säuren und in Basen eingetheilt: die ersteren bilden die elektronegative Klasse, und die zweiten die elektropositive; und diese Körper stehen unter sich in einer solchen Beziehung, daß oft eine schwache Säure einer stärkeren als Base dient, und daß eine schwache Base oft die Rolle einer Säure in Beziehung auf eine stärkere Base spielt.

Die aus einer Säure und einer Base zusammengesetzten Salze üben noch unter sich elektrische Reactionen von zweierlei Art auf einander aus, nämlich sowohl zersetzende, wodurch sich die Elemente in anderen Verhältnissen mit einander verbinden, als auch verbind-

dende, indem sich zwei Salze mit einander verbinden und ein Doppelsalz bilden, wobei alsdann das eine Salz eine elektronegative, und das andere eine elektropositive Reaction ausübt. Die erstere (die zersetzende) beruht auf den specifischen elektrischen Reactionen der einzelnen Elemente, die das Bestreben haben, sich vollkommener zu neutralisiren; die zweite (die verbindende) hängt im Gegentheil von der elektrischen Reaction des ganzen zusammengesetzten Atoms ab, welches als Ganzes, mit Beibehaltung seiner Zusammensetzung, besser neutralisirt zu werden strebt.

Ein Theil der zusammengesetzten Körper bildet eine dritte Klasse von elektrochemischen Beziehungen, die sich nicht unter den einfachen Körpern finden; es sind die indifferenten, welche keine elektrochemischen Reactionen mehr haben und sich nicht mit anderen Körpern verbinden. Streng genommen aber giebt es keine absolute elektrochemische Indifferenz, denn diese Körper zeigen sie nur bis zu einem gewissen Grade. Sie ist von zweierlei Art. Die eine findet da statt, wo sich so viele Körper mit einander verbunden haben, daß dadurch eine vollkommene Neutralisation entstanden ist, und kein anderer Körper mehr in die Verbindung eingehen kann. Alle elektrische Reaction hat dann aufgehört gegen die Körper, welche sich mit dem zusammengesetzten verbinden könnten; aber seine Elemente behalten noch ihre specifische Reaction auf diejenigen Körper, die jenen zu zersetzen streben. So kann sich z. B. der krystallisirte Alaun mit keinem anderen Körper verbinden, er kann aber von vielen zersetzt werden. Die zweite Art von elektrochemischer Indifferenz ist viel merkwürdiger. Verschiedene zusammengesetzte Körper haben die besondere Eigenschaft, daß sie, einer gewissen Temperatur ausgesetzt, plötzlich von einem Feuer durchfahren werden, als ob darin eine chemische Verbindung vor sich gehe, ohne daß, wenigstens in den meisten dieser Fälle, ihr Gewicht sich weder vermehrt noch vermindert. Aber ihre Eigenschaften, und am meisten ihre Farbe, werden dadurch verändert; auf

äußern sie keine Verwandtschaft mehr; sie verbinden sich nicht mehr mit denjenigen Körpern, zu denen sie eine große Verwandtschaft hatten, und widerstehen der Einwirkung derer, welche sie zuvor mit Leichtigkeit zersetzten. Sie verlieren diese elektrochemische Indifferenz nicht anders, als wenn sie, bei einer hohen Temperatur, der Einwirkung von, mit einer sehr starken Verwandtschaft begabten, Körpern ausgesetzt werden, das heißt, als wenn sie mit den Alkalien oder den feuerbeständigen Säuren erhitzt werden, mit denen sie sich dann auf dem trocknen Wege verbinden, indem sie in ihren vorigen elektrochemischen Zustand zurückkehren. Beispiele davon sind die Zirconerde, das Chromoxydul etc. Die wahrscheinlichste Erklärung dieser Erscheinung ist, daß sich die Elemente dieser Körper in zwei verschiedenen Graden von Innigkeit mit einander verbinden können; der eine, schwächere, findet auf nassem Wege bei einer wenig erhöhten Temperatur, und der andere auf trockenem Wege bei einer starken Hitze statt, vorausgesetzt, daß sie nicht zugleich der Einwirkung anderer Substanzen ausgesetzt sind. Es ist wahrscheinlich, daß der größte Theil der Mineralien, deren Zusammensetzung so beschaffen ist, daß sie durch die Säuren leicht aufgelöst oder zersetzt werden müßten, die aber dessen ungeachtet nicht davon angegriffen werden, sich in einem solchen Zustande sehr inniger Verbindung ihrer constituirenden Bestandtheile befinden, wie z. B. der Feldspath, der Spinell, das Zinnoxid etc., welche in dem Zustande, wie man sie in der Natur findet, der Einwirkung der stärksten Säuren widerstehen. Gleichwohl ist der Grad von elektrochemischer Indifferenz, zu welchem sich auf diese Art zusammengesetzte Körper bringen lassen, sehr veränderlich, und es bedarf daher, um sie zu vernichten, stärkerer oder schwächerer, elektrochemischer Reactionen. Das Chromoxydul, das Zinnoxid und die Zirconerde erlangen durch Einwirkung der Schwefelsäure, bei einer, dem Kochpunkte der Säure nahen Temperatur, die Verwandtschaften wieder, welche sie durch die Hitze des Feuers verloren haben. Die Thonerde, das

Eisenoxyd etc., die nach dem Glühen nicht mehr in der Kälte von schwachen Reagentien angegriffen werden, können durch starke Chlorwasserstoffsäure bei der Siedhitze, und selbst bei einer gemäßigteren, aber lange anhaltenden Temperatur aufgelöst werden. Gewisse Salze, wie der Alaun, der Eisenvitriol etc., wenn sie durch Calcination ihr Wasser verloren haben, scheinen zu gleicher Zeit ihre Verwandtschaft zum Wasser und ihre Auflöslichkeit in demselben verloren zu haben; sie fallen darin nieder, ohne daß sich die geringste gegenseitige Einwirkung zeigt; wenn sie aber lange darin bleiben, so nehmen sie nach und nach ihr Krystallwasser wieder an, und lösen sich auf. Der Gyps, einer Temperatur von $+ 110^{\circ}$ ausgesetzt, verliert sein Wasser, nimmt es aber nach dem Erkalten wieder auf; glüht man ihn aber bis zum Rothglühen, so verliert er für immer die Eigenschaft, Wasser zu binden, außer wenn man ihn wieder auflöst und krystallisirt. Diese Eigenschaft der Körper, vorzüglich durch die Wirkung einer starken Hitze, in einen mehr oder weniger starken Grad von elektrochemischer Indifferenz überzugehen, und ihr Bestreben, sich mit anderen Körpern zu verbinden, zu verlieren, ist viel allgemeiner, als man bis jetzt geglaubt hat; es ist möglich, daß sie, wie die gewöhnliche chemische Vereinigung, mit einer Entwicklung von Wärmestoff in verschiedenem Grade, vom nicht wahrzunehmenden an, bis zur Feuer-Erscheinung, verbunden ist.

Die vorhergehenden Betrachtungen führen zu folgender Frage: Wie findet sich die Elektrizität in den Körpern? Wie ist ein Körper elektropositiv oder elektronegativ? Bisher haben Thatsachen unsere theoretischen Ansichten begleitet und ihnen zur Bekräftigung gedient. Wir kommen nun auf ein Feld, wo wir keine solche Beweise finden, und wo folglich unsere Vermuthungen, wenn sie auch richtig wären, doch immer zweifelhaft bleiben; aber wir wollen es wenigstens versuchen, uns die Ursache jener Erscheinungen vorzustellen.

Wir wissen, daß ein Körper nicht elektrisch wird,

ohne daß sich die beiden Elektricitäten offenbaren, sei es in verschiedenen Theilen desselben Körpers, oder wenigstens in seinem Wirkungskreise. Wenn sich die Elektricitäten in einem, ein Continuum bildenden Körper einzeln zeigen, so finden sie sich immer in zwei entgegengesetzten Punkten dieses Körpers concentrirt, und sein elektrischer Zustand hat dann vollkommen dieselbe Polarität, wie ein magnetischer Körper; und bei dem jetzigen Stande unserer Kenntnisse können wir uns von freier Elektricität nicht anders einen Begriff machen, als in Folge einer solchen Polarität. Der Turmalin bietet das beste Beispiel dieser elektrischen Polarität dar.

Aber diese Polarität müssen auch die kleinsten Theilchen eines Körpers haben; denn es läßt sich nicht ein Theil eines elementaren Körpers denken, der nicht die Eigenschaften des Ganzen, oder die einer Vereinigung mehrerer Theilchen zusammen habe. Hieraus folgt natürlich, daß man ohne diese Corpusculartheorie keinen Begriff von der elektrischen Polarität in den Körpern haben kann. Bei der Annahme aber, daß die Körper aus Atomen zusammengesetzt sind, können wir uns vorstellen, daß ein jedes dieser Atome eine elektrische Polarität besitze, von welcher die elektrochemischen Erscheinungen bei ihrer Vereinigung abhängen, und deren ungleiche Intensität die Ursache des Kraft-Unterschiedes ist, womit sich ihre Verwandtschaften äußern.

Diese, in den kleinsten Theilchen der Körper allgemeine elektrische Polarität reicht indessen nicht hin, die Erscheinungen von specifischer Elektricität zu erklären, welche ein jedes derselben zeigt, und welche die einen elektropositiv und die anderen elektronativ macht. Diese Eigenschaft hängt vielleicht von jener Art von, wenn ich so sagen darf, elektrischer Einseitigkeit ab, welche zuerst von Erman beobachtet und die Unipolarität genannt worden ist, und deren Existenz man bestimmt erwiesen hat, obgleich wir nicht, nach unseren Ideen von der Elektricität, die Nothwendigkeit ihrer Existenz einsehen. Stellen wir uns vor, es sei in den Atomen

eines Körpers die Elektrizität des einen Poles in einem gewissen Punkte entweder vorherrschender oder concentrirter, als die Elektrizität des anderen Poles, ungefähr auf dieselbe Art, wie der eine Pol eines Magnets viel stärker sein kann als der andere; stellen wir uns ferner vor, es existire in den kleinsten Theilchen eines jeden Körpers eine ähnliche spezifische Unipolarität, in Folge welcher bei den einen der positive, bei den anderen der negative Pol vorherrscht, so werden wir recht gut begreifen können, wie die Elektrizität in den Körpern vorhanden sein kann, und worin ihre elektrochemischen Eigenschaften bestehen. Die Körper sind also elektropositiv oder elektronegativ, je nachdem der eine oder der andere Pol darin vorherrscht.

Aber diese spezifische Unipolarität erklärt nicht allein alle Phänomene. Wir sehen, daß sich zwei elektronegative Körper, wie der Sauerstoff und der Schwefel, auf eine viel innigere Art mit einander verbinden, als z. B. der Sauerstoff und das Kupfer, obgleich letzteres elektropositiv ist. Der Verwandtschaftsgrad der Körper hängt demnach nicht allein von ihrer spezifischen Unipolarität ab, er muß aber hauptsächlich von der Intensität ihrer Polarität im Allgemeinen abgeleitet werden. Gewisse Körper sind einer intensiveren Polarisation fähig, als andere, und müssen daher ein stärkeres Bestreben haben, die Elektrizität zu neutralisiren, welche in ihren Polen vertheilt ist, das heißt einen größeren Verwandtschaftsgrad als die anderen Körper; so daß dieser letztere eigentlich in der Intensität der Polarisation besteht. Daher verbindet sich der Sauerstoff eher mit dem Schwefel als mit dem Blei; denn wenn auch die beiden ersteren dieselbe Unipolarität haben, so neutralisirt doch der positive Pol des Schwefels eine größere Quantität von negativer Elektrizität in dem vorherrschenden Pole des Sauerstoffs, als der positive Pol des Bleies neutralisiren kann.

Der Grad von elektrischer Polarität der Körper, wenn diese wirklich nicht bloß in unserer Vorstellung existirt, scheint keine constante Quantität zu sein, sondern hängt

sehr von der Temperatur ab, durch welche er sich vermehrt, und durch deren Modificationen er Veränderungen erleidet. Man muß wohl unterscheiden zwischen der specifischen Polarität der Körper und ihrer Polarisations-Capacität; denn viele von ihnen, die bei gewöhnlicher Temperatur der Luft nur eine sehr schwache Polarität zu haben scheinen, erlangen bei der Rothglühhitze eine sehr starke, wie z. B. die Kohle. Andere dagegen haben eine sehr schwache Polarisation, welche ihren höchsten Grad bei niedrigeren Temperaturen erreicht, und einige verlieren sie selbst gänzlich bei höheren Wärmegraden, wie z. B. das Gold. Hierdurch begreifen wir, wie es kommt, daß der Phosphor sich bei niedrigen Temperaturen oxydirt, während dabei die Kohle und der Schwefel keine Veränderung erleiden. Auch sehen wir hierdurch ein, warum Körper, welche bei erhöhten Temperaturen Verbindungen bilden, die mit der größten Kraft zusammenhalten, bei geringeren Hitzgraden gar keine Wirkung auf einander äußern; weil nämlich die zu ihrer Verbindung nöthige Intensität von Polarisation nur bei höheren Temperaturen erregt wird. Wir können dadurch deutlich die Ursache einsehen, durch welche die Verwandtschaften der meisten Körper nur erst bei hohen Temperaturen wirksam zu werden anfangen. Ist die elektrochemische Neutralisation einmal vor sich gegangen, so kann sie nur durch elektrische Kräfte wieder aufgehoben werden, welche den Theilen ihre erste Polarität wieder geben, auf dieselbe Weise, wie die Entladung der elektrischen Säule. Woher es komme, daß die Temperatur die elektrische Polarität erhöht, wissen wir nicht; aber es ist diese Erscheinung so oft beobachtet worden, als wir mit unseren Instrumenten eine polare Elektrizität haben entdecken und messen können, und dieser positive Beweis ist der Leitfaden für unsere Vermuthungen hinsichtlich der Polarität der Atome.

„*Corpora non agunt nisi soluta*“ ist ein alter chemischer Spruch, welchen man so erklärte, daß die flüssigen Körper mit einer größeren Oberfläche auf einander

wirken. Dies ist richtig; aber die Oberfläche kann auch durch Pulvern vergrößert werden, ohne daß dadurch eine verhältnißmäßige Wirkung entsteht. Damit eine Verbindung zwischen polarisirten Partikeln vor sich gehe, müssen wenigstens die des einen Körpers beweglich sein und mit einer gewissen Leichtigkeit den anderen ihre entgegengesetzten Pole zuwenden können. Diese Beweglichkeit findet nun hauptsächlich in den Flüssigkeiten statt. Zwischen zwei festen Körpern geht auch keine Verbindung vor sich, oder wenigstens nur höchst selten; sie wird viel leichter bewirkt, wenn sich der eine derselben im flüssigen Zustande befindet, und noch viel leichter, wenn sie beide flüssig sind.

Da jedes polarisirte Atom einen der Intensität seiner Polarisation proportionalen Wirkungskreis haben muß, so folgt daraus, daß nur innerhalb dieser Sphäre die Vereinigung statt finden kann, und daß wenn die polarisirten Partikeln durch zu große Abstände von einander getrennt sind, sich ihre gegenseitige Wirkung verhältnißmäßig vermindert. Daher verbinden sich die flüssigen Körper leicht und fast bei allen Temperaturen. Die gasförmigen dagegen bedürfen meistens der Beihülfe der Wärme; und wenn sie verdünnt, und folglich ihre Theilchen weiter von einander entfernt sind, so verlieren sie auch ihre gegenseitige elektrochemische Wirkung. So bedarf, zum Beispiel, ein sehr verdünntes Gemenge von Sauerstoffgas und Wasserstoffgas zur Entzündung und zum Fortbrennen eine viel höhere Temperatur, als wenn es dem atmosphärischen Drucke ausgesetzt ist, weil der Abstand zwischen den Sauerstoff- und Wasserstoff-Atomen ihren gewöhnlichen Wirkungskreis übersteigt.

Die elektrochemischen Eigenschaften der oxydirten Körper hängen fast immer ausschließlicly von der Unipolarität ihres elektropositiven Elementes, d. h. von ihrem Radikal ab; das Oxyd ist gewöhnlich elektronegativ in Beziehung auf andere Oxyde, wenn sein Radikal in Beziehung auf ihre Radikale negativ ist, und eben so umgekehrt. Schwefelsäure z. B. ist gegen alle metal

Oxyde elektronegativ, weil der Schwefel gegen alle Metalle negativ ist. Die Oxyde von Kalium und Zink dagegen sind gegen alle oxydirte Körper elektropositiv, gegen deren Radikale Kalium und Zink positiv sind. Diese Thatsache, deren Ursache wir nicht erklären können, berichtigt eine unrichtige Idee über das saermachende Princip, für welches man nach der antiphlogistischen Theorie den Sauerstoff hielt. Wir finden jetzt, daß es in dem Radikale der Säuren liegt, und daß der Sauerstoff darin eine so indifferente Rolle spielt, daß er eben so gut in die Zusammensetzung der stärksten Salzbasen oder der elektropositiven Oxyde, als wie in die der stärksten Säuren oder der elektronegativen Oxyde eingeht. Bisweilen ist es indessen der Fall, daß ein positives Oxyd, durch eine höhere Oxydation, weniger elektropositive Eigenschaften erlangt, die es den elektronegativen näher bringen, wie z. B. das Zinnoxid, die Mangansäure; aber bei den stärksten Basen, wie bei dem Kali und Natron, kann wohl ein hinzukommender Antheil Sauerstoff die positive Reaction zerstören, ohne aber doch eine negative hervorzubringen; und so entstehen die Superoxyde starker Salzbasen.

Wenn die nun angeführten Vermuthungen eine richtige Idee von der Beziehung der Körper mit der Elektrizität darstellen, so folgt daraus, daß das, was wir chemische Verwandtschaft nennen, mit allen ihren Abänderungen nichts Anderes ist, als die Wirkung der elektrischen Polarität der Partikeln, und daß die Elektrizität die erste Ursache aller chemischen Thätigkeit ist; daß sie die Quelle des Lichtes und der Wärme ist, die vielleicht nur Modificationen davon sind, durch welche der Raum mit strahlendem Licht und mit Wärmestoff erfüllt wird, und daß sie sich, durch verschiedene, noch unbekannte Ursachen, bald als Wärme, bald als vertheilte Elektrizität offenbart, daß sie aber im letzteren Falle mit Hervorbringung von Licht und Wärme verschwindet.

Die Elektrizität, deren Natur uns noch unbekannt ist, und die mit keinem anderen, innerhalb unserer Erfahrung liegenden Körper Analogie hat (wenn man das

magnetische Fluidum ausnimmt, das zur Elektrizität in demselben Verhältnisse wie Licht und Wärme zu stehen scheint, indem die Elektrizität zu gleicher Zeit mit diesen magnetische Polarität hervorbringt), scheint also die erste Thätigkeits-Ursache in der ganzen, uns umgebenden Natur zu sein. Ich übergehe mit Stillschweigen alle Hypothesen, zu welchen sie Veranlassung gegeben hat; sie könnten nur Vergleichen mit anderen, besser bekannten Körpern zum Grunde haben, mit denen sie übrigens keine Aehnlichkeit hat. Man nahm an, die Elektrizität sei eine vibrirende Bewegung in den Körpern, analog derjenigen, welche den Schall hervorbringt; man sagte, sie sei die den Körpern einwohnende primitive Kraft etc., aber keine von diesen Hypothesen hat über ihre Natur ein helleres Licht verbreitet, und alle haben mangelhafte Seiten gehabt; man konnte einsehen, daß dies nicht die wahre Art sei, sich von diesem so merkwürdigen Agens eine Vorstellung zu machen.

Jede chemische Wirkung ist also, ihrem Grunde nach, ein elektrisches Phänomen, das auf der elektrischen Polarität der Partikeln beruht. Alles, was Wirkung der sogenannten Wahlverwandschaft zu sein scheint, wird nur durch eine in gewissen Körpern stärker, als in anderen, vorhandene elektrische Polarität bewirkt. Wird z. B. die Verbindung AB durch den Körper C zersetzt, der zu A eine größere Verwandschaft hat als B, so muß C eine größere Intensität von elektrischer Polarität als B haben; hierdurch entsteht vollkommnere Neutralisation zwischen A und C als zwischen A und B, welche von einer so großen Temperatur-Erhöhung begleitet sein kann, daß Feuer erscheint. B erscheint dann wieder mit seiner ursprünglichen Polarität, die es durch die Vereinigung von A mit C erlangt. Wenn im Gegentheil von diesen drei Körpern A die schwächste Polarisirung hat, so wird B durch C ebenfalls ausgetrieben werden, aber ohne bemerkbare Temperatur-Erhöhung, und nur allein durch das größere Neutralisirungs-Bestreben von C, welches stärker polarisirt ist. Wenn sich zwei Körper, AB und CD, gege

zersetzen, daß sich daraus zwei andere Körper, AD und CB, bilden, so wird die elektrische Polarisation auf gleiche Weise in den letzteren Verbindungen besser neutralisirt sein, als in den ersteren. Ich werde weiter unten von den mitwirkenden Nebenursachen sprechen, wodurch die Wirkung nicht allein von dem Grade der Polarisation der Körper abhängt.

Ein Körper, der sich bald als elektropositiver, bald als elektronegativer mit anderen zu verbinden vermag, kann aus der ersteren Verbindung nur durch positivere Körper, und aus der zweiten nur durch negativere ausgetrieben werden; so kann der Schwefel aus der Schwefelsäure, worin er elektropositiv ist, durch noch positivere ausgetrieben werden; aber aus dem Schwefelblei, worin er elektronegativ ist, kann er nur durch Körper, die in Beziehung auf das Blei negativ und noch negativer als der Schwefel sind, ausgetrieben werden.

Bekanntlich haben einige anorganische, zusammengesetzte Körper die Eigenschaft, bei einer hohen Temperatur sich mit einer starken Detonation zu zersetzen, wie z. B. das Knallsilber und Knallgold. Diese Verbindungen sind immer durch eine schwache, bei wenig erhöhten Temperaturen wirksame elektrische Polarität gebildet, und sind aus Elementen zusammengesetzt, wovon wenigstens zwei eine große Capacität für elektrische Polarität haben. Werden sie erhitzt, so nehmen sie diese größere Polarität an, die elektrischen Pole der Partikeln nehmen gegenseitig eine andere Stellung an, es geht eine stärkere Neutralisation vor sich, es entsteht Feuer, und die Körper zersetzen sich in einem Augenblick mit Detonation.

Der Zustand von elektrochemischer Indifferenz, in welchen mehrere zusammengesetzte Körper durch die früher erwähnte Feuer-Erscheinung versetzt werden, die sich in ihnen, bis zu einem gewissen Grade erhitzt, zeigt scheint eine neue, vor sich gehende elektrochemische Neutralisation anzuzeigen; und das Aufhören des Vereinigungs-Bestrebens giebt eine Zerstörung der elektrochemischen

Polarisation zu erkennen, die gewöhnlich in dem zusammengesetzten Atom zurückbleibt. Es ist daher einleuchtend, daß dieses Phänomen in einer mehr oder weniger starken Neutralisation der elektrischen Vertheilung besteht, welche das Atom polarisch machte. Wenn A und B, zum Beispiel, zwei Atome vorstellen, welche sich mit den entgegengesetzten Polen berühren, so bestand ihre chemische Verbindung in der Neutralisation der Elektricitäten dieser Pole; aber das zusammengesetzte Atom ist auch noch polarisch durch die Elektricitäten in den beiden anderen Polen. Wenn nun auch diese Polarisation plötzlich zerstört wird, so muß dadurch dieselbe Feuer-Erscheinung, wie durch jede andere elektrische Neutralisation, entstehen. Diese Zerstörung der specifischen Polarisation eines zusammengesetzten Körpers findet nur in den schwach polarisirten Körpern statt, und nicht in den sehr elektronegativen oder sehr elektropositiven.

Die nun erwähnten elektrischen Erscheinungen gelten hauptsächlich für die unorganische Natur; in der organischen Natur finden wir andere Verhältnisse.

Wenn die elektrochemischen Ansichten richtig sind, so folgt daraus, daß jede chemische Verbindung einzig und allein von zwei entgegengesetzten Kräften, der positiven und der negativen Elektricität, abhängt, und daß also jede Verbindung aus zwei, durch die Wirkung ihrer elektrochemischen Reaction vereinigten Theilen zusammengesetzt sein muß, da es keine dritte Kraft giebt. Hieraus folgt, daß jeder zusammengesetzte Körper, welche auch die Anzahl seiner Bestandtheile sein mag, in zwei Theile getheilt werden kann, wovon der eine positiv und der andere negativ elektrisch ist. So z. B. ist das schwefelsaure Natron nicht aus Schwefel, Sauerstoff und Natrium zusammengesetzt, sondern aus Schwefelsäure und aus Natron, die wiederum jedes für sich in einen elektropositiven und einen elektronegativen Bestandtheil getheilt werden können. Eben so kann auch der Alaun nicht als unmittelbar aus seinen einfachen Bestandtheilen zusammengesetzt betrachtet werden, sondern er ist zu be-

trachten als das Product der Reaction der schwefelsauren Thonerde, als negativen Elementes, auf das schwefelsaure Kali, als positives Element; und so rechtfertigt auch die elektrochemische Ansicht das, was ich über die zusammengesetzten Atome der ersten, zweiten, dritten etc. Ordnung gesagt habe.

Es giebt noch eine Verbindung, die ihrer Natur nach von den bisher erwähnten ganz verschieden ist, die nämlich, wenn ein fester Körper, in Berührung mit einer Flüssigkeit, schmilzt, eine Portion Wärmestoff bindet und sich mit dem flüssigen Körper vermischt, oder was wir auflösen nennen. Diese Erscheinung ist nicht mit einer elektrischen und chemischen Neutralisation verknüpft; der Körper behält seine elektrochemische Reaction ohne Verminderung, und übt sie wegen der Beweglichkeit seiner Partikeln viel lebhafter aus, als wenn er sich im festen Zustande befindet. Auch wird kein Wärmestoff entbunden, sondern im Gegentheil absorhirt, und die Erfahrung läßt uns glauben, daß sich diese Absorbition im Verhältnisse mit dem Abstände, welcher die Partikeln des fest gewesenen Körpers von einander trennt, vermehrt. Wenn man daher Wasser auf ein Salz gießt, welches sich nicht chemisch mit Wasser verbinden kann, oder welches schon diejenige Menge, womit es sich verbinden kann, enthält, so sinkt die Temperatur während der Auflösung des Salzes und der Verbreitung seiner Atome im Wasser; kann aber das Salz chemisch gebundenes Wasser aufnehmen, so wird zuerst durch die Verbindung des Salzes mit Wasser Wärme frei, und dann sinkt die Temperatur, wenn das Salz chemisch gebundenes Wasser enthält und sich aufzulösen anfängt. Uebrigens kann ein Körper chemisch gebundenes Wasser aufnehmen, ohne deswegen im Wasser auflöslich zu sein; und umgekehrt, er kann auflöslich sein, ohne die Fähigkeit zu haben, sich chemisch mit Wasser zu verbinden. Alle diese Umstände zeigen also, daß die innere Wirkung einer Auflösung durchaus von der einer chemischen Verbindung verschieden sei, und daß sie nicht als verschiedene Grade derselben Erscheinung be-

betrachtet werden können. Was anzeigt, daß die Auflösung von einer specifischen Verwandtschaft zwischen dem auflösenden und dem auflöselichen Körper abhängt, ist, daß 1) nicht alle Körper in den Flüssigkeiten gleich auflöselich sind, und daß es viele absolut unauflöseliche giebt; und 2) daß die Cohäsion ein Hinderniß ist, das bei dem aufzulösenden Körper überwunden werden muß. Es ist nicht wahrscheinlich, daß sich hierbei die Natur anderer, als der gewöhnlichen Grundkräfte bediene, obgleich es, auf der anderen Seite, unmöglich ist, sich eine Vorstellung von der Modification dieser Kräfte zu machen, die eine, von der gewöhnlichen chemischen Verbindung so verschiedene Erscheinung hervorbringt.

Als einen Beweis der gegenseitigen Durchdringung der Körper bei der Verbindung hat man die, selbst unter dem besten Microscop, vollkommen homogen erscheinende Zusammensetzung einer Auflösung, und den Umstand angesehen, daß z. B. ein Gran Kochsalz, in einem Quart Wasser aufgelöst, jedem Tropfen dieser Auflösung die Eigenschaft ertheilt, durch das salpetersaure Silberoxyd getrübt zu werden. Man darf aber nicht erwarten, daß es in einem flüssigen Gemische leichter sei die Atome des aufgelösten Körpers von denen des auflösenden zu unterscheiden, als mit dem Microscope die Atome des letzteren zu unterscheiden; dies können wir nicht, obgleich die Ausdehnbarkeit durch die Wärme, die Durchdringbarkeit der Flüssigkeiten durch Gase, und andere Erscheinungen uns sagen, daß die Atome kleine Zwischenräume zwischen sich lassen müssen.

Man hat in neueren Zeiten beobachtet, daß die porösen Körper Luft absorbiren, die sie mehr oder weniger in ihre Zwischenräume mit Wärme-Entwickelung comprimiren, so daß in ihren Poren die Luft condensirter ist, als bei dem gewöhnlichen Drucke in der Luft. Hierbei wirken die porösen Körper ebenfalls mit einer specifischen Verwandtschaft, und die Gase der verschiedenen Körper werden nicht in proportionalen Quantitäten davon absorbirt. Ferner hat man gefunden, daß Was-

ser und Flüssigkeiten sich zu den Gasen, womit sie sich nicht chemisch verbinden, auf dieselbe Art wie die porösen Körper verhalten, woraus man schließen kann, daß die Absorbtion der Gase durch die Flüssigkeiten und die durch poröse, feste Körper gleichartige Vorgänge sind. Zudem hat man gefunden, daß, so wie ein Gas aus Wasser durch ein anderes Gas, welches dazu kommt, theilweise ausgetrieben werden kann, auch ein Gas durch einen festen, sich im Wasser auflösenden Körper ausgetrieben wird. Eine Flüssigkeit, welche einen festen Körper aufgelöst enthält, absorbirt um so weniger Gas, je größer die Menge des aufgelösten festen Körpers ist, welcher einen Theil der Zwischenräume einzunehmen scheint, die das Gas eingenommen haben würde. Es fehlt uns also nicht an Gründen, um anzunehmen, daß die Auflösung der festen Körper in einer Flüssigkeit, die Absorbtion der Gase durch Flüssigkeiten, und ihre Absorbtion durch feste, poröse Körper, im Allgemeinen zu derselben Klasse von Erscheinungen gehören.

Auf jeden Fall müssen wir uns nach der Corpusculartheorie vorstellen, daß die Auflösung eines festen Körpers in einer Flüssigkeit darin bestehe, daß, nachdem die Cohäsion des festen Körpers durch eine unbekannt Modification der Affinität zerstört worden ist, die Atome dieses Körpers sich vertheilen, und sich zwischen die der Flüssigkeit legen, und nicht allein ihre Zwischenräume ausfüllen, sondern sie auch erweitern, wodurch der Umfang der Flüssigkeit vergrößert wird. Man muß sich vorstellen, daß in einer gleichförmig gemischten Flüssigkeit ein jedes Atom vom aufgelösten Körper von einer gleichen Anzahl von Atomen des Auflösungsmittels umgeben sei; und wenn mehrere Substanzen zusammen aufgelöst sind, so müssen sie die Zwischenräume zwischen den Atomen des Auflösungsmittels unter sich theilen, so daß, bei einer gleichförmigen Mischung der Flüssigkeit, eine solche Symmetrie in der Lage der Atome entsteht, daß alle Atome der einzelnen Körper sich in Beziehung zu den Atomen der anderen Körper in einer gleichförmigen Lage befin-

den. Man kann daher sagen, daß die Auflösung durch die Symmetrie in der Stellung der Atome, so wie die Verbindung durch die bestimmten Proportionen charakterisirt ist. Hierdurch entsteht auch eine Ausdehnung der Wirkungen der chemischen Affinität über die Grenzen weg, welche man bei Untersuchung der festen oder gasförmigen Körper findet. Um dies zu erläutern, wollen wir annehmen, es seien 1000 Atome eines Körpers, z. B. Kupferchlorid, in einer Flüssigkeit aufgelöst, und man gielte dann, unter guter Vermischung, 1000 Atome Schwefelsäure hinzu, so wird sich neben jedes Atom des ersten Körpers ein Atom des letzteren stellen. Da aber die Schwefelsäure zum Kupferoxyd eine größere Verwandtschaft hat, als das Chlor zum Kupfer, so wird das Chlor der Schwefelsäure weichen, und es werden folglich dadurch 1000 At. schwefelsaures Kupferoxyd und 1000 At. Chlorwasserstoffsäure entstehen; diese letztere bleibt indessen bei dem neugebildeten Atome; ihre Affinität, das heißt, ihre elektrochemische Polarität, wenn auch durch eine stärkere Polarität überwunden, ist doch nicht vernichtet; sie fährt daher fort wirksam zu sein, und vermindert die Wirkung der mächtigeren Schwefelsäure, die nur durch ihren Ueberschuß wirken kann, oder, mit anderen Worten, sie stößt, durch ihre elektronegative Polarität, einen Theil der ebenfalls polarisirten Schwefelsäure ab, bis sich zwischen den beiden Verwandtschaften ein Gleichgewicht herstellt; dann bleibt ein Theil des Chlors, mit einer gewissen Anzahl von Kupfer-Atomen verbunden, in der Auflösung, während sich die Schwefelsäure mit den anderen oxydirten verbindet. Die Quantität der durch die Schwefelsäure bewirkten Zersetzung steht in einem zusammengesetzten Verhältnisse des Unterschiedes zwischen den Verwandtschaftsgraden der beiden entgegenwirkenden Säuren (d. h. ihrer verschiedenen Intensität von elektrochemischer Polarisirung) und der Anzahl ihrer gegenwärtigen Atome; denn wenn man, in dem angeführten Beispiel, Atome von Chlorwasserstoffsäure zusetzt, so werden sie eine gewisse Anzahl von Kupferoxyd-

Atomen zersetzen und eine entsprechende Anzahl von Schwefelsäure-Atomen austreiben, die kleiner sein wird, als die Anzahl von Atomen der hinzugefügten Chlorwasserstoffsäure. Es werden sich also freie Atome der beiden Säuren um die verbunden bleibenden lagern, und werden durch ihre entgegengesetzten und sich das Gleichgewicht haltenden Kräfte ihre gegenseitige Verbindung mit dem Kupferoxyd verhindern. Es ist einleuchtend, daß, bei Herstellung des Gleichgewichtes, die schwächere Affinität der Chlorwasserstoffsäure, die sich aber durch eine grössere Anzahl ihrer zwischen die Masse gelegten Atome äußert, der stärkeren Affinität der Schwefelsäure gleich ist, die durch eine geringere Anzahl von Atomen ausgeübt ist.

Stellen wir uns nun vor, die eine dieser entgegenwirkenden Säuren sei unauflöslich und gehe folglich, in dem Maasse, als sie frei werde, je nach ihrer Natur, in den festen oder gasförmigen Zustand über, so werden ihre freien Atome, statt durch ihre Gegenwart wirksam zu sein und sich um die Verbindung zu lagern, sich davon entfernen und zuletzt durch die andern ganz ausgetrieben sein, deren freie Atome die Verbindung umgeben, wenn sie in hinreichender Menge vorhanden sind. So kann also, durch eine leicht begreifliche, mechanische Wirkung, die schwächere Säure die stärkere austreiben, wenn erstere in hinreichender Menge vorhanden ist, und letztere sich nicht in der Auflösung erhalten kann. Ist dagegen die neue Verbindung mit einer der Säuren unauflöslich, so scheidet sie sich aus der Flüssigkeit ab, in dem Grade, als sie sich bildet. Der Theil der Base, welcher in der Auflösung bleibt, ist also nicht zwischen die Säuren vertheilt; und die Flüssigkeit bleibt in dieser Hinsicht in demselben Zustande, worin sie war, als man die fällende Säure zuzusetzen anfang, mit dem Unterschiede indessen, daß die Kräfte, welche mit der Wirkung dieser Säure im Gleichgewichte stehen, in dem Maasse zunehmen, als man mehr von der Säure zusetzt, und daß man daher immer mehr zusetzen muß, um dieselbe Quantität von der Ver-

bindung niederzuschlagen. Auch kann auf diese Weise eine Säure eine stärkere austreiben, wie sich z. B. die Weinsäure oder Citronensäure der Kalkerde in einer Auflösung von salpetersaurer Kalkerde bemächtiget, indem sie einen Niederschlag von weinsaurer oder citronsaurer Kalkerde bildet.

Man sieht leicht ein, daß diese Erscheinungen gerade dieselben sind, deren Existenz von Berthollet mit so vielem Scharfsinne erwiesen und untersucht wurde, und woraus dieser berühmte Chemiker folgerte, die Körper könnten sich innerhalb gewisser Grenzen in unendlich vielen Proportionen mit einander verbinden, und es fänden nur dann bestimmte Verhältnisse statt, wenn, in Folge der Cohäsions- oder Expansions-Kraft, die Körper in festem Zustande abgeschieden oder im Gaszustande entwickelt werden. Ungeachtet die Resultate von Berthollet's Versuchen anfangs der allgemeinen Annahme des Systemes von den chemischen Proportionen so entgegengesetzt schienen, so finden wir sie jetzt als nothwendige Folgen aus den Ansichten der Corpusculartheorie hervorgehen, und wir müssen mit Dank die Arbeiten eines Gelehrten anerkennen, der, wenn er auch den Gegenstand unter einem andern Gesichtspunkte betrachtete, uns doch den Weg nach einer Richtung gebahnt hat, nach welcher die Speculationen über die chemischen Proportionen sonst nur sehr spät sich gewendet hätten. Wir sehen nun, daß die gleichartige Vertheilung der Atome der aufgelösten Körper zwischen denen des Auflösungsmittels Erscheinungen hervorbringen, die, wenn sich die wirksamen Körper und ihre Producte in der Auflösung erhalten, vollkommen dieselben sein müssen, als wenn Verbindungen in allen Verhältnissen möglich wären. Man sieht also, daß Berthollet's scharfsinnige Untersuchungen in seiner *Statique chimique* weder der Theorie von den bestimmten Proportionen, noch den Ansichten von der Corpusculartheorie entgegen sind. Berthollet erstreckte selbst auf die festen Körper die Anwendung der Resultate seiner Beobachtungen über die Flüssigkeiten; diese Ausdehnung, in sofern

sie den Einfluß der chemischen Masse (d. h. die Summe des Affinitätsgrades aus der vorhandenen Quantität des wirksamen Körpers) auf einen festen Körper betrifft, welcher sich in einer Flüssigkeit befindet, ist richtig, wenn der feste Körper, ungeachtet seiner Unauflöslichkeit, noch nicht gänzlich außerhalb dem Wirkungskreise der Flüssigkeit ist; aber die Anwendung, die man nachher davon auf die trocknen und festen Körper machte, indem man z. B. annahm, daß sich die Metalle zwischen dem Maximum und Minimum in unendlich vielen Graden oxydiren könnten, ist durch die Erfahrung widerlegt worden, welche zeigt, daß wenn ein der Wirkung des Sauerstoffs ausgesetztes Oxyd sich nicht vollkommen in ein anderes Oxyd hat verwandeln können, das neugebildete Oxyd sich mit einem Theile des nicht veränderten Oxydes gemengt, oder bisweilen auch chemisch verbunden findet, so daß es oft nicht schwer ist mit dem Microscope zu entdecken, daß sie nur mit einander gemengt sind.

Es bleibt uns nun noch übrig, von der elektrochemischen Theorie aus, einige Worte über die Cohäsionskraft zu sagen, deren mechanische Erscheinungen in den letzteren Zeiten mit so vielem Erfolge studirt worden sind. Es ist bewiesen worden, daß die regelmässige Form der Körper in ihren Atomen das Bestreben voraussetzt, sich vorzugsweise in gewissen Punkten mit einander in Berührung zu setzen, das heißt, daß sie von einer Polarität abhängt, welche folglich nur elektrisch oder magnetisch sein kann, welches letztere wir indessen durch keinen Umstand zu glauben berechtigt sind. Da alle Atome eines Körpers eine gewisse Polarität behalten, so müssen sie natürlich suchen sich mit ihren entgegengesetzten Polen zu treffen; und man könnte, in Folge ihrer Polarität, vermuthen, daß die Cohäsion sich auf dieselbe Art bilde, wie der positiv elektrisirte Deckel des Elektrophors durch die negative Elektricität des Kuchens zurückgehalten wird, ohne gegenseitige Entladung oder Durchdringung. Man könnte von der anderen Seite die chemische Verbindung mit der Neutralisation der beiden entgegengesetzten Elektri-

citäten vergleichen, welche entsteht, wenn die untere Belegung des Kuchens mit der oberen in Verbindung gesetzt wird, wodurch eine Entladung der Electricität bewirkt wird.

Es ist indessen unmöglich, aus diesem Gesichtspunkte die Ungleichheit der Cohäsion in den verschiedenen Körpern, oder, je nach verschiedenen Umständen, in demselben Körper, so wie die Modificationen der Cohäsion, wie Härte, Geschmeidigkeit, Zähigkeit, Sprödigkeit etc., zu erklären. Und wollte man die Gasförmigkeit dadurch erklären, daß man sagte, die Atome wendeten sich gegenseitig ihre analogen Pole zu, und stießen sich einander nach allen Richtungen ab, und die Flüssigkeit dadurch, daß man in den Achsen der Atome eine kleine Inclination voraussetzte, so wäre man genöthigt einen neuen Umstand ausfindig zu machen, wodurch ihre Achsen in einer gegenseitigen Stellung erhalten würden, aus der sie ihre Polarität unaufhörlich abzulenken streben würde.

Wir können also gegenwärtig die Cohäsion und alle ihre Modificationen noch nicht durch das erklären, was wir bis jetzt von der Electricität, als allgemeiner Grundkraft, wissen. Die Cohäsion hängt indessen von einer Kraft ab, deren Wirkung nicht allein mechanisch, sondern auch chemisch ist, und welche den Verwandtschaften auf eine bemerkliche Art entgegen wirkt und sie modificirt; und gerade vorzüglich in den Auflösungen hat die Cohäsionskraft Gelegenheit ihre chemischen Wirkungen zu äußern, wo sie oft eine schwächere Verwandtschaft unterstützt, die, durch das Bestreben in den festen Zustand überzugehen, eine stärkere überwindet, wie es Berthollet so gut aus einander gesetzt hat.

IV. Ueber die Bestimmung der relativen Anzahl von einfachen Atomen in chemischen Verbindungen.

Dalton, welcher den ersten Versuch machte, die Anzahl von einfachen Atomen, woraus die zusammengesetzten

setzten Atome mehrerer Körper gebildet sind, zu bestimmen, nahm an, daß sich die Körper vorzugsweise in dem Verhältnisse verbinden, daß sich ein Atom des einen Elementes mit einem Atom des anderen verbinde, und wenn nur eine Verbindungsstufe zwischen denselben bekannt war, so betrachtete er dieselbe als aus einem Atom eines jeden Elementes zusammengesetzt. Da aber, wo mehrere Oxydationsgrade von demselben Radikal bekannt waren, nahm er an, daß die Anzahl von Sauerstoff-Atomen gleich mit der der Multipeln wäre, so daß Kohlenoxydgas aus einem Atom Kohlenstoff und einem Atom Sauerstoff, Kohlensäure aus einem Atom Kohlenstoff mit zwei Atomen Sauerstoff, schweflichte Säure aus einem Atom Schwefel mit zwei Atomen Sauerstoff, und Schwefelsäure aus einem Atom Schwefel mit drei Atomen Sauerstoff bestände. Mehrere englische und einige deutsche Verfasser sind Dalton's Princip gefolgt. Wenn nur eine Verbindung bekannt ist, so liegt jedoch etwas Willkührliches in der Idee, ohne alle Rücksicht auf die übrigen Verhältnisse dieser Verbindung, anzunehmen, daß sie aus einem Atome eines jeden Elementes bestehe, und es sind nun eine Menge von Beispielen allgemein anerkannt, wo es nicht der Fall ist. Man kannte z. B. damals nur einen Oxydationsgrad vom Wolfram und vom Molybdän, nämlich die Säuren dieser Metalle; wir haben aber seitdem mehrere entdeckt, so wie auch, daß diese Säuren mehr als ein Atom Sauerstoff enthalten. Auf jeden Fall muß man da, wo es auf Bestimmung von Zahlen ankommt, so wenig als möglich der Willkühr überlassen, und man muß mit der größten Aufmerksamkeit Alles umfassen, was irgend eine Anleitung geben kann. Ungeachtet wir wahrscheinliche Angaben über die atomistische Zusammensetzung der meisten Körper haben, so ist doch diese Kenntniß, wie wir bald sehen werden, in vielen Fällen noch so wenig sicher, daß man nur von sehr wenigen Körpern sagen kann, man kenne mit voller Zuverlässigkeit die Anzahl von einfachen Atomen, woraus das zusammengesetzte Atom gebildet ist.

Es giebt mehrere Arten, wie man die relative Anzahl der Atome auszumitteln sucht; wir wollen sie nun durchgehen und hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit untersuchen.

1) Eine einzige derselben giebt Resultate, welche keinem Zweifel unterworfen sind, die nämlich, wo man die relativen Volume, nach welchen sich die Bestandtheile eines Körpers verbinden, in Gasform bestimmen kann. So z. B. kennen wir mit voller Sicherheit die relative Anzahl von Atomen des Stickstoffs und Sauerstoffs in den Oxydationsstufen des Stickstoffs, die des Stickstoffs und Wasserstoffs im Ammoniak, die des Chlors und Sauerstoffs in dessen Oxydationsstufen, und die des Chlors und Wasserstoffs in der Chlorwasserstoffsäure; aber unglücklicherweise erstreckt sich diese Sicherheit nicht weiter, als bis zu denjenigen Körpern, die in isolirtem Zustande in Gasform aufgesammelt und gemessen werden können, und hört ganz auf, wenn der eine Bestandtheil eines zusammengesetzten Körpers nicht bei einer Temperatur in Gasform erhalten werden kann, wobei er sich seinem relativen Volum nach bestimmen läßt. Aber auch bei dieser einzig sichern Bestimmung haben einige Chemiker den Samen des Zweifels dadurch einzustreuen gesucht, daß sie sich vorstellten, die Gase der brennbaren Körper, z. B. die des Wasserstoffs, Stickstoffs, Chlors, enthielten auf ein gegebenes Volum nur halb so viel Atome als das Sauerstoffgas, so daß z. B. zwei Volume Wasserstoffgas eine eben so große Anzahl Atome enthielten, als ein Volum Sauerstoffgas, weshalb man das Wasser als aus einem Atom eines jeden seiner Elemente zusammengesetzt betrachten zu können glaubte. Diese Annahme, die in keinem natürlichen Verhältnisse irgend einen Grund hat, wurde zuerst von dem englischen Chemiker Thomson aufgestellt, und ist seitdem von sehr vielen Andern befolgt worden. Es ist klar, daß die Unrichtigkeit dieser Annahme nicht durch Vergleichung der relativen Anzahl wägbarer Atome in den Gasen der einfachen Körper bewiesen werden kann; sie läßt sich abe

anderen Punkten aus widerlegen. Aus dem, was ich weiter unten erwähnen werde, geht hervor, daß wir mit völliger Sicherheit das relative Gewicht der Atome vom Schwefel und Sauerstoff kennen, woraus wiederum folgt, daß der Schwefelwasserstoff, welcher, ganz gleich dem Wasser in Gasform, ein dem darin enthaltenen Wasserstoff gleiches Volum hat, ohne Widerrede aus zwei Atomen Wasserstoff und einem Atom Schwefel besteht. Es ist aber nichts natürlicher, als anzunehmen, daß der eine dieser, auf gleichartige Weise zusammengesetzten Körper, so wie der andere auf zwei Atome Wasserstoff ein Atom von dem andern Bestandtheile enthalte. Wollte man dabei einwenden, der Schwefel habe so große Analogie mit dem Sauerstoff, daß von dem Schwefel dasselbe gelten müsse, wie vom Sauerstoff, so kann man diesem Einwurfe die Zusammensetzung der Unterschweifelsäure entgegenstellen, welche aus zwei Atomen Schwefel und fünf Atomen Sauerstoff besteht, und welche zeigt, daß das Gewicht vom Atom und Volum des Schwefels zu einander stehen müsse, wie bei dem Chlor, Stickstoff und Wasserstoff, d. h. daß Atom und Volum dasselbe sein müssen. Es ist außerdem bekannt, daß sich Stickgas nicht mit weniger als seinem dreifachen Volum Wasserstoffgas (im Ammoniak) verbindet, man müßte also aus einem gleichen Grunde annehmen, daß der Stickstoff 3 Mal so viel wägbare Atome als der Wasserstoff enthalte, wovon man doch auf andern Wegen die Unrichtigkeit beweisen kann.

2) Dadurch, daß man bei einem Körper, welcher mehrere Oxydationsgrade hat, die relativen Mengen von Sauerstoff bestimmt, welche von einer gegebenen Quantität des oxydirbaren Körpers aufgenommen werden. Wenn sich diese verhalten wie 1:2, so kann dieß auch sein wie 2:4; verhalten sie sich wie 2:3, so tritt auch die Alternative ein, daß in dem ersten Fall ein Atom Radikal verbunden sein kann mit einem Atom Sauerstoff, und in dem zweiten 2 Atome Radikal mit 3 Atomen Sauerstoff; ist das Verhältniß wie 3:4, so kann die Alternative statt

finden, daß einmal 2 Atome Radikal verbunden sind mit 3 Atomen Sauerstoff, und wiederum 1 Atom Radikal mit 2 Atomen Sauerstoff; ist aber das Verhältniß wie 3:5, so ist keine Alternative möglich, und es bleibt da nur die Frage übrig, ob das Atom des Radikals eins oder zwei ist. Wir werden hierauf weiter unten zurückkommen. — Wenn ein Körper nicht mehr als eine Oxydationsstufe hat, so sucht man nach, ob es nicht unter seinen Verbindungen mit Schwefel mehrere Verbindungsstufen giebt, wie es z. B. mit Arsenik und Zinn der Fall ist.

3) Wenn sich ein elektropositives Oxyd mit einem elektronegativen, z. B. eine Basis mit einer Säure, verbindet, so ist der Sauerstoff in der letztern ein Multiplum mit einer ganzen Zahl vom Sauerstoff der ersteren, und diese Zahl ist dann gewöhnlich zugleich die Anzahl der Sauerstoff-Atome in dem negativen Oxyd. Z. B. die Salpetersäure, Chlorsäure, Jodsäure, Unterschwefelsäure enthalten 5 Atome Sauerstoff, und ihre Sättigungscapacität ist $\frac{1}{5}$ von ihrem Sauerstoffgehalt; die Schwefelsäure enthält 3 Atome Sauerstoff, und ihre Sättigungscapacität ist $\frac{1}{3}$ von ihrem Sauerstoffgehalt; die schweflichte Säure enthält 2 Atome Sauerstoff, und ihre Sättigungscapacität ist $\frac{1}{2}$ von ihrem Sauerstoffgehalt. Wenn es nun der Fall ist, daß das Resultat von der Oxydationsreihe mit der Zahl übereinstimmt, welche von der Sättigungscapacität abgeleitet wird, so kann man ziemlich sicher sein, die richtige gefunden zu haben. In den Fällen, wo der Sauerstoff in dem negativen Oxyde nicht ein gerades Multiplum vom Sauerstoffgehalt des positiven Oxydes ist, sondern sich zu dem letzteren wie 3:2 oder wie 5:2 verhält, so enthält das negative Oxyd in dem erstern Falle 3 und in dem letztern 5 Atome Sauerstoff.

4) Wenn ein Körper mit einem andern Körper isomorph ist, worin man die Anzahl der Atome kennt, so wird dadurch die Anzahl von Atomen in beiden bekannt, weil die Isomorphie eine mechanische Folge der Gleichheit in der atomistischen Construction ist. Ich habe schon in dem Vorhergehenden an mehreren Stellen die wichtige

Entdeckung von Mitscherlich berührt, welche unter dem Artikel „Krystallisation“ im 4ten Th. ausführlicher beschrieben werden wird, daß nämlich Körper, aus einer gleichen Anzahl auf gleiche Weise vereinigter Atome zusammengesetzt, dieselbe Form annehmen, wenn sie krystallisiren; so jedoch, daß zwei Grundformen möglich zu sein scheinen, und daß von isomorphen Körpern sich gewisse vorzugsweise zu der einen und andere zu der zweiten halten, in welchem Falle ihre isomorphe Natur schwieriger darzulegen ist. Bei denen jedoch, welche sich vorzugsweise zu derselben Form halten, ist das Resultat leicht gegeben. Aus leicht einzusehenden Gründen kann dieses Verhältniß eben so positive Resultate geben, als die Messung der relativen Volume der Bestandtheile in Gasform. Folgendes Beispiel mag zeigen, wie wir durch die Isomorphie die Anzahl der Atome kennen lernen können. Wir kennen vom Aluminium bis jetzt nur ein Oxyd, die Thonerde. Vor der Entdeckung der Isomorphie hatte man wohl aus den Verhältnissen, in welchen sich die Thonerde mit elektropositiveren Oxyden verbindet, geschlossen, daß sie 3 Atome Sauerstoff enthalten müsse, aber nun fand Mitscherlich, daß die Thonerde mit Eisenoxyd und Manganoxyd isomorph sei, von welchen es durch die Sauerstoff-Multipla in der Oxydationsreihe bekannt ist, daß sie 3 Atome Sauerstoff enthalten. Durch die Isomorphie ist es deshalb nun auch vollkommen bewiesen, daß auch die Thonerde 3 Atome Sauerstoff enthält. Eben so fand Mitscherlich, daß Kupferoxyd, Eisenoxydul, Kobaltoxyd, Nickeloxyd, Zinkoxyd, Manganoxydul, so wie Talkerde und Kalkerde unter sich isomorph seien, daß aber wiederum durch eine andere Grundform, welche die Verbindung der Kalkerde mit Kohlensäure gemein hat mit den kohlen-säuren Verbindungen von Baryterde, Strontianerde und Bleioxyd, diese mit der Kalkerde isomorph seien, und daraus folgt, daß wenn die Anzahl von Atomen in einem einzigen dieser 11 Oxyde mit Sicherheit bestimmt werden kann, sie für alle bekannt ist.

Aus dem, was ich nun angeführt habe, könnte es wohl

den Anschein haben, als besäßen wir Auswege genug, die Anzahl der Atome in allen Oxyden kennen zu lernen; aber dem ist nicht so, und wir sind noch sehr unsicher, was von der Schwierigkeit, mit Sicherheit die Anzahl von Atomen der Radikale zu bestimmen, herrührt. Betrachten wir die Verbindungen des Wasserstoffs, Stickstoffs, Chlors und Jods, so finden wir sie in den meisten Fällen zusammengesetzt aus 2 Atomen Radikal mit 1, 2, 3 und 5 Atomen Sauerstoff. Daraus bietet sich natürlicherweise die Vermuthung dar, daß, so wie das erste Oxyd der erwähnten Körper aus 2 Atomen Radikal mit 1 Atom Sauerstoff besteht, dies ein allgemeiner Anfang der Oxydationsreihe sein könne. — Auf der andern Seite ist es, bei Vergleichung der Oxydationsstufen des Schwefels, welche nach den Multipeln 1, 2, $2\frac{1}{2}$ und 3 statt finden, ziemlich sicher, daß in dem ersten, zweiten und vierten Terme ein Atom Radikal mit 1, 2 und 3 Atomen Sauerstoff verbunden ist, und daß in dem dritten 2 Atome Schwefel mit 5 Atomen Sauerstoff vereinigt sind, wodurch die Unterschwefelsäure, hinsichtlich ihrer Zusammensetzung, mit der Salpetersäure, Chlorsäure und Jodsäure analog ist. Wenn in diesen Säuren des Schwefels das letztere, statt ein, zwei Atome ausmache, so würde die Unterschwefelsäure aus 3 Atomen Radikal mit 5 Atomen Sauerstoff bestehen, ein Verhältniß, von dem wir in der unorganischen Natur durchaus keine entsprechenden Beispiele finden. Wir können aber in diesem Falle jede Ungewissheit wegräumen; denn das Atom des Schwefels kann eben so leicht aus den Verbindungen bestimmt werden, in die er als negativer Bestandtheil eingeht, nämlich aus der Zusammensetzung der durch ihn, als negativen Körper, gebildeten Säuren, der Schwefelbasen und Schwefelsalze, und da bei Bestimmung der Atome des Schwefels dieselben Regeln gelten müssen, wie bei Bestimmung der Sauerstoff-Atome, und das Resultat dann dasselbe Gewicht für das Atom des Schwefels giebt, als wenn die Schwefelsäure als aus 1 Atom Schwefel und 3 Atomen Sauerstoff zusammengesetzt betrachtet wird, so kann die-

ser Punkt als vollkommen entschieden angesehen werden. Wir haben dadurch zwei Oxydationsreihen, von welchen ich die eine die Stickstoffreihe nennen will, die, wenn R ein Atom Radikal und O ein Atom Sauerstoff bedeutet, aus $2R+O$, $R+O$, $2R+3O^*$, $2R+5O$ gebildet ist. Die andere, welche ich die Schwefelreihe nennen will, ist gebildet aus $R+O$, $R+2O$, $R+3O$ u. s. w. ******). Wir sind so nahe gekommen, daß wir bestimmt sagen können, die Oxydationsreihe eines Körpers werde eine von diesen sein; aber es ist gegenwärtig für die meisten brennbaren Körper unmöglich, mit voller Sicherheit zu entscheiden, zu welcher von diesen dieselben gehören. Wir werden weiter unten sehen, daß die Umstände für die Stickstoffreihe, als die allgemeinste, sprechen; dagegen hat die des Schwefels einen so ausgemachten Vorzug hinsichtlich der Einfachheit der Berechnung, daß sie aus diesem Grunde vorzugsweise von mir gewählt wurde, bis daß es, wenn nicht bewiesen, wenigstens höchst wahrscheinlich gemacht worden ist, daß sie nicht die richtige sei. Wo man zum Berechnen eine derselben wählen mußte, habe ich überall, wo es nicht gegeben ist, zu welcher Reihe ein Körper gehört, die Reihe des Schwefels angenommen. Der einzige Fehler, welcher hierbei gemacht wird, ist, daß das Atom des Radikals doppelt so schwer wird, als es ist; da es aber beständig zu demselben Gewicht berechnet wird, so

*) Ich habe absichtlich die von $R+2O$ nicht aufgestellt, welche von französischen Chemikern *acide nitreux* genannt wird, weil sowohl ihre Zusammensetzungs- als Zersetzungs-Erscheinungen zeigen, daß sie bei dem Stickstoff besteht aus einem Atom Stickstoffoxyd, verbunden mit einem Atom Salpetersäure, das heißt, aus 3 Atomen Stickgas und 6 Atomen Sauerstoffgas.

***) Es ist hier nicht meine Meinung, anzudeuten, daß es in der Natur zwei verschiedene Reihen gebe, sondern es handelt sich bloß darum, daß wir von dem, was wir mit Gewißheit wissen, auf das, was nicht durch direkte Versuche ausgemittelt werden kann, geleitet werden. Ich halte es daher für sehr wahrscheinlich, daß die in der Reihe des Schwefels fehlenden Glieder, die sie der des Stickstoffs gleich machen würden, nämlich $2R+O$ und $2R+3O$, möglicherweise künftig noch entdeckt werden.

hat dieß keinen Einfluß auf die Richtigkeit der Berechnungen.

Ich werde nun einige Beispiele von den Betrachtungen anführen, durch welche man sich bei der Wahl zwischen den beiden Reihen leiten lassen kann.

Untersuchung der Oxydationsreihe des Kohlenstoffs. Der Kohlenstoff hat drei Oxydationsstufen, welche sich unter einander wie 1, $1\frac{1}{2}$ und 2, oder wie 2, 3 und 4 verhalten. Mehrere Gründe sprechen in dem Grade gegen den Umstand, das Kohlenoxyd enthalte 2, und die Kohlensäure 4 Atome Sauerstoff, daß ich nicht glaube, daß sie in Betrachtung zu kommen brauchen. Es bleibt dann die Frage übrig, ob das Kohlenoxyd $R+O$ oder $2R+O$ sei. Beide Meinungen haben ausgezeichnete Autoritäten für sich. Wenn das Kohlenoxyd die zuerst angeführte Zusammensetzung hat, so ist die Oxalsäure $4R+3O$; gewiß fehlt es uns an Beispielen einer solchen Zusammensetzung in der unorganischen Natur; aber die Oxalsäure ist ein Product von organischen Substanzen, und da wäre diese Zusammensetzung nicht ungewöhnlich. Ein Volum kohlen-saures Gas verwandelt sich in 2 Vol. Kohlenoxyd-gas, und dieß würde eben sowohl statt haben, wenn sich 2 Vol. Kohlen-gas mit 1 Vol. Sauerstoff-gas verbänden und sich zu 2 zusammenzögen, als wenn sich ein Volum eines jeden Elementes, wie gewöhnlich, ohne Condensation verbände. Wenn aber das kohlen-saure Gas aus 1 Volum Kohlenstoff und 1 Volum Sauerstoff-gas besteht, so wären seine Elemente zur Hälfte zusammengezogen, weil es nur das Volum des Sauerstoff-gases einnimmt; besteht es dagegen aus 2 Volumen Sauerstoff-gas und 1 Volum Kohlen-gas, zu 2 zusammengezogen, so stimmt dieß mit einem ganz gewöhnlichen Verhältnisse überein. Wir sehen ferner, daß die Kohlensäure in ihren einfachsten Verbindungen mit den Alkalien und alkalischen Erden 2 Mal den Sauerstoff der Base enthält, ein Verhältniß, welches wiederum mit der Annahme von 2 Atomen Sauerstoff in der Kohlensäure übereinstimmt; und vergleicht man nun alle Wahrscheinlichkeiten für den

einen oder den andern Anfang der Reihe, so bleibt größte Wahrscheinlichkeit offenbar bei $R+O$, $2R+R+2O$.

Bei dem Arsenik und dem Phosphor findet selbe Oxydationsreihe wie bei dem Stickstoff statt, nämlich 2, 3 und 5, denn der Schwefel (im Realgar) bei dem Arsenik aus, was in den Oxydationsstufen. Hier entsteht folglich ebenfalls die Frage, ob diese 2 Atome Radikal oder 1 enthalten. Es ist keine notwendige Folge der Reihe, daß die 2 Atome Radikal auf 3 und 5 Atome Sauerstoff enthalten; aber von den Fällen, die determinirt werden könnten, ist keiner, welcher ein Atom Radikal enthält. Fälle, welche noch zu determiniren übrig sind, sind die beiden angeführten, so wie die Antimonsäure und Mangan säure. Von dem Bekannten sollte man auf die Unbekannte schließen können. Aber auf der andern Seite muß folgender Umstand, der möglicherweise für das Gegentheil spräche, nicht unbemerkt gelassen werden, nämlich: die Salpetersäure, die Chlorsäure, die Jodsäure und die Unterschwefelsäure sättigen eine Quantität Basis, deren Sauerstoff $\frac{1}{2}$ ihres Sauerstoffgehalts ist; die Arsenik- und die Phosphorsäure dagegen sättigen eine Quantität Basis, deren Sauerstoff $\frac{2}{3}$ ihres Sauerstoffgehalts ist, das Doppelte von den vorhergehenden; sie sind mit den vorhergehenden isomorph, aber nicht isomorph mit einer der vorhergehenden. Dies könnte vielleicht davon ein Grund sein, daß in diesen Säuren das Verhältniß des Radikals zum Sauerstoff ein anderes sei, als in der Salpetersäure und der Chlorsäure. Indessen halte ich, zumal, da in der Reihe des Schwefels selbst die 5 Atome Sauerstoff halbes Atom Radikal aufnimmt, die Unterschwefelsäure auch 2 Atome Radikal aufnimmt, für die Idee von 2 Atomen Radikal in unorganischen Säuren, welche 5 Atome Sauerstoff enthalten, für so überwiegend, daß die Atomzahlen 5:2 in den Säuren so lange als immer zusammengehörend betrachtet werden könnten, daß ein Beispiel vom Gegentheile zur Genüge bewiesen werden würde.

Die Bestimmung der Oxydationsreihe der elektropositiven Metalle gehört zu den wichtigsten Punkten in der Atomlehre. Ich habe erwähnt, daß mehrere der stärkeren Basen unter den Metallen mit den alkalischen Erden isomorph sind, so wie, daß Eisenoxyd, Manganoxyd und Chromoxyd mit der Thonerde isomorph sind. Aus der Lehre von den isomorphen Körpern folgt, daß brennbare Körper, welche mit einer gewissen Anzahl von Sauerstoff-Atomen unter sich isomorph sind, es auch mit anderen müssen, wenn sie sich mit einer anderen, aber gleichfalls mit einer gewissen Anzahl von Sauerstoff-Atomen verbinden. Daher gehören auch Aluminium und Chrom zu den zuvor erwähnten isomorphen Körpern. Aus uns unbekanntem Urtheile bieten nicht alle Körper eine gleiche Anzahl oder entsprechende Oxydationsstufen dar, aber diejenigen, welche den isomorphen Körpern angehören, kann man als isomorph ansehen, und folglich den einen eine Verbindungsstufe ergänzend betrachten, die bei dem andern fehlt. Auf diese Weise bekommen wir, wenn wir die relativen Mengen von Sauerstoff betrachten, die sich mit diesen Körpern verbinden, folgende Multipeln, nämlich:

- 1 im Kupferoxydul;
- 2 im Kupferoxyd, Eisenoxydul u. a. m.;
- 3 im Eisenoxyd, Manganoxyd, der Mennige u. a.;
- 4 im braunen Bleisuperoxyd, Mangansuperoxyd;
- 5 in der Mangansäure.

Vergleichen wir nun die Schwefelungsstufen des Eisens (Th. II. p. 363—374.) mit Ausnahme der ersten, so finden wir da die Multipeln 1, 2, 3 und 4, wobei 2 und 3 in der Schwefelreihe, 2 und 3 in der Oxydationsreihe entsprechen. Das Angeführte scheint ziemlich gute Veranlassungen zu geben, diese Multipeln als den Ausdruck der richtigen Anzahl von Schwefel- und Sauerstoff-Atomen, verbunden mit einem Atom vom Radikal, zu betrachten. Auch habe ich dies lange für die Berechnung der Atome dieser Körper zum Grunde gelegt, jedoch nicht ohne alle die Umstände im Gesicht zu behalten, welche dagegen sprechen konnten, und nicht ohne die Unsicherheit und

den dabei begangenen möglichen Irrthum einzugestehen^{*)}. Eine mehr erweiterte Erfahrung, und vorzüglich die Anwendung der durch die Isomorphie gegebenen Resultate, die damals noch nicht entdeckt waren, haben mich seitdem veranlaßt, in diesem Falle die Ansichten zu verändern und, statt die eben angeführte Reihe als aus einem Atom Radikal mit 1, 2, 3, 4 und 5 Atomen Sauerstoff bestehend zu betrachten, sie als aus $2R + O$, $R + O$, $2R + 3O$, $R + 2O$, $2R + 5O$ zusammengesetzt anzusehen, das heißt, für die elektropositiven Metalle die Oxydationsreihe des Stickstoffs und nicht die des Schwefels, so wie wir sie gegenwärtig kennen, anzunehmen. Die Aenderung, welche dieß in den früher von mir angenommenen Verhältnissen macht, betrifft hauptsächlich das Gewicht vom Atom der elektropositiven Metalle, welches hierdurch auf die Hälfte herabgesetzt wird.

Ich will nun die Gründe angeben, welche mich veranlaßten, die zuletzt angeführte Reihe als die richtigste zu betrachten.

1) Setzt dieselbe kein so großes Uebergewicht in den Atomen des Sauerstoffs, oder im Allgemeinen in den Atomen des elektronegativen Elementes, und auch nicht bei mehreren Metallen so viele fehlende oder noch unentdeckte Verbindungsgrade voraus. So lange man in dem Chlor Sauerstoff annahm, waren seine höheren Oxydationsgrade Beispiele von Verbindungen mit vielen Atomen Sauerstoff; wir haben in dem Vorhergehenden gesehen, daß selbst die oxydirte Chlorsäure nur 3 Atome Sauerstoff auf ein Atom Radikal enthält, und wenn wir die Oxydationsreihe des Stickstoffs für die Metalle im Allgemeinen annehmen, so werden 3 Atome Sauerstoff auf 1 Atom Radikal die höchste, bis jetzt bekannte Oxydationsstufe.

2) Einige Metalle, z. B. das Zink, das Blei, das Wismuth, das Kupfer und das Quecksilber haben in ihrer er-

*) Ich verweise hierüber auf meine kleine Schrift: *Essai sur la Théorie des proportions chimiques etc.* Paris 1819. *Introduct. p. XV.* und mehrere andere Stellen darin.

sten Oxydationsstufe entweder nicht das Vermögen, sich mit Säuren zu verbinden, oder thun es nur unter gewissen Bedingungen; aber in beiden Fällen wird dieses Oxyd von stärkeren Säuren, welche dasselbe nicht oxydiren können, z. B. von Schwefelsäure, zersetzt, wobei reducirtes Metall und die folgende Oxydationsstufe, die sich dann als Basis mit der Säure verbindet, hervorgebracht werden. Es ist dann wahrscheinlicher anzunehmen, daß $2R + O$ ein R abscheide, und daß die stärkste Affinität bei $R + O$ liege, als daß von 2 Atomen $R + O$ das eine seinen Sauerstoff dem andern abgebe, um ein R und $R + 2O$ zu bilden, dessen Zusammensetzung dann auf der stärkeren Affinität beruhen würde. Indessen sind alles dieß nur Wahrscheinlichkeiten, für sich selbst unzureichend, etwas zu entscheiden.

3) Im Zusammenhang mit ihren vortrefflichen Untersuchungen über die Wärme, stellten Dulong und Petit verschiedene Forschungen über die eigenthümliche Wärme mehrerer der gewöhnlichen Metalle an, und fanden dieselbe in dem Grade abnehmend, als die Atomgewichte zunahmen, so, daß durch Multiplication der ersteren mit letzteren immer dieselbe Summe erhalten wurde. Dieß traf jedoch nur in dem Falle ein, wo das Atomgewicht dieser Metalle so genommen wurde, wie es aus der nun angenommenen Reihe folgt. Das Atom des Schwefels, dessen Gewicht ich (mit einiger Unsicherheit in den letzten Decimalen) mit Gewißheit für bekannt halte, dient dabei zur Vergleichung. Nimmt man dann die Oxydationsreihe des Stickstoffs für diese Metalle an, so wird das Product ihres Atomgewichts, multiplicirt mit ihrer eigenthümlichen Wärme, gleich mit demselben Product vom Atomgewicht und der eigenthümlichen Wärme des Schwefels; nimmt man aber die Oxydationsreihe des Schwefels an, so fällt das Atom doppelt so schwer aus, und das erwähnte Product von der Multiplication des Atomgewichts mit der eigenthümlichen Wärme wird dann doppelt so groß, als das des Schwefels. Ein überzeugender Grund, um, wenn

100 Bestimmung der relativen Anzahl

man das Atomgewicht des Schwefels als gekannt annimmt, das der übrigen zur Hälfte herabzusetzen.

Ich will hier die Resultate von Dulong's und Petit's Vergleichen anführen.

	Eigenthüml. Wärme.	Atom- gewicht.	Product ihrer Multi- plication.
Schwefel	0,1880	201,15	0,3790
Gold	0,0298	1243,0	0,3704
Platin	0,0314	1215,2	0,3816
Zinn	0,0514	735,3	0,3779
Wismuth	0,0288	1330,4	0,3835
Kupfer	0,0949	395,7	0,3755
Blei	0,0293	1294,5	0,3793
Zink	0,0927	403,2	0,3738
Nickel	0,1035	369,7	0,3826
Eisen	0,1100	339,2	0,3731.

Die zwischen den Zahlen in der dritten Columne entstehenden Verschiedenheiten sind von zu geringer Bedeutung, als daß nicht in den angeführten Fällen das Verhältniß zwischen dem eigenthümlichen Gewichte und dem Atomgewichte als constant betrachtet werden könnte.

Man kann sich dabei fragen, ob dieses Verhältniß so beständig sei, daß man aus der eigenthümlichen Wärme eines Körpers mit Sicherheit sein Atomgewicht berechnen kann. Dieß möchte noch nicht zu beantworten sein; aber unter den von Dulong und Petit untersuchten Körpern fanden sich mehrere, bei welchen es nicht der Fall war. Arsenik und Antimon ließen sich nicht zu einem solchen Resultate bringen. Silber und Tellur gaben die Summe doppelt so groß, als sie, allen Gründen nach zu vermuthen, sein zu müssen scheint, und Kobalt, welches eins der zuvor erwähnten isomorphen elektropositiven Metalle ist, mit denen es eine und dieselbe Oxydationsreihe hat, und dessen Atom man folglich als eben so bekannt, als das jener betrachten kann, gab das Product von der Multiplication des Atomgewichtes mit der eigenthümlichen

Wärme $1\frac{1}{2}$ Mal so groß, als es ausfallen sollte. Wenn nun das von der eigenthümlichen Wärme abgeleitete Resultat das richtige wäre, so würde die Oxydationsreihe des Kobalts bestehen aus $3R+2O$, $R+O$, $3R+4O$, wobei $3R+2O$ das Kobaltoxyd sein würde. Ein solches Verhältniß ist, wenigstens für gegenwärtig, durchaus nicht wahrscheinlich. — Eine Fortsetzung von Dulong's und Petit's vortrefflicher Arbeit in diesem Gegenstande würde indessen ein wesentlicher Dienst für die Wissenschaft sein.

4) Bei der Untersuchung der Oxydationsreihe des Chroms findet das ungewöhnliche Verhältniß statt, daß in der niedrigsten Oxydationsstufe des Chroms, dem Oxydul, sich der Sauerstoff zu der Sauerstoffmenge in der höchsten, der Chromsäure, wie 1:2 verhält. Dagegen findet man, daß in chromsauren Salzen die Säure eine Quantität Basis sättigt, deren Sauerstoff $\frac{1}{3}$ von dem der Säure ist, woraus man mit Grund schließen kann, daß diese Säure 3 Atome Sauerstoff enthält; aber aus Mitscherlich's Untersuchungen ist es auf der andern Seite bekannt, daß das Chromoxydul isomorph ist mit Eisenoxyd, Manganoxyd und Thonerde, und daß es folglich ebenfalls 3 Atome Sauerstoff enthalten muß; und da sich erweislich in beiden eine gleiche Anzahl von Sauerstoff-Atomen findet, so muß die Ursache des multipeln Verhältnisses von 1:2 darin liegen, daß, wenn die Chromsäure $R+3O$ ist, das Chromoxydul $2R+3O$ ist, was wiederum vollkommen mit der Zusammensetzung von Eisenoxyd und Manganoxyd übereinstimmt, die aus der zuvor angenommenen Reihe folgt.

Ferner ist es bekannt, daß in der Oxydationsreihe des Mangans die Sauerstoffmultipeln sich wie 2, 3, 4 und 5 verhalten, und daß das letzte davon eine Säure ist; wir haben vorher gesehen, daß Säuren mit 5 Atomen Sauerstoff, aller Wahrscheinlichkeit nach, immer 2 Atome Radikal enthalten; wenn aber die Mangansäure $2R+5O$ ist, so ist das Manganoxyd auch $2R+3O$, und auf diese Weise leiten alle Umstände, die uns hier leiten können, zur Annahme derselben Reihe.

102 Bestimmung der relativen Gewichte

Ich bekenne aufrichtig, daß die Verhältnisse des Chroms und Mangans, vor allen andern, mich bestimmt haben, die Reihe des Stickstoffs, als die, aller Wahrscheinlichkeit nach, richtigste zu wählen, und die dem Ansehen nach weit einfachere, die ich zuvor befolgte, aufzugeben. Diese kann möglicherweise auch richtig sein, wenn, aus zuvor angeführten Gründen, die Anzahl von einfachen Atomen in den zusammengesetzten nicht so einfach ist, als die Rechnung sie giebt, sondern daß, was nach der Rechnung aus $R+O$ besteht, eigentlich aus $2R+2O$ besteht. Schwerlich möchte indessen hierüber etwas von Seiten der Erfahrung ausgemacht werden können; aber die Vermuthung, daß eine Verbindung von einem Atom mit einem in der Natur nicht existire, obgleich es nach unsern Rechnungen der Fall ist, kann einigen Grund darin bekommen, daß ein solches, aus zwei Sphären zusammengesetztes Atom nur eine lineäre Dimension haben würde, während dagegen aus 3, 4, 5, 6 etc. Sphären Körper entstehen, welche, wenn ich so sagen darf, den Keim zu der bestimmten mathematischen Figur enthalten, die an ihren Krystallen in so großer Regelmäßigkeit wahrzunehmen ist.

Aus dem Vorhergehenden folgt, daß wir die stärkeren Basen als aus einem Atom Radikal und einem Atom Sauerstoff zusammengesetzt betrachten, und hiernach berechnen wir das Atomgewicht der Radikale.

V. Ueber die Art, die relativen Gewichte der einfachen Atome zu bestimmen und mit einander vergleichbar zu machen.

Eine der einfachsten Methoden, die relativen Gewichte der Atome zu bestimmen, ist die, daß man mit gehöriger Genauigkeit die Körper in Gasform wägt und das specifische Gewicht derselben mit einander vergleicht. Allein abgesehen davon, daß diese Methode sich nur bei sehr wenigen Körpern ausführen läßt, erfordern auch

solche Versuche, wenn das Resultat genau werden soll, einen hohen Grad von Geschicklichkeit und unausgesetzte Aufmerksamkeit auf eine Menge von Schwierigkeiten, die man zu besiegen hat. Von solcher Art ist die Schwierigkeit, eine Gasart absolut rein, ohne Einmischung von Luft, Wassergas und andern Gasarten, zu erhalten; die Schwierigkeit, das zu wägende Gas genau von gleicher Elasticität mit der Luft während der Wägung zu bekommen u. s. w. Das Atomgewicht des Sauerstoffs, Stickstoffs und Wasserstoffs haben auf diese Weise so ziemlich genau bestimmt werden können, weil diese Gase keine Einwirkung ausüben auf die metallnen Hähne des Gefäßes und auf das Fett, womit diese, um dicht zu halten, überzogen sind. Das Atomgewicht des Kohlenstoffs hat auf gleiche Art aus der Wägung des Kohlensäuregases, das ein dem seinigen gleiches Volumen Sauerstoffgas enthält, abgeleitet werden können, da alles, was jenes mehr wiegt als dieses, Kohlenstoff ist. Solche Gase hingegen, die mit Leichtigkeit die Hähne angreifen, oder von dem Fette auf ihnen absorbirt, oder sonst leicht verändert werden, wie z. B. Chlor, Schwefel- und Phosphorwasserstoffgas, so wie auch die sauren Gase im Allgemeinen, können auf diese Weise wohl approximativ gewogen werden; aber das Resultat dieser Wägung kann den hohen Grad von Genauigkeit nicht erreichen, welche in der Gewichtsbestimmung bei den Körpern in fester, oder zuweilen in flüssiger Gestalt durch gut gewählte synthetische oder analytische Methoden erreicht werden kann.

Die gewöhnlichste Weise, die Atomgewichte der Körper zu erhalten, besteht darin, die Verbindungen derselben mit Sauerstoff mit möglichster Genauigkeit zu analysiren, sobald man, durch das, was ich vorhin angeführt habe, die relative Anzahl der Atome in der Verbindung kennt. Wenn sie z. B. aus 3 Atomen Sauerstoff und einem Atom des Radikals besteht, so verhält sich das Gewicht von einem Atom Sauerstoff zu einem Atom des Radikals, wie $\frac{1}{3}$ der gefundenen Sauerstoffmenge zu der ganzen gefundenen Menge des Radikals, oder bloß zu der Hälfte

20. Bestimmung der element. Gewichte

bestimmt, wenn das Gewicht des Leuchtens um 13 Atome
abnimmt und dieser Lackat besteht.

In der getrockneten Kronegewichte mit einander ver-
setztbar zu machen, nimmt man das Gewicht eines un-
ter ihnen an, wählet z. B. die weiche, man wählet die
andere, erhebet und sie die damit verhältnissmäßig macht,
z. B. 10, 10, 10, das spezifische Gewicht der Körper mit
dem sie Arbeit angenommen ist, ist das Wasser
verhältniss.

Bei der Wahl des Körpers, wechset die Einheit ver-
setzt, aber die Bemerkung ist, dass die Einheit
mit dem Wasserstoff getheilt.

Letztlich wechset diese nicht sicher Vergleich ver-
setzt, wählet man den Wasserstoff, warum, weil die-
sen Kronegewicht das kleinste von allen ist. Daraus
besteht es besteht von einer Menge von Atomen be-
steht, wenn man sie die ist von Kronegewicht erhalten,
nach die Behandlung von 2-100, das die Kronegewicht
der Körper, wie sie wird diese Kronegewicht bestimmt wer-
ten, den getrockneten Muthen des Kronegewichts vom Was-
serstoff in 1000 summen, das die Kronegewicht möglicher-
weise nur den Behandlungszustand zugeschrieben werden
kann. Bei dieser Berechnung man 2-100 das Kronege-
wicht des Wasserstoffs geht er mit zwei Zahlen Was-
serstoff, mit wenn diese Berechnung richtig wäre, so
würden die Kronegewichte aller Körper ohne die di-
vidiren man durch die Summe, welche das Gewicht von
zwei Atomen Wasserstoff austricht, aber das spezifische
Gewicht aller Krone müsste eine Zeit einwirkbar sein durch
das Doppelte spez. Gewicht des Wasserstoffes. Versu-
chen wir es unter der letzteren Form, er ändert wir, das,
wenn das spezifische Gewicht des Wasserstoffes 0,0688,
also das Doppelte desselben 0,1376 ist, dasselbe das Ge-
wicht des Stickstoffes = 0,975 mit 7,12, das des Kohlen-
stoffes = 1,924 mit 11,975, das des Sauerstoffes mit
und das des Chlors = 2,4252 mit 17,62 dividirt
auch bei den drei ersten die Abweichung für
halten könnte, so ist sie doch beim

Chlor zu groß, als daß man sie für einen Fehler in der Beobachtung halten könnte, selbst wenn man annähme, daß dergleichen sowohl bei der Wägung des Chlors, als auch bei der des Wasserstoffs begangen sein sollten. Durch Vergleichung mit dem Gewicht des Wasserstoffs zu gleichen Volumen wird überdies dem Fehler auch nicht abgeholfen. Auf jeden Fall verdient dieser Gegenstand so ausführlich untersucht zu werden, daß man, falls Prout's Bemerkung ohne Grund ist, sie als vollkommen widerlegt zu betrachten hat, oder, falls sie richtig, daß man sie als zuverlässig annehmen kann. Statt dessen haben mehrere Chemiker auf den Anschein der Sache dieselbe für gegeben betrachtet und danach Tabellen errichtet. Diese Frage zu entscheiden ist schwer. Der geringste Fehler in dem Atomgewicht des Wasserstoffs wird bei der Berechnung so oft multiplicirt, daß die Uebereinstimmung mit den geraden Multipeln, eben so leicht wie die Abweichung von ihnen, eine Folge der Beobachtungsfehler sein kann. Bei einigen Körpern liegt sogar das ganze Atomgewicht des Wasserstoffs nicht völlig außerhalb der Gränzen der Beobachtungsfehler. Ist Prout's Vermuthung gegründet, so kann das Atomgewicht des Wasserstoffs nur genau auf die Art erhalten werden, daß man die Atomgewichte der übrigen Körper mit den vorausgesetzten Multipeln dividirt und von den verschiedenen auf diese Art erhaltenen Resultaten die Mittelzahl nimmt. Jedoch hat ein solches Multiplum-Verhältniß zwischen dem Atomgewicht des Wasserstoffs und dem der übrigen Körper keinen Grund von der Art, daß es theoretisch vorausgesetzt werden könnte, sondern dessen Wirklichkeit, falls sie statt findet, muß für die Atome eines jeden Körpers factisch nachgewiesen werden. Ein solcher Versuch ist von Thomson gemacht worden, aber auf eine Weise, welche die Frage eben so unentschieden gelassen hat. Sein Verfahren bestand darin, daß er die von Andern bestimmten Atomgewichte auf das nächste gerade Multiplum des doppelten Atomgewichts vom Wasserstoff reducirte, und danach bestimmte er alsdann die

Gewichte der zusammengesetzten Atome. Um nun zu beweisen, daß die von ihm auf diese Art gefundenen Zahlen die einzig richtigen seien, hat er sie einer Probe unterworfen, die, wenn sie einschlägt, in vielen Fällen entscheidend ist, der nämlich, daß von solchen Salzen, die sich gegenseitig zersetzen, wie z. B. von schwefelsaurem Kali und Chlorbaryum, diejenigen Quantitäten, welche hernach als Atomgewichte angenommen werden, einander genau ausfällen; er führt dabei an, daß die Fällung stets so vollständig eintraf, wie es die Berechnung voraussetzte. — Ich habe gerade das angeführte Beispiel auf das allersorgfältigste mit reinen Materialien und mit äußerster Genauigkeit abgewogenen Quantitäten wiederholt und gefunden, daß $2\frac{1}{4}$ Procent vom Chlorbaryum unausgefällt blieben *). Thomson's Arbeit in diesem Felde ist also zum wenigsten unzuverlässig.

Die andere Methode zur Vergleichung der Atomgewichte besteht darin, das Atomgewicht des Sauerstoffs zur Einheit anzunehmen. Ich gebe dieser vor der ersten den Vorzug, aus dem Grunde, weil die meisten Körper, mit denen die Chemie sich beschäftigt, Oxyde oder Verbindungen von Oxyden sind, und es also eine große Erleichterung bei allen Berechnungen ist, nur 100, 200, 300 u. s. w. dem Atome des Radikals hinzuzulegen zu brauchen, um die Gewichte der Oxyde zu erhalten. Denen, welche das Atom des Wasserstoffs zur Einheit annehmen, entgeht diese Erleichterung; sie nehmen das Atomgewicht des Sauerstoffs zu 8 oder 16 an, je nachdem sie das Gewicht des Sauerstoffs mit 2 oder mit einem Atom Wasserstoff vergleichen. Man muß dann beständig diese Zahl mit 2, 3 oder 5 multipliciren, um das Gewicht der Sauerstoffatome zu erhalten, die zu dem Atomgewicht des Radikals addirt werden sollen. In Rücksicht

*) Dieser Versuch ist mehrmals mit denselben Resultaten wiederholt worden, und zwar mit Salzen, die jedes Mal besonders aus reinen Materialien bereitet wurden, damit kein unbeachteter zufälliger Umstand dazu beitragen konnte.

auf Leichtigkeit und Einfachheit in der Berechnung hat also der Sauerstoff als Einheit große Vorzüge und wird sie auch behalten, selbst wenn das zuvor angeführte Multiplum-Verhältniß des Wasserstoff-Atomgewichtes sich bestätigen sollte.

Ich nehme das Atomgewicht des Sauerstoffs zu 100 an. Man hat dagegen eingewandt, daß hierdurch die Zahlen zu groß würden. Aber diesem Einwand fehlt jeder gültige Grund, denn eine gewisse Größe wird bei jedem Decimalbruch erfordert, damit er so nahe wie möglich die volle Genauigkeit erhält. Derjenige, welcher keine große Genauigkeit braucht, kann nach üblicher Weise die Zahl abkürzen, indem er so viel abnimmt, daß nur die beiden ersten Ziffern übrig bleiben; derjenige aber, welcher eine große Genauigkeit gebraucht, kann sich nicht mit einer so kurzen Zahl behelfen. Die englischen Schriftsteller sehen sehr darauf, daß die Zahlen kurz und leicht zu behalten sind, und machen sich deshalb kein Gewissen daraus, ein gefundenes Resultat bis zum nächsten Multiplum des doppelten Wasserstoffatoms zu verkleinern oder zu vergrößern, wodurch sie alle Brüche los werden. Es scheint mir aber nicht Recht zu sein, die Zahlen zur Erleichterung für das Gedächtniß abzukürzen, wenn es auf Kosten der Genauigkeit geschieht, weil sich gewiß höchst selten jemand in dem Falle befindet, daß er sich bei einer chemischen Berechnung nur auf sein Gedächtniß zu verlassen braucht, und bei einer genauen Berechnung darf man es niemals thun.

VI. Ueber die Art, durch Formeln die Zusammensetzung der Körper auszudrücken, sowohl hinsichtlich ihrer Elemente, als auch hinsichtlich der Anzahl ihrer Atome.

In dem Vorhergehenden haben wir gesehen, wie die Symbole der Radikale und des Sauerstoffs die Vorstellungen von den verschiedenen Oxydationsreihen erleichtern. Wenn man einem jeden Körper ein besonderes Zeichen

108 Art, durch Formeln die Zusammensetzung

giebt, welches das relative Gewicht seines Atomes vorstellt, so kann man davon einen allgemeineren Gebrauch machen. Zu diesen Zeichen wählen wir den Anfangsbuchstaben der lateinischen Namen der Körper. Wenn die Namen mehrerer Körper mit demselben Buchstaben anfangen, so setze man den ersten Buchstaben hinzu, welchen sie nicht gemeinschaftlich besitzen. So z. B. bedeutet C=Kohlenstoff, Cl=Chlor, Cr=Chrom, Cu=Kupfer, Co=Kobalt. Bei den Metalloiden setzt man keinen Buchstaben hinzu, auch dann nicht, wenn ihre Namen mit demselben Buchstaben anfangen, wie die einiger Metalle. Chlor und Kiesel machen indess eine Ausnahme davon, weil deren Namen mit denselben Buchstaben anfangen; wie Kohle und Schwefel.

Die Anzahl der Atome wird durch Ziffern bezeichnet. Eine Ziffer zur Linken multiplicirt alle Atome, welche derselben, bis zum nächsten + Zeichen oder bis zu Ende der Formel, zur Rechten steht. Eine kleine Zahl zur Rechten oben gestellt, wie ein algebraischer Exponent, multiplicirt nur die Atomgewichte zur Linken, wenn welche dahingestellt sind. Z. B. $S^2 O^3$ bedeutet ein Atom Unterschwefelsäure, aber $2S^2 O^3$ bedeutet zwei Atome von derselben Säure.

In allen solchen Fällen, wo 2 Atome des Radikals sich mit 1, 3, oder 5 Atomen Sauerstoff verbinden, wie z. B. der Schwefel, wird die Deutlichkeit der Formel sehr vermehrt, wenn man ein besonderes Zeichen für Doppelatome hat. Das natürlichste Zeichen wäre gewiß, die Anfangsbuchstaben zu verdoppeln, aber auf eine solche Weise, daß sie zusammenhängend bleiben und nicht zwei, sondern ein Zeichen ausmachen. Um diese Formeln im Schreiben zu bezeichnen, habe ich es jedoch weit leichter zu bewerkstelligen und eben so deutlich gefunden, durch den Anfangsbuchstaben, wenn er zwei Atome bezeichnen soll, im untern Drittel desselben einen geraden Strich zu ziehen, so daß z. B. P ein einfaches und $\underset{\sim}{P}$ ein doppeltes Atom Phosphor bedeutet, As ein einfaches und $\underset{\sim}{As}$ ein doppeltes Atom Arsenik.

Wenn man zusammengesetzte Atome der ersten Ordnung ausdrücken will, kann es auf folgende Art geschehen: $\text{CuO} + \text{SO}^3$ bedeutet schwefelsaures Kupferoxyd, und $\text{Fe} + 3\text{SO}^3$ bedeutet schwefelsaures Eisenoxyd. Wenn man aber die Zusammensetzung eines Doppelsalzes, d. h. eines zusammengesetzten Atomes zweiter Ordnung, ausdrücken will, wird die Formel auf diese Weise lang und unübersichtlich, und da diese Atome zweiter Ordnung gewöhnlich nichts anderes sind, als Sauerstoffsalze oder Schwefelsalze, so kann man mit Leichtigkeit, oberhalb der Radikale, die Anzahl der Sauerstoffatome mit Punkten, die der Schwefelatome mit Kommaten bezeichnen, wenn man glaubt, daß dies letztere bei einigen Fällen Nützlichkeit hat. Man bezeichne z. B. schwefelsaures Kupferoxyd mit CuS^{\cdot} , schwefelsaures Eisenoxyd mit FeS^{\cdot} , und man mit $\text{K}^{\cdot}\text{S}^{\cdot} + \text{Al}^{\cdot}\text{S}^{\cdot} + 24\text{H}$. Indes pflege ich gewöhnlich das Wasseratom mit Aq zu bezeichnen. Auf dieselbe Weise kann z. B. K^{\cdot} Schwefelkalium bedeuten, und z. B. Mo^{\cdot} bedeuten molybdänschwefliges Schwefelkalium. Diese Schwefelverbindungen kommen indes bis jetzt so selten vor, daß die Abkürzung ihrer Formeln zu keiner bedeutenden Erleichterung führen wird. Ich pflege gewöhnlich diese Formeln mit dem elektropositiven Theile anzufangen und mit dem elektronegativen zu beenden.

Folgendes sind die Symbole, welche die einzelnen einfachen Körper bezeichnen:

o Sauerstoff	B Bor
h Wasserstoff	Si Kiesel
v Stickstoff (<i>Nitrogenium</i>)	Se Selen
s Schwefel	As Arsenik
p Phosphor	Cr Chrom
cl Chlor	Mo Molybdän
j Jod	W Wolfram
f Fluor	Sb Antimon (<i>Stibium</i>)
c Kohlenstoff	Te Tellur

110 Art, durch Formeln die Zusammensetzung

Ta	Tantal	Co	Kobalt
Ti	Titan	Ni	Nickel
Os	Osmium	Fe	Eisen
Au	Gold	Mn	Mangan
Ir	Iridium	Ce	Cerium
R	Rhodium	Al	Aluminium
Pt	Platin	Zr	Zirkonium
Pd	Palladium	Y	Yttrium
Hg	Quecksilber	Be	Beryllium
Ag	Silber	Mg	Magnesium
Cu	Kupfer	Ca	Calcium
U	Uran	Sr	Strontium
Bi	Wismuth	Ba	Baryum
Sn	Zinn	L	Lithium
Pb	Blei	Na	Natrium
Cd	Cadmium	K	Kalium.
Zn	Zink		

Diese Anfangsbuchstaben hat man gewählt aus der lateinischen Nomenclatur, weil sie den Naturforschern aller Länder angehört, von ihnen allen gebraucht werden kann, ohne daß es nöthig ist, jene nach der jedesmaligen Sprache zu ändern. Daß dieß ein wesentlicher Vortheil ist, kann wohl nicht bestritten werden, auch haben die Meisten, die sich derselben bedient haben, dieß eingesehen. Ein französischer Schriftsteller *) hat die National-Eitelkeit gehabt, sie mit den Anfangsbuchstaben in der französischen Sprache zu vertauschen. Wenn dieses von den englischen, deutschen, italienischen Schriftstellern nachgeahmt wird, so geht, ohne den geringsten Vortheil, viel von der Bestimmtheit und Falschheit dieser Formeln verloren; man darf indess von den klaren Ansichten der Mehrzahl der wahren Naturforscher erwarten, daß sie diesen Nutzen nicht einer so kindischen Eitelkeit aufopfern. „Die Wissenschaft,“ sagt Humphry Davy **) so vor-

*) *Beudant, Essai d'un cours élémentaire et général des sciences physiques. Minéralogie.*

**) In seiner Rede als Präsident der K. Gesellschaft zu London bei Ueberreichung der Copleyschen Medaille für Hrn. Arago, für die

trefflich, „gehört der Welt, sie ist nicht das besondere Eigenthum eines Landes oder eines Zeitalters“ *).

Entdeckung des magnetischen Zustandes des rotirenden Kupfers:
„Science, like that Nature to which it belongs, is neither limited by time nor space, it belongs to the world and is of no country and of no age.“

- *) Es sei mir hier erlaubt, einige Einwürfe zu beantworten, die man gegen den Gebrauch dieser Formeln zur Bezeichnung der atomistischen Zusammensetzung der Körper gemacht hat. Man hat gesagt, sie seien undeutlich, irreleitend und zwecklos. Undeutlich sind sie gewifs nur so lange, als man ihre Bedeutung noch nicht kennt; hernach kann nichts leichter sein, als sie zu verstehen. Irreleitend können sie dagegen niemals sein, sie liefern einen einfachen Ausdruck, wie, nach der Vorstellung der Person, welche die Formel aufgesetzt hat, die Verbindung zusammengesetzt ist. Wenn diese Vorstellung unrichtig und irreleitend ist, so wird sie es sein, auf welche Weise man sie auch ausdrückt; die Formel hat daran keinen Antheil. Man hat auch gesagt, sie machen auf die Mathematiker einen unangenehmen Eindruck, da die in der Algebra unter dem Namen des Exponenten bekannte Zahl oben zur Rechten einen höheren Werth hat als hier, und dafs die Mathematik vor allem ihr Recht haben müsse; ein solcher Einwurf aber verdient keine Berücksichtigung. Der Buchstabe P in der griechischen Sprache wird als R in der russischen gelesen, und eben so leicht, als man sich bei Lesung eines Buchs hinsichtlich der Sprache irren kann, eben so leicht kann man sich hinsichtlich der Wissenschaft irren. Was aber den Einwurf der Zwecklosigkeit betrifft, so will ich hier dem Leser durch das folgende Beispiel einen Begriff geben, wie viel diese Formeln ausdrücken und wie anschaulich der Ausdruck ist: $\text{K}\overset{\cdot\cdot}{\text{S}} + \overset{\cdot\cdot}{\text{A}}\overset{\cdot\cdot}{\text{I}}\overset{\cdot\cdot}{\text{S}}^3 + 24\overset{\cdot\cdot}{\text{H}}$ ist, wie wir vorhin gesehen haben, die Formel, welche die Zusammensetzung des Alauns ausdrückt. Sie zeigt, dafs in diesem ein Atom Kalium vereinigt ist mit 2 Atomen (einem Doppelatom) Aluminium, mit 4 Atomen Schwefel, mit 48 Atomen Wasserstoff und mit 40 Atomen Sauerstoff; dafs ein Atom Kali vereinigt ist mit einem Atome Thonerde, mit 4 Atomen Schwefelsäure und mit 24 Atomen Wasser, oder dafs ein Atom schwefelsaures Kali vereinigt ist mit einem Atome schwefelsaurer Thonerde und beide Salze neutral sind, d. h. in dem Sättigungsgrade, wo die Säure das Dreifache von dem Sauerstoff der Basis enthält; dafs der Sauerstoff der Thonerde das Dreifache von dem des Kali's ist; dafs der Sauerstoff der Schwefelsäure das Zwölffache von dem des Kali's, und das Vierfache von dem der Thonerde ist; dafs der Sauerstoff des Wassers das Vierundzwanzigfache von dem im Kali, das Achtfache von dem in der Thonerde, und das Doppelte von dem in der Schwefelsäure ist. Zwar kann man sagen, dafs mehrere dieser Angaben unmittelbare Folgerungen von einander sind; das sind sie gewifs für die, welche sie kennen, aber für diese

VII. Ueber das Gewicht der Atome der einfachen Körper.

Die Versuche, durch welche die Gewichte der Atome der einfachen Körper bestimmt sind, und welche ich hier anführen werde, sind zum großen Theil absichtlich von mir angestellt, um diese relativen Gewichte auszumitteln. Dafs ich in Fällen, wo Andere dieselben Versuche, wie ich, aber mit verschiedenem Resultate, angestellt haben, den meinigen den Vorzug gebe, wird mir hoffentlich keiner verdenken. Ich weiß sehr gut, welche Sorgfalt ich selbst anwandte, um ein genaues Resultat zu erlangen, aber bei aller Achtung für die Bemühungen Anderer, kann ich doch nicht im gleichen Grade Kenntniß von diesen haben. Wo die Resultate aus den Versuchen Anderer abgeleitet worden sind, ist es angegeben.

1) Sauerstoff. Das Atom desselben wird, wie ich schon angeführt habe, zu 100 angenommen. Da das spezifische Gewicht desselben, nach den von Dulong und mir gemeinschaftlich angestellten Versuchen, 1,1026 ist, und das des Wasserstoffs 0,0688; so ist, wenn man das Atomgewicht des Wasserstoffs als Einheit betrachtet, das Atomgewicht des Sauerstoffs = 16,026.

2) Wasserstoff. Aus dem Vorhergehenden folgt, dafs das Atom des Wasserstoffs 6,244 wiegt. Ich muß jedoch hinzusetzen, dafs diese Bestimmung nicht bloß auf dem

schließt das Wort Alaun dasselbe ein, wie die ganze Formel, deren man sich gerade zu dem Zwecke bedient, einem Andern mit Leichtigkeit einen Ueberblick von dem, was er bemerken soll, zu verschaffen. — Ueberdies stößt man bei chemischen Untersuchungen auf Verbindungen, denen entweder kein Name zu geben ist, oder die für den Augenblick nur durch eine lange Umschreibung benannt werden können, und die durch die Zusammensetzungsformel mit der vollkommensten Genauigkeit ausgedrückt werden. Ich will beispielsweise nur die vielen höheren Schwefelungsstufen der Schwefelalkalimetalle anführen, für welche eine passende Nomenclatur bis jetzt noch fehlt, die man aber, bis passende Namen gefunden werden, durch die Formeln: KS , KS^2 , KS^3 etc., mit großer Leichtigkeit bezeichneth.

dem Vergleich des specifischen Gewichts der beiden Gase erubt, sondern auch auf einem mit derselben vollkommen übereinstimmenden und hinreichend oft mit dem nämlichen Resultat wiederholten Versuche, Wasser auf die Art zu bilden, daß man ein genau bestimmtes Gewicht von reinem Kupferoxyd in einem Strome von reinem und getrocknetem Wasserstoffgas erhitzte, und den Gewichtsverlust des Kupferoxydes, welcher aus fortgegangenem Sauerstoff bestand, mit dem Gewichte des neugebildeten Wassers verglich, das man in einem mit geschmolzenem Chlorcalcium gefüllten und genau gewogenen Gefäße auffing.

3) Stickstoff. Nach einer von Dulong und mir gemeinschaftlich angestellten Wägung wurde das specifische Gewicht des Stickstoffgases zu 0,976 gefunden. Vergleicht man dann, durch eine einfache *Regula de tri* das specifische Gewicht des Sauerstoffes mit dem des Stickstoffes, so wird das Gewicht eines Atomes Stickstoff = 88,518. Berechnet man es nach der Analyse des salpetersauren Bleioxydes, welches, nach Verjagung der Säure durch Glühen, 0,6731 Bleioxyd zurückläßt, worin 0,048268 Sauerstoff enthalten sind, so bleiben, da die 0,3269 Salpetersäure das 5 fache jener Sauerstoffmenge, nämlich 0,24134 enthalten, für das Gewicht des Stickstoffs 0,08556 übrig, zu welchem sich das Gewicht des Sauerstoffes verhält, wie 2 Atome Stickstoff zu 5 Atomen Sauerstoff. Daraus erhält man die Zahl 88,61. Wenn der Wasserstoff zur Einheit angenommen wird, ist das Gewicht des Stickstoffs 14,18.

4) Schwefel. Ich habe schon gesagt, wie wir mit Sicherheit wissen, daß die Schwefelsäure aus $S + 3O$ besteht. Um das relative Gewicht desselben in der Schwefelsäure zu bestimmen, wurden 100 Th. Blei in einem gewogenen Platintiegel in reiner Salpetersäure aufgelöst, mit Schwefelsäure versetzt, abgeraucht und geglüht. Die Resultate von vier solcher Versuche waren einander bis auf die vierte Ziffer völlig gleich, sie variirten erst in der fünften Ziffer. Nach einer Mittelzahl aus diesen Re-

sultaten betrug das schwefelsaure Bleioxyd 146,44 Th. Das Blei darin nimmt 7,725 Th. Sauerstoff auf; die Schwefelsäure enthält das 3fache dieser Quantität, d. h. 23,175; der Rückstand, 15,54, ist also Schwefel. Wird das Gewicht des Schwefels aus dem Verhältnisse desselben zu $\frac{1}{2}$ des Sauerstoffgewichts berechnet, so wiegt das Atom des Schwefels 201,165. Ist das Wasserstoffatom die Einheit, so wiegt das des Schwefels 32,216*). Aus dem specifischen Gewichte des Schwefelwasserstoffgases und schweflichtsauren Gases kann man das Gewicht des Schwefelatoms nicht mit Sicherheit ableiten, weil diese beide so hoch ausfallen, daß sie das übersteigen, was in dem vorhergehenden Versuche gegründeterweise ein Beobachtungsfehler sein kann. Gay-Lussac und Thénard fanden das specifische Gewicht des Schwefelwasserstoffgases zu 1,2132, welches das Atomgewicht des Schwefels zu 203,9 giebt, und ich fand das specifische Gewicht des schweflichtsauren Gases, als Mittel aus 9 Wägungen, die nur unbedeutend in der 4ten Ziffer variirten, zu 2,247, wonach das Atom des Schwefels 207,58 wiegen müßte. Die Ursache dieser Abweichung habe ich nicht entdecken können; zwar vermuthete ich, daß das Atomgewicht des Schwefels ein wenig höher ist, als es hier angegeben worden, allein so groß kann der Unterschied doch nicht sein.

5) Phosphor. Die Gründe, welche uns bestimmen, 2 Atome Phosphor und 5 Atome Sauerstoff in der Phosphorsäure anzunehmen, habe ich schon angeführt.

*) Diejenigen, welche die Atomgewichte der Körper als gerade Multipla von dem Atomgewicht des Wasserstoffs betrachten, nehmen das letztere im Vergleich mit dem des Sauerstoffs zu 6,25 an, und das des Schwefels gerade zum 32fachen von dem des Wasserstoffs. - Einer meiner Versuche zur Reduction des Bleioxydes mit Wasserstoffgas hatte das Resultat gegeben: 7,74 Th. Sauerstoff auf 100 Th. Blei. Diefes giebt gerade 200 für das Atomgewicht des Schwefels. Wenn es gegründet ist, daß die Atomgewichte der Körper Multipla sind von denen des Wasserstoffs, so muß das aus diesem Verhältnisse berechnete Atomgewicht des Bleies, das zu 1292,96 ausfällt, sich genau durch 6,25 dividiren lassen. Das Atomgewicht des Bleies ergiebt sich aber zum 206,4fachen des Wasserstoffs.

Das relative Gewicht wurde auf die Art bestimmt, daß man genau gewogene Mengen vom Phosphor durch Digestion mit neutralen Auflösungen von Goldchlorid, oder von schwefelsaurem Silber, zu Phosphorsäure oxydirte. Aus der Menge dieser reducirten Metalle wurde alsdann die Sauerstoffmenge berechnet, welche der Phosphor aus der Auflösung aufgenommen hatte; sie betrug in 3 Versuchen 126,93, 27,0 und 127,45 auf 100 Th. Phosphor. Die letzte, durch Reduction von Silber erhaltene, halte ich für die genaueste. Wenn dann das Gewicht des Phosphors als 2 Atome und das des Sauerstoffs als 5 Atome betrachtet wird, so wird das Atomgewicht des Phosphors = 196,15, und ist 31,41 Mal so schwer, als das des Wasserstoffs.

6) Chlor. Das Atomgewicht des Chlors ist aus folgender Reihe von Versuchen berechnet worden: 1) 100 Th. wasserfreies chlorsaures Kali geben bei trockener Destillation 39,15 Th. Sauerstoff, und lassen 60,85 Th. Chloralium zurück (Resultat von vier übereinstimmenden Versuchen). 2) 100 Th. Chlorkalium bringen 192,4 Th. Chlorsilber hervor, und 3) 100 Th. Silber bilden 132,75 Th. Chlorsilber. Wenn die Chlorsäure aus $2\text{Cl} + 5\text{O}$ besteht, so folgt aus diesen Datis, daß 1 Atom Chlor 221,325 wiegt. Berechnet aus dem von Gay-Lussac genommenen spezifischen Gewicht des Chlorgases, = 2,4252, wiegt das Chloratom 220. Das Gewicht desselben, wenn das des Wasserstoffatoms zur Einheit angenommen wird, ist 35,43.

7) Jod. Das Gewicht des Jods ist durch Gay-Lussac bestimmt. Derselbe fand, daß 100 Th. Jod sich mit 26,225 Th. Zink genau zu neutralem Jodzink vereinigen. Dieses besteht nun aus 1 Atom Zink, dessen Gewicht 403,225 ist, und aus 2 Atomen Jod, dessen Gewicht also auf 783,35 zu stehen kommt, oder auf das 25,44fache des vom Wasserstoffatom.

8) Fluor. Wir haben im Lehrbuche das Fluor als einen Salzbilder betrachtet, als solchen werden wir auch ein Atomgewicht bestimmen. 100 Th. reines Fluorcalcium gaben in 3 Versuchen 174,9, 175,0 und 175,1 schwefelsaure Kalkerde. Die Mittelzahl daraus ist 175. Wird

danach der Gehalt an Calcium berechnet, so ist das Uebrige Fluor; ob es aber ein oder zwei Atome Fluor sind, ist nicht bekannt, so lange wir nicht wissen, ob die Fluorwasserstoffsäure aus 1 Atom Fluor mit einem oder zwei Atomen Wasserstoff besteht. Man hat Grund, das Fluor in diesem Falle als analog mit Chlor und Jod zu halten; aber für sicher kann man es nicht halten. Gips ist CaS ; berechnet man danach den zuvor angeführten Versuch, so findet man, daß 256,03, das Gewicht von einem Atom Calcium, vereinigt gewesen sind mit 233,795 Fluor. Dieß ist nun das Gewicht von einem oder zwei Atomen. Nehmen wir es für zwei an, so wiegt ein Atom Fluor 116,9, also 18,735 Mal so viel, als das des Wasserstoffs.

9) Kohlenstoff. Ein Volumen Sauerstoffgas wird zu Kohlensäuregas verwandelt, ohne daß sich sein Volumen ändert. Wenn man das specifische Gewicht der beiden Gase vergleicht, so erhält man folglich die Menge des Kohlenstoffs in der Kohlensäure. Dulong fand das specifische Gewicht des Kohlensäuregases zu 1,524. Wenn die Kohlensäure $\text{C} + 2\text{O}$ ist, so folgt daraus, daß das Atom des Kohlenstoffs 76,436 wiegt, oder 12,24 Mal so viel, als das des Wasserstoffs. Ich habe vorher aus der Analyse des kohlen sauren Bleioxydes, verglichen mit Biot's und Arago's Angabe vom specifischen Gewicht des Kohlensäuregases, nämlich 1,51961, das Atom des Kohlenstoffs zu 75,33 berechnet; aber bei der Analyse von Pflanzensäuren, wo dieser Fehler sich mit der Anzahl der Kohlenstoffatome multiplicirt, sieht man am besten, daß diese Zahl zu klein ist. Die, welche alle Atomgewichte zu Multipeln von dem des Wasserstoffs machen, setzen es noch mehr herunter, nämlich gerade zu 75.

10) Bor. Das Gewicht des Atoms vom Bor ist auf folgende Art bestimmt: Es wurde Borax (borsaures Natron) analysirt. Von den 3 Bestandtheilen desselben, Borsäure, Natron und Wasser, konnte das Wasser mit der größten Genauigkeit bestimmt werden; es gab von diesem in 3 Versuchen ohne Abweichung 74,1 Procent vom

Gewicht des Salzes. Das Wasser hält 10 Mal so viel Sauerstoff, als die Base. Der Versuch gab 16,31 Procent Natron. Corrigirt nach dem Wassergehalt werden es 16,3753, wonach für die Borsäure 36,5248 übrig bleiben. Nach Humphry Davy's Versuchen, mit denen die meinigen übereinstimmen, enthält die Borsäure 68 Procent Sauerstoff. Dieses macht das 6fache des vom Natron, wird aber, corrigirt nach dem Sauerstoff des gefundenen Natrongehalts, 68,81 Procent. Es fragt sich nun noch, ob die Säure 6 Atome Sauerstoff enthält? Wir haben gesehen, daß in allen anderen Säuren, wo man eine Richtschnur zur Beurtheilung hat, höchstens 3 At. Sauerstoff auf 1 Atom des Radikals gehen. Sollte wohl die Borsäure, ohne irgend ein Zwischenglied, sogleich eine größere Anzahl von Sauerstoffatomen aufnehmen, als irgend ein anderer Körper? In den Verbindungen, die der Fluorbor mit Fluorkalium und anderen Fluorüren giebt, enthält der Fluorbor drei Mal so viel Fluor, als das Fluorkalium. Diefs spricht für 3 Atome. Aber unter den borsäuren Salzen kann man nur bloß ein basisches Kalisalz hervorbringen, worin der Sauerstoff der Säure das 3fache von dem der Basis ist. In der natürlichen borsäuren Talkerde ist der Sauerstoff in der Säure das 4fache von dem in der Base, und in den Salzen mit Ueberschuß an Säure das 12fache. In den Salzen, welche vorzugsweise gebildet werden, und welche ganz das Ansehen haben, als seien sie die neutralen Verbindungen der Säure, wie im Borax, enthält die Säure 6 Mal so viel Sauerstoff, als die Base. Bis Weiteres, d. h. bis etwas Richtigeres bewiesen werden kann, nehme ich an, daß die Borsäure 3 Atome Sauerstoff enthält, daß aber ein Atom Borsäure, gleich wie bei der oxydirten Chlorsäure, aus 2 Atomen Bor und 6 Atomen Sauerstoff besteht. Enthält die Borsäure 3 Atome Sauerstoff, so wiegt ein Atom Bor 135,98 und ist 21,7 Mal so schwer, als das des Wasserstoffs.

11) Kiesel. Durch directe Versuche, den Kiesel in Säure zu verwandeln, habe ich gefunden, daß diese Säure 51,28 bis 51,92 Procent Sauerstoff enthält. Durch

Berechnung aus der Analyse des Kieselfluorbaryums fällt der Sauerstoffgehalt in der Kieselsäure zu 51,975 Procent aus. Die Frage ist nun, zu bestimmen, wie viel Sauerstoffatome diese ausmachen. Die Kieselsäure verbindet sich mit den Basen in solchen Verhältnissen, daß sie 1, 2, 3 oder 6 Mal so viel Sauerstoff enthält, als die Base. Das gewöhnlichste Verhältniß ist drei, und die auf unserer Erde am häufigsten vorkommende von allen Verbindungen, ein Doppelsalz von kieselsaurem Kali und kieselsaurer Thonerde, der Feldspath, ist so zusammengesetzt, daß, wenn der Kiesel gegen Schwefel ausgetauscht wird, Alaun entsteht. Dies giebt allen Grund anzunehmen, daß die Kieselsäure, wie die Schwefelsäure, 3 Atome Sauerstoff enthält. Der Fluorkiesel verbindet sich wohl mit anderen Fluorüren in einem solchen Verhältniß, daß der erstere nur 2 Mal so viel Fluor enthält, als die letzteren; aber daraus kann man nicht schließen, daß die Kieselsäure nur 2 Atome Sauerstoff enthält. Denn eine so zusammengesetzte Säure kann sich nicht mit einer Basis, die 3 Atome Sauerstoff enthält, in einem solchen Verhältnisse verbinden, daß der Sauerstoff der Base zu dem der Säure wie 1 zu 3 ist, weil das einfachste Verhältniß von Atomen, was hierzu erfordert würde, 2 Atome Basis und 9 Atome Säure wäre, ein Verhältniß, wovon es ganz an Beispielen fehlt. Wollte man dagegen bloß 1 Atom Sauerstoff in der Kieselsäure annehmen, so könnte man nicht die höheren Sauerstoffmultipla mit 6 und 3 in diesen Salzen erwarten. Es ist folglich am wahrscheinlichsten, daß die Kieselsäure, wie die Schwefelsäure, aus $\text{Si} + 3\text{O}$ besteht, und daß das Atom des Kiesels wiegt 277,8, oder 44,49 Mal so viel, als das des Wasserstoffs.

12) Selen. 100 Th. Selen, die völlig mit Chlor gesättigt werden, gewinnen dabei 179 Th. im Gewicht an absorbirtem Chlor. Die so erhaltene Masse wird durch Wasser genau in Selensäure und Chlorwasserstoffsäure zerlegt. 100 Th. Selensäure enthalten folglich 40,436 Procent Sauerstoff. Diese Säure giebt neutrale Salze, in denen die Säure 2 Mal so viel Sauerstoff enthält, als die

Basis, und saure Salze, in denen sie 4 Mal so viel Sauerstoff enthält, als die Basis. Sie muß folglich 2 Atome Sauerstoff enthalten, und die 179 Th. Chlor, welche von 100 Th. Selen aufgenommen werden, machen folglich 4 Atome Chlor aus gegen 1 Atom Selen. Daraus folgt, daß das Atomgewicht des Selens ist 494,59, oder daß es 79,6 Mal so schwer ist, als das des Wasserstoffs.

13) Arsenik. Das Atomgewicht des Arseniks ist durch folgenden Versuch bestimmt: 2,203 Grammen arsenichte Säure wurden durch Destillation mit Schwefel zersetzt in einem kleinen Apparate, aus dem nur schweflichtsaures Gas und kein Schwefeldampf fortgehen konnte; es verlor 1,069 Grm. an fortgegangener schweflichter Säure. Dieses giebt auf 100 Th. arsenichter Säure 24,18 Th. Sauerstoff; wenn aber dieß 3 Atome Sauerstoff sind und die 75,82 Procent Arsenik 2 Atome, so wiegt ein Atom Arsenik 470,385, oder 75,345 so viel als 1 Atom Wasserstoff.

14) Chrom. Das Atomgewicht des Chroms ist nach folgendem Versuch berechnet. 100 Th. wasserfreies salpetersaures Bleioxyd wurden mit neutralem chromsauren Kali gefällt und gaben 98,772 Th. chromsaures Bleioxyd. Darin sind enthalten 67,31 pC. Bleioxyd und folglich 31,462 Th. Chromsäure. In dem Oxyde werden 4,8268 Th. Sauerstoff gefunden, die in der Chromsäure mit 3 multiplicirt sind, = 14,4804; werden diese vom Gewichte der Säure abgezogen, so bleibt für das des Chroms 16,9816. Wenn aber dieß 3 Atome Sauerstoff gegen 1 Atom Chrom sind, so wiegt das Atom des Chroms 351,86, oder 56,25 Mal so viel, als das Wasserstoffatom.

15) Molybdän. Die Reihe der Verbindungen des Molybdäns mit Schwefel giebt die Multipla 2, 3 und 4, und die mit Sauerstoff die von 1, 2 und 3, wobei die Multipla 2 und 3 einander correspondiren. Sowohl die Molybdänsäure, als der Molybdänschwefel (das Salze bildende Schwefelmolybdän) sättigen eine Quantität Basis, deren Sauerstoff oder Schwefel $\frac{1}{3}$ ist von dem in der Säure oder dem Molybdänschwefel. Dieß giebt also vollen Grund anzunehmen, daß darin 3 Atome gegen 1 Atom

Molybdän enthalten sind. 100 Th. wasserfreies salpetersaures Bleioxyd, gefällt mit neutralem molybdänsauren Ammoniak (d. h. mit solchem, das aus einer an Ammoniak reichen Flüssigkeit angeschossen war) gaben 110,68 Th. molyddänsaures Bleioxyd. Dieses enthält nun 67,31 Th. Bleioxyd, dessen Sauerstoff 4,8268 zu 3 Malen in der Molybdänsäure gefunden wird. Die 43,37 Th. Molybdänsäure, welche das Bleioxyd mit sich gefällt hat, bestehen folglich aus 14,48 Th. Sauerstoff und 28,89 Molybdän. Wenn aber diese Quantität 3 Atome Sauerstoff sind gegen 1 At. Molybdän, so wiegt das letztere 598,56 oder 95,77 Mal so viel, als das des Wasserstoffs.

16) Wolfram. Die Verbindungen dieses Metalles mit Schwefel und Sauerstoff geben die Multipla von 2 und 3, und die Sättigungscapacität der Wolframsäure und des Wolframschwefels ist ein Drittel von dem Gehalt dieser Verbindungen an Sauerstoff oder Schwefel. Man kann folglich mit Recht annehmen, daß die Säure 3 At. Sauerstoff enthält. Das Atomgewicht ist durch folgenden Versuch bestimmt: 899 Th. Wolframsäure, in einem gewogenen Apparate mit Wasserstoffgas reducirt, hinterließen 716 Th. Metall. Von diesen wurden 676 Th. wieder zu Säure verbrannt, und diese wog 846 Th. Die Mittelzahl aus diesen beiden Versuchen giebt auf 100 Th. Wolfram: 25,355 Th. Sauerstoff. Wenn dies 3 Atome sind, so wiegt 1 Atom Wolfram 1183,2 oder 189,5 Mal so viel, als das Wasserstoffatom.

17) Antimon. Die Multipla in der Reihe der Sauerstoff- und Schwefel-Verbindungen dieses Metalles verhalten sich wie 3, 4, 5. Die letztere von diesen besitzt den Charakter einer Säure, und wie wir mit gutem Grund annehmen, daß 5 At. Sauerstoff in einer Säure 2 At. des Radikals voraussetzen, eben so müssen wir es auch hier thun, so daß die Reihe wird: $2\text{Sb} + 3\text{O}$, $\text{Sb} + 2\text{O}$ und $2\text{Sb} + 5\text{O}$. Wenn 100 Th. reines metallisches Antimon mit rauchender reiner Salpetersäure oxydirt werden, und man das Product, nach Abdestillation der Säure, gelinde glüht, bis es nach dem Erkalten weiß wird, so wiegt es

124,8, und stellt alsdann die Verbindung $\text{Sb} + 2\text{O}$ dar. Dieses giebt das Atomgewicht des Antimons zu 806,45, oder 129,14 Mal schwerer, als das des Wasserstoffs.

18) Tellur. Von diesem Metalle kennen wir nur ein Oxyd und eine Schweflungsstufe. Das erstere entsteht, wenn 100 Th. Tellur mit Salpetersäure oxydirt werden, und das Oxyd zur Verjagung der Säure im Destillationsgefäße abgedunstet wird. Es wiegt alsdann 124,8. Dieses Oxyd verhält sich zu Basen, wie eine Säure, und sättigt eine Quantität Basis, deren Sauerstoffgehalt die Hälfte von dem des Oxydes ist. Es ist daher glaublich, daß sie 2 Atome Sauerstoff enthält, wie die antimonichte Säure. Das Atomgewicht desselben wird also auch durchaus das nämliche oder 806,45. Die äußeren Eigenschaften und das specifische Gewicht des Tellurs gleichen ebenfalls denen des Antimons, und dies bestimmt mich, die Atomgewichte derselben als gleich zu betrachten, ungeachtet nach dem zuvor angeführten Versuche von Dulong und Petit es scheinen könnte, als wäre es nur 403,225, und folglich das Telluroxyd: $\text{Te} + \text{O}$; denn in diesem Falle stimmt das Tellur mit den anderen Metallen darin völlig überein, daß das Product aus seiner specifischen Wärme und seinem Atomgewichte gleich wird mit dem des Schwefels. Die specifische Wärme desselben ist 0,0912, welche mit 403,225 multiplicirt = 0,3675 ist.

19) Tantal. Dieses Metall hat zwei Oxydationsstufen, in denen die Multipla des Sauerstoffs = 2:3 sind. Ueber die Anzahl der Tantalatome giebt es nichts als Muthmaßung, und da die Tantalsäure einerseits nur sehr wenig Sauerstoff enthält, andererseits als Säure nur wenig hervorstechende Eigenschaften besitzt, so werde ich annehmen, daß sie ist: $2\text{Ta} + 3\text{O}$. Das Atomgewicht ist aus folgendem Versuch berechnet: 99,75 Th. reines Schwefeltantal wurden, mit Beachtung der gewöhnlichen Vorsichtsmaßregeln, die Schwefelsäure fortzuschaffen, zu Tantalsäure verbrannt und gaben 89,35. Der Unterschied zwischen beiden Gewichten verhält sich zum Sauerstoff in den 89,35 Tantalsäure, wie sich der Unterschied zwischen

einem Atome Schwefel und einem Atome Sauerstoff verhält zu einem Atome Sauerstoff; dies setzt in den 89,35 Th. Tantsäure 10,287 Th. Sauerstoff voraus. Wenn dies 3 Atome sind, und die übrigen 79,063 zwei Atome Tantal, so wird das Gewicht des Tantal-Atoms: 1152,87, d. h. 184,63 Mal so schwer, als das des Wasserstoffs.

20) Titan. Das höhere Oxyd dieses Metalles, oder die Titansäure ist isomorph mit Zinnoxid, und muß folglich, so wie dieses, 2 Atome Sauerstoff enthalten. Sein Atomgewicht ist durch Heinrich Rose bestimmt. Er fand, daß 101,7 Th. Schwefeltitan zu 75,7 Th. Titansäure verbrennen. Durch dieselbe Art Rechnung, wie beim Tantal, folgt daraus, daß das Atomgewicht 389,1 wiegt, oder 62,25 Mal so viel, als das des Wasserstoffs.

21) Gold. Dieses Metall hat zwei Oxyde, worin die Sauerstoffmultipla sind = 1 : 3. Eins fehlt zwischen ihnen, von dem wir muthmaßen, daß es das purpurfarbene ist. Auszumachen, ob diese Oxyde aus $Au + O$ und $Au + 3O$, oder aus $2Au + O$ und $2Au + 3O$ bestehen, ist nicht anders möglich, als durch die Beobachtung von Dulong und Petit über die specifische Wärme des Goldes; diese stimmt mit 2 Atomen Gold in diesen Oxyden überein. Das Atomgewicht des Goldes ist bestimmt durch die Quecksilbermenge, welche nöthig ist, das Gold aus seinem Chlorid zu fällen, während das Quecksilber sich in's Chlorid verwandelt. 142,9 Th. Quecksilber schlagen 93,55 Gold nieder. Wenn aber das Quecksilber nur 2 Atome Chlor und das Gold 3 Atome Chlor aufnimmt, so entspricht das Quecksilber 3 At., und das Gold 2 Atomen. Folglich da das Atom des Quecksilbers 1265,8 wiegt, so wiegt das des Goldes 1243, d. i. 199,079 Mal mehr, als das des Wasserstoffs.

22 und 23) Osmium und Iridium sind die einzigen Körper, deren Verbindungsverhältnisse unbekannt sind.

24) Platin. Dieses Metall hat zwei Oxydationsstufen, in welchen die Sauerstoffmultipla sind wie 1 und 2. Der Versuch, welchen ich in dem Vorhergehenden von Dulong

und Petit angeführt habe, scheint zu beweisen, daß sie 1 Atom Platin auf 1 oder 2 Atome Sauerstoff enthalten, obgleich das Platinoxydul sonst dem Kupferoxydul ziemlich gleicht, welches aus $2\text{Cu} + \text{O}$ besteht. Das Atomgewicht des Platins ist bestimmt durch die Zersetzung des Chlorürs im Glühen. 100 Th. Platinchlorür hinterlassen 73,3 metallisches Platin, und wenn das fortgehende 2 Atome Chlor sind, wiegt 1 At. Platin 1215,23, und ist 194,62 Mal so schwer, als ein Atom Wasserstoff.

25) Rhodium. Dieses Metall hat drei Oxyde, worin die Sauerstoffmultipla sind: 1, 2 und 3; ob aber diese mit einem oder zwei Atomen Rhodium vereinigt sind, hat bisher noch nicht mit einiger Bestimmtheit berechnet werden können. Das mittlere dieser Oxyde vereinigt sich mit Basen und enthält in der Verbindung, welche mit Kali erhalten wird, nachdem der Ueberschuß von Alkali ist ausgewaschen worden, 4 Mal so viel Sauerstoff, als die Basis. Aber daraus kann nicht mehr gefolgert werden, als daß diese Oxydationsstufe nicht 3 Atome Sauerstoff enthält; denn die neutrale Verbindung, aus welcher die Sauerstoffatome sollten berechnet werden, wird vom Wasser zerstört. Da das Rhodium in vielen seiner Verhältnisse dem Platin gleicht, aber nur das halbe spezifische Gewicht desselben besitzt, so ist es nicht wahrscheinlich, daß sein Atom schwerer ist, als das des Platins; dieses wird es aber, wenn man in der angeführten Oxydreihe bloß 1 Atom Rhodium vereinigt mit 1, 2 und 3 Atomen Sauerstoff annimmt. Ich nehme deshalb das Rhodiumoxydul zu $2\text{R} + \text{O}$ an. Das demselben entsprechende Chlorür, durchs Glühen zersetzt, hinterläßt von 100 Th. 77,23 Th. metallisches Rhodium. Wenn aber die fortgegangenen 22,77 eben so, wie das zurückgebliebene Metall, 1 Atom ausmacht, so wiegt 1 Atom Rhodium 750,65, oder ist 120,2 Mal so schwer, als das Wasserstoffatom.

26) Palladium. Man kennt von diesem Metall nur ein Oxyd und eine Schweflungsstufe, und beide halten eine gleiche Anzahl von Atomen. Es bleibt also bloß die Vermuthung übrig, daß sie aus einem Atome von jedem

Elemente zusammengesetzt sind. 100 Th. Palladium nehmen zur völligen Sättigung 28,15 Schwefel auf, und wenn dieß 1 Atom ist, so wiegt 1 Atom Palladium 714,60, und ist 114,45 Mal so schwer, als das Atom des Wasserstoffs.

27) Silber. 100 Th. Silber geben, nach dem, was ich schon bei dem Chlor angeführt habe, 132,75 Th. Chlor-silber. Ich habe allen Grund, dieses als AgCl^2 zu betrachten und das Silberoxyd als zusammengesetzt aus 1 Atome Radikal und 1 Atome Sauerstoff, in Uebereinstimmung mit den stärkeren Basen unter den Metalloxyden. Die große Leichtigkeit, womit das Superoxyd dieses Metalles seinen Sauerstoff abgibt, scheint zu zeigen, daß man annehmen muß, das Superoxyd enthalte mehr Sauerstoff, als: $\text{Ag} + \text{O}$. In diesem Falle wiegt das Atom des Silbers 1351,605, oder ist 216,46 Mal so schwer, als das Atom des Wasserstoffs.

Ich habe zuvor angeführt, daß das Atomgewicht, welches aus der specifischen Wärme des Silbers in Dulong's und Petit's Versuchen hergeleitet wird, nur gerade zu der Hälfte von diesem ausfällt; denn sie fanden die specifische Wärme des Silbers = 0,0557, welche mit $\frac{1351,605}{2}$ multiplicirt = 0,3764 ist. Man könnte auch sagen, daß für eine Zusammensetzung des Silberoxydes, wie sie aus diesem Atomgewicht folgt, die Analogien mit dem Quecksilber- und Kupferoxydul angeführt werden könnten. Vergleicht man aber weiter das Silber mit dem Blei, sowohl hinsichtlich ihres specifischen Gewichts, als hinsichtlich ihrer Verbindungen mit Chlor (Hornblei und Hornsilber), so findet man es gewiß auffallend, wenn das Atomgewicht des Silbers bloß die Hälfte von dem des Bleies, und im Hornsilber vom Radikal die doppelte Anzahl Atome gegen die im Hornblei sein soll. Indefs muß die Sache bis auf Weiteres als unentschieden betrachtet werden. In den Tabellen wird der ganze Unterschied der, daß in dem einen Falle das Silberatom mit einem einfachen, und in dem andern mit einem doppelten oder durchstrichenen Buchstaben, entweder mit Ag oder mit $\underline{\text{Ag}}$ bezeichnet wird.

28) Quecksilber. Nach den Versuchen von Sefström nehmen 100 Th. Quecksilber, um Oxyd zu werden, 7,89, 7,9 bis 7,97 Th. Sauerstoff auf, und um Oxydul zu werden, die Hälfte dieser Quantität. Sefström betrachtet 7,9 als die nächste Approximation zum richtigen Verhältnisse. Da das Oxyd eine stärkere Basis ist, als das Oxydul, welches oft durch Einwirkung sehr geringer Kräfte metallisches Quecksilber absetzt und sich in Oxyd verwandelt, so hat man Grund, dieselben als aus $2\text{Hg} + \text{O}$ und $\text{Hg} + \text{O}$ zusammengesetzt zu betrachten. Das Atom des Quecksilbers wiegt dann 1265,8, oder 202,72 Mal so viel, als das des Wasserstoffs.

29) Kupfer. Das Atom dieses Metalles gehört zu denen, die am leichtesten und mit großer Genauigkeit bestimmt werden können, weil man dazu nur eine gewogene Quantität von reinem Kupferoxyd in einem kleinen gewogenen Glasapparat durch Wasserstoffgas zu reduciren braucht. a) 7,68075 Grm. Kupferoxyd, zur Befreiung von Feuchtigkeit vor dem Wägen in dem Gefäße unter Hindurchleitung von trockner Luft geglüht, verloren bei der Reduction mit Wasserstoffgas 1,55 Grm. an fortgegangenem Sauerstoff. b) 9,6115 Grm. Kupferoxyd verloren bei gleicher Behandlung 1,939 Sauerstoff. 100 Th. Kupfer geben nach dem ersten 125,272, und nach dem letzten 125,2824 Th. Kupferoxyd. Diese Versuche variiren also erst in der fünften Ziffer des Gewichts vom Kupferoxyd, und auch da nur um Eins. Der erste Versuch ist der Berechnung zum Grunde gelegt, wobei wir sowohl aus der Isomorphie des Kupferoxyds mit dem Eisenoxydul, als auch aus der specifischen Wärme desselben mit ziemlicher Sicherheit schliessen können, daß es aus $\text{Cu} + \text{O}$ besteht. Dann wiegt 1 Atom Kupfer 395,695, und ist 63,325 Mal so schwer, als das des Wasserstoffs.

30) Uran. Nach den Versuchen von Arfvedson und mir, hat dieses Metall zwei Oxyde, in denen die Sauerstoffmultipla sind 2 und 3. Man hat allen Grund, diese Oxyde als $\text{U} + \text{O}$ und $2\text{U} + 3\text{O}$ zu betrachten, weil jedenfalls das Uran, ungeachtet es nicht zu den spe-

cifisch schweren Körpern gehört, doch das höchste Atomgewicht besitzt. Das Atomgewicht des Urans kann mit gleicher Genauigkeit und auf dieselbe Weise, wie das des Kupfers, bestimmt werden, wenn man Uranoxydul in einem Strome von Wasserstoffgas gelinde glüht. Auf diese Weise fand Arfvedson, womit auch spätere von mir angestellte Versuche vollkommen übereinstimmten, daß 100 Th. Uran im Oxydul mit 3,557 Th. Sauerstoff vereinigt sind. Dem zu Folge wiegt das Uranatom 2711,36, oder 434,23 Mal so viel, als das des Wasserstoffs.

31) Wismuth hat zwei Oxyde, von welchen bloß das eine seiner Zusammensetzung nach bekannt ist. Das Schwefelwismuth enthält eine gleiche Anzahl Atome wie das Wismuthoxyd. Um über die Anzahl von Atomen in dem Wismuthoxyde zu einiger Gewisheit zu kommen, haben wir keinen anderen Leitfaden, als Dulong's und Petit's Versuche über die specifische Wärme der Metalle; aus ihnen findet man, daß, wenn Wismuthoxyd $\text{Bi} + \text{O}$ ist, das Product der Multiplication der specifischen Wärme mit dem Atomgewicht $\frac{1}{2}$ zu niedrig ausfällt, daß aber, wenn das erstere $2\text{Bi} + 3\text{O}$ ist, letzteres gleich wird mit den Producten bei den übrigen 9 Körpern, die ich schon angeführt habe. In diesem Falle ist das Wismuthoxyd zusammengesetzt aus derselben Anzahl von Atomen, wie das Antimonoxyd, mit welchem es bekanntlich in seinem Verhalten so viele Analogie hat. — Lagerhjelm fand, daß 100 Th. metallisches Wismuth sich mit 11,275 Th. Sauerstoff verbinden, und wenn dieß 2 und 3 Atome sind, so wiegt das Atom Wismuth 1330,4 und ist 213,07 Mal schwerer, als das des Wasserstoffs.

32) Zinn. Das von Dulong und Petit bemerkte Verhältniß zwischen der specifischen Wärme und dem Atomgewicht des Zinns, zeigt, daß in den beiden Oxyden des Zinns, wie in denen des Platins, ein Atom Zinn vereinigt ist mit einem und mit zwei Atomen Sauerstoff. 100 Th. Zinn, mittelst reiner Salpetersäure in Zinnoxid verwandelt, gaben 127,2 Th. dieses Oxydes. Daraus folgt, daß das Atom des Zinns wiegt: 735,29, oder 117,76 Mal so viel, als das Wasserstoffatom.

33) Blei. Die Zusammensetzung des Bleioxydes kann auf dieselbe Weise und mit derselben Genauigkeit bestimmt werden, wie die des Kupferoxyds. Nach einer Mittelzahl aus 4 Versuchen, von welchen einige nur in der 6ten Ziffer des Gewichts vom Bleioxyde variirten, vereinigen sich 100 Th. Blei mit 7,725 Th. Sauerstoff, woraus folgt, daß das Atom des Bleies 1294,5 wiegt, und daß es 207,12 Mal schwerer ist, als das des Wasserstoffs.

34) Cadmium. Nach Stromeyer's Versuchen nehmen 100 Th. Cadmium in der einen bekannten Oxydationsstufe dieses Metalles 14,352 Th. Sauerstoff auf. Dieses Oxyd ist wahrscheinlich $\text{Cd} + \text{O}$, und dann wiegt 1 Atom Cadmium 696,77, oder ist 111,6 Mal so schwer, als das vom Wasserstoff.

35) Zink. Nach den übereinstimmenden Versuchen von Gay-Lussac und mir, nehmen 100 Th. Zink, um Zinkoxyd zu werden, 24,8 Th. Sauerstoff auf. Das Atom des Zinks wiegt alsdann 403,225, und ist 64,57 Mal so schwer, als das des Wasserstoffs.

36) Nickel. Rothoff fand, daß 188 Theile Nickeloxyd, in neutrales Chlorür verwandelt, mit salpetersaurem Silber 718,2 Theile Chlorsilber gaben. Hieraus wird das Gewicht des Nickels berechnet, auf die Weise, daß sich wie 718,2:188 verhält das Gewicht von AgCl^s (1794,255) zu NiO . Dies giebt für das Atom des Nickeloxydes 469,755, wovon 1 Atom Sauerstoff = 100 abgezogen, für das Nickelatom übrig bleibt: 369,755, und dieses 59,21 Mal so viel wiegt, als das des Wasserstoffs.

37) Kobalt. Rothoff fand, daß 269,2 Th. Kobaltoxyd, in neutrales Chlorür verwandelt und mit salpetersaurem Silber gefällt, 1029,9 Th. Chlorsilber erzeugten; durch eine mit der oben angeführten völlig gleichen Rechnung folgt dann, daß das Atom des Kobaltes 369 wiegt, und daß es 59,11 Mal so schwer ist, als das Atom des Wasserstoffs.

38) Eisen. Bei mehreren wiederholten Versuchen habe ich gefunden, daß 100 Th. schwedisches Eisen, von

der Sorte, die zu Claversaiten gezogen wird, 143,5 Th. Eisenoxyd geben, und dieses Eisen 0,005 seines Gewichtes Kohle enthält. Wird diese Kohle abgezogen, so bleibt als Resultat, daß 100 Th. Eisen 144,25 Th. Eisenoxyd geben. Einige Chemiker nehmen die Zusammensetzung des Eisenoxydes nach dem unmittelbaren Resultate der Verwandlung des Eisens zu Oxyd an, ohne die Kohle abzurechnen. Dieß ist offenbar unrichtig. In den von mir angestellten Versuchen wurde die Kohle durch Verbrennung in Kohlensäure verwandelt und der Kohlengehalt nach dem Gewichte des erhaltenen kohlensauren Kalkes bestimmt. Wenn nun die gefundenen Zahlen 100 und 44,25 nach dem, was schon vorher bestimmt worden, 2 und 3 Atome sind, so wiegt das Atom des Eisens 339,215, und ist 54,33 Mal so schwer, als das des Wasserstoffs.

39) Mangan. 100 Th. Mangan vereinigen sich mit 42,16 Sauerstoff, um Manganoxyd, d. i. $2\text{Mn} + 3\text{O}$ zu werden. Daraus folgt, daß das Atom des Mangans 355,787 wiegt, und 56,95 Mal so schwer ist, als das des Wasserstoffs.

40) Cerium. In den Oxyden dieses Metalles verhalten sich die Sauerstoffmultipla wie 2 und 3. Dieß ist, nach dem, was wir bei anderen Metallen angenommen haben, eine Andeutung, sie als $\text{Ce} + \text{O}$ und $2\text{Ce} + 3\text{O}$ zu betrachten. Nach den Versuchen von Hisinger nehmen 100 Th. Cerium im Oxydul 14,821 Th. Sauerstoff auf; woraus folgt, daß das Atom des Ceriums 574,72 wiegt, oder 92,04 Mal so viel, als das des Wasserstoffs.

41) Zirconium. Der Sauerstoffgehalt der Zirconerde ist nach der Menge bestimmt, die von derselben 100 Th. Schwefelsäure sättigen. In sechs Versuchen wurden die folgenden Mengen: 75,74, 75,80, 75,84, 75,84, 75,92 und 75,96 Th. Zirconerde erhalten. Diese müssen nun 19,95 Th. Sauerstoff enthalten. Um zu bestimmen, wie viel Sauerstoffatome diese ausmachen, bedient man sich des Umstandes, daß Fluorzirconium sich mit Fluorkalium in zwei Verhältnissen verbindet, worin die Fluormultipla zwischen beiden Salzen sind, wie 1:1 und 2:3.

Da

Da dieses auch mit Fluoraluminium und dem Eisenfluorid der Fall ist, wo die Oxyde 3 Atome Sauerstoff enthalten, so ist dieß eine Andeutung, die Zirkonerde, wie diese Oxyde, als aus $2\text{Zr} + 3\text{O}$ bestehend zu betrachten. Dann ist ihr Atomgewicht 420,21, oder 67,2 Mal so viel, als das des Wasserstoffs.

42) Yttrium. Man hat nach Analogie der Yttererde mit dem Ceroxydul allen Grund, sie mit jenem als gleich zusammengesetzt zu betrachten, nämlich aus $\text{Y} + \text{O}$. Die Zusammensetzung der Yttererde ist danach berechnet, daß 100 Th. gelinde geglüheter schwefelsaurer Yttererde, mit Chlorbaryum gefällt, 145,27 Th. schwefelsaure Baryterde geben. Daraus berechnet, fällt das Gewicht eines Atomes zu 402,57 aus, und ist 64,47 Mal so schwer, als das des Wasserstoffs.

43) Beryllium (das Glycium der englischen und französischen Chemiker). Das Beryllium hat nur eine bekannte Oxydationsstufe. Die Beryllerde vereinigt sich leicht mit solchen Oxyden, die drei Atome Sauerstoff enthalten, z. B. mit Schwefelsäure, Kieselsäure und Thonerde, und zwar in solchen Verhältnissen, daß die Beryllerde $\frac{1}{2}$ und sogar $\frac{1}{4}$ so viel Sauerstoff enthält, wie diese; dieß deutet an, daß die Erde wahrscheinlich weder ein noch zwei Atome enthält, sondern wie die Thon- und Zirkonerde 3 Atome, und diese wahrscheinlich mit 2 Atomen des Radikals verbunden. Die Zusammensetzung des Smaragds und Euclases, welche Doppelsilicate von Thonerde und Beryllerde sind, stimmen nicht wohl mit einem anderen Atomverhältnisse in der Beryllerde, als mit diesem. Das Atomgewicht ist nach folgendem Versuch bestimmt: schwefelsaure Beryllerde (ganz neutral), die 100,1 Th. Beryllerde enthielt, gab 454,9 schwefelsaure Baryterde, als sie mit Chlorbaryum gefällt wurde. Daraus findet man, daß die Erde 31,154 Procent Sauerstoff enthalten muß. Wenn dann die Erde $2\text{Be} + 3\text{O}$ ist, so wiegt das Beryllium 331,28, und sein Atom ist 53,04 Mal so schwer, als das des Wasserstoffs.

44) Aluminium. 100 Th. wasserfreier, schwefel-

saurer Thonerde hinterlassen, nach Verjagung der Säure im heftigen Feuer, 29,934 Th. Thonerde. 100 Th. Schwefelsäure werden folglich von 42,7227 Th. Thonerde gesättigt, und die Erde enthält 46,7047 Procent Sauerstoff. Diese ist $2\text{Al} + 3\text{O}$, und folglich wiegt das Atom 171,667, oder 27,49 Mal so viel, als das des Wasserstoffs.

45) Magnesium. Mehrere Chemiker haben in den letzteren Jahren die Zusammensetzung und das Sättigungsverhältniß der Talkerde untersucht, mit einem Resultat, das nicht ganz mit dem meinigen übereinstimmt. Ich habe auf folgende Art verfahren. Um eine von Manganoxydul freie Talkerde zu erhalten, wurde *Magnesia alba* in Wasser aufgelöst, worin Kohlensäuregas geleitet wurde. Die Auflösung gab bei dem Kochen eine Talkerde, worin nicht eine Spur von Mangan enthalten war. 100 Th. von dieser reinen, durch Glühen kaustisch gemachten, Talkerde, in einem gewogenen Platintiegel in einem Ueberschuß von destillirter, mit Wasser verdünnter Schwefelsäure aufgelöst, vorsichtig abgedunstet und der Ueberschuß von Säure über der Spirituslampe bei einer allmählich bis zum Glühen steigenden Hitze fortgejagt, hinterließen 293,985 Th. schwefelsaurer Talkerde, die sich ohne Trübung in Wasser auflöste, und folglich durch die Hitze keinen Theil ihrer Säure verloren hatte *). Hieraus kann man das Atomgewicht des Magnesiums berechnen, welches dann wird: 158,36, und 25,33 Mal so viel wiegt, als das des Wasserstoffs.

46) Calcium. Das Atom desselben ist nach folgendem Versuche bestimmt: 301 Th. wasserfreien Chlorcalciums, in Wasser aufgelöst und mit salpetersaurem Silberoxyd gefällt, geben 773 Th. Chlorsilber. Darnach das Atomgewicht berechnet, wird dieß 256,03, d. i. das 41fache des vom Wasserstoff.

*) In diesem Falle behält die Erde ihre Säure bei dem Glühen, weil das Wasser, was sonst eine Spur davon wegführt, eher als der Säureüberschuß fortdunstet. Ich habe gezeigt, daß der Niederschlag mit Chlorbaryum ein unrichtiges Resultat liefert, dadurch, daß *Magnesia* mit dem schwefelsauren Baryt niederfällt.

47) Strontium. Stromeyer fand, daß 100 Th. wasserfreien Chlorstrontiums 181,25 Th. Chlorsilber hervorbringen. Dieses giebt das Atomgewicht des Strontiums zu 547,3, oder zu 87,57 Mal so schwer, als das des Wasserstoffs.

48) Baryum. 100 Th. wasserfreien Chlorbaryums gaben in zwei Versuchen 138,06 und 138,08 Chlorsilber. Dieselbe Quantität Chlorbaryum gab mit Schwefelsäure 112,17 und 112,18 Th. schwefelsauren Baryts. Nach dem Mittel aus den ersteren dieser wiegt ein Atom Baryum 856,95, und nach dem Mittel aus den letzteren 856,93, welche folglich als durchaus mit einander übereinstimmend angesehen werden können. Das Baryumatom wiegt alsdann 137,11 Mal mehr, als das Wasserstoffatom.

49) Lithium. 420,4 Th. Chlorlithium gaben, nach Arfvedson's Versuchen, 1322,4 Th. Chlorsilber; dies giebt das Atomgewicht für das Lithium: 127,8, oder 20,45 Mal so schwer, als das des Wasserstoffs.

50) Natrium (das Sodium der französischen und englischen Chemiker). 100 Theile Chlornatrium geben 244,6 Th. Chlorsilber. Daraus folgt, daß das Atom des Natriums 290,92 wiegt, oder 46,55 Mal so viel, als das des Wasserstoffs.

51) Kalium (das Potassium der französischen und englischen Chemiker). 100 Theile Chlorkalium geben 192,4 Th. Chlorsilber. Daraus folgt, daß das Atom des Kaliums 487,915 wiegt, und 78,14 Mal so schwer ist, als das Wasserstoffatom. Kalium und Natrium sind darin von einander verschieden, daß das Superoxyd von Kalium $K+3O$, und das von Natrium $2Na+3O$ ist.

g a n i s c h e C h e m i e.

1910

In der lebenden Natur scheinen die Elemente ganz anderen Gesetzen zu gehorchen, als in der todten, die Producte ihrer gegenseitigen Einwirkungen werden daher ganz anders, als in dem Gebiete der unorganischen Natur. Die Ursache dieser Verschiedenheit zwischen dem Verhalten der Elemente in der todten Natur und den lebenden Körper zu entdecken, würde der Schlüssel zur Theorie der organischen Chemie sein. Sie ist indessen auf eine solche Weise verborgen, daß wir, wenigstens gegenwärtig, ohne alle Hoffnung sind, sie auszumitteln. Dessen ungeachtet müssen wir streben, dieser Kenntniß näher zu kommen; denn einmal wird es uns glücken, entweder sie ganz zu erreichen, oder bis an einer bestimmten Grenze stehen zu bleiben, über welche das menschliche Forschungsvermögen nicht weiter hinaus erstreckt werden kann. Ein lebender Körper, als Gegenstand einer chemischen Untersuchung betrachtet, ist eine Werkstätte, in welcher eine Menge chemischer Prozesse vorgehen, deren Endresultat ist, alle die Erscheinungen hervorzubringen, deren Gesamtheit wir Leben nennen, und diese Werkstätte auf eine solche Art zu unterhalten, daß sie sich, so zu sagen, von einem Atome allmählich bis zur höchsten erreichbaren Vollkommenheit entwickelt, worauf sie wiederum zurückgeht. Nach einer gewissen Trägheit in den Prozessen, hören diese endlich auf einmal auf, und von diesem Augenblicke an fangen die Elemente des vorher lebenden Körpers an, den Gesetzen der unorganischen Natur zu gehorchen. So verhält es sich mit einem jeden lebenden Körper. Der Zeitraum, welchen das Leben, d. h. die Erscheinungen von Entwik-

worin nichts entstehen kann, was der Vorstellung von Zufall entspricht. Wir sehen nicht ein, wie gerade dieses Streben der unorganischen Materie, durch die Sättigungsbegierde wechselseitiger Kräfte in einen indifferenten und ruhenden Zustand zu kommen, gebraucht wird, sie in unaufhörlicher Thätigkeit zu erhalten; aber wir sehen diese berechnete Regelmäßigkeit in den Bewegungen der Welten, unsere Forschungen entdecken mit jedem Tage mehr und mehr von dem für gewisse Endzwecke auf eine so erstaunenswürdige Weise eingerichteten Gebäude organischer Körper, und es wird uns immer mehr Ehre machen, die Weisheit zu bewundern, der wir nicht nachfolgen können, als in philosophischem Uebermuth uns zu einer vermeintlichen Kenntniß dessen zu vernünfteln, was uns vielleicht nicht gegeben ist, jemals zu verstehen.

Ich erwähnte, der lebende Körper sei, von einer chemischen Seite betrachtet, eine Werkstätte chemischer Prozesse, die durch eigene, für die Beschaffenheit des hervorzubringenden Productes eingerichtete, Instrumente ausgeführt werden, von welchen jedes einzelne den Namen Organ bekommt. Davon hat die lebende Natur den Namen organische erhalten, eine Benennung, welche wir auch auf die Ueberreste und Producte lebender Körper so weit ausdehnen, bis sich endlich ihre Elemente ganz und gar, und nur nach Art der unorganischen Natur vereinigt haben.

Ich habe schon, bei der Lehre von den chemischen Proportionen, die verschiedenen Arten nachgewiesen, nach welchen sich die Elemente vereinigen können, und habe angeführt, daß in der unorganischen Natur die zusammengesetzten Atome der ersten Ordnung binäre sind, d. h. daß sie nur aus zwei Elementen bestehen; und alle zusammengesetzten Atome der zweiten, dritten etc. Ordnung können auf Atome der ersten Ordnung reducirt, oder aus ihnen zusammengesetzt werden. In diese letzteren geht am gewöhnlichsten eines der Elemente nur zu einem Atom ein, während das andere zu mehreren eingehen kann, und es ist seltener der Fall, daß sich 2 Atome eines Elementes mit 3 oder 5 eines anderen vereinigen können.

Die Zusammensetzung der organischen Körper zeichnet sich dagegen von den vorhergehenden durch Folgendes aus:

1) Können nicht alle als einfach betrachteten Körper der unorganischen Natur Elemente für die organische Zusammensetzung werden, sondern es findet sich nur eine geringe Anzahl davon in der lebenden Natur. Diese sind vorzüglich: Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff und Stickstoff; aber organische Stoffe enthalten bisweilen zugleich dabei kleine Antheile von Schwefel, Phosphor, Chlor, Fluor, Eisen, Kalium, Natrium, Calcium und Magnesium. Die Hauptmasse ist jedoch immer aus den vier erst genannten gebildet.

2) Bestehen zusammengesetzte Atome der ersten Ordnung im Allgemeinen aus mehr als zwei Elementen. Die vegetabilische Natur ist hauptsächlich aus drei zusammengesetzt: Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, zu welchen in der animalischen Zusammensetzung noch das vierte, der Stickstoff, kommt. Jedoch ist dieß vielen Veränderungen dadurch unterworfen, daß mehrere Pflanzenstoffe Stickstoff enthalten und mehrere Thierstoffe keinen. Wenn aber Stickstoff ein Bestandtheil der ersteren ist, so ist seine Menge, verglichen mit der in den thierischen Körpern, sehr geringe, und die Anzahl von Thierstoffen, welche keinen Stickstoff enthalten, ist sehr beschränkt. Da in der organischen Natur der Sauerstoff einer der wesentlichen Bestandtheile ist, so können auch die organischen Producte als Oxyde von zusammengesetzten Radikalen betrachtet werden. Diese Radikale existiren nicht außer Vereinigung mit Sauerstoff, wenigstens kennen wir kein einziges derselben, und sind folglich ganz hypothetisch, denn sonst wären, was wir nun zusammengesetzte Atome der ersten Ordnung nennen, eigentlich Atome der zweiten Ordnung, und ihre hypothetischen Radikale würden die wirklichen Atome der ersten Ordnung ausmachen. Auch kennen wir von diesen Radikalen nicht mehrere Oxydationsstufen, sondern es wird die Zusammensetzung des Radikales immer durch Zukommen von Sauerstoff

verändert. Den größten Beweis hiervon giebt die Zusammensetzung der Ameisensäure, Bernsteinsäure, Galläpfelsäure und Citronensäure, wie ich schon im ersten Theile gezeigt habe.

3) Sind diese 3 oder 4 Elemente auf eine solche Weise mit einander vereinigt, daß keines davon zu einem Atome eingeht oder einzugehen braucht, sondern daß mehrere Atome von einem Elemente sich mit mehreren von anderen zu einem einzigen zusammengesetzten Atome vereinigen. Wenn z. B. in der unorganischen Natur die Schwefelsäure aus einem Atom Schwefel und 3 Atomen Sauerstoff besteht, so besteht in der organischen Natur z. B. die Weinsäure aus 4 Atomen Kohlenstoff, 5 Atomen Wasserstoff und 5 Atomen Sauerstoff. Daraus folgt, daß die zusammengesetzten Atome der ersten Ordnung in der organischen Natur dem Volum nach größer sein müssen, als in der unorganischen, und deshalb in ihren Verbindungen mit anderen oxydirten Körpern eine bedeutend geringere Sättigungscapacität haben, d. h. zu einem größeren Gewicht eingehen müssen, wie es auch die Erfahrung bestätigt hat.

Aber diese Verhältnisse der Zusammensetzung sind gleichwohl nicht ganz ohne Einschränkung. Gleichwie die Elemente der unorganischen Natur bisweilen, und in mehr selten statt findenden Verbindungen, die Verbindungsweise der organischen Natur darin nachahmen, daß sich z. B. 2 Atome von einem Elemente mit 3 oder 5 Atomen von einem anderen zu einem zusammengesetzten Atome der ersten Ordnung vereinigen können, so ist es in der organischen Natur bisweilen der Fall, daß ein zusammengesetztes Atom der ersten Ordnung nur aus zwei Elementen besteht; so z. B. haben Theodor de Saussure und Houtou-Labillardière gefunden, daß mehrere flüchtige Oele aus dem Pflanzenreich keinen Sauerstoff enthalten, und nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen. Sie bestehen aber nicht als organische Producte aus einem Atom von einem mit einem oder mehreren Atomen von anderen Elemente, sondern aus vielen Atomen von jedem




Elemente, so daß sich durch die Analysen kein einfaches Verhältniß zwischen ihren Bestandtheilen zu erkennen giebt.

Durch die nun angeführten Verhältnisse kann in der organischen Natur eine ganz unberechenbare Anzahl von Verbindungen entstehen, und gerade auf diese Weise bringt die Natur die gränzenlosen Abänderungen von Körpern hervor, die aus gleichen Elementen in so wechselnden Verhältnissen zusammengesetzt sind, daß man, bei der ersten Betrachtung derselben, leicht auf die Vermuthung kommen könnte, in der organischen Natur fänden keine bestimmten Proportionen statt. Aber gleichwohl sind sie vorhanden, und wir brauchen unsere Aufmerksamkeit nur auf die Verhältnisse zu richten, in welchen diese zusammengesetzten organischen Atome der ersten Ordnung sich mit zusammengesetzten unorganischen Atomen der ersten Ordnung vereinigen, wobei wir, so weit unsere Untersuchungen bis jetzt reichen, finden, daß sie dieselben Gesetze befolgen, wie die unorganischen Atome, daß nämlich der Sauerstoff des einen (gewöhnlich des organischen Oxydes) ein Multiplum mit einer ganzen Zahl vom Sauerstoff des anderen ist *); oder, wenn organische Säuren 5 Atome Sauerstoff enthalten, so treffen zwischen dem Sauerstoff derselben und dem des organischen Oxydes durchaus dieselben Verhältnisse ein, welche ich schon für unorganische Säuren mit 5 Atomen Sauerstoff angeführt habe. Durch diesen Umstand ist es auch möglich geworden, in organischen Körpern die einfachen Atome, woraus sie zusammengesetzt sind, zu berechnen, wie ich weiter unten zeigen werde.

*) Wir werden weiter unten einige scheinbare Ausnahmen hiervon kennen lernen, welche die organischen Salzbasen machen, die aber wohl bei einer näheren Kenntniß der inneren chemischen Constitution dieser Basen, mit der Zeit aus dem Wege geräumt werden können.

Aber aufer diesen Verschiedenheiten in der Art, wonach sich die Elemente in der organischen Natur vereinigen, findet noch eine andere, nicht weniger merkwürdige Veränderung in der chemischen Natur selbst und den Eigenschaften dieser Elemente statt, so lange sie unter dem Einflusse der lebenden Natur stehen, oder in denjenigen Verbindungen gehalten werden, in welche sie durch den organischen Prozeß gebracht würden. In der organischen Natur ist z. B. der Schwefel immer, in welcher Verbindung er vorkommen mag, ein stark elektronegativer Körper, und Kohlenstoff ein sehr schwach elektronegativer, welcher aus allen Verbindungen, worin er elektronegativer Bestandtheil ist, von den meisten anderen Körpern ausgetrieben wird. Dies gilt in noch höheren Grade vom Wasserstoff. Wir nehmen an, daß diese Eigenschaften von dem ursprünglichen elektrischen Zustande (el. Polarität) dieser Körper herrühre, von dem wir vermuthen, daß er der Grund ihres gegenseitigen Verhaltens und ihrer Verwandtschaften sei. In der organischen Natur dagegen sind, aus gleichen Elementen zusammengesetzte, Körper, so ungleich in chemischen Eigenschaften, daß sie, von einem gleichen Gesichtspunkte aus betrachtet, unmöglich als aus denselben Elementen gebildet angesehen werden könnten. So z. B. besteht Zucker Gummi etc. aus Sauerstoff, verbunden mit Kohlenstoff und Wasserstoff; keiner von diesen Körpern hat die Eigenschaften von Säure oder Basis, oder sie haben sie wenigstens in einem so geringen Grade, daß diese Eigenschaften nicht ohne besondere Umstände hervorgerufen werden können. Essigsäure, Bernsteinsäure, Citronensäure Ameisensäure u. a. bestehen ebenfalls aus Sauerstoff, verbunden mit Kohlenstoff und Wasserstoff; aber diese sind starke Säuren, die in der unorganischen Natur von aus gezeichnet elektronegativen Radikalen gebildet sein würden, und dessen ungeachtet enthält die Essigsäure und die Bernsteinsäure weniger Sauerstoff als das Gummi und der Zucker, während Citronensäure und Ameisensäure einig Procent mehr als diese enthalten. Die Oxalsäure ist i

ieser Hinsicht ein ausgezeichnetes Beispiel. Diese Säure besteht nur aus Kohlenstoff und Sauerstoff, und der Kohlenstoff ist darin mit $1\frac{1}{2}$ Mal so viel Sauerstoff wie im Kohlenoxyd, und nur mit $\frac{2}{3}$ so viel, wie in der ganz schwachen Kohlensäure verbunden, so daß, wenn man diese drei als die Oxydationsstufen des Kohlenstoffs betrachtet, folgende Reihe entsteht:



Hier ist also, ganz gegen das gewöhnliche Verhältniß, die höhere, aus einem Atom des einen Elementes und einem Atom vom anderen bestehende, Oxydationsstufe, eine sehr schwache Säure, und die niedrigere, aus mehr als einem Atom vom einen Elemente mit mehreren Atomen vom anderen zusammengesetzte, eine ganz starke Säure. Offenbar hat also die Oxalsäure, welche eine der stärksten Säuren ist, ein weit mehr elektronegatives Radikal, als die Kohlensäure. Aber diese Säure ist entweder unmittelbar in einem lebenden Körper hervorgebracht, oder ist ein Product von der bis zu einem gewissen Grade gehenden Zerstörung organischer Stoffe geworden, und dadurch hat ihr Radikal ganz andere elektrischchemische Eigenschaften erhalten, als es behalten kann, nachdem es aus diesem Zustande wieder zu der Art von Verbindungen gekommen ist, welche die unorganische Natur ausmachen.

In den Organen der lebenden Körper bekommen also die Oxyde zusammengesetzter Radikale, welche sie hervorbringen, einen eigenen elektrochemischen Zustand, welcher nicht bloß auf der Natur des angewendeten unorganischen Elementes beruht, sondern hauptsächlich auf der eigenthümlichen Beschaffenheit des lebenden Organes, und es wäre, von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, nicht unmöglich, daß in der organischen Natur zwei Körper vorkommen könnten, welche aus gleichen Elementen und zu gleichem relativen Gewichte beständen, welche aber durchaus keine gleichen Eigenschaften hätten.

Wie das Organ dabei wirkt, ist uns nicht möglich zu erforschen, nicht einmal zu vermuthen. Seitdem wir gefunden zu haben glauben, daß der elektrische Zustand der Körper, und im Allgemeinen die Elektricitäten, das *Primum movens* aller chemischen Thätigkeit sei, können wir auch mit vieler Wahrscheinlichkeit vermuthen, daß die Organe des lebenden Körpers ein Vermögen besitzen, auf eine, ihnen eigenthümliche Art die elektrische Polarität der Körper, welche sie hervorbringen, zu bestimmen; aber dieß ist auch Alles, was wir darüber sagen können, wenn wir uns nicht in eitele Speculationen vertiefen wollen.

Mehrere der elektrischchemischen Zustände, welche bei organischen Zusammensetzungen hervorgebracht werden, sind von der ursprünglichen Natur der unorganischen Elemente so abweichend, daß sie nur unter dem Einflusse der Kraft, welche sie hervorbrachte und sie in den im lebenden Körper zu ihrer Aufnahme bestimmten Verwahrungsort einschloß, sich erhalten können, und durch die geringste Einwirkung einer fremden Kraft anfangen, verändert zu werden. Andere haben einen größeren Bestand, und einige können sich in trockener Form sehr lange, selbst Jahrtausende hindurch, erhalten; aber alle haben das gemeinschaftlich, daß, wenn sie den auf der Erdoberfläche wirkenden chemischen Agentien, der Wärme, der Luft und dem Wasser ausgesetzt werden, sie gradweise von dem einen elektrochemischen Zustande zu dem andern zurückzugehen anfangen, und Producte von immer größeren Bestand bilden, bis sie sich endlich in binäre Verbindungen zwischen den Elementen auflösen, d. h. bis endlich die Elemente vollkommen der unorganischen Natur anheimfallen. Es ist also eine Folge der Neigung der unorganischen Elemente, ihre ursprünglichen elektrischchemischen Eigenschaften wieder anzunehmen, daß die chemischen Producte der lebenden Natur nach und nach zerstört werden. Die dabei statt findenden Prozesse, welche die Elemente durch die Zerstörung der einen Verbindung allmählich in eine andere versetzen, die wiederum

derum in ihrer Reihe weiter aufgelöst wird, erhalten die Namen Gährung und Fäulnis, und erzeugen eine Menge sehr merkwürdiger Producte und Erscheinungen, welche ich späterhin beschreiben werde.

Die Kunst vermag nicht die Elemente der unorganischen Natur nach Art der lebenden Natur zu vereinigen; bei unseren Versuchen bringen wir nur binäre Vereinigungen und Zusammensetzungen derselben hervor. Sogar die lebenden Körper selbst können einen großen Theil von Materien nicht aus rein unorganischen Stoffen hervorbringen, sondern bedürfen dazu der Producte anderer lebender Körper als Material zu ihren Prozessen. So z. B. lebt die vegetabilische Natur des einen Jahres von den Ueberresten der vorhergehenden Jahre, die pflanzenfressenden Thiere brauchen Pflanzen, und die fleischfressenden andere Thiere zu Nahrungsmitteln, d. h. als Material zur Unterhaltung der in jedem Individuum vorgehenden chemischen Prozesse.

Wenn sich die Kunst des Einflusses chemischer Reagentien auf organische Producte bedient, so kann sie eine kleine Anzahl mit den organischen Producten gleichartiger Materien hervorbringen, aber dieß geschieht immer so, daß sie ihre Elemente ihrem endlichen Zerfallen in binäre Verbindungen um einige Schritte näher bringt; so z. B. erhalten wir Aepfelsäure und Oxalsäure durch Behandlung einer großen Anzahl Stoffe mit Salpetersäure, Essig und Oele (brenzliche) durch Destillation bei höherer Temperatur; aber es ist noch nie geglückt, aus den unorganischen Elementen weder Oxalsäure, noch Aepfelsäure, noch Essigsäure zu erzeugen, weder dadurch, daß man ihre Elemente, ein jedes im isolirten Zustande, zusammenzubringen versucht, noch dadurch, daß man binäre Verbindungen der Elemente zu ihrer Erzeugung einander darbietet. Die Bedingungen, welche sur Hervorbringung des Oxydes von einem zusammengesetzten Radikale erforderlich sind, und welche ihm jenen eigenthümlichen, bestimmten elektrochemischen, von demjenigen so verschiedenen, Charakter geben, wie er aus dessen Grund-

stoffen folgen sollte, sind folglich eben so völlig unbekannt, wie die Wirkungsart der lebenden Organe.

Indessen können wir aus völlig unorganischen Stoffen drei Materien hervorbringen, worin die Elemente nach Art der unorganischen Natur mit einander vereinigt sind, aber diese stehen gerade auf der äufsersten Grenze zwischen organischer und unorganischer Zusammensetzung. Sie sind: *a*) eine zusammenziehende Materie, welche durch Behandlung von Holzkohlenpulver mit Salpetersäure erhalten und nach ihrem Entdecker Hatchet's künstlicher Gerbestoff genannt wird, weil sie die Leimauflösung fällt; aber diese Materie hat nichts anderes mit gewöhnlichem Gerbestoff gemeinschaftlich, als den Geschmack und diese Fällung. Ich werde bei dem natürlichen Gerbestoff etwas mehr davon erwähnen. *b*) Wenn Gufseisen in Königswasser oder Salpetersäure aufgelöst, und das Eisenoxyd, nach seiner Ausfällung mit Ammoniak, mit Wasser ausgekocht wird, so färbt sich dieses Wasser gelb, und hinterläßt nach dem Abdampfen ganz dieselbe Materie, welche man durch Auskochung der Dammerde erhält, und welche das letzte Stadium organischer Zusammensetzungsart ist, welches Thier- und Pflanzen-Stoffe durchgehen, ehe sie sich völlig in binäre Verbindungen auflösen. Ein Theil derselben schwerauflöselichen Materie bleibt in Gestalt eines schwarzen Pulvers in der Säure unaufgelöst, welches beim Kochen mit Wasser dieses gelb, und welches kaustisches Kali schwarz färbt. *c*) Werden Wasserdämpfe über glühendes Kohlenpulver hin- und hergeleitet, oder wird ein Gemenge von 10 Th. Kohlenwasserstoffgas im Maximum, 20 Theile von demselben Gase im Minimum und 1 Th. Kohlensäuregas durch eine gelinde glühende Porzellanröhre geleitet, so entsteht ein eigenthümlicher, weißer, talgartiger, flüchtiger Körper, der zuerst von Bérard bemerkt worden ist. Er hat einen eigenen brenzlichen Geruch, krystallinisches Gefüge, und erfordert, um sich zu entzünden und zu brennen, auch in Sauerstoffgas eine bedeutend höhere Temperatur, als die ist, wobei er sich verflüchtigt.

Wenn wir aber auch in Zukunft mehrere solche Producte, aus rein unorganischen Materien und von einer mit den organischen Producten analogen Zusammensetzung, entdecken sollten, so ist doch diese unvollständige Nachahmung immer zu unbedeutend, als daß wir jemals hoffen könnten es zu wagen, organische Stoffe künstlich hervorbringen, und, wie es in den meisten Fällen in der unorganischen Natur glückt, die Analyse durch die Synthese zu bestätigen.

Alles, was also unsere Forschungen in diesem geheimnißvollen Theile der Chemie ausrichten können, ist, die chemischen Veränderungen zu beobachten, welche von den lebenden Körpern in den Elementen, worin sie sich befinden, d. h. auf die chemischen Reagentien, von welchen sie umgeben sind, hervorgebracht werden, so wie die Erscheinungen, welche den Lebensprozeß begleiten, so weit es uns möglich ist, ihn zu verfolgen, dann die organischen Producte von einander zu trennen, ihre Eigenschaften zu studiren und ihre Zusammensetzung zu bestimmen. Aber alles dieß ist sehr schwer, die Chemie erhebt sich hier auf einen höheren Werth, wenn ich mich dieses Gleichnisses für mathematische Gegenstände bedienen darf, und auch das schärfste Auge ist beständigen Irthümern ausgesetzt, während die Entdeckung des Wahren oft eben so sehr vom Zufall als von geistvoller Berechnung abhängt.

Die erste Schwierigkeit, welche bei Behandlung organischer Materien aufstößt, ist die Unmöglichkeit, zu unterscheiden, ob das, was ich untersuchen will, eine Verbindung, oder sogar nur ein bloßes Gemenge aus zwei organischen Stoffen ist, oder ob es wirklich von allen anderen isolirt ist. Es geschieht so oft, daß zwei mit einander verbundene organische Materien sich einander in ihre Verbindungen mit unorganischen Körpern begleiten, und wenn sie bei keinem von unseren Versuchen getrennt werden, so werden wir dadurch irre geführt und halten das Untersuchte für unvermischt. Auf diese Art sind wir immer sehr unsicher, ob das von uns für

einen einzigen Stoff Gehaltene wirklich so ist; und überdem ist es in vielen Fällen absolut unmöglich, einen solchen rein und frei selbst von solchen fremden Materien zu erhalten, deren Gegenwart uns bekannt ist. Ueberall in der organischen Natur sind die Schwierigkeiten zu trennen größer, und die Wege dafür weniger zahlreich als in der unorganischen, so daß dieser Theil der Chemie als noch gänzlich in seiner Kindheit sich befindend betrachtet werden kann.

Die Schwierigkeiten bei der Analyse eines jeden isolirten Stoffes sind nicht weniger groß, und diese Analysen sind durchaus zwecklos, wenn man theils nicht absolut sicher ist, nicht zwei oder mehrere statt eines Stoffes zu analysiren, und theils, wenn man nicht die Sättigungscapacität des zu untersuchenden Körpers bestimmen kann.

Der Endzweck dieser Analysen ist, nicht allein zu bestimmen, welche unorganische Elemente der organische Stoff enthält, sondern auch, welches die Anzahl ihrer Atome ist. Das erstere kann nicht mit Sicherheit geschehen, wenn nicht zugleich ein Weg zur Bestimmung des letzteren gegeben ist, weil, wenn die Anzahl von einfachen Atomen groß ist, die mehr oder weniger bedeutenden Abweichungen von dem richtigen Verhältnisse, die in allen und auch den besten von unseren Versuchen vorkommen, oft größer werden, als das Gewicht von einem oder einigen Atomen eines der Elemente, besonders des Wasserstoffs, und weil jedes Resultat so beschaffen ist, daß, wie unrichtig es auch sein mag, es gleichwohl eine gewisse relative Anzahl von den gefundenen Atomen des Elementes geben kann, welche ihm entspricht. Aber, was dann beweisen würde, daß die berechnete Atomenanzahl die richtige sei, so hat man nichts Anderes als die vorausgesetzte vollkommene Richtigkeit des Versuches, welche für sich selbst unmöglich ist. Die geringste Verschiedenheit im Resultate giebt eine andere Anzahl von Atomen, ohne eine Möglichkeit, zu bestimmen, welches von den von einander abweichenden Resultaten das richtige sei.

Die einzige Art, welche wir bis jetzt kennen, um eine wahrscheinliche Anleitung zur Bestimmung der Anzahl von einfachen Atomen zu erlangen, ist, mit Genauigkeit die Sättigungscapacität des organischen Stoffes auszumitteln, welche immer auf der Anzahl seiner einfachen Atome beruht. Ich erwähnte, daß uns die Erfahrung, so weit sie bis jetzt reicht, gelehrt hat, daß die Oxyde zusammengesetzter Radikale dieselben Gesetze wie die Oxyde der einfachen befolgen, daß nämlich, bei ihrer Vereinigung mit anderen oxydirten Körpern, dies auf eine solche Weise geschieht, daß der Sauerstoff des einen ein Multiplum mit einer ganzen Zahl vom Sauerstoff des anderen ist, d. i. 1, 2, 3, 4 etc. Mal so viel Atome Sauerstoff als der andere enthält. Verbindet sich dann der organische Stoff mit einem binären Oxyd, dessen Anzahl von Sauerstoffatomen bekannt ist, so kann man, wenn die Sauerstoffmenge in dem organischen Körper bekannt wird, bestimmen, wie viel Atome dies in der Quantität von organischem Körper ausmacht, welche zur Sättigung von einem Atom des binären Oxydes nöthig ist, und zwar nach ganz denselben Gründen, nach welchen wir diese Berechnungen bei unorganischen Verbindungen machen. Ich will dies durch ein Beispiel erläutern. Man hat gefunden, daß die Sättigungscapacität der Essigsäure 15,550 ist, d. h. daß die Basis, wovon 100 Th. Essigsäure gesättigt werden, diese Quantität Sauerstoff enthält. Bei der Analyse fand man in 100 Th. Essigsäure 46,64 Sauerstoff, 47,53 Kohlenstoff und 5,83 Wasserstoff. Nun muß der Sauerstoff, in Folge des erwähnten Gesetzes, ein Multiplum mit einer ganzen Zahl von 15,55 sein; und wir finden, daß $15,55 \times 3 = 46,64$ ist. Daraus sehen wir nun, daß die Essigsäure auf jedes Atom Sauerstoff in der Basis, wovon sie gesättigt wird, 3 Atome Sauerstoff enthält; wenn aber die Quantität des Sauerstoffs 3 Atomen entspricht, so müssen die gefundenen Quantitäten der anderen Stoffe irgend einer Anzahl von ganzen Atomen entsprechen, d. i. wenn die Menge des Sauerstoffs in der Essigsäure zu 300 (dem Gewichte von 3 Atomen Sauer-

stoff) genommen wird, und danach die gefundenen Mengen von Kohlenstoff und Wasserstoff durch eine einfache *Regula de tri* proportional berechnet werden, so müssen sie sich mit dem Atomgewichte eines jeden fast gerade aufdividiren lassen, was in diesem Falle eintritt, so daß das Atom vom Gewichte des Kohlenstoffs gerade 4 Mal aufgeht im gefundenen Gewicht vom Kohlenstoff, und das des Wasserstoffs 6 Mal. Woraus dann folgt, daß jedes Atom Essigsäure aus 3 Atomen Sauerstoff, 6 Atomen Wasserstoff und 4 Atomen Kohlenstoff besteht. So genau, wie in dem angeführten Beispiele, fallen wohl niemals die Versuche aus; wenn sie aber gut angestellt werden, so werden die Abweichungen nicht größer, als gewöhnlich unsere Beobachtungsfehler zu sein pflegen.

Wenn man in solchen Fällen durch die Untersuchungen der Sättigungscapacität das Resultat auf die Weise unrichtig erhalten würde, daß die Anzahl der Sauerstoffatome eigentlich halb oder doppelt so groß sein sollte, so ist dies für die relative Menge der einfachen Atome gleichgültig, und läßt sich auf jeden Fall näher bestimmen, wenn man mehrere Verbindungsstufen zwischen dem binären und dem organischen Oxyde untersucht, wenn solche vorhanden sind. Untersucht man z. B. die Verbindungen der Essigsäure mit dem Bleioxyde, so findet man, daß in ihren beiden basischen Salzen die Quantitäten des Bleioxyds 3 und 6 Mal so groß sind, als in dem neutralen Salze; ein bestimmter Beweis, daß die Essigsäure 3 oder 6 Atome Sauerstoff enthalten muß, und nicht 2 oder 4 enthalten kann.

Einige Chemiker haben versucht, die Zusammensetzung der organischen Stoffe durch binäre Verbindungen, in welche sie getheilt werden können, oder auch, wo es möglich ist, durch eine gewisse Anzahl einfacher und eine gewisse Anzahl binärer Atome vorzustellen. Diese Darstellung ist mitunter recht interessant, darf aber nicht als Grundaufstellung der elementaren Zusammensetzung organischer Körper angenommen werden. Andere sind so weit gegangen, daß sie, um die organische Zusammensetzung

mit der unorganischen analog zu machen, annahmen, die organischen Stoffe beständen aus Verbindungen von zwei binären Verbindungen, gleich z. B. einem Salze in der unorganischen Natur; aber, abgerechnet von der Unge- reimtheit, welche darin läge, wenn man auf diese Weise z. B. eine Säure zusammengesetzt betrachtete, so existiren in den meisten Fällen nicht die binären Verbindungen, woraus man die organischen Körper zusammengesetzt an- nehmen würde.

Die Untersuchung der Zusammensetzung der organi- schen Oxyde macht einen sehr wichtigen Theil der Che- mie aus, auf den künftig die Entwicklung der Natur mehrerer organischer Prozesse zu beruhen kommt, und wenn man sie vornimmt, so muß man, um zu vollkom- men sicheren Resultaten zu gelangen, Alles beobachten, was der Standpunkt der Wissenschaft dabei gestattet. Ich werde deshalb in der Kürze anführen, was dabei zu beobachten ist.

1) Muß der zu analysirende Körper von al- len anderen brennbaren Körpern getrennt wer- den. Dies ist, wie ich schon anführte, sehr schwer; es können dafür keine bestimmten Regeln gegeben werden, und es beruht durchaus auf dem eigenen individuellen Vermögen die Wege aufzufinden, um die Reinheit des Körpers zu prüfen und ihn von fremden Stoffen zu tren- nen. Viele für eigenthümliche und besondere Stoffe ge- haltene Körper möchten wohl Verbindungen aus zweien oder mehreren sein, welche uns der Zufall zu trennen noch nicht gelehrt hat. Diese, die erste Bedingung, wenn eine Analyse ein richtiges und anwendbares Resultat ge- ben soll, ist daher so schwer zu erfüllen, daß man bei der Unsicherheit deshalb gerne eine Reihe von Untersu- chungen vermeidet, deren Resultat mit der Zeit unrichtig befunden werden wird. Man kann denjenigen, welche sich mit dieser Art von Analysen zu beschäftigen beabsichtigen, nicht genug die Nothwendigkeit der Beobachtung dieser ersten Bedingung einschärfen. Keine der Scheidungsme- thoden, welche die unorganische Chemie darbietet, wie

152 Die org. Mat. muß v. d. Anal. vollk. isol. werden.

z. B. Destillation, Behandlung mit verschiedenen Auflösungsmitteln, mit Wasser, Alkohol, Aether, Verbindung mit Basen aus allen Klassen, darf unversucht bleiben, um ausfindig zu machen, ob die zu untersuchende Materie ein einfaches organisches Oxyd oder eine Verbindung von zweien oder mehreren sei. Um zu entdecken, ob ein Körper, den man untersuchen will, andere Körper eingemischt enthalte, schreibt Chevreul vor, ein gewisses Gewicht eines Körpers mehrere Mal nach einander mit kleineren Quantitäten von demselben Auflösungsmittel zu behandeln und diese für sich zu nehmen, womit man fortfährt, bis alles aufgelöst ist. Ist dann der Körper unvermischt, so enthält immer dieselbe Menge des Auflösungsmittels eine gleiche Menge vom aufgelösten; ist er aber vermischt, so soll es in den meisten Fällen eintreffen, daß die ersten und letzten Portionen nicht allein ungleiche Quantitäten vom aufgelösten Stoffe enthalten, sondern daß auch der Rückstand nach ihrer Abdampfung durch seine ungleichen Charaktere die Natur der der Substanz beigemischten Materien zu erkennen giebt. — Nach der Entfernung aller organischen Oxyde, hat man gewöhnlich noch ein unorganisches übrig, dessen Gegenwart, auch in geringer Menge, durchaus das Resultat der Analyse verwirrt. Dies ist das Wasser, dessen Bestandtheile man mit denen des organischen Oxydes vermischt erhält. Dieses Wasser ist darin entweder in chemischer Verbindung und in einem bestimmten Verhältnisse enthalten, oder es ist nur hygroskopisch zurückgehalten, theils durch die Eigenschaft des Körpers, zu zerfließen, theils, in Folge des allgemeinen Vermögens poröser Körper, Wassergas aus der Luft zu condensiren, mechanisch in seine Zwischenräume condensirt.

Wenn das Wasser in bestimmter Proportion in dem zu untersuchenden Körper enthalten ist, so wird zwar das Resultat der Analyse unrichtig, es kann aber dann berechnet und die relative Anzahl der Atome gefunden werden. Entdeckt und bestimmt man nachher den Wassergehalt, so ist das Resultat der Analyse brauchbar, und giebt, nach

Abzug des Wassers, die Zusammensetzung des organischen Oxydes. So z. B. als Thénard und Gay-Lussac die Weinsäure analysirten, bedienten sie sich der weinsauren Kalkerde, worin ein Atom Säure mit 4 Atomen verbunden ist. Da sie dieses Wasser zu den Bestandtheilen der Säure rechneten, so wurde ihr Resultat dadurch fehlerhaft, und stellte nicht die richtige Zusammensetzung der Weinsäure vor; nachdem man aber gefunden hatte, daß die Weinsäure in diesem Salze 4 Atome Wasser enthält, so brauchte man nur diese abzuziehen, und das Uebrige stellte nun die wahre Zusammensetzung der Weinsäure dar.

Ist aber das Wasser nur hygroskopisch, so wird das analytische Resultat absolut unbrauchbar und der Versuch ohne alle Anwendbarkeit. Um alles hygroskopische Wasser zu entfernen, bedient man sich entweder bloß der Wärme, indem man die zu untersuchende Materie zu feinem Pulver reibt und in einem offenen Gefäße bei einer hohen Temperatur trocknet, die jedoch nicht so hoch sein darf, daß dadurch die Zusammensetzung auf irgend eine Weise verändert wird; oder man wendet auch zugleich eine höhere Temperatur und den luftleeren Raum an. Dieß pflege ich so zu veranstalten: eine Reibschale von Steingut wird mit Sand gefüllt und auf der Sandkapelle erhitzt, bis daß ein mit der Kugel in den Sand gesenktes Thermometer die beabsichtigte Temperatur, z. B. $+110^{\circ}$ bis $+120^{\circ}$ anzeigt *). Die in ein schmales, cylindrisches Glasgefäß (z. B. in eine halb Zoll weite, am einen Ende zugeschmolzene Glasröhre) gelegte Probe, wird nun in den Sand gesenkt, nachdem man die Oeffnung des Gefäßes mit Papier zugebunden hat. Die heiß gemachte Reibschale mit ihrem Inhalt wird nun unter den Recipienten der Luftpumpe gebracht, unter welchen man zugleich ein mit concentrirter Schwefelsäure

*) Viele Stoffe vertragen, ohne Zersetzung, noch stärkere Hitze, andere aber vertragen diese Temperatur nicht. Durch vorläufige Versuche findet man leicht die Temperatur, wobei die Materie brenzlich zu riechen anfängt, wonach man dann seine Trocknungshitze richtet.

154 Bestimmung der Sättigungscapacität

gefülltes, offenes Gefäß gestellt hat. Man macht so schnell wie möglich luftleer und läßt die Anstalt darin erkalten. Je größer und je weniger wärmeleitend das hierbei tragbare Sandkapelle gebrauchte Gefäß ist, um so länger erhält es sich warm, und um so länger dauert die gemeinschaftliche Wirkung der höheren Temperatur und des Vacuums. Auf diese Weise entfernt man vollkommen alle hygroskopische Wasser, welches viele Stoffe so hartnäcklich zurückhalten, daß es sich nicht bloß durch das Vacuum wegschaffen läßt. Sehr viele Stoffe, welche chemisch gebundenes Wasser enthalten, verlieren es ebenfalls auf die Art, zumal wenn das organische Oxyd noch mit einem anderen binären Oxyde als Wasser verbunden ist. Andere dagegen können nicht von ihrem Wasser weder durch Wärme noch das Vacuum geschieden werden, wie z. B. Weinsäure, zweifach weinsaures Kali u. a. m., aus welchen es jedoch durch Zufügung anderer Oxyde entfernt werden kann.

2) Muß man die Sättigungscapacität des organischen Oxydes mit der höchsten möglichen Genauigkeit bestimmen. Ist die Sättigungscapacität groß, so hat ein kleiner Fehler im Resultate weniger bedeu- ten, als wenn sie klein ist; und je geringer sie ist, um so nothwendiger ist es, daß die gefundene Zahl correct werde, weil, wenn ein organisches Oxyd eine große Anzahl von Atomen enthält und seine Sättigungscapacität ein Submultiplum seines Sauerstoffgehaltes mit einer größeren Zahl, z. B. 6, 8, 10 und darüber ist, so wird der Fehler in der Bestimmung der Sättigungscapacität auch eben so viel Mal bei der Berechnung der Analyse multiplicirt. Wäre z. B. die Sättigungscapacität 2 und der Sauerstoffgehalt 10 Mal so groß, der Versuch aber hätte gegeben 2,1 statt 2, so wird das davon berechnete Resultat um 1 Procent unrichtig.

Bei Bestimmung der Sättigungscapacität wählt man diejenige Verbindung mit einem binären Oxyde, die sich am leichtesten analysiren läßt, und man sucht dabei, wenn möglich, mehrere Verbindungen in ungleichen Sättigungscapacitäten.

raden hervorzubringen, theils weil die Analysen derselben sich einander corrigiren, und theils weil man in dem Grade das Resultat sicherer erwarten muß, als eine größere Quantität vom unorganischen Oxyde mit dem organischen verbunden werden kann.

Ich habe im Allgemeinen bei meinen Versuchen vorzugsweise das Bleioxyd gewählt, theils weil diese Basis, häufiger als andere, Verbindungen mit Ueberschuß an Base einget, und theils weil sich ihre Verbindungen leichter analysiren lassen. Aber bei Anwendung desselben muß man sich genau erinnern, daß die Verbindungen auf eine solche Weise hervorgebracht sein müssen, daß sie sich auf einer bestimmten Sättigungsstufe befinden, nicht Gemenge von mehreren sind, und nicht mechanisch eingetengtes Bleioxyd enthalten. Durch Digestion mit gelähmtem Bleioxyd können sie selten ohne freies Bleioxyd erhalten werden. Bedient man sich dagegen der Bleisalze zu ihrer Anfällung aus Auflösungen, so hat man sich zu erinnern, daß wenn das zum Niederschlagen dienende Bleisalz im Ueberschuß vorhanden ist, davon immer eine kleine Portion mit gefällt wird. Tropfe ich z. B. eine Auflösung von oxalsaurem Kali in die Auflösung eines salpetersauren oder essigsauren Bleioxyds, so enthält immer das niederfallende oxalsaure Bleioxyd eine kleine Portion essigsaures oder salpetersaures Bleioxyd, deren Bestandtheile sich bei der Verbrennung des oxalsauren Bleioxyds in die der Oxalsäure einmengen und zu einem fehlerhaften Resultate Anlaß geben. Wird dagegen das Bleisalz in kleinen Antheilen zu dem oxalsauren Kali zugesetzt, so daß immer letzteres in der Auflösung im Ueberschuß bleibt, so findet dieser Umstand nicht in bemerkbarem Grade statt. Ferner muß man sich erinnern, daß man, bei Anwendung des essigsauren Bleioxyds zu Fällungen, genau nachsehen, daß die Auflösung nicht mehr als ein einziges der drei in Wasser auflöselichen Verbindungen, welche die Essigsäure mit dem Bleioxyd bildet, enthalte, weil die geringste Einmischung von einer der übrigen anderen eine gemischte Verbindung hervorbringt,

158 Bestimmung d. Sättigungsgrenze v. A. Blei

Wenn man zu vollständig erhaltenen Bleisauerstoff eine kleine Menge von Wasser zusetzt, so wird die Verbindung zerfallen. Dieser Zerfall wird durch Zersetzung mit Wasser hervorgerufen. Man kann auf zwei Arten hervorgebracht werden. Nämlich durch Zersetzung mit Wasser, welches man durch Zersetzung mit Wasser hervorgerufen ist. Oder durch Zersetzung mit Wasser, welches man durch Zersetzung mit Wasser hervorgerufen ist.

Wenn man eine metallische Verbindung erhält, wie man sie wird, so wird man sie durch die gegebene Form. Bleisauerstoff enthält ein chemisch gebundenes Wasser, und zerfällt es im Allgemeinen beim Trocknen im Vacuum leicht ab: jedoch muß man immer aufmerksam sein, daß man nicht in diesem Falle durch eine Ausnahme hintergangen werde.

Die trockne Verbindung wird auf eine dünne und geringe Schale von Glas gelegt, darauf schnell gegeben, und die Schale dann über einer Spirituslampe erhitzt, so daß sich die Masse an den Rändern erhitzt; in den meisten Fällen kann man dann die Lampe wegnehmen und die Verbindung fährt von selbst zu brennen fort. Zuletzt unterstützt man die Verbrennung durch die Lampenflamme, und um der Luft zu der verbrennenden Masse, die von allen Seiten von dem aufsteigenden heißen Luftstrom umgeben ist, Zutritt zu verschaffen, läßt man einen Streifen eines Metallbleches an den Rand der Schale; die kalte Luft strömt dann über diesen Streifen und die Verbrennung geht vor sich. Man muß bei der Verbrennung eine zu starke Hitze vermeiden, weil man sonst oft Bleikugeln mit Ausstoßung von Bleirauch hervorkommen sieht, wobei ein Theil vom Blei verfliehet. Nach beendigter Verbrennung wird die Schale mit ihrem Inhalt gewogen. Hierdurch erfährt man, was von der Bleiverbindung übrig geblieben ist. Aber dieser Rückstand ist zum Theil reducirtes Blei, dessen Sauerstoff bei

er Verbrennung verloren ging. Um diesen zuzulegen, wird die gewogene Masse mit destillirtem Essig behandelt, welcher das Bleioxyd auflöst und das Blei zurückläßt, das man zuerst mit etwas warmen Wasser und zuletzt mit etwas Alkohol abwäscht, trocknet und in der Chale wiegt. Man berechnet dann das Quantum Sauerstoff, welches zur Umwandlung dieses Bleies zu Oxyd erforderlich ist, und fügt diese Quantität zum Gewichte des Rückstandes, wodurch man die Quantität des Bleioxyds in der zur Analyse angewandten Verbindung erhält, und woraus man die Sättigungscapacität berechnen kann. Es ersteht sich von selbst, daß man sich nicht auf einen einzigen Versuch verlassen darf; man muß nicht allein den Verbrennungs-Versuch wiederholen, sondern man muß auch die Bereitung der Verbindung noch einmal vornehmen, damit man sich überzeuge, daß man sie jedesmal auf derselben Sättigungsstufe erhalte, und nicht ein zufälliges Gemenge von mehreren Verbindungsgraden erhalten habe; und erst dann, wenn man immer dasselbe Resultat mit höchst unbedeutenden Abweichungen (z. B. nur in 10,000 Theilen) erhält, kann man hoffen, daß die Versuche einigermaßen zuverlässig seien.

3) Muß man das organische Oxyd auf eine solche Weise verbrennen, daß der Kohlenstoff in Kohlensäure, der Wasserstoff in Wasser umgewandelt, und der Stickstoff, wenn er darin enthalten ist, in Gestalt von Stickgas ausgeschieden werde, ohne daß er sich oxydire.

Es giebt hierzu mehrere Wege. Lavoisier verbrannte die organische Materie in mit Sauerstoffgas gefüllten Glocken, in welchen er sie mit dem Brennglase oder auf sonst eine Art anzündete. Abildgaard destillirte sie mit Schwefelsäure und Mangansuperoxyd, und ich versuchte, schon lange vorher, ehe man noch den uns jetzt erreichbaren Grad von Genauigkeit in den Resultaten hoffen konnte, die Salze verschiedener Pflanzensäuren theils mit braunem Bleisuperoxyd, und theils mit Mennige zu destilliren; aber keine von diesen Versuchen gaben je

158 Thénard's u. Gay-Lussac's Methode,

mehr als entfernte Annäherungen zu dem richtigen Verhältnisse. Die ersten, recht geglückten Versuche wurden von Thénard und Gay-Lussac angestellt.

Dies machten sie auf folgende Weise: der zu analysirende Stoff wurde bei $+100^{\circ}$ wohl getrocknet, gewogen und genau mit einer ebenfalls abgewogenen Menge chlorsauren Kali's, in einem so großen Ueberschuß, vermischt, daß kein Theil des organischen Oxydes unverbrennt bleiben konnte. Vor Anwendung des geschmolzenen chlorsauren Kali's wurde bestimmt, wieviel Sauerstoffgas es gab. Die wohl zerriebene und vermischte Masse wurde mit Wasser zu einem steifen Teige gemacht, der durch einen kleinen Metallcylinder, von dem Durchmesser einer schmalen Feder, gepreßt wurde, wodurch er die Gestalt cylindrischer Stangen bekam, die dann mit einem Messer in kleinere Theile zertheilt wurden, und diese wurden endlich zwischen den Fingern zu kleinen Kugeln gedreht, ungefähr so, wie man Pillen macht. Diese Kugeln wurden wieder bei $+100^{\circ}$ getrocknet, und, wenn sie dann bei fortgesetztem Trocknen nichts mehr an Gewicht verloren, zu dem Versuche angewendet.

Zur Verbrennung dieser Kugeln bedienten sie sich eines von ihnen erfundenen Apparates, der in einem unten verschlossenen Cylinder oder einer Röhre von Glas bestand, welche oben mit einem eigenen messingenen Hahn versehen war, wodurch jedesmal nur eine Kugel eingebracht werden konnte, ohne daß der innere Raum des Cylinders mit der Luft in Communication kam. Neben diesem Hahn befand sich eine Ableitungsröhre für das sich bei der Verbrennung bildende Gas. Der Boden des Cylinders wurde zwischen Kohlen erhitzt, so daß die darauf fallenden Kugeln sogleich entzündet wurden.

Sie fingen damit an, einige Dutzend der getrockneten Kugeln, eine nach der anderen, hineinzulassen, welche nicht gewogen wurden, weil sie damit bezweckten, den Apparat, vor dem Anfange des Versuches, mit demselben Gase zu erfüllen, welches nach Beendigung des Versuches darin zurückbleiben würde, um auf diese Art

die Einmischung der atmosphärischen Luft unter die Verbrennungsprodukte zu verhindern, und um nicht nöthig zu haben, für das, was nach beendigtem Versuche in der Röhre zurückbleibt, einen unsicheren Abzug vorzunehmen. Darauf wurde eine gewogene Portion von trocknen Kugeln abgebrannt, welche 0,5 bis 0,6 Gramm organischen Stoffes enthielten, und das sich entwickelnde Gas wurde über Quecksilber in Glasgefäßen aufgefangen, worin es mit Genauigkeit gemessen werden konnte.

Nachdem das Volum des Gases gemessen war, wurde es hinsichtlich seiner Natur untersucht. Hierzu wurde nicht die ganze Portion, sondern nur kleine Mengen davon in graduirten Röhren angewandt. Die erste Probe ging darauf hinaus, zu erfahren, ob die Bestandtheile des organischen Stoffes vollständig oxydirt worden waren, und ob in dem Gase nicht eine Portion Kohlenoxydgas enthalten war; dies geschah so, daß 100 Volumtheile vom erhaltenen Gase mit 20 Th. Wasserstoffgas vermischt und durch den elektrischen Funken verbrannt wurden. Verschwanden dann von diesen 120 Theilen mehr als 30, so wurde dadurch erwiesen, daß das Gas unverbrannte Theile enthielt, und das Resultat des Versuches war nicht zuverlässig; war aber der Verlust im Volum 30 oder höchst nahe 30 Theile, so war die organische Substanz vollständig verbrannt. Sie nahmen dann, nachdem dies ausgemacht war, eine andere Portion vom Gase in eine graduirte Röhre, und ließen über Quecksilber etwas starke Lauge von kohlensaurem Kali hinzu, welche das Kohlensäuregas absorbirte, worauf die Menge des zurückbleibenden Gases gemessen wurde. Auf diese Weise fanden sie das relative Gewicht des Kohlensäuregases und Sauerstoffgases, und da die Größe des ganzen Gasvolums bekannt war, so wurde dieses in Gewicht verwandelt. Was das Kohlensäuregas und Sauerstoffgas zusammen weniger wogen, als das Gewicht des organischen Oxydes, zu dem Gewichte des aus dem Salze entwickelten Sauerstoffs gelegt, betrug, wurde für Wasser genommen, dessen Wasserstoffgehalt daraus berechnet wurde, und anzeigte, wie viel Sauerstoff das or-

160 Thénard's u. Gay-Lussac's Methode.

ganische Oxyd enthielt. Der Kohlenstoff wurde nach dem Gewichte der Kohlensäure bestimmt. Wurde dann das Gewicht des erhaltenen Sauerstoffgases zu dem Gewichte des Sauerstoffs im Kohlensäuregase und zu dem Gewichte des Sauerstoffs im Wasser gelegt, so wurde die Sauerstoffmenge erhalten, welche das Salz und das organische Oxyd zusammen enthielten. Aber der Sauerstoff im chlor-sauren Kali war zuvor durch Versuche gefunden, und wurde nun von dieser Quantität abgezogen; was übrig blieb, war der Sauerstoffgehalt in der analysirten Substanz. Wurde eine Verbindung analysirt, die eine solche Basis enthielt, welche Kohlensäure zurückhalten kann, wie z. B. Baryterde oder Kalkerde, so wurde die von der Base zurückgehaltene Kohlensäure mit in Rechnung gebracht. Diese analytische Methode, welche sich auf eine heftige und augenblickliche Verbrennung gründet, ist von Thénard und Gay-Lussac zur Untersuchung der Zusammensetzung von 19 organischen Stoffen angewendet worden, nämlich von 15 Pflanzenstoffen: Essigsäure, Oxalsäure, Weinsäure, Citronensäure, Schleimsäure, Zucker, Milchsücker, Gummi, Stärke, Eichenholz, Buchenholz, Baumöl, Wachs, Copal und Terpenthinharz; und von 4 thierischen Stoffen: Faserstoff, Eiweiß, Käse und Leim; und aus den nachher nach einer anderen Methode, mit einigen von diesen Substanzen angestellten Analysen hat man gefunden, daß jene analytische Methode richtige Resultate gebe wenn sie mit Beobachtung der erforderlichen Vorsichtsmaßregeln angewendet wird.

Die Uebelstände, denen sie unterworfen ist, sind, außer der Schwierigkeit, einen absolut luftdichten Hahn zu bekommen, daß selbst ein großer Ueberschuß von chlor-saurem Kali nicht jeden Theil des organischen Körpers verbrennt, weil das Entzündete noch unzureichend erhitzte Theile auf kältere Stellen der Röhre wirft. Thénard und Gay-Lussac schreiben daher vor, die Glasröhre so heiß zu halten, wie es, ohne Erweichung und Ausblasung derselben durch die Gasentwicklung, möglich ist. Ferner muß der Wassergehalt aus dem Verluste be-recht-

Langsame u. progress. Verbr. mit chlors. Kali. 161

rechnet werden, und folglich fallen alle Fehler, die bei Ausführung des Versuches vorkommen können, auf den Wasserstoff; aber der Wasserstoff ist derjenige von den Bestandtheilen des organischen Körpers, welcher in der geringsten Menge in seine Zusammensetzung eingeht, sein Atom ist, im Vergleich mit dem der anderen, so leicht, daß ein sehr geringer Fehler leicht ein oder einige Atome Wasserstoff zu viel oder zu wenig giebt. Es ist daher für jede Analyse organischer Oxyde von der äußersten Wichtigkeit, mit vollkommener Genauigkeit die Menge des durch die Verbrennung sich bildenden Wassers bestimmen zu können, weil ohne diesen Umstand keine sichere Berechnung der relativen Atome der Elemente möglich ist.

Ich habe mich einer anderen Vorrichtung bedient, bei der ich hauptsächlich beabsichtigte: 1) eine langsame und vollkommene Verbrennung der organischen Substanz, und 2) eine sichere Bestimmung des Gewichtes von dem durch die Verbrennung erhaltenen Wasser.

Diesen Endzweck erreicht man, wenn das organische Oxyd allein, oder mit einer Base, am liebsten Bleioxyd verbunden, in wohl getrocknetem Zustande sehr genau mit dem oxydirenden Körper vermischt, und in eine lange, an dem einen Ende verschlossene Röhre gelegt wird. Diese Röhre wird dann nach und nach, von dem offenen Ende an gegen das verschlossene zu, erhitzt. Bei meinen ersten Versuchen wandte ich chloresaurer Kali als oxydirendem Körper an, und sie wurden so bewerkstelligt, daß der zur Untersuchung bestimmte Körper sehr genau in einer bis zu $+100^{\circ}$ oder darüber erhitzten Reibschale mit 5 bis 6 Th. trockenem chloresauren Kali, und hierauf mit dem 10 bis 12fachen, vom Gewichte des Gemenges, kurz zuvor geschmolzenem Kochsalze vermischt wurde. Diese Mischung muß sehr gut gemacht werden, und die Reibschale während des Mengens beständig sehr heiß sein. Man hat darauf zu sehen, daß man keine schwitzende Hände habe, und daß nicht die ausgeathmete feuchte Luft auf die Masse komme, wodurch sie leicht

hygroscopische Feuchtigkeit anziehen könnte. Sie wird nun in die zur Bewerkstelligung der Verbrennung bestimmte Röhre gebracht. Das zuletzt in der Reibschale bleibende wird mit Hülfe von gröberem Kochsalzpulver, womit es vermenzt und in die Röhre gebracht wird, herausgenommen.

Diese Röhre, Fig. 1., hat $\frac{1}{2}$ Zoll inneren Durchmesser, und ist an dem einen Ende zugeschmolzen. Auf den Boden derselben legt man ein Gemenge von Kochsalz und etwas chlorsaurem Kali, frei von Zusatz von dem zu analysirenden Körper. Darüber legt man die zusammengeriebene Masse, deren letztes Viertel mit mehr Kochsalz vermischt wird, um im Anfange die Heftigkeit der Operation leiten zu können, und zu oberst legt man etwas Kochsalz, das mit ein wenig chlorsaurem Kali vermenzt ist. Dadurch, daß man sowohl vor als hinter die brennbare Masse chlorsaures Kali legt, wird bezweckt, daß die Operation mit Sauerstoffgas-Entwicklung anfängt, so daß wenn die Hitze auf den brennbaren Körper zu wirken anfängt, er schon in einer Atmosphäre von Sauerstoffgas liegt; und ist die Verbrennung beendet, so würde ein Theil Kohlensäuregas und Wassergas in der Verbrennungsröhre, der Vorlage und der Leitungsröhre zurückbleiben, wenn es nicht durch das sich zuletzt entwickelnde reine Sauerstoffgas ausgetrieben werden würde. Nachdem die Masse in die Röhre gebracht ist, wird diese vor der Lampe ausgezogen, so daß sie die Gestalt von Fig. 2. erhält.

Die Röhre muß dabei so lang sein, daß man sie beim Ausziehen am offenen Ende halten kann, um das Eindringen von Wasserdämpfen durch die zu große Nähe der Flamme an der Mündung vermeiden zu können. Das ausgezogene Ende der Röhre wird in ein kleines, vor der Lampe ausgeblasenes Gefäß geführt, das die Gestalt von Fig. 3. hat, und so klein wie möglich sein muß. Die Verbindung macht man mittelst elastischer Röhren von Gauthschuck (auf die, bei diesem Artikel im 4. Theile angeführte Weise). Dieses Gefäß hat zum Endzweck, das

sich bei der Verbrennung bildende Wasser aufzusammeln; und damit nichts davon durch die Gase weggeführt werde, leitet man diese aus der kleinen Vorlage durch eine Röhre, welche mit Chlorcalcium gefüllt ist, das nach dem Schmelzen zu gröblichem Pulver gestossen und wovon nachher aller feinere Staub abgeseibt worden ist. Um das Herausfallen des Kalksalzes zu verhindern, sind die Mündungen der Röhre mit Korken verschlossen, durch welche kleinere Röhren gehen, deren inwendige Mündung mit Cambrick überzogen ist. Das eine Ende dieser Röhre ist mittelst einer biegsamen Röhre an die Vorlage, und das andere Ende an eine feine so gebogene Leitungsröhre befestigt, daß sie das Gas in einen Quecksilber-Apparat leitet, wie es Fig. 6. zeigt.

Der Druck des Quecksilbers im Apparate auf die sich entwickelnden Gase bewirkt, daß sich das Glas der Verbrennungsröhre, wenn es durch die Hitze erweicht, ausdehnt, und bisweilen entsteht ein Loch darin. Um diesem zuvorzukommen, wird die Röhre sehr dicht mit dünnem Eisenblech umgeben, und mit einem Stahldrath umwunden. Die auf diese Weise vorgerichtete Röhre wird in einem länglichen Ofen erhitzt, welcher zu diesem Behufe aus Mauersteinen aufgestellt sein kann. Man fängt mit dem Erhitzen am vorderen Ende an, und schützt die hinteren Theile durch einen beweglichen Schirm, F. Fig. 6., durch welchen die Röhre geht. Dieser Schirm wird, in dem Maafse, als die Verbrennung fort geht, allmählich nach hinten zu gerückt, während die vorderen Theile, wo die Verbrennung beendigt ist, beständig gelinde glühend erhalten werden.

Die Menge des Körpers, welcher verbrannt werden soll, darf nicht zu groß sein, wenn man alles dabei sich entwickelnde Gas will auffangen können; ein Drittel, höchstens ein halber Gramm kann hierzu genommen werden. Untersucht man Pflanzenstoffe, welche keinen Stickstoff enthalten, so braucht man bloß die Menge des Wassers und des Kohlensäuregases zu bestimmen. Die des Wassers erhält man durch unmittelbare Wägung; da aber

hierbei immer etwas in der ausgezogenen Spitze der Verbrennungsröhre sitzen bleibt, so wird diese durch einen Feilstrich (bei B. Fig. 6.) abgeschnitten und mit der Vorlage und der Röhre mit Chlorcalcium gewogen, worauf man sie herausnimmt, trocknet, wiegt und ihr Gewicht von dem der Vorlage abzieht. Was dieses nun mehr beträgt, als vor Anfang des Versuches, ist erhaltenes Wasser.

Die Menge des Gases kann entweder dem Gewichte oder dem Volum nach bestimmt werden. Im ersteren Falle sammelt man es in einer größeren Glocke auf, die alles während des Versuches sich entwickelnde Gas aufnehmen kann. In diese läßt man dann ein kleines Gefäß von Glas ein, welches Kalihydrat enthält, und dessen Oeffnung mit Handschuhleder zugebunden ist. Das Gefäß wird vor dem Versuche mit dem darin enthaltenen Kalihydrat gewogen, indem man es mit einem Kork verschlossen hat, den man nachher beim Zubinden mit dem Leder abnimmt, worauf man es in die Glocke läßt, um darin das Kohlensäuregas einzusaugen. Ich pflegte gewöhnlich an der unteren Seite dieses Gefäßes ein Ohr mit einem daran befestigten feinen, geglühten Stahldrath zu haben, um dasselbe nach Belieben wieder aus der Glocke herausziehen zu können. Leinene oder seidene Fäden eignen sich hierzu nicht, weil sie wie umgekehrte Heber wirken, und Luft durch ihre Poren einlassen. Nachdem das Quecksilber in der Glocke zu steigen aufgehört hat, läßt man das Kaliglas noch 12 Stunden darin, worauf man es herausnimmt, mit dem vorher angewandten Kork verschließt, von anhängendem Quecksilber wohl reinigt, und wiegt. Was es nun mehr als vorher wiegt, ist vom Kali aufgenommene Kohlensäure. Soll aber das Gas dem Maasse nach bestimmt werden, so muß man sich zum Auffangen desselben schmaler, cylindrischer Gefäße bedienen, die um so besser hierzu sind, je geringer ihr Durchmesser ist. Dieselben müssen mit großer Genauigkeit graduirt sein, und es muß eine solche Anzahl davon in Bereitschaft stehen, daß sie das sich entwickelnde Gas fassen können; dann bestimmt man die Ba-

rometerhöhe, den Thermometerstand im Zimmer, und richtet das Glas so, daß das Quecksilber inwendig und auswendig gleich hoch steht. Darauf läßt man Stücke von Kalihydrat hinein, die an einem biegsamen Stahldrathe befestigt sind, und von denen man das Kohlensäuregas aufsaugen läßt; dann zieht man das Kali heraus und mißt das übrigbleibende Gas, nach den weiter unten zu gebenden Regeln. Das Verschwundene ist Kohlensäuregas, dessen Volum dann dem Gewichte nach berechnet wird. Bei dieser letzteren Methode sind mehr Quellen zu Fehlern, als bei der ersteren, weshalb ich immer diese vorgezogen habe, wenn die analysirte Substanz keinen Stickstoff enthielt.

Analysirt man einen mit Bleioxyd verbundenen Stoff, so zersetzt das übrigbleibende Bleioxyd eine kleine Quantität Kochsalz, und es bildet sich Natron; dieses Natron sättigt $\frac{1}{2}$ so viel Säure als das Bleioxyd. Es verbindet sich mit Kohlensäure vom Kohlenstoff der verbrannten Substanz, und diese Kohlensäure muß nach der Menge des Bleioxyds berechnet und zu der in Gasform erhaltenen gelegt werden.

Bei dieser Operationsmethode hat man den Vortheil, mit großer Sicherheit die Menge des Wasserstoffs bestimmen zu können, und wenn dabei ein Fehler begangen wird, so liegt er nur darin, daß die Materialien nicht vollkommen trocken waren, was der Fehler des Operators und nicht der der Methode ist.

Diejenigen, welche nach mir ähnliche Analysen anstellten, haben die von mir gebrauchte Methode gewählt, eine langsame Verbrennung durch Einlegung der Masse in lange Glasröhren, die nach und nach von dem vorderen Ende nach dem hinteren zu erhitzt werden, zu bewirken; sie legten aber nicht dasselbe Gewicht auf das Auffangen des Wassers wie ich, und sie wandten dabei Korke und Lutum, statt der von mir gebrauchten biegsamen Röhren, an, wodurch auch ein Theil Feuchtigkeit aus dem Lutum in den Apparat verdunstet, und das Resultat einen geringeren Grad von Zuverlässigkeit erlangt.

Chlorsaures Kali kann nicht mit Vortheil zur Untersuchung stickstoffhaltiger Substanzen angewendet werden, weil, wenn Sauerstoff im Ueberschuß vorhanden ist, Salpetersäure gebildet wird, die Verbrennung aber unvollständig wird, wenn es nur in der zur Oxydation des Kohlenstoffs und Wasserstoffs hinreichenden Menge vorhanden ist. Diesem Uebelstande hat Gay-Lussac, durch Anwendung von schwarzem Kupferoxyd, als oxydirendem Körper, abgeholfen, dessen Vorzug zu dieser Art von Analysen, auch bei Abwesenheit des Stickstoffs, so gut durch die Erfahrung entschieden ist, daß man selten oder nie mehr in den Fall kommen wird, hierzu chlorsaures Kali anzuwenden. Mehrere Versuche sind damit angestellt worden von Bérard, Porret, Prout, Thomson, und auch ich habe Gelegenheit gehabt, dasselbe mit vollkommenem Erfolge anzuwenden. Gay-Lussac schrieb vor, man solle, im Fall sich etwas Salpetersäure aus Stickstoffgas haltenden Materien bilden werde, metallisches Kupfer, entweder als Feilspähne oder als kleine Spirale von Kupferdrath, vor das Oxyd in die Röhre legen, und das Metall während des Versuches beständig glühend erhalten, wodurch dann die Oxyde von Stickstoff reducirt werden würden; aber man hat gefunden, daß diese Vorsicht überflüssig sei. Man braucht nur reines Kupferoxyd vor das Gemenge in der Röhre zu legen, um bei dem Durchgange durch das glühende Oxyd vollständig Alles zu oxydiren, was etwa noch unvollkommen verbrannt sein könnte. Richtet man seinen Apparat nicht so vor, daß das gebildete Wasser gewogen werden kann, so berechnet man seine Quantität dadurch, daß man die Röhre vor und nach dem Glühen wiegt. Der Gewichtsverlust ist gleich dem Gewichte des verbrannten organischen Körpers, zusammengelegt mit dem vom Kupferoxyd aufgenommenen Sauerstoff. Berechnet man das Gewicht des erhaltenen Gases, so ist der Unterschied zwischen diesem und dem Verluste der Röhre Wasser. Indessen kann die Röhre, da zu diesem Versuche Glühhitze, und, wenn sie nicht ausgeblasen werden soll, Umgebung der Röhre mit

einem Metallblech erforderlich ist, nach dem Glühen wohl schwerlich mit Genauigkeit gewogen werden; und würde man, um das Metallblech entbehren zu können, eine schwächere Hitze geben, so wird man in vielen Fällen nur eine unvollständige Verbrennung bewirken. Bischof hat vorgeschlagen, die Glasröhre mit einer Röhre von Platinblech zu umgeben, das durch die Hitze nicht oxydirt wird, und folglich die Wägung der geglühten Röhre nach beendigtem Versuche zuläßt. Diefes ist gewifs sehr zweckmäfsig, wird aber kostbar, weil das Blech, sowohl durch das Reinigen von angeschmolzenem Glas, als durch das Auf- und Zusammenrollen, bald verdorben wird. — Prout hat den Vorschlag gemacht, man solle, um den vom Kupfer aufgenommenen Sauerstoff zu bestimmen, den Rückstand in der Röhre mit Schwefelsäure behandeln, welche eine der Menge des Sauerstoffs entsprechende Quantität metallischen Kupfers unauflöst zurückläßt. Diefes findet aber nur dann Anwendung, wenn diese Analysen mit organischen Oxyden vorgenommen werden, die nicht an Bleioxyd, Baryterde oder Kalkerde gebunden sind.

Prout hat einen eigenen Apparat zur Verbrennung mit Kupferoxyd erfunden, bei dem die lange Röhre mittelst einer Argandschen, Spiritus brennenden Lampe erhitzt wird, durch deren inneren Kanal die Röhre geleitet ist. Die Röhre ist befestigt und die Lampe beweglich, so dafs sie von dem oberen Ende der Röhre nach dem unteren derselben geführt werden kann, und die Verbrennung auf diese Art allmählich vor sich geht. Diese Idee ist sehr sinnreich, hat aber Schwierigkeiten, die darin bestehen, dafs sich gern Wasser in dem oberen abgekühlten Theile der Röhre condensirt, dann leicht herunterfließt und das Glas sprengen kann, und dafs die Menge des Wassers nicht mit Genauigkeit bestimmt werden kann; ein Umstand, der bei diesen Analysen wesentlich ist. Ich halte es daher für überflüssig, Prout's Verbrennungs-Instrument näher zu beschreiben.

Zu diesen Versuchen kann man das Kupferoxyd auf mehrfache Weise erhalten. Die am wenigsten kostbare

ist, krystallisirten, reinen Kupfervitriol in Wasser aufzulösen und ihn mit kohlsaurem Kali zu fällen, wobei der Niederschlag mit Alkali im Ueberschuß gekocht werden muß, um alles basische schwefelsaure Salz, das anfangs niederfällt, zu zersetzen. Der Niederschlag wird wohl ausgewaschen, getrocknet und geglüht. — Kupferoxyd durch Glühen von dünn ausgewalztem Kupfer zu bereiten, indem man dasselbe nach mehrstündigem Glühen im Muffelofen herausnimmt und biegt, so daß das Oxyd abfällt, geht etwas langsam, ist aber gewiß, wenn es sich um Bereitung größerer Quantitäten auf einmal handelt, am wenigsten theuer. Die abgefallenen Oxydkrusten müssen gepulvert und von Neuem, unter Umrühren, im Muffelofen geglüht werden, bis das Oxyd völlig schwarz wird. — Ferner kann man Kupfer in Salpetersäure auflösen, zur Trockne abdampfen und glühen. Eine jede Bereitungsart ertheilt dem Oxyde gewisse Eigenheiten. Das durch Alkali gefällte ist schon feines Pulver. Es nimmt einen großen Raum ein, und vermischt sich folglich leichter mit der organischen Substanz. Das durch Glühen erhaltene ist viel dichter, man kann davon eine weit größere Menge in die Röhre bringen, als vom vorhergehenden. Es eignet sich vorzüglich gut für solche Stoffe, die wenig Sauerstoff enthalten, und wo die brennbaren Theilchen dicht mit vielen Theilchen des oxydirenden Körpers umgeben werden müssen. Das durch Salpetersäure erhaltene steht hinsichtlich der Dichtigkeit in der Mitte zwischen den beiden anderen. Bei Anwendung desselben fand ich bisweilen Spuren von Salpetersäure darin, die sich auf die Art offenbart, daß das Quecksilber, worin man das Gas auffängt, auf der Stelle, wo die Gasblasen aufsteigen, ein gelindes schwarzes Anlaufen zeigt. Dieß findet statt, wenn die Salpetersäure ein Salz mit einem Alkali oder einer Erde zur Base enthielt, und kann durch Anwendung vollkommen reiner Materialien vermieden werden. — Das schon einmal gebrauchte Kupferoxyd kann nicht, ohne vorhergegangene höhere Oxydation, ein zweites Mal angewandt werden, denn es wird ein Gemenge

aus Oxyd und Oxydul, das dann brennbare Stoffe unvollständiger oxydirt. Man erhält es am besten wieder durch Auflösen in Schwefelsäure und Fällen mit Alkali. Enthält das angewandte Kupferoxyd die geringste Spur von Schwefelsäure, so erhält man schweflichte Säure unter den Gasen.

Das Kupferoxyd hat große Neigung, hygroskopische Feuchtigkeit aufzunehmen, mehr als die meisten anderen Körper. Sie ist um so größer, je lockerer das Oxyd ist, und folglich am geringsten bei dem durch Glühen bereiteten Oxyde. Deshalb muß es immer frisch vor dem Versuche geblüht, noch heiß abgewogen und mit dem organischen Stoff in einer sehr heißen Reibschale vermischt werden. Auf diese Art kann man die Feuchtigkeit vermeiden, von der man gleichwohl immer eine Spur bekommt. Ich bin so nahe gekommen, daß ich bei Anwendung von wasserstofffreien Materien bei dem Versuche nicht mehr als 1 Milligramm Feuchtigkeit bekam, wenn 30 bis 40 Grm. Kupferoxyd angewandt wurden. Die Beobachtung dieses Umstandes ist von der äußersten Wichtigkeit. Ure hat vorgeschlagen, gewogenes Kupferoxyd sich mit Feuchtigkeit in der Luft sättigen zu lassen, es wieder zu wiegen und beim Versuche dann diese Feuchtigkeit abzuziehen. Aber dieser Ausweg ist unzureichend, weil die Feuchtigkeit des Oxyds mit dem Hygrometerstande veränderlich ist. Gay-Lussac pumpt die Luft aus der Röhre, in welcher das Gemenge schon abgewogen ist, aus, und läßt sie dann sich voll Luft saugen, die durch eine mit Chlorcalcium gefüllte Röhre geleitet wird. Dies wird mehrere Male wiederholt, während die Röhre mit kochendem Wasser umgeben ist, und hierdurch wird alle Feuchtigkeit ausgetrieben. Dies scheint auch erreicht werden zu können, wenn man, statt des Luftwechsels, concentrirte Schwefelsäure in das Vacuum stellt, mit welchem die Röhre in Gemeinschaft steht.

Nach Beendigung der Operation bleibt bei diesen Versuchen immer eine kleine Portion Gas in den Quecksilberapparate führenden Leitungsröhre,

der Verbrennungsröhre selbst, zurück. Um diesen unvermeidlichen Fehler so klein wie möglich zu machen, muß die Verbrennungsröhre ganz nahe da, wo das reine Kupferoxyd endigt, ausgezogen werden, welches eine wenigstens $1\frac{1}{2}$ Zoll lange Lage ausmachen muß, damit beim Ausziehen die gemengte Masse nicht bis zur anfangenden Zersetzung erhitzt werde. Die zur Aufnahme des Wassers bestimmte Vorlage muß, so wie die Röhre mit Chlorcalcium, sehr klein sein. Hierzu nimmt man geschmolzenes und zuvor mit Chlorwasserstoffsäure übersättigtes Chlorcalcium, das man als grobes Pulver in die Röhre füllt. Die in die Quecksilberwanne führende Gasleitungsröhre muß eine gröbere Thermometerröhre sein; bei sorgfältiger Beobachtung alles dieses, wird der Verlust an rückständigem Gas sehr unbedeutend.

Auf folgende Art kann man ihn gleichwohl gänzlich vermeiden. Man vermischt einige Centigramm geschmolzenes chloresures Kali mit 3 bis 4 Mal so viel Kupferoxyd, und legt dieses Gemenge auf den Boden der Röhre; auf dasselbe legt man ein Zoll hoch reines Kupferoxyd, hierauf das Gemenge und zuletzt wieder $1\frac{1}{2}$ Zoll Kupferoxyd. Kommt man nun im Verlaufe der Operation endlich zu der Periode, wo die Gasentwicklung fast aufgehört hat, so setzt man eine andere Glocke über die Gasentwicklungs-Röhre, und indem die Hitze allmählich nach hinten zu geleitet wird, fängt das auf dem Boden liegende Salz an, Sauerstoffgas zu geben, das die vorstehenden Gase austreibt, so daß beim Aufhören der Gasentwicklung nur Sauerstoffgas im Apparate bleibt. Hat man eine nicht stickstoffhaltige Substanz in Untersuchung, so läßt man alles Gas sich in einer und derselben Glocke ansammeln, und bestimmt dessen Gehalt an Kohlensäure, je nach den Umständen, dem Gewichte oder dem Volum nach. Das nicht absorbirte ist dann ein Gemenge von Sauerstoffgas und atmosphärischer Luft. Hat man aber eine stickstoffhaltige Materie, so muß man in der Mitte der Operation, oder wenn man glaubt, daß das übergehende Gas von der, im Apparate zu Anfange des Versuches vorhanden gewesenenen, atmosphärischen Luft frei

sei, eine besondere Portion vom Gase auffangen, wovon man die relativen Volume des Stickgases und Kohlensäuregases ausmittelt. Bestimmt man dann in den übrigen Gasportionen nur die Menge der Kohlensäure, so berechnet man die des Stickstoffs nach dem gefundenen Verhältnisse, denn dieß muß in allen Gasportionen proportional sein. Pelletier schlägt vor, die Masse in der Verbrennungsröhre in zwei gleiche Portionen zu theilen, dadurch daß man zwischen beiden Glaspulver eine solche Strecke lang legt, daß die eine Portion abgebrannt werden kann, ohne daß eine Zersetzung der anderen anfängt. Von der ersten Portion fängt man nur das Wasser auf, und läßt das Gas weggehen. Von der letzten dagegen fängt man auch das Gas auf. Der Ableitungs-Apparat enthält dann dasselbe und gleichviel Gas, als zu Ende des Versuches darin zurückbleibt, und man hat keine andere atmosphärische Luft eingemengt, als die, welche die Zwischenräume des gemengten Pulvers in der Röhre erfüllte. Da es aber bei diesen Versuchen von der größten Wichtigkeit ist, bei der Analyse stickstoffhaltiger Materien das Volum des entwickelten Stickgases, relativ zu dem des Kohlensäuregases, mit der äußersten Genauigkeit bestimmen zu können, und folglich auch die geringste Einmischung von Luft vermieden werden muß, so hat Gay-Lussac folgende Methode in Anwendung gebracht. Die Röhre, durch welche man das Gas in den Quecksilberapparat leitet, wird von einer solchen Länge (z. B. 27 Dec. Zoll) genommen, daß, wenn der Apparat luftleer gemacht wird, das Quecksilber darin aus der Wanne in die Höhe steigt, ohne bis an die Entwicklungsröhre zu gelangen. An dem oberen Ende dieser Röhre hat man eine Seitenröhre angeschmolzen, welche, an ein Ventil befestigt, mit einer Luftpumpe in Verbindung gesetzt werden kann, worauf man die Luft behutsam aus dem Apparate auspumpt, und das Ventil abschraubt *). Die Operation beginnt dann im luftleeren

*) Dieser wichtige Beitrag zu den Methoden für die Analyse organischer Stoffe ist sehr leicht zu bewerkstelligen. Ich habe ihn

Raume, und es kann sich in der Glocke kein anderes Gas ansammeln, als dasjenige, welches von der Probe herrührt. Man bekommt zwar nun einen kleinen Verlust durch das nach beendigtem Versuche in der Röhre zurückbleibende; dieß wird aber durch einen anderen Versuch, der so eingerichtet ist, daß der ganze Gehalt an Kohlensäuregas gemessen werden kann, corrigirt, aus welchem dann, wenn man die relativen Quantitäten des Kohlensäuregases und Stickgases sicher kennt, die ganze des Stickgas-Gehaltes berechnet wird.

Th. de Saussure hat zur Verbrennung organischer Stoffe eine andere Methode befolgt. Er vermischt die zu analysirende Substanz sehr genau mit dem 50fachen ihres Gewichts sehr reinem und zuvor geglühtem Quarzsand, und wiegt dann davon eine Menge ab, die 5 bis 6 Centigramm des zu analysirenden Stoffes enthält. Diese Masse wird in eine 6 Zoll lange und 1 Zoll weite Glasröhre, welche am einen Ende zugeschmolzen und in der Mitte im rechten Winkel gebogen ist, gebracht. An dem offenen Ende befindet sich ein luftdichter Hahn von Eisen. Nach Einbringung der Substanz in die Röhre, läßt er sie bis auf den Boden fallen, pumpt die Luft dann aus und füllt die Röhre mit Sauerstoffgas, was noch einmal wiederholt wird, um alle atmosphär. Luft herauszubringen. Nach genauer Beobachtung des Barometer- und Thermometerstandes, wird der Hahn zgedreht und die Röhre so gestellt, daß

mit Erfolg auf folgende Art ausgeführt. Die am oberen Schenkel der langen Ableitungsröhre angebrachte Seitenröhre wird in der Mitte, in einiger Entfernung von ersterer, zu einem sehr geringen Durchmesser ausgezogen. Das freie Ende wird mit einer gut angebundnen Cautschuckröhre versehen, die mit ihrer andern Oeffnung an eine, vom Recipienten der Luftpumpe kommende Röhre gebunden wird. Hierauf wird die Luft ausgepumpt, und sobald man gesehen hat, daß der Apparat dicht hält, und das Quecksilber innerhalb $\frac{1}{2}$ Stunde seinen Standpunkt in der langen Röhre nicht verändert hat, wird das ausgezogene Stück der Seitenröhre mittelst der Flamme einer Spirituslampe zugeschmolzen und abgezogen, worauf die Luftpumpe hinweggenommen werden kann, und man sich nun nicht mehr auf ein vielleicht unsicheres Ventil zu verlassen braucht, oder durch einen unnöthig zusammengesetzten Apparat während des Glühens der Röhre gehindert ist.

der unten zugeschmolzene Schenkel horizontal liegt; dann wird das Pulver durch gelindes Schütteln in eine möglichst dünne Lage ausgebreitet. Hierauf wird es mittelst einer Spirituslampe von Punkt zu Punkt erhitzt, so daß der organische Stoff im Sauerstoffgase verbrennt. Wird etwas halb verbranntes an kälteren Punkten der Röhre condensirt, so werden diese wiederum erhitzt, bis alles verbrannt ist. Nach dem Erkalten der Röhre, wird sie unter Quecksilber geöffnet und das Volum des darin befindlichen Gases bestimmt; hierauf wird es in ein schickliches Gefäß gelassen und analysirt. Die Röhre wird hierauf mit 30 Gramm Wasser ausgespült, und dieses dann über ungelöschtem Kalk destillirt, um zu finden, ob es Ammoniak enthalte.

Diese analytische Methode ist indessen nicht ganz so sicher wie die vorhergehenden, sowohl wegen der Schwierigkeit, Alles vollständig zu verbrennen, als auch deshalb, weil die Quantität von gebildetem Wasser nur durch Rechnung aus dem Verlust bestimmt wird. Wenn man bisweilen eine Substanz zu analysiren hat, die aus Kohlenstoff und Wasserstoff ohne Sauerstoff besteht, so kann diese Methode große Genauigkeit geben, weil das beim Versuche verschwindende Gas doppelt so viel Wasserstoffgas entspricht, und wird dann das Volum des Kohlensäuregases bestimmt, so erhält man die relativen Volume der beiden Bestandtheile, wobei man nicht einmal den zu analysirenden Stoff zu wiegen braucht. Dagegen muß man sich bei der Volum-Bestimmung der Gase erinnern, daß sie sich im höchsten Grade von Feuchtigkeit befinden, und muß einen Abzug für das Wassergas machen, nach seiner Expansion für die Temperatur, wobei das Gas gemessen wird. Auch hat de Saussure diesen Apparat meistens zur Analyse flüchtiger und fetter Oele, in denen sich theils kein, theils sehr wenig Sauerstoff findet, angewendet.

Um bei der von mir oben beschriebenen analytischen Methode ein einigermaßen zuverlässiges] zu erlangen, ist keine besonders große Gen

174 Analysen von Stoffen, deren Sättigungscapac.

Operators erforderlich. Dies hat viele Chemiker unserer Zeit veranlaßt, eine Menge Analysen organischer Stoffe vorzunehmen und bekannt zu machen, deren Zuverlässigkeit im Uebrigen durch keine Controlle erwiesen werden. Es giebt kein analytisches Resultat, das nicht einer Formel entsprechen könnte, zumal wenn man die Anzahl der Atome multiplicirt. Gerade deshalb glaube ich es hier von Neuem der Aufmerksamkeit meiner Leser einschärfen zu müssen, daß die Hauptsache bei diesen Analysen ist, daß man den Stoff, welchen man untersucht, genau von allen anderen organischen Stoffen trenne, und daß man hernach seine Sättigungscapacität bestimme. Ein jedes aufgeführte analytische Resultat, das nicht von genauen Untersuchungen über die Reinheit des Stoffes und über Bestimmung seiner Sättigungscapacität begleitet ist, verdient kein Vertrauen, und hat es dessen ungeachtet der Untersuchende versucht, nach seinem Resultate die relative Menge der Atome zu berechnen, so beweist dies, daß er nicht eingesehen hat, was zur Gewinnung eines zuverlässigen Resultates erfordert wird. Es steht der Wissenschaft eine Periode bevor, in welcher Chemiker mit beschränkten Kräften, aber mit lebhafter Begierde nach Entdeckungen und Berühmtheit, die chemischen Proportionen mißbrauchen, die Resultate von schlecht angestellten Analysen nach wahrscheinlichen Formeln einrichten, und, besonders die organische Chemie, mit falschen Angaben anfüllen werden. Früher oder später wird man indessen, allgemeiner als jetzt, die Schwierigkeit dieser beim ersten Anblick so leicht aussehenden Untersuchungen einsehen, und dieselbe Begierde nach Berühmtheit, welche jetzt unrichtige Resultate erzeugt, wird dann, durch die Furcht vor Offenbarung leicht zu vermeidender Mißgriffe, von Arbeiten abhalten, deren richtiger Ausführung man sich nicht gewachsen zu sein fühlt.

Die organischen Körper zerfallen in zwei wohl unterschiedene Klassen, in Pflanzen und Thiere, welche

ihren am wenigsten ausgebildeten Individuen allmählich von der einen Klasse, oder, wie man es ehemals nante, von dem einen Reiche zu dem anderen übergeben. Ich werde das Hauptsächlichste von dem, was uns die Chemie von einer jeden derselben für sich gelehrt hat, anführen, und werde dabei zuerst von den Pflanzen anfangen.

Pflanzen-Chemie.

Die Kenntniß von dem Baue der lebenden Körper, von dem Zusammenhange und den Verrichtungen ihrer verschieden beschaffenen Theile, wird Physiologie genannt. Diese Wissenschaft begreift also das Mechanische im Bau und das Chemische in der Zusammensetzung der Theile und in den Prozessen. Unglücklicherweise sind uns indessen die letzteren so verschlossen, daß uns die Chemie nur gar zu wenig über das zu sagen hat, was im lebenden Körper vorgeht. Es ist einleuchtend, daß sich diese Kenntniß nothwendig auf eine vorhergehende Bekanntschaft mit dem Baue gründen müsse. Je mehr sich die Lebenskraft solcher Prozesse bedient, die denen der unorganischen Natur gleich kommen, und je weniger sie sich durch Thätigkeit und Selbstständigkeit ausdrückt, um so verwickelter, undeutlicher ist der Bau, und um so schwieriger sind die Zwecke der einzelnen Theile zu erforschen. Deshalb ist auch noch, aller Bemühungen ungeachtet, unser Wissen von der Anatomie der Pflanzen in seiner Kindheit, und ihre Physiologie weit hinter der der Thiere, von der wir wiederum am meisten bei den ausgebildetsten Thierklassen wissen. Bei diesen hat sich die Lebenskraft in zwei Mittelpunkten, im Gehirn und im Herzen, concentrirt, auf welchen das individuelle Leben eines jeden einzelnen Theiles entschieden beruht. Das Aufhören der Gemeinschaft mit denselben vernichtet in wenigen Augenblicken in dem getrennten Theile alles Leben. Diese Wirkung auf Abstand erforderte deutlicher ausgebildete Formen, die leichter zu verfolgen, und hinsichtlich ihres Endzweckes zu bestimmen waren. Bei den Pflanzen dagegen finden sich keine solche Mittelpunkte der Lebenskraft; ein jeder einzelne Theil enthält die Be-

din-

dingungen zur Fortdauer des Lebens, und es war unmöglich, ein eigenes Organ zu finden, das für das Bestehen des Ganzen wesentlicher gewesen wäre, als ein anderes. Die Wurzel, von ihrem Stamme getrennt, treibt einen neuen Stamm; ein abgeschnittener Stamm, ein Ast schlägt oft neue Wurzeln und wird zur neuen Pflanze; ein abgeschnittener Zweig, eine abgebrochene Blume, ein Blatt, fahren eine gewisse Zeit lang zu leben fort, wenn sie Wasser einsaugen können. Wenn auch mehrere von diesen, nach der Trennung von der Hauptpflanze, nicht mehr das produciren, was sie im Zusammenhange mit ihr producirt haben würden, so fährt gleichwohl das Leben fort. Diese allgemeinere Vertheilung der Lebenskraft hat hauptsächlich dazu beigetragen, uns ihren Hauptsitz in den Pflanzen und die mechanischen Prozesse verborgen zu halten, welche einen Theil der Lebenserscheinungen ausmachen. Man hat wohl gefunden, daß sich Flüssigkeiten in den Pflanzen bewegen, daß diese Bewegung in gewissen Jahreszeiten viel lebhafter ist, als in anderen, und daß sie von unten nach oben geht; ob sie aber von oben wieder abwärts gehe, weiß man nicht mit gleicher Gewißheit. Die Pflanzen-Physiologen sind nicht einig über die Bestimmung der inneren, durch Dissection bloßgelegten Theile der Pflanzen, und sogar oft verschiedener Meinung über ihre wahre Form. Wenn bei den Thieren ein jedes einzelne Product ein eigenes Organ für seine Bereitung hat, so finden sich keine solche, oder richtiger gesagt, so hat man noch keine solche in den Pflanzen entdeckt, und es hat den Anschein, als ob Zucker, Gummi, Harz, Stärke, Oele u. a., bisweilen mit einander in der ganzen Pflanze, bisweilen mit einander in einem gewissen Theile derselben, gebildet würden. Mit einem Wort, der Bau der Pflanzen ist so verwickelt, daß die scharfsinnigen, noch in den letzteren Zeiten von ausgezeichneten Männern, wie Knight, Rudolphi, Link, Mirbel u. a., angestellten Forschungen, die Physiologie der Pflanzen nicht in einem solchen Grade aufklären konnten, daß es nur einigermaßen mit dem, w

wir von der Physiologie der Thiere wissen, verglichen werden könnte.

Ich werde nun anführen, was wir von den chemischen Erscheinungen, welche zwischen lebenden Pflanzen und den damit in Berührung kommenden chemischen Reagentien vorgehen, wissen, so weit als diese Erscheinungen bis jetzt ausgemittelt worden sind.

Keimen. (*Germinatio.*)

Linné stellte zuerst als einen, von Ausnahmen freien, Satz auf, daß alles Lebende durch Saamen oder Eier fortgepflanzt werde, daß nichts Organisches entstehe, ohne Product von seines Gleichen zu sein, und daß folglich nichts Neues zu der einmal hervorgebrachten Schaar organischer Körper hinzukommen könne. Die Richtigkeit dieses Satzes steht mit unserer Erfahrung auf eine entscheidende Art in Uebereinstimmung, in dem Grade, als die organischen Körper deutlich ausgebildet sind; aber in denjenigen Klassen der Thiere und Pflanzen, wo die Erscheinungen der Lebenskraft weniger unabhängig sind von den ursprünglichen Eigenschaften der unorganischen Elemente, ist dieß nicht immer gleich deutlich, und man hat vermuthet, daß darin eine Menge ungleicher organischer Körper ohne Saamen, durch Zerstörung anderer organischer Materien, entstehen könnten, wie z. B. Schimmel, Schwamm u. a. m. Diese Production hat den Namen *Generatio aequivoca* bekommen, und es ist gewiß, daß es oft absolut unmöglich ist, einzusehen, wie mehrere von diesen durch andere Individuen von derselben Art hervorgebracht worden seien. Eine Menge organischer Materien, worin das Leben verlöscht ist, erzeugen, mit Wasser übergossen, in diesem kleine, mit Bewegung begabte Körper, die man nur mit stark vergrößerndem Microscope entdecken kann, und die eine Zeit lang sich zu bewegen fortfahren, worauf sie zu sterben scheinen und bisweilen durch andere ersetzt werden. Man hat sie

Infusionsthierchen (*Infusoria*) genannt. Ihre Bildung scheint, was sie auch sein mögen, nicht eine Succession von gleichartigen Individuen sein zu können, so daß es uns wirklich nicht allein unbekannt, sondern auch zweifelhaft ist, ob der Linné'sche Satz auch in den am wenigsten ausgebildeten Klassen organischer Körper wahr sei. Ein scharfsinniger Naturforscher, Hornschuh, hat die Vermuthung angeregt, und sie selbst wahrscheinlich gemacht, daß das *primum germen* von einem dieser weniger ausgebildeten organischen Körper, es möge übrigens ein Saamen oder ein von einem lebenden Individuum abgesonderter Theil sein, sich ungleich nach den verschiedenen Umständen entwickele, die während dessen darauf Einfluß haben, z. B. je nachdem es im Wasser oder in der Luft, und auf Kosten ungleicher Pflanzen- oder Thierstoffe vegetirt, und dabei andere Formen und andere Lebenserscheinungen hervorbringe; so daß in diesen niederen Klassen, wo die Lebenskraft weniger selbstständig wirkt, die ungleiche Materie, auf deren Kosten das Leben unterhalten wird, wesentlich an der Bestimmung der Beschaffenheit des anwachsenden organischen Körpers Theil nehme. Diese Idee hat große Wahrscheinlichkeit für sich, und wird durch eine sehr interessante, zuerst von v. Humboldt beobachtete Thatsache unterstützt, daß nämlich Pflanzen von einer vollkommeneren Ausbildung, welche in Gruben, wo sie nicht vom Lichte getroffen werden, ausschlagen, eine ungefärbte und der Form nach durchaus nicht wieder erkennbare Pflanze hervorbringen, welche, wieder an's Tageslicht gebracht, zerstört wird und stirbt, worauf aber aus derselben, durch den Einfluß des Lichtes, von der Wurzel aus eine neue und richtig beschaffene Pflanze auftreibt.

Aber wir wollen die Entscheidung dieser Wahrscheinlichkeiten einer künftig mehr erweiterten Erfahrung überlassen, und zur Beschreibung der Erscheinungen des Keimens zurückkehren. — Die Saamen der Pflanzen gleichen darin den Eiern der Vögel, daß sie einen kleinen Punkt enthalten, von dem aus alle Erscheinungen von Leben

180 Cicatrix. Radicula n. Plumula. Cotyledon.

beginnen, und der von einer vegetabilischen, mehr oder weniger voluminösen Masse umgeben ist, die zum Material für die Entwicklung des lebenden Punktes bestimmt ist; auch sind sie von einer meistens dreifachen Haut zur Beschützung des Inneren umgeben.

Jeder Saamen hat außerdem ein Zeichen von seinem Zusammenhange mit der Mutterpflanze während ihres Wachsthumms. Dieses Zeichen entspricht dem Nabel der Thiere, und hat daher bald den Namen Umbilicus, bald Cicatrix erhalten. Der lebende Punkt im Saamen hat zwei Theile, der eine bestimmt zur Wurzel, Radicula, der andere zu der über der Erde sich befindenden Pflanze, Plumula. Dieselben können mitunter an grösseren Saamen unterschieden werden, wie z. B. an Bohnen, an denen sich der Bau des Saamens am leichtesten studiren läßt; bisweilen aber sieht man sie erst nach schon begonnener Keimen ordentlich getrennt. Die zur ersten Nahrung der anfangenden Pflanze bestimmte organische Materie ist in mehrere Räume vertheilt, die während des Keimens getrennt werden. Diese nennt man dann Cotyledonen. Die Grasarten haben nur ein Cotyledon, die meisten Pflanzen haben zwei, aber einige, wie z. B. die Gartenkresse, haben bis zu sechs.

Damit die Erscheinungen von Lebensthätigkeit in *primum germen* beginnen, müssen unumgänglich drei Bedingungen erfüllt werden: 1) der Saamen muß Gelegenheit haben, aus einer feuchten Umgebung eine gewisse Menge Wassers einzusaugen; 2) die Temperatur muß über 0° gehen, weil, wo das Wasser in fester Form keine Erscheinungen von Leben möglich sind; sie darf aber auch nicht $+30^{\circ}$ übersteigen, weil das anfangende Leben des Saamens von einer höheren Wärme getödtet wird; und 3) muß der Saamen mit der Luft in Berührung sein. Es schwillt dabei der Saamen allmählich an, die Cotyledonen trennen sich, es bildet sich die Wurzel aus, dringt in die Erde, die Plumula zeigt Spuren der ersten Blätter, strebt nach dem Lichte, treibt die Cotyledonen mit sich über die Erde, welche sich dann in das

Bedingung. d. Keimens. Inner. Verlauf desselb. 181

was wir Herzblätter nennen, verwandeln, und nach der Ausbildung der ordentlichen Blätter, verwelken und abfallen.

Was wir von dem inneren Verlaufe hierbei kennen, ist Folgendes. Der Saamen hat in seiner Bedeckung Kamäle, welche sich durch Haarröhrchenkraft mit Wasser füllen, womit alsdann, durch Mittheilung zu dem Innern, der ganze Saamen aufschwillt. Alle Saamen schwelzen früher oder später im Wasser auf, aber nur Saamen von Wasserpflanzen können, in Wasser gesenkt, keimen. Der Saamen der Landpflanzen darf nur von einem feuchten Körper umgeben sein, welcher nicht verhindert, daß zu gleicher Zeit die Luft damit in Berührung komme. Ihre gewöhnlichste Umgebung ist die Erde, deren Feuchtigkeit der Saamen einsaugt, aber Erde ist keine nothwendige Bedingung zum Keimen; es geht eben so gut vor sich z. B. in feuchtem Löschpapier, auf einem feuchten Brett; kurz die feste Umgebung hat keinen anderen Einfluß auf das Keimen, als daß sie jene drei Hauptbedingungen verhindert oder zuläßt. Alle anderen Ursachen des Fortfahrens desselben liegen in dem Saamen selbst. — Indem das Wasser die organische Materie in den Cotyledonen durchtränkt, wird darin ein eigener chemischer Prozeß erregt, der von Wärme-Entwicklung begleitet ist, und in der Bereitung der Nahrungsmittel für das beginnende Leben zu bestehen scheint. Die Producte von diesem Prozesse sind vermuthlich nach der ungleichen Beschaffenheit der Materien in den Cotyledonen veränderlich. Wir wissen darüber nur etwas bei den stärkehaltigen Saamen der Gräser, wo sich die Stärke allmählich in derselben Art von Zucker verwandelt, in welche wir sie mit Hülfe der Säuren künstlich verwandeln können; und dieser Zucker verschwindet dann während des Keimens und läßt eine gummiartige Substanz zurück, so daß sich die Materie in den Cotyledonen mit jedem Tage verändert, während die Radicula und die Plumula auf ihre Kosten an Größe zunehmen.

Ob das Wasser dabei noch etwas anderes als die Ver-

wandlung der festen Stoffe des Saamens in Auflösl. und dadurch den Zustand, wirksam zu werden, bew. ob sich z. B. die Pflanze mit seinen Bestandtheilen einigt und dieselben, aus der binären Verbindung Wasser, in ternäre Verbindungen versetzt, ist unbek. aber letzteres ist, nach dem, was ich später erw. werde, unwahrscheinlich.

Saamen, welche in atmosphärischer Luft keimern ändern nicht in einem bestimmbar. Grade das χ dieser Luft; dagegen aber verändern sie ihre Besch. heit, ganz auf dieselbe Art, wie sie z. B. durch das men der Thiere verändert wird, so daß ein Theil Sauerstoffgas in Kohlensäuregas verwandelt wird, bei es bekanntlich sein Volum nicht verändert. Fol. vermindert sich während des Keimens unaufhörlich ursprüngliche Kohlenstoffgehalt des Saamens, während Sauerstoff- und Wasserstoff-Gehalt der Bestandtheile vermindert in das sich entwickelnde Germen einzug. scheint. Diese Ausscheidung von Kohlenstoff, welche Gegenwart des freien Sauerstoffs in dem umgebenden dium erfordert, scheint eine wesentliche Grundbeding. für alle Lebenserscheinungen in allen Klassen organis. Wesen zu sein. Mit ihrer Unterdrückung wird auch Fortdauer von Leben verhindert; wird daher die den menden Saamen umgebende Luft bis zu einem gewi. Grade ihres Gehaltes an Sauerstoffgas beraubt, oder viel Kohlensäuregas vermischt, so hört das begon. Keimen auf und der Saamen stirbt.

Versucht man, bei Beobachtung aller im Ueb. dem Keimen günstigen Umstände, den Saamen im leeren Raume, in Wasserstoffgas, Stickgas, Kohlen. gas u. s. w. keimen zu lassen, so tritt kein Zeichen Leben ein, sondern die aufgequollenen Saamen fa. zuletzt an andere Prozesse zu erleiden, wobei sie zer. werden und alles Leben verlischt. Dagegen keime sehr gut in Sauerstoffgas, und durch v. Humboldt's. suche hat man gefunden, daß sehr alte Saamen, w. auf gewöhnliche Weise durchaus nicht keimen w.

zum Keimen gebracht werden konnten, als sie mit einer schwachen Auflösung von Chlor in Wasser benetzt wurden, durch dessen oxydirende Eigenschaft die Ausscheidung von Kohlenstoff bewirkt wurde, die auf gewöhnlichem Wege nicht vor sich gehen wollte. Diese Ausscheidung von Kohlenstoff macht, daß das kleine erste Product des Keimens weniger feste Materien enthält, als der Saamen. Th. de Saussure trocknete und wog Erbsen, ließ sie hierauf in Wasser keimen und trocknete dann nach 3 Tagen die gekeimte Saat; er fand nun, daß sie $4\frac{2}{3}$ Procent an Gewicht verloren hatten, wovon nicht völlig 1 Procent von der Luft aufgenommener Kohlenstoff war. Die übrigen $3\frac{2}{3}$ Procent, welche de Saussure für während des Keimens gebildetes Wasser ansah, war vermuthlich der Unterschied im Wassergehalt zwischen den trocknen Erbsen vor dem Keimen, die nicht ohne Zerstörung des Lebens vollkommen ausgetrocknet werden konnten, und zwischen der durch das Trocknen getödteten Saat.

Der unmittelbare Einfluß der Sonnenstrahlen ist dem Keimen nachtheilig. Ueberall finden wir in der Natur, daß die ersten Lebenserscheinungen organischer Wesen im Dunkeln ihren Anfang nehmen, und daß sie erst nach einer gewissen Entwicklung den Einfluß des Lichtes suchen und bedürfen. Auch haben die Versuche bestätigt. Saamen, unter übrigens günstigen Umständen, dem unmittelbaren Einfluß der Sonnenstrahlen ausgesetzt, sterben ohne zu keimen. Dem zerstreuten Lichte ausgesetzt, keimen sie zwar, aber bedeutend langsamer als die, welche, unter übrigens gleichen Umständen, im Dunkeln gelassen werden. De Saussure hat aus seinen Versuchen geschlossen, daß die Ursache hiervon in der wärmeerregenden Kraft der Sonnenstrahlen liege, weil, wenn das Sonnenlicht durch Media geht, welche einen großen Theil der wärmenden Strahlen zurückhalten, sein Einfluß in demselben Verhältnisse weniger schädlich ist. In diesem Falle gleicht die Wirkung der Sonnenstrahlen auf Saamen, der bleichenden Wirkung, welche sie auf Pflan-

zenfarben ausüben, die in wenigen Augenblicken mit einer gewissen höheren Temperatur, welcher man den gefärbten Körper aussetzt, nachgeahmt werden kann. Wärme, bis zu einem gewissen Grade, befördert sonst das Keimen, so wie sie alle Lebensprozesse beschleunigt. Dieselben Saamen keimen bedeutend schneller in warmen Klimaten, oder in einer künstlich erwärmten Erde, als in kälteren Klimaten und ohne fremde Erwärmung.

Die in den Cotyledonen bereiteten Nahrungsmittel werden von der Radicula aufgenommen, von der kleinen Gefäße ausgehen und sich in jenen verlieren. Dagegen aber findet sich keine Gemeinschaft zwischen jenen und der Plumula, welche folglich von der ersten Lebensperiode an alle ihre Nahrung durch die Wurzel aufnimmt.

Bei dieser Ausbildung der Pflanze verdient ein Umstand alle Aufmerksamkeit, daß sich nämlich die Wurzel immer nach unten, und die Plumula nach oben entwickelt. Obgleich dies wohl ebenfalls, wie alle andere Erscheinungen des Lebens, auf den eigenen Wirkungen der Lebenskraft beruht, so suchte man doch ausfindig zu machen, durch welchen Umstand dies hauptsächlich bedingt werde; denn bestünde diese Erscheinung bloß darin, daß die Pflanze und die Wurzel nach entgegengesetzten Richtungen gingen, so müßte die Ursache nur in der Organisation der Pflanze gesucht werden; da sie aber dabei ihre Wurzel mehr oder weniger gerade nach dem Mittelpunkte der Erde, und ihren Stamm nach der entgegengesetzten Seite führt, so hat auch ohne Zweifel der Einfluß allgemeiner Kräfte Theil daran. Man sah, daß z. B. ein Baum, welcher auf der obersten Fläche einer alten Mauer aufgewachsen war, hier bald nicht mehr Nahrungsstoff genug fand, und eine Wurzel nach und nach gerade von oben herunter sandte. Während dessen blieb der Baum im Wachsen stehen, die Wurzel nahm an Länge und Dicke zu, bis sie nach Verlauf von mehreren Jahren zur Erde gelangte, sich darin verästelte, und dem Baume neue Nahrung und frischen Zuwachs gab. Um auszumitteln, ob die Gravitation an diesen Erscheinungen Theil habe, ver-

suchte Knight, Bohnen keimen zu lassen, die an einem horizontalen, durch ein Wasserrad in Bewegung gesetzten, Rade befestigt waren. Die Bohnen wurden mit hinlänglichem Wasser versehen, sie keimten und schlugen aus. In diesem Zustande wirkte die Centrifugalkraft auf dieselben durchaus so wie die Gravitation auf die in Ruhe befindlichen Saamen, und er fand dabei, daß die Wurzel der Richtung der Centrifugalkraft folgte und nach außen ging, während die Kronen der Pflanzen die entgegengesetzte befolgten und zuletzt im Mittelpunkte des Rades zusammenkamen. Als sich das Rad bei einem andern Versuche mit einer geringeren Geschwindigkeit bewegte, so wurde der Einfluß der Gravitation nicht überwunden, sondern die Pflanze nahm dann ihre Richtung in einem Mittel zwischen der Wirkung der Gravitation und der der Centrifugalkraft, so daß die Wurzel nach außen und unten, und der Stengel nach innen und oben ging.

Duhamel legte keimende Bohnen und Kastanien in Röhren von passendem Durchmesser, umgab sie darin mit Erde und hing sie verkehrt, d. h. mit der Wurzel nach oben und der Plumula nach unten, auf. Da die Plumula keinen Weg fand, zu Tage zu kommen, so rollten sich beide, Radicula und Plumula, spiralförmig um den Saamen auf.

Sobald die Cotyledonen zu Tage kommen, nehmen sie die Gestalt von Blättern an, die Herzblätter; die Wurzel nährt sich nun aus der Erde, und die Herzblätter verrichten dann, in Berührung mit der Luft, die Functionen der noch unvollkommen entwickelten, eigentlichen Blätter, bis sich die letzteren hinlänglich ausgebildet haben, wo dann die Herzblätter verwelken und abfallen. Werden sie sehr vor der Zeit weggenommen, so stirbt die schon entstandene Pflanze, und werden sie näher an der Periode, wo sie von selbst abfallen, weggenommen, so bleibt sie zwar am Leben, aber ihre Ausbildung wird sehr bedeutend verzögert.

Das Wachsen und die Erscheinungen der
kungen der Pflanze auf Erde, Wasser
Luft.

Ehe die Cotyledonen die Gestalt von Blättern
nommen haben, wächst vorzüglich die Wurzel; so
sie aber in der Luft eine grüne Farbe bekommen
ben, fängt auch die Plumula sich lebhafter zu entwi
an. Die Ausbildungsperiode der Pflanzen ist im Ueb
ein für Jeden so bekannter Gegenstand der Erfah
dafs jede Beschreibung davon überflüssig wäre. Ich
che nur zu erwähnen, dafs diejenigen Theile, welche
sowohl im Stamme als in der Wurzel ausbilden,
Im Innersten ein häutiges Gewebe, bei ungleichen
zen von verschiedenem Umfang, welches den N
Mark (*Medulla*) erhalten hat, und dessen Bestim
man nicht kennt. Es scheint hauptsächlich bei der
jungen Pflanze ein wirksames Organ zu sein, weil
der Zeit ohne Nachtheil für das Leben der Pflanz
stört wird, und es oft künstlich ausgetrieben worde
ohne dafs dadurch nachtheilige Folgen für das Ge
einzutreffen schienen. Auf das Mark folgt der h
Theil, das Holz (*Lignum*), welches bei ungleiche
wachsen von ungleicher mechanischer und chemisch
schaffenheit ist, wie z. B. die biegsame Faser des
und der harte, schwere Buxbaum. Dieser Theil
seinem lebenden Zustande mit einer unzähligen
longitudineller, mehr oder weniger regelmäfsig au
deter Röhren durchzogen, und ist im Ganzen ein
röse, beständig mit Flüssigkeiten erfüllte Masse.
dem Holze liegt eine weiche und feuchte, mit G
und Flüssigkeiten erfüllte Haut, welche den Namen S
(*Alburnum*) erhalten hat, und zu äufserst über die
die Pflanze mit einer mehr oder weniger dicke
deckung, der Rinde (*Cortex*) umgeben. Diese
vorhanden, um vor äufserer Beschädigung und vo
wirkung von Luft und Wasser zu schützen, und zu
oft, um die Ausdünstung der Flüssigkeiten von inn

verhindern. — Bei den Bäumen und Sträuchern, welche nur die Blätter jährlich wechseln, deren holziger Stamm mit seinen Aesten und Zweigen sich aber erhält, vermehrt sich das Holz beständig auf der Oberfläche auf die Weise, daß der Splint, nachdem er im Frühling und Anfang des Sommers seine vegetabilischen Verrichtungen gethan hat, allmählich in Holz übergeht, während sich auf der inneren Seite der Rinde neuer Splint bildet; dadurch entstehen bei gewissen Holzarten, z. B. den Tannen und Fichten, sehr sichtbare concentrische Ringe, welche Jahrringe genannt werden, und deren Anzahl gewöhnlich ziemlich sicher das Alter des Baumes anzeigt, während ihre ungleiche Breite und ihre ungleichen Abstände unter einander zeigen, in welchem Grade die verschiedenen Jahre für die Vegetation günstig waren. Obgleich die innere Rinde voller Säfte ist und beständig mit dem Baume wächst, so ist dies doch nicht in demselben Grade mit der äußeren der Fall, die nach und nach zu einer trockenen und todten Umgebung wird, und mit der Zeit berstet, in dem Maße nämlich, als sie zur Umschließung des beständig dicker werdenden Stammes zu enge wird.

Sowohl der Stamm als die Wurzel breiten sich in Aeste aus, welche im Allgemeinen bei Bäumen und Sträuchern unregelmäßig sind, so daß sich ihre Vertheilung bei den verschiedenen Individuen nie einander ähnlich ist. Diese Vertheilung der Aeste über der Erde hängt von zufälligen, nicht so leicht aufzufindenden Ursachen ab. Die Verästelung der Wurzel dagegen beruht auf dem Zutritt der Nahrung in der Erde. Wo diese häufig vorhanden ist, verästelt sich die Wurzel innerhalb eines kleinen Umkreises in kleinen Abtheilungen; wo sie sparsam ist, schießt sie länger aus und geht durch größere Erdmassen, um aus der Entfernung aufzusammeln zu können, was ihr in der Nähe fehlt.

Das Ende eines jeden Zweiges und eines jeden Stammes ist aus im Auswachsen befindlichen Theilen und nach für das Jahr beendigter Vegetation aus einer Knospe gebildet, die bei der nächsten Frühlingssonne auswächst, und

Blätter oder Laub, und an einigen Stellen Blüten und Früchte bildet. Die Blätter schießen, nach der übereinstimmenden Meinung der Pflanzenanatomien, aus dem Splinte, mit dessen Gefäßen sie in Gemeinschaft stehen, und bei dessen endlicher Verwandlung in Holz sie abfallen, hervor.

Die Pflanzen nehmen das Material zu ihrem Wachsthum aus der Erde und der Luft, welche beide für sie gleich unentbehrlich sind. Zu Anfange des Frühlings, ehe noch grüne Theile der Gewächse gebildet sind, schöpfen sie ihre Nahrung nur aus der Erde durch die Wurzel. Selbst der erdartige Theil des Marks scheint dabei keinen anderen als nur einen mechanischen Einfluß auf die Pflanze zu äußern; die in der Erde befindlichen allmählich verwesenden Pflanzen-Ueberreste des vorigen Jahres bilden das Nahrungsmittel, welches dann von den Wurzeln aufgenommen wird. Aber ohne Wasser geht keine Vegetation vor sich, die Erde muß daher beständig feucht sein, wenn die Pflanzenwurzeln etwas daraus sollen aufnehmen können. Diese Feuchtigkeit löst da kleine Mengen der in der Erde befindlichen auflöselichen Stoffe auf, welche von der Wurzel aufgesogen und durch dieselbe in den über der Erde befindlichen Theil des Baumes oder Gewächses hinaufgeführt werden. Wie das Mechanische dieser Einsaugung vor sich geht, ist schwer zu sagen. Die Wurzel hat keine andere sichtbare Oeffnungen, als ihre Porosität, gleich wie alle Pflanzenmaterien. Schneidet man die äußerste Spitze einer Wurzel ab, so verlängert sie sich nicht mehr, sondern es nehmen statt dessen die Seitenäste zu, zum Beweis, daß das Ende einer jeden Wurzelfaser einen für einen gewissen Endzweck eingerichteten Bau habe, welche Bestimmung nicht mehr von der neuen Endfläche erfüllt wird, die abstirbt und zusammentrocknet. Man hat sich das Einsaugungsvermögen der Wurzel aus der Haarröhrchenkraft poröser Körper, d. h. durch die Kraft erklärt, wodurch eine sehr feine Glas- oder sogenannte Haar-Röhre, in eine Flüssigkeit gestellt, diese Flüssigkeit weit über ihren äußeren Stand

in die Röhre hinaufzieht. Diese Kraft mag wohl hierbei mitwirkend sein, aber allein kann sie nicht dieses Einsaugungsvermögen ausmachen; denn mit derselben starken Kraft, womit die Haarröhrchen Flüssigkeiten einsaugen, halten sie dieselben auch zurück; aber die Wurzel giebt sie beständig wieder auf eine solche Weise ab, daß sie in den Gewächsen hinauf getrieben und bis in die äußersten Theile derselben fortgetrieben werden. — Nur aufgelöste Stoffe können auf diese Weise in die Pflanzen gebracht werden. Gewissen Auflösungen ausgesetzt, absorbiren die Wurzeln die in denselben aufgelösten Körper in einem anderen Verhältnisse zum Wasser, als worin sie in der Auflösung enthalten sind, besitzen aber gleichwohl nicht das Vermögen, vorzugsweise die für die Pflanze brauchbaren Stoffe aufzunehmen, sondern es ist sehr häufig der Fall, daß die schädlichsten in größerer Quantität aufgenommen werden. Pflanzen, welche mit gefärbtem Wasser, mit Dinte und dergl. begossen werden, saugen die Farbe mit dem Wasser auf, und man kann so nach einigen Tagen durch Dissection der Pflanze das Aufsteigen der Flüssigkeit verfolgen. Gewisse, in dem zum Begießen der Pflanzen dienenden Wasser aufgelöste Stoffe unterhalten das Pflanzenleben sehr gut, andere zerstören es gänzlich. Wir besitzen hierüber recht interessante Versuche von de Saussure. Er ließ mit ihren Wurzeln versehene Stöcke von *Polygonum persicaria* und von *Bidens cannabina* in Auflösungen von folgenden Stoffen wachsen: Chlorkalium, Kochsalz, salpetersaurer Kalkerde, schwefelsaurem Natron (verwittertem), Salmiak, essigsaurer Kalkerde, schwefelsaurem Kupferoxyd, Zucker, arabischem Gummi, Dammerde-Extract. Jede dieser Substanzen war in 100 Mal so viel Wasser aufgelöst, ausgenommen die letzte, wovon 4 Th. in 100 Th. Auflösung enthalten waren.

Das *Polygonum* fuhr fünf Wochen lang fort (der Versuch wurde nicht länger fortgesetzt) in den Auflösungen von Chlor-Kalium und -Natrium, von schwefelsaurem Natron, von salpetersaurer Kalkerde und von Humus-extract zu wachsen, seine Wurzeln zu entwickeln und zu

gedeihen. In der Salmiak-Auflösung lebte die Pflanz aber abzehrend und ohne Wurzeln auszuschlagen. In d Auflösung von Gummi und essigsaurer Kalkerde verwelk sie nach 10 Tagen, und starb nach 3 Tagen in der Au lösung von Zucker und der von schwefelsaurem Kupfe oxyd. Die Bidens zeigte dasselbe Verhalten, aber in kü zeren Perioden.

Um zu bestimmen, ob diese Auflösungen unverände aufgenommen würden oder nicht, stellte er mehrere Stöc dieser Pflanzen in Auflösungen der genannten Salze, u nachdem nach der Vegetation von einigen Tagen ung fähr die Hälfte der Flüssigkeit aufgesogen war, untersuch er den Salzgehalt in der übrig gebliebenen, und fand dan dafs von 100 Th. Salz, welche sich in der ganzen Aufl sung fanden, die Pflanze mit der aufgesogenen Hälfte d Flüssigkeit aufgenommen hatte von

	Polygonum. Bidens.		Polyg. B.	
Chlorkalium	14,7	16	Essigsauerm Kalk	8
Chlornatrium	13,0	15	Schwefels. Kupfer	47
Salpeters. Kalk	4,0	8	Zucker	29
Schwefels. Natron	14,4	10	Gummi	9
Salmiak	12,0	17	Humusextract	5

Man findet also hier, dafs die Pflanzen ungleich Mengen, aber am meisten von den schädlichsten Stoffe aufnahmen; de Saussure erklärt diels daraus, dafs d schädlicheren Stoffe bald das Vermögen der Pflanzen, di selben auszuschliessen, zerstörten, worauf die Auflösu geradeweg aufgesogen wurde, statt dafs bei den übrig das Wasser fortwährend in einem grösseren Verhältnis als das darin aufgelöste Salz, aufgenommen werden konnt

De Saussure versuchte ferner, die erwähnten Pfla zen in eine Portion Wasser zu setzen, welches mehre Salze zu gleichen Theilen aufgelöst enthielt, und nach d Vegetation von einiger Zeit die übriggebliebene Auflösu zu untersuchen.

Eine jede Auflösung enthielt ein Procent von eine jeden der aufgelösten Salze.

von Polygonum. v. Bidens.

1	{	Wasserfreies schwefelsaures Natron		
		absorbirt	11,7	7
2	{	Kochsalz	22	20
		Wasserfreies schwefelsaures Natron	12	10
3	{	Chlorkalium	17	17
		Essigsäure Kalkerde	8	5
4	{	Chlorkalium	33	16
		Salpetersäure Kalkerde	4,5	2
5	{	Salmiak	16,5	15
		Essigsäure Kalkerde	31	35
6	{	Schwefelsaures Kupferoxyd	34	39
		Salpetersäure Kalkerde	17	
7	{	Schwefelsaures Kupferoxyd	34	
		Schwefelsaures Natron	6	13
8	{	Kochsalz	10	16
		Essigsäure Kalkerde	0	0
8	{	Gummi	26	21
		Zucker	34	46

Die ungleiche Menge, in welcher diese Salze absorbirt wurden, zeigt also ein bestimmtes Vermögen der Wurzel an, in der Flüssigkeit, worin sie absorbirt, einen Ueberschufs von Bestandtheilen ausgeschlossen zu halten, ein Vermögen, welches im Stengel fehlt; denn werden die Wurzeln abgeschnitten und der Stengel dann in eine Flüssigkeit gesteckt, so wird diese ohne vorhergegangene Veränderung so wie sie ist und alle Salze gleich absorbirt.

Marcet d. j. hat gezeigt, das Mineralstoffe, welche für Thiere Gifte sind, es auch für Pflanzen sind, z. B. arsenichte Säure, Quecksilberchlorid, Blei- und Kupfer-Salze, wenn mit ihrer Auflösung in Wasser die Pflanzen begossen werden. Was man aber weniger vermuthet haben würde, ist, das vegetabilische Gifte für Thiere es auch für Pflanzen sind, wie z. B. die Extracte von Opium, Krähenaugen, Kockelskörnern, Belladonna, Cicuta, Digitalis, ferner Kirschchlorbeerwasser, Blausäure, Alkohol u. a. Sehr häufig zeigt sich die Wirkung des Giftes zuerst an dem Blattstiele, der sich in der Mitte krümmt, worauf das Blatt verwelkt und die ganze Pflanze stirbt.

Wenn irgend ein Umstand die rein unorganischen Bestandtheile der Erde auflöslich macht, so folgen sie ebenfalls mit der von der Wurzel aufgenommenen Flüssigkeit, und dadurch kann das Erdreich, worin die Pflanzen fortkommen, einen chemischen Einfluß auf die Vegetation zu haben scheinen. Daher fand de Saussure die Asche von Fichten, welche auf Granitboden gewachsen waren, bedeutend verschieden von Fichten, welche in Kalkstein-Gegenden gewachsen waren. Aber dies ist doch wohl mehr eine Zufälligkeit. Ich werde, bei Erwähnung der Pflanzen-Asche, die Versuche anführen, welche zu beweisen scheinen, daß die unorganische Erdmasse nicht hauptsächlich zur Abgebung der die Asche bildenden Stoffe beitrage.

Aber es ist nicht allein die Flüssigkeit in der Erde, welche auf die Wurzel Einfluß hat. Auch der Theil der Atmosphäre, welcher hier eindringt, äußert darauf einen bestimmten Einfluß. De Saussure nahm einige junge Kastanien-Schößlinge mit ihrer Wurzel, und stellte sie so, daß der Stamm selbst durch den verschlossenen Tubus einer Glasglocke ging und in freier Luft stand. In der Glocke wurde die Wurzel von einem Gas umgeben und nur ihre Spitze tauchte in Wasser. Enthielt die Glocke atmosphärische Luft, so vegetirte der Kastanienbaum so lange, als der Versuch fortgesetzt wurde. In Wasserstoffgas und Stickgas starb er nach 14 Tagen, und in Kohlen-säuregas schon nach einer Woche. Dieser Umstand scheint zu zeigen, daß der heilsame Einfluß der Lockerheit der Erde auch auf dem Zutritt der Luft beruhe, und nicht allein auf der größeren Leichtigkeit, womit sich die Wurzeln darin ausbreiten können.

Die Wurzel sendet die aufgesogenen Flüssigkeiten, welche nun Saft, *sebum*, genannt werden, schnell zum Stengel oder Stamme, welcher ihn dann in alle Theile der Pflanze verschickt, um aus den darin aufgelösten festen Materien beim Auswachsen die neuen zu bilden. Dieses Forttreiben der Flüssigkeiten geschieht mit einer sehr bedeutenden Kraft. Hales fand, daß sie bei einer Weinranke,

ke, welche in der Periode, wo die Bewegung des Saftes am stärksten ist, abgeschnitten war, einer Quecksilbersäule von 0,825 Meter Höhe ($33\frac{1}{2}$ Zoll?) das Gleichgewicht hielten. Man hat viel nach den Gefäßen gesucht, welche dieselben führen, ohne aber mit einiger Sicherheit ihr bestimmen zu können, als daß sie in dem Holze liegen, und daß die Bewegung des Saftes von der Wurzel nach den Extremitäten geht. Die Mechanik, wodurch der Saft fortgetrieben wird, ist ebenfalls der Gegenstand aller Forschungen gewesen, ist aber hier, gleichwie in den Capillargefäßen der Thiere, völlig unbekannt. Es darf gewiß nicht vielen Nachdenkens, um zu finden, daß sie in auf einander folgenden Erweiterungen und Zusammenziehungen bestehen müsse, aber diese Bewegung nicht genügend erwiesen werden können, und man sich keine wahrscheinliche Vorstellung von der Mechanik machen können, welche bewirkt, daß der Saft immer ununterbrochen dieselbe Richtung nimmt, weil die Reaktionen ohne eine solche ihn nach allen Richtungen gleich auspressen müßten. Man hat vermuthet, es seien die Gefäße mit Klappen, ungefähr von derselben Einrichtung wie in den Venen der warmblütigen Thiere, versehen sein; aber die Unrichtigkeit dieser Vermuthung wird ganz entscheidend durch den Versuch bewiesen, wenn man einen jungen Baum umkehrt, die Krone in die Erde eingräbt und die Wurzel in der Luft läßt, so daß die Zweige der ersteren Wurzel werden und den Boden in entgegengesetzter Richtung nach den ehemaligen Wurzeln treiben, welche Knospen bekommen und Blätter bilden. Die Richtung der Bewegung ist sonst das wenigsten schwer Verständliche. Nachdem wir gesehen haben, daß die Wurzel das Vermögen, einzusaugen, und folglich keine Flüssigkeit abgibt oder herausgibt, so müssen die eingesaugten Flüssigkeiten, nachdem sie in Röhren gekommen sind, welche sich innen langsam durch Zusammenziehen entleeren, dahin abfließen, wo der Widerstand am geringsten ist, und die Flüssigkeit am besten vorwärts kommt, was,

da es nicht in der Wurzel sein kann, in den übrigen Theilen der Pflanze geschehen muß, Auch giebt ein von einer Pflanze abgeschnittener frischer und saftiger Stengel den Saft sowohl nach unten als oben ab, und die Gefäße entleeren sich einem großen Theile nach. Aber bei dieser Frage über die Bewegung des Saftes entsteht noch eine andere: wohin nimmt alle der aufsteigende Saft seinen Weg? Circulirt er, wie bei den Thieren? Diese letzte Frage scheinen die übereinstimmenden Resultate der Forschungen hierüber mit Nein beantwortet zu haben. Wenn man aber die große Menge von Saft gesehen hat, welche während des Frühlings, z. B. aus einer verletzten Birke, hervorquillt, so verwundert man sich natürlicherweise über das Unbegreifliche hierbei, daß man nicht einsieht, wohin alle diese Flüssigkeit gehen kann. Dabei hat man indessen zuerst zu bemerken, daß das ausfließende Quantum nur ein kleiner Theil von dem ist, was der Baum, als er verletzt wurde, enthielt, daß es durch Zusammenziehung der Röhren von mehreren Theilen des Baumes kommen kann, und daß die Wurzel, bei verminderter Spannung in den Gefäßen des Baumes mit größerer Leichtigkeit aus der Erde neue Flüssigkeiten einsaugt. Daraus folgt daher, daß aus einem verletzten Baume mehr ausfließt, als bei der verletzten Stelle in dem nicht beschädigten Baume geflossen sein würde. Aber das auch zugegeben, daß das Aufsteigen des Saftes in dem Baume in keinem Verhältniß mit dem steht, was bei seiner Verletzung ausfließt, so ist es immer auffallend, wohin diese in Bewegung gesetzte Flüssigkeit gehen werde. Die Erfahrung hat indessen gelehrt, daß die neuen auswachsenden Blätter Wasser in großer Menge ausdunsten, und zwar am meisten anfangs, und damit in beständigem Abnehmen von ihrer ersten Entwicklung bis zu dem Augenblick fortfahren, wo sie im Herbste gelb werden und abfallen. Woodward, Hales und Sennebier haben besondere Versuche zur Bestimmung der Menge des Ausgedunsteten angestellt, und haben sie sehr bedeutend gefunden. Woodward fand, daß verschiedene Pflanz-

zen im Verlaufe von 11 Wochen von ihrer Oberfläche ungefähr 100 Mal so viel Wasser ausgedunstet hatten, als sie zu Anfange des Versuches wogen. Folglich steigt der Saft von unten herauf sehr wasserhaltig nach oben, um während des Vegetationsprozesses selbst concentrirt zu werden, seine festen Stoffe abzusetzen und neuen aufsteigenden Flüssigkeiten Platz zu machen. Aber Knight hat gezeigt oder es wenigstens wahrscheinlich zu machen gesucht, daß ein Theil der in das Laub gelangenden Flüssigkeit, nach einer daselbst durch Abdunstung und Berührung mit der Luft untergangenen Veränderung, vom Laube durch eigene Gefäße in einer nach der Wurzel gerichteten Bewegung in den Splint und das Holz, oder bei Pflanzen, deren Stängel jährlich vergeht, in die Wurzel concentrirt wieder zurückkehre und daselbst Stoffe absetze, welche vom aufsteigenden Saft wieder aufgelöst würden, so lange die Vegetation lebhaft ist, aber, nachdem sie aufgehört hat, Stoffe zur Vegetation des nächsten Jahres abgebe. Knight hat diese Vorstellung durch einige recht interessante Versuche wahrscheinlich gemacht. Er ließ den Saft eines Maulbeerbaums in verschiedenen Höhen über der Wurzel ausrinnen, und fand ihn um so concentrirter, von je höher er genommen wurde. An der Wurzel war sein spec. Gewicht 1,004, $3\frac{1}{2}$ Elle höher hinauf hatte das Ausfließende 1,008 spec. Gew., und bei 5 Ellen Höhe 1,012. Derselbe Versuch, bei einer Birke wiederholt, gab ein analoges Resultat. Der Saft dieser Bäume enthält Zucker; an der Wurzel besaß er kaum Geschmack, aber je höher er genommen wurde, um so süßer wurde er. Auch hat die Erfahrung gelehrt, daß Hölzer, Rinden und Wurzeln, welche zu medicinischem Behuf im spätem Herbst oder früh im Frühlinge, ehe noch der Saft in Bewegung gekommen ist, gesammelt werden, viel reicher an den darin gesuchten Bestandtheilen sind, als die im Sommer gesammelten, weil dann diese Bestandtheile zur Vegetation des Jahres verbraucht worden sind, sich aber wieder neue Vorräthe für den nächsten Frühling sammeln, wenn jene aufgehört hat. Knight fand daher, daß ein

im Winter abgehauenes Stück Holz 0,679 spec. Gewicht hatte, während ein Stück von demselben Holze, mitten im Sommer abgehauen, nur 0,609 hatte.

Die Summe von dem, was wir über die Bewegung des Saftes in den Pflanzen zu wissen glauben, ist also, daß, nachdem während der Winterkälte (oder in den warmen Ländern durch Austrocknung während des heißen Sommers) die Erscheinungen des Pflanzenlebens fast aufgehört haben, die Wurzeln bei annähernder Wärme des Frühlings, wenn das Wasser in der Erde seine feste Gestalt verloren hat, oder in den heißen Zonen bei der Regenzeit, anfangen, die sie umgebenden Flüssigkeiten zu absorbiren, und sie in größerer Menge, als im übrigen Jahre, in allen Richtungen nach den Extremitäten der Pflanzen zu treiben, wobei sich ihre grünen Theile bilden und auswachsen, während der größte Theil des Wassers in der zugeführten Flüssigkeit in die Luft verdampft, und das, was von den im Saft aufgelösten festen Stoffen nach der Vegetation übrig bleibt, mehr concentrirt durch den Splint zurückgeführt wird, um theils während noch dauernder Vegetation von dem aufsteigenden Saft wieder aufgenommen, theils um bei anfangender Abnahme der Vegetation des Jahres vom Holze und Splinte aufbewahrt zu werden, je nach den Umständen entweder nur in der Wurzel oder sowohl in dieser als in dem Stamme, zur Entstehung der Vegetation des nächsten Jahres.

Ich werde später bei Beschreibung der chemischen Verhältnisse einzelner Pflanzentheile das anführen, was wir über die Zusammensetzung der Pflanzensäfte, welche bedeutend mehr veränderlich ist, als die der Flüssigkeiten in den einzelnen Thierklassen, wissen.

Die grünen Theile der Pflanzen und im Allgemeinen die Blätter oder das Laub machen ein für das Pflanzenleben sehr wesentliches Organ aus; werden sie weggenommen, so bleibt die ganze Vegetation für das Jahr stehen, und würden sie jeden Frühling von einem Baume weggenommen werden, so würde er nach wenig Jahren absterben. Die Hauptfunction der Blätter scheint eine

doppelte zu sein: 1) das überflüssige Wasser im Pflanzensaft abzdunsten, und 2) die übrigbleibende Masse dem Einflusse der Luft auszusetzen. Wir wollen durchgehen, was wir von diesen beiden wissen.

1) Die Abdunstung, welche man mit der Ausdunstung der Thiere verglichen und daher *Transpiratio* genannt hat, besteht eigentlich in dem Trocknen des saftigen Laubes bis zu einem gewissen Grade, indem sich, wenn die Luft trocken ist, die Feuchtigkeit durch seine Poren in Wassergas verwandelt. Dabei werden die Flüssigkeiten des Laubes concentrirt, aber es trocknet nicht aus, so lange aus der Pflanze neuer Saft zufließt. Man hat versucht, die Ausdunstung von Pflanzen auf umgebende Glasgefäße sich condensiren zu lassen, da aber die Luft im Glase bald zum Maximum von Feuchtigkeit kommt, so wird die Ausdunstung unterbrochen, welche nur auf dem Vermögen der Luft, aufzunehmen zu können, beruht, und nicht, wie bei den Thieren, von der höheren Temperatur der ausdunstenden Oberfläche unterstützt wird. Hales fand, daß das Ausgedunstete bloß Wasser sei, welches jedoch etwas nach der Pflanze roch, und beim längeren Aufbewahren einen faulen Geruch annahm. Sennebier untersuchte größere Portionen von diesem Wasser, worin er nur höchst unbedeutende Rückstände fand. Diese bestanden aus kohlensaurer und schwefelsaurer Kalkerde und Spuren von Gummi und Harz; Bestandtheile, welche nicht abgedunstet sein konnten, sondern auf irgend eine Art mechanisch eingemengt sein mußten. Bisweilen geschieht es, daß die Abdunstung von einer wirklichen Secretion auf der Blatt-Oberfläche begleitet ist, indem das Wasser wegdunstet und die festen Stoffe auf der Oberfläche zurückläßt; von dieser Natur ist der sogenannte Honigthau, welcher eine krankhafte Erscheinung ist, und die Ueberzüge von kohlensaurem Kalk, die sich bisweilen auf den Blättern gewisser Pflanzen bilden. Guettard, Duhamel und Bonnet haben gezeigt, daß die obere Seite der Blätter leichter das abdunstende Wasser von sich läßt; als die untere, und indem sie die obere

Seite der Blätter firnisten, unterbrachen sie größtentheils diese Abdunstung.

Die Abdunstung nimmt gegen den Herbst zu immer mehr ab, die Blätter bekommen eine größere Festigkeit, ihr Gewebe wird härter und trockner, und sie kommen, ebe sie abfallen, in einen dem Alter der Thiere nicht unähnlichen Zustand.

2) Die lebende Masse der Blätter übt auf die umgebende Luft einen höchst bemerklichen Einfluß aus, der darin besteht, daß sie am Tage, oder so lange sie vom Lichte getroffen werden, die Kohlensäure in der Luft auf die Weise zersetzen, daß der Kohlenstoff mit einer gewissen Portion ihres Sauerstoffs sich mit der Pflanze vereinigt, und der größte Theil des Sauerstoffs gasförmig in der Luft bleibt; aber in der Nacht und im Dunkeln verwandeln sie einen Theil des Sauerstoffgases der Luft in Kohlensäuregas, jedoch in einem geringeren Verhältnisse, als dem Kohlenstoff entspricht, welchen sie am Tage absorbirten, und saugen eine Portion Sauerstoff auf, welche sie beim Sonnenlichte des folgenden Tages wieder von sich geben. Je länger die Pflanzen den Einfluß des Lichts genießen, um so mehr Kohlenstoff nehmen sie aus der Luft auf, und je kürzer die Nacht ist, um so weniger Kohlenstoff geben sie während der dunkeln Zeit wieder an die Luft zurück, und um so schneller geht die Vegetation vor sich. Deshalb gehen alle Prozesse des Pflanzenlebens im Norden mit einer Schnelligkeit vor sich, wie man sie in wärmeren Ländern, wo die Länge des Tages die der Nacht wenig übertrifft, nicht kennt. Bei der nördlichen Mitternachtsonne durchläuft das Pflanzenleben in sechs Wochen dieselben Perioden, wozu es im schönen Italien 4 bis 5 Monate bedarf.

Priestley bemerkte zuerst (im J. 1771) die Eigenschaft der Pflanzen, verdorbene Luft zu verbessern. Er ließ ein Wachlicht in abgeschlossener Luft brennen, bis das Licht verlösch. Dann brachte er einen Stock von Mentha in diese Luft und ließ sie darin 10 Tage lang wachsen, worauf er fand, daß das Licht wieder sehr gut

in dieser Luft brannte. Aber man verstand nicht sogleich, was dieser Versuch zu bedeuten hatte. Man erfuhr nachher, daß Pflanzen in einer Atmosphäre von bloß Kohlensäure sterben, daß aber eine geringe Beimischung derselben zur Luft auf eine sehr ausgezeichnete Art zum Gedeihen der Pflanze beitrage. Ingenhous's bemerkte zuerst, daß die Blätter das Vermögen besitzen, die Luft zu verbessern, und daß sie diese Wirkung nur so lange äußerten, als sie dem Einflusse der Sonnenstrahlen ausgesetzt waren. Er brachte Pflanzen in mit Wasser gefüllte Glasgefäße, und fand, daß sie Sauerstoffgas entwickelten, als sie in die Sonne gestellt wurden. Die Beschaffenheit des Wassers war hierbei nicht gleichgültig. In gekochtem Wasser gaben sie kein Gas, in Flußwasser sehr wenig, und in Brunnenwasser am meisten. Sennebier bewies, daß diese Erscheinung von der Zersetzung der Kohlensäure herrührte. Er imprägnirte ein Wasser, worin Pflanzen keine Spur von Sauerstoffgas entwickelten, mit Kohlensäuregas, und von nun an wurde Sauerstoffgas in Menge entwickelt. Als keins mehr erhalten wurde, fand sich das Wasser frei von Kohlensäure, und als mehr davon zugesetzt wurde, fing eine neue Entwicklung von Sauerstoffgas an. Dieser Gegenstand ist zuletzt durch Th. de Saussure's Versuche zu völliger Gewisheit gebracht worden, und ich will das Entscheidenste davon mit seinen eigenen Worten anführen:

„Ich setzte, sagt er, eine künstliche Atmosphäre aus 290 Cub. Centimeter von einer atmosphärischen Luft zusammen, in welcher das Eudiometer 21 Procent Sauerstoffgas anzeigte, zu welcher Luft Kohlensäuregas gemischt wurde, so daß dann Kalkwasser darin $7\frac{1}{2}$ Procent Kohlensäure anzeigte. Dieses Luftgemenge war in einer Glasglocke enthalten und durch Quecksilber gesperrt, das mit einer dünnen Lage von Wasser bedeckt war, um die schädliche Wirkung auf die Pflaunzen zu verhindern, welche sich immer zeigt, wenn die sie umgebende Luft unmittelbar von Quecksilber berührt wird.“

„Unter diesen Recipienten brachte ich 7 Stöcke von

Vinca pervinca, wovon jeder 2 Decimeter Höhe hatte, und die alle zusammen einen Raum von 10 Cub. Decimeter einnahmen. Ihre Wurzeln waren in ein besonderes Gefäß gesetzt, welches 15 Cub. Centimeter Wasser enthielt. Dieser Apparat wurde 6 Tage hinter einander dem unmittelbaren Einfluß der Sonnenstrahlen von 5 bis 11 Uhr Morgens ausgesetzt. Am 7. Tage wurden die Pflanzen herausgenommen, die keine sichtbare Veränderung erlitten hatten. Das Volum der Luft war unverändert, so viel man bei Anwendung einer Glasglocke beurtheilen kann, welche 13 Centimeter Durchmesser hat und worin daher eine Veränderung, welche unter 20 Cub. Centimeter geht, schwer zu bemerken ist; aber größer kann der Fehler wenigstens nicht sein. Kalkwasser zeigte keine Spur mehr von Kohlensäure in dieser Luft an, und das Eudiometer bestimmte den Sauerstoffgehalt zu $24\frac{1}{2}$ Proc.“

„Neben dem eben beschriebenen Apparat stand ein anderer, ganz gleich beschaffener, der eben so viel Stöcke einschloß, worin aber die Luft nicht mit Kohlensäure vermischt war. Als diese Luft nach Verlauf derselben Zeit geprüft wurde, fand sie sich hinsichtlich der Reinheit und des Volums nicht im Mindesten verändert.“

„Aus dem, was ich über die Zusammensetzung der künstlichen Atmosphäre angeführt habe, geht hervor; daß sie vor Anfang des Versuchs enthielt:

4199	Cub. Centimeter	Stickgas
1116	—	—
431	—	—
		Sauerstoffgas
		Kohlensäuregas

5746

aber nachdem sie die Pflanzen verändert hatten:

4338	Cub. Centimeter	Stickgas
1408	—	—
0	—	—
		Sauerstoffgas
		Kohlensäuregas

5746

„Die eingesetzten Stöcke hatten folglich 431 Cub. Centimeter Kohlensäuregas fortgenommen. Hätten sie daraus allen Sauerstoff entbunden, so würde das Volum des Kohlensäuregases von einem gleichen Volum Sauerstoff-

as ersetzt worden sein; sie haben aber nicht mehr als 92 Cub. Centimeter von letzterem entbunden. Die fehlenden 139 Cub. Centimeter Sauerstoffgas haben sie folglich assimilirt, während sie statt dessen 139 Cub. Centimeter Stickgas entwickelt haben.“

„Ein vergleichender Versuch hat gezeigt, daß die 1 Stöcke von *Vinca pervinca* vor dem Versuch in getrocknetem Zustand 2,707 Gramm gewogen, und bei der trocknen Destillation 0,528 Gramm Kohle gegeben haben würden; aber nach beendigter Vegetation in der kohlenstoffhaltigeren Luft gaben sie bei der trocknen Destillation 0,649 Gramm Kohle, so daß 0,120 Gramm Kohlenstoff aus der Luft aufgenommen worden sind. Ich habe auf gleiche Weise die anderen 7 Stöcke, welche in der kohlenstofffreien Luft standen, verkohlt, und habe gefunden, daß ihr Kohlenstoffgehalt eher ab- als zugenommen hat.“ So weit de Saussure.

Seine Versuche haben ferner gezeigt, daß Pflanzen in einer von Kohlensäuregas freien Atmosphäre nicht treiben, wenn sie vom Sonnenlichte getroffen werden. In den Nächten geben sie Kohlensäuregas aus, welches am Tage wieder zersetzt wird, und auf diese Art fahren sie wohl noch einige Zeit zu leben fort; wird aber in den Recipienten etwas ungelöschter Kalk gebracht, wovon die Kohlensäure absorhirt wird, so verwelken sie nach einigen Tagen, und ihre Blätter fallen zusammen. Dagegen aber werden die Resultate im Dunkeln ganz entgegengesetzt. Die Pflanzen fahren nicht allein fort, in einer, mit Kalk von Kohlensäure befreiten, Luft zu gedeihen, sondern sie erhalten sich auch viel frischer, als wenn das Kohlensäuregas darin gelassen wird. Er fand ferner, daß das Kohlensäuregas, so heilsam es auch beim Einflusse des Lichtes für die Pflanzen ist, wenn es in geringer Menge der Luft beigemischt ist, schädlich wird, wenn es in großer Menge vorhanden ist. Junge Pflanzen von gewöhnlichen Erbsen (*Pisum sativum*) verwelkten sogleich in reinem Kohlensäuregas, und sogar in einem Gemenge von einem Theil Luft mit 2 Theilen Kohlensäuregas. Sie ver-

welkten nach einer Woche in einem Gemenge von gleichen Theilen atmosphärischer Luft und Kohlensäuregas. Erhielt die Luft $\frac{1}{4}$ Kohlensäuregas, so wuchsen sie ungefähr so wie in gewöhnlicher atmosphärischer Luft, aber die Luft, in der sie eingeschlossen waren, nur $\frac{1}{14}$ Kohlensäuregas vermischt, so wuchsen sie bedeutend schneller als in der Luft, ungefähr wie 11 : 8.

Wir haben aus den erwähnten Versuchen de Saussure's gesehen, daß die Pflanzen mit dem Kohlenstoff aus der Kohlensäure Sauerstoffgas absorbiren; sie absorbiren dasselbe aber auch aus einer nicht Kohlensäurehaltigen Atmosphäre. Dies findet besonders im Dunkeln statt. Legt man frische, eben abgepflückte Blätter unter eine mit atmosphärischer Luft gefüllte Glocke und läßt sie eine Nacht hindurch darin, so findet man, daß sie eine Portion Sauerstoffgas absorbirt und einen andern Theil Kohlensäuregas verwandelt haben. Setzt man sie nach einigen Stunden lang dem Sonnenlichte aus; so nehmen ihren Kohlenstoff wieder auf, und alles verschwundene Sauerstoffgas kommt allmählich wieder, so daß die Luft wieder die Beschaffenheit, wie vor dem Versuche, nimmt. Nimmt man zu diesem Versuche Blätter von saftigen Pflanzen, und die ein zähes Leben haben, z. B. *Cactus opuntia*, so geben diese kein Kohlensäuregas sondern saugen nur Sauerstoffgas ein und geben es wieder ab, was mehrere Male mit demselben Blatte wiederholt werden kann. De Saussure nennt diese Erscheinung die Inspiration und Expiration der Pflanzen. Ließ die eingeschlossnen Cactusblätter 30 bis 40 Stunden lang im Dunkeln stehen, um diese Inspiration bis zu höchstem Grade zu bringen, was, wie er fand, das $1\frac{1}{4}$ ihres Volums Sauerstoffgas war. (Ließ er sie noch länger, so fing ein anderer Prozeß einzutreten an, wobei der Cactus den übrigen Sauerstoff der Luft in Kohlensäuregas verwandelte und zuletzt starb.) Das absorbirte Sauerstoffgas konnte weder unter der Luftpumpe noch durch Wärme ausgezogen werden, nur das Sonnenlicht kann dasselbe wiederum hervorrufen.

Die Eigenschaft der Blätter das Kohlensäuregas zu raetzen, die Luft zu verbessern, und dennoch Sauerstoff einzusaugen, ist sehr mißverstanden worden, durch die Ursache, daß man Pflanzen einer Atmosphäre aussetzt, die keine Kohlensäure enthält; da entwickelt sich kein Sauerstoffgas, und, wie wir aus dem Vorhergehenden gesehen haben, wird der Luft am Tage immer wieder der Sauerstoff zurückgegeben, welcher in der Nacht aufgesaugt wurde. Mehrere Chemiker haben, indem sie dieses Resultat erhielten, die Eigenschaft der Pflanzen, Sauerstoffgas sowohl zu entwickeln, als zu absorbiren, geläugnet; diese Erscheinungen finden nur auf Kosten des Kohlensäuregases statt, und zwar so, als ob nicht allein der Kohlenstoff von der Pflanze aufgenommen würde, sondern als ob eine Verbindung von Kohlenstoff mit Sauerstoff in einem weit geringeren Verhältnisse als in der Kohlensäure absorbirt würde. Wenn die von Saussure angeführten Versuche mit *Vinea pervinca* hinsichtlich der Proportionen als einigermaßen genau angesehen werden können, so hätte bei denselben der Kohlenstoff in der Pflanze $\frac{1}{4}$ von dem Sauerstoff, welchen er im Kohlensäuregas enthielt, mit sich geführt.

Im Uebrigen variiren diese Verhältnisse im Grade sehr stark nach ungleichen Pflanzen, ungleicher Jahreszeit, Tageszeit, und dem mehr oder weniger gesunden Zustand der einzelnen Individuen von derselben Species. Saftige und in feuchter Erde gezogene Pflanzen absorbiren im Dunkeln weniger Sauerstoffgas als andere; beständig grüne Bäume weniger, als diejenigen, deren Blätter jährlich abfallen. Im Allgemeinen ist die Menge von absorbirtem Sauerstoff größer im Frühling als im Herbst. De Saussure hat hierüber eine Menge von Versuchen besonders angestellt, deren einzelne Resultate jedoch mehr zur einzelnen Geschichte einer jeden Pflanze, als zur allgemeinen Darstellung der Lehre davon gehören.

Sowohl die Absorption des Sauerstoffgases im Dunkeln, als die Zersetzung der Kohlensäure im Tageslichte, geschieht durch eine eigene organische Bildung im Laube,

welche nicht in der äußersten Bedeckung der Blätter besteht, sondern zunächst darunter liegt. So lange ein Blatt ganz ist, oder selbst, wenn ein frisches Blatt in Stücke zerschnitten wird, findet diese Wirkung statt; wird es aber zerstoßen, so daß die Organisation zerstört wird, so wird kein Sauerstoffgas mehr im Dunkeln absorbiert, und das Kohlensäuregas nicht mehr im Tageslichte zersetzt, sondern es verwandelt die vegetabilische Masse nur einen kleinen Theil vom Sauerstoff der Luft in Kohlensäure, wie alle todte organische Materien. Dagegen hat man gefunden, daß nur grüne Theile der Pflanzen diese Eigenschaften haben, aber weder Wurzeln, Holz, Splint, noch Blumenblätter sie besitzen.

Sauerstoffgas allein hat einen weniger heilsamen Einfluß auf Pflanzen im Schatten oder im Dunkeln. Im Lichte treiben sie gleich gut darin, ungefähr wie in atmosphärischer Luft. Stickgas wird von den Pflanzen nie absorbiert, es scheint keinen Einfluß auf sie auszuüben, und wenn sie nach und nach in einer Atmosphäre von reinem Stickgas ausgehen, so ist es nur aus Mangel an Sauerstoff und Kohlensäure. Wasserstoffgas und Kohlenoxydgas verhalten sich wie Stickgas.

Dies sind die Veränderungen, welche von den Wirkungen des Pflanzenlebens auf die Luft hervorgebracht werden, wenn sie mit den grünen Theilen der Pflanzen in Berührung kommt. Aber welche sind die Veränderungen, welche hierbei in diesen Pflanzentheilen selbst entstehen? Bilden sich hierbei neue Pflanzenstoffe? Und wohin kommen sie? Man sieht aus dem Vorhergehenden, daß der durch Abdunstung im Blatte concentrirte Pflanzensaft nun hinsichtlich seiner Zusammensetzung verändert wird, und daß diese Veränderung hauptsächlich zur Ausbildung der ganzen Pflanze beiträgt. Die hier ausgebildeten Stoffe bleiben also nicht im Blatte. Bei der Dissection des letzteren findet man Kanäle, welche in die Pflanze und ihren Splint übergehen, durch welche, nach Knight's Meinung, der concentrirte und ausgearbeitete Saft vom Laube in die übrige Pflanze zurückgeführt wird,

kelung der grünen Farbe beschleunigt. Ingenhousz fand, daß das Grün in einer wasserstoffgashaltigen Luft leuchtend dunkler wird, und Sennebier hat gezeigt, daß sie dadurch auch im Dunkeln einen deutlichen Stich ins Grüne annehmen. v. Humboldt fand, daß in einer wasserstoffgashaltigen Atmosphäre in dem beständigen Dunkel der Gruben verschiedene Grasarten von den Geschlechtern *Poa* und *Plantago*, *Trifolium arvense*, *Cheiranthus cheiri* u. a. grüne Farbe bekommen. — Was die chemische Natur des grünen Farbstoffes betrifft, so werde ich später etwas mehr darüber anführen.

Ehe ich die Blätter verlasse, will ich auch ihre Eigenschaft, die mit denselben in Berührung kommenden Flüssigkeiten einzusaugen, erwähnen. Bonnet fand, daß sie, mit der einen Seite auf Wasser gelegt, nicht allein selbst zu leben fortfahren, sondern daß sie auch die Aeste oder Zweige, woran sie sitzen, unterhalten können. Er fand aber, daß nicht beide Seiten dieses Vermögen in gleichem Grade besitzen, daß im Allgemeinen bei den Blättern der Bäume und Sträucher dieses Vermögen der unteren Seite zukommt, bei anderen aber, z. B. den Erdäpfeln, vorzüglich der oberen Seite. Hieraus folgt, daß Regen und Thau zur Auffrischung durch Absorption der Blätter bedeutend beitragen können.

Eben so ausgezeichnet, wie auf die umgebende Luft der Einfluß der Blätter ist, ist auch der der Blumenkronen. De Saussure hat gefunden, daß sie alle Sauerstoff absorbiren, und daß sie, in einer Portion Luft gelassen, welche ungefähr das 200fache von ihrem Volum beträgt, das 5 bis 10fache ihres Volums Sauerstoffgas in 24 Stunden in Kohlensäuregas umwandeln, und im Allgemeinen weit mehr als grüne Blätter in gleicher Zeit im Dunkeln erzeugen. Ungleiche Species wirken dabei ungleich stark. Lamarck, Sennebier und Hubert haben bemerkt, daß verschiedene Species von *Arum*, während des thätigen Zustandes der Befruchtungswerkzeuge, um so viel wärmer als die umgebende Luft werden, daß es nicht allein mit dem Thermometer, sondern auch durch

das Gefühl zu entdecken ist. Saussure brachte eine Blüthe von einer Arumspecies, welche sich in diesem Erwärmungszustande befand, in eine Glasglocke, welche das 166fache ihres Volums atmosphärische Luft enthielt; wenige Augenblicke nach ihrem Einbringen unter die Glocke, beschlug sich das Glas inwendig mit einem Thau von der Ausdunstung der warmen Blume, und nach 24 Stunden fand sich in der Luft nicht mehr als 1 Procent Sauerstoffgas, alles Uebrige war in Kohlensäuregas verwandelt. Als er nachher Theile von in diesem Zustande befindlichen Blumen hineinbrachte, fand er, daß diese chemische Thätigkeit hauptsächlich den Geschlechtstheilen angehört, und durch Versuche mit einer Menge anderer Blüthen fand er, daß sie sich während der Befruchtungsperiode einen halben bis einen ganzen Grad wärmer erhalten, als die umgebende Luft ist. Gewöhnlich ist indessen die Wärme-Entwicklung dabei so schwach, daß man nur durch die größere Kohlensäuregas-Bildung während dieser Periode darauf schließen kann. Mitunter gehört die Erscheinung mehr den männlichen als den weiblichen Blüthen und ihren Theilen an, bisweilen ist es umgekehrt. Doppelte Blüthen verzehren weniger Sauerstoffgas und dauern länger, als einfache, und wahrscheinlich ist die schnelle Zerstörung, welche die Blüthen vieler Pflanzen bei diesem Prozeß erleiden, eine Folge dieses großen Verlustes an Kohlenstoff. Ob die Wärme-Entwicklung eine unmittelbare Folge der Kohlensäure-Bildung oder ein Product eines zugleich vor sich gehenden organischen Prozesses, wie bei den Thieren, ist, kann nicht entschieden werden; aber de Saussure fand, daß gewisse Blüthen eine höhere Temperatur hatten, als andere, welche dessen ungeachtet in gleicher Zeit ein größeres Quantum Kohlensäuregas bildeten.

Früchte verändern, während ihres grünen Zustandes, die Luft auf dieselbe Art, wie die Blätter; aber de Saussure fand, daß die sehr unreifen dabei oft eine Portion Sauerstoff aufsaugen und zurückbehalten, und er scheint geneigt zu sein, hiervon die Menge freier Säure

abzuleiten, welche sich in unreifen Früchten bildet. Bérard fand, daß diese Veränderung der Luft auch mit abgepflückten Früchten, die durch Liegen reifen, statt findet. Wird eine abgepflückte, noch nicht ganz reife Frucht in den luftleeren Raum eingeschlossen, so reift sie nicht, selbst nicht in einer Zeit von einigen Monaten, sobald sie aber herausgenommen wird, wirkt sie auf die Luft ein und reift. Dasselbe geschieht in Luft, welche keinen Sauerstoff enthält, eben so gut, wie im luftleeren Raum, so daß Ausschluss des Sauerstoffs hier die Hauptsache ist. Bérard hat gezeigt, daß Früchte wenigstens 2 bis 3 Monate lang in einem Glasgefäße aufbewahrt werden können, auf dessen Boden man ein feuchtes, zusammengeriebenes Gemenge von Kalkhydrat und schwefelsaurem Eisenoxydul gelegt hat, das so bedeckt ist, daß es die Frucht nicht berührt, worauf man das Gefäß verschlossen hat. Das von der Kalkerde abgeschiedene Eisenoxydul hat bald allen Sauerstoff absorbiert, und die Veränderung der Früchte wird unterbrochen. Pfirsiche, Pflaumen, Aprikosen, Kirschen können einen, aber Aepfel und Birnen drei Monate lang aufbewahrt werden. Nach dieser Zeit werden sie sauer und bekommen einen unangenehmen Geschmack. Früchte, welche in der Luft anfangen zu faulen, fahren fort sie auf gleiche Weise zu verändern wie zuvor; aber zuletzt hauchen sie Kohlensäuregas vom eigenen Kohlenstoff und Sauerstoff aus, und vergrößern dann das Volum der Luft. — Die Früchte bestehen gewöhnlich aus einem zelligen Gewebe, welches, mit Ausnahme der Kerne, nur 2 bis 4 Procent vom Gewicht der Masse ausmacht, und in welchem ein Saft eingeschlossen ist, der die Auflösung von Gummi, Zucker, Aepfelsäure und Eiweiß ist. Wenn die Frucht reift, nachdem sie vom Baume abgenommen ist, so vermindert sich das zellige Gewebe, es nimmt die Menge des Gummi's und Zuckers zu, es dunstet Wasser ab, und der Saft concentrirt sich. Reift die Frucht am Baume, so geschieht dieselbe Veränderung, aber unter Zuflufs von neuem Saft, der auf Kosten der Luft verändert wird; dadurch gewinnt die Frucht am

210 Quelle des Wasserstoffs der Pflanzen.

Bäume während des Reifens sowohl an Gewicht als an Volum, wovon das Entgegengesetzte bei den abgepflückten statt findet. In einer vollkommen reifen Frucht, d. h. welche ihren höchsten Zuckergehalt hat, wird dann der Zucker gemeinschaftlich mit dem zelligen Gewebe verändert; ersterer wird durch eine Art Gährung unter Entwicklung von Kohlensäuregas zerstört, während das letztere braun wird und seinen Zusammenhang verliert. Zugleich dunstet Wasser ab, und es vermindert sich das Volum der Frucht, wodurch sie runzlich wird.

Aus dem Vorhergehenden haben wir gesehen, wie sich die Pflanzen aus zwei der unorganischen Elemente, woraus sie zusammengesetzt sind, nämlich Kohlenstoff und Sauerstoff, zueignen. Wir haben aber nicht gefunden, woher sie den Wasserstoff nehmen und den Stickstoff, welchen gewisse ihrer Bestandtheile in bemerklicher Menge enthalten. Man hat viel über die Frage nachgedacht, ob Wasser auf die Art zersetzt werde, daß sein Wasserstoff in die ternären Verbindungen eingehen kann. Dieß ist jedoch nach dem, was wir bis jetzt erfahren haben, nicht wahrscheinlich; entweder würde sich der Wasserstoff mit der Pflanze vereinigen und Sauerstoff abgeschieden werden, oder es würde das Wasser sich gänzlich mit dem Kohlenstoff zu ternären Verbindungen vereinigen. Erstes scheint nicht der Fall zu sein, weil die Pflanzen in einer bloß feuchten Luft, die keine Kohlensäure enthält, kein Sauerstoffgas entwickeln. Es bleibt nun übrig zu untersuchen, ob Kohlensäuregas und Wassergas gemeinschaftlich zersetzt werden, so daß der Sauerstoff, welchen man allein von dem Kohlensäuregas herrührend glaubte, theils von der Kohlensäure und theils vom Wasser entwickelt worden ist, wodurch jedes Blatt sich aus der feuchten, kohlenstoffhaltigen Luft Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff in dem zu seiner Organisation nöthigen Verhältnisse zueignen würde. Dieß läßt sich aber wahrscheinlich nicht beweisen, denn die Versuche können nicht so angestellt werden, daß ihr Resultat entscheidend ausfällt. Man könnte z. B. fragen, ob in wasser-

freier Luft das Kohlensäuregas von den Pflanzen unzer setzt bleibe, so wie Wassergas in einer kohlenstofffreien Luft; aber eine wasserfreie Luft um eine lebende Pflanze ist eine Unmöglichkeit. — Das letztere dagegen, daß das Wasser gänzlich in Verbindung mit dem Kohlenstoff ternäre Verbindungen bilde, ist offenbar unrichtig, weil der kleinste Theil der Pflanzenstoffe Wasserstoff und Sauerstoff in gleichem Verhältniß wie im Wasser enthält; in den meisten ist der Wasserstoff im Ueberschuß, und in sehr wenigen überwiegt das Verhältniß des Sauerstoffs das des Wasserstoffs.

Auf gleiche Weise wissen wir nicht, woher der Stickstoffgehalt in den Pflanzen kommt; man hat nicht finden können, daß sie ihn aus der Luft aufnehmen; es bleibt daher für diese Bestandtheile nur übrig, daß sie die Pflanzen aus dem mit der Erde vermischten Moder (Humus) erhalten, welcher die Ueberreste anderer zerstörter organischer Stoffe ausmacht. Man glaubte lange, das bloße Wasser sei das Nahrungsmittel der Pflanzen, weil Saamen und Zwiebeln ohne andere flüssige Nahrung als Wasser wachsen und Blüthen treiben können. Man findet wirklich, daß die Pflanze bis zum Blühen kommt, so wie aber die Geschlechts-Verrichtungen beginnen, verwelkt sie, ohne Saamen bilden zu können. Als man den Saamen und die Zwiebeln, von denen solche Pflanzen ausgeschlagen waren, wog, fand man, daß die feste Masse der ausgebildeten Pflanze nach dem Trocknen weniger wog, als die trocknen Saamen oder Zwiebeln, von denen sie ausgeschlagen war, so daß das Wachstum eigentlich auf einer Umsetzung der Bestandtheile der Saamen und Zwiebeln, neben dem aus der Luft aufgenommenen Zuschuß von Kohlenstoff und Sauerstoff, beruht hat. Im Zusammenhang hiermit steht auch im Allgemeinen die Erfahrung der Landwirthe, daß auf Ackererde gezogene Pflanzen, wenn sie abgenommen werden, ehe sie in Saamen oder Frucht gehen, die Erde nicht ausmagern, daß sie aber einen guten Theil der durch's Düngen gewonnenen Fruchtbarkeit der Erde wegnehmen, wenn sie in

212 Wärme-Entwicklung bei der Vegetation.

Saamen gehen — ein Gegenstand, auf den ich bei der Lehre von der Ackererde zurückkommen werde.

Es ist lange eine Frage gewesen, ob die Erscheinungen des Pflanzenlebens im Allgemeinen von einer Veränderung der Temperatur begleitet sind. Man hat sich durch Thermometer-Versuche zu überzeugen gesucht, daß Bäume in ihrer Masse einige Grade höhere Temperatur behalten, als die umgebende Luft hat; die Resultate sind aber so veränderlich gewesen, daß man mit Grund behaupten kann, daß die Temperatur-Unterschiede, von dem Umstande abgesehen, daß das Holz langsamer die Temperatur der äußeren Luft annimmt, und man also, wenn sich diese ändert, die innere Masse des Baumes bisweilen etwas wärmer, bisweilen etwas kälter als die Luft aufsuchen wird. De Saussure hat mit großer Wahrscheinlichkeit vermuthet, daß Absorbition von Sauerstoffgas durch die grünen Theile der Pflanzen, wie bei den Thieren, eine Ursache von Wärme-Vertheilung sein könne, was gewiß kann es ihr nicht zugerechnet werden, weil es leicht von dem dünnen Blatte durch die umgebende Luft weggenommen wird. Der einzige Fall, wobei die Wärme-Entwicklung mit einiger Sicherheit bekannt ist, ist bei dem Befruchtungs-Prozesse, wie ich oben erwähnt habe, und hierbei entwickelt sich Wärme bisweilen in großer Menge. Hubert hat gefunden, daß die Blüten von *Arum cardifolium*, in dem Augenblick, wo sie sich öffnen, eine so starke Wärme entwickeln, daß 12 solche um eine Thermometerkugel gestellter Blumen die Temperatur von $+26$ bis $+62^{\circ}$ erhöhten.

Es ist allgemein bekannt, daß die Pflanzen kein Gefühl und keine Bewegung haben. Einige scheinen gleichwohl mit beiden begabt zu sein, z. B. *Mimosa sensitiva*, *Hedysarum gyrans*, *Dionea muscipula* u. m. a., und sehr viele Pflanzen verändern ihre Stellung nach der Tageszeit. Sehr viele Pflanzen ziehen ihre Blätter zusammen, schließen ihre Blumen, verändern ihre Stellung am Abend und gehen wieder auf beim Erscheinen der Morgensonne. Dies nannte Linné den Schlaf der Pflanzen. Man hat

zu einem Blumen-Horologium angewendet *). Es ist wenigstens ein Theil dieser Bewegungen eine Wirkung der Luft-Feuchtigkeit am Abend zu sein, wobei die Abdunstung von der Oberfläche der Pflanze aufhört und die Theile mehr mit Saft erfüllt werden; und sie treffen auf gleiche Weise bei Regen ein, so daß man das Verhalten verschiedener Pflanzen als Wetter-Prophezeiung annehmen kann. — Pflanzen, welche in wenig erhellten Räumen stehen, wenden sich immer nach der Oeffnung, durch welche das Licht eindringt, was man davon abgeleitet hat, daß das wärmeerregende Vermögen des Lichts die Wärme auf dieser Seite durch eine stärkere Abdunstung erhöht; eine Erklärung, die wohl nicht richtig sein dürfte, da sonst in nördlichen Climates alle Pflanzen nach Süden gebogen sein müßten; dagegen sieht man, daß bei einzeln stehenden Bäumen die Entwicklung der Zweige in der Krone auf der südlichen Seite üppiger ist, als auf der nördlichen. Verschiedene Pflanzen sind mit traubenförmig gewundenen Fäden, (*cirrus*) versehen, womit sie nahestehende Gegenstände umfassen und sich daran festhalten. Man hat diese Windungen ebenfalls der Wirkung des Lichts zugeschrieben, wiewohl dies nicht weniger leicht einzusehen ist.

Die grünen Theile der Pflanzen sterben jährlich ab, nicht in den gemäßigten und kalten Zonen bei Annäherung des Winters eintritt. Das durch den Frost erstarrte Wasser zerreißt durch die Ausdehnung des Eises die organischen Gebilde, welche beim nachherigen Schmelzen des Eises zu einer weichen Masse herunterfallen, welche bald die Farbe verändert und zerstört zu werden anfängt.

Die Bäume lassen ihre Blätter fallen, welche sich gerade an der Vereinigung des Blattstieles mit den Zweigen von denselben ablösen, und verändern bisweilen zuerst ihre Farbe in Gelb, Rothgelb oder Roth. Bei allen

*) Vergl. *Hoffberg's inledning till vaxtrikets kannedom* (Einleitung zur Kenntniß des Pflanzenreichs) 3 Uppl. p. 43.

214 Nähere Bestandtheile der Pflanzen.

denjenigen Pflanzen, welche vor Annäherung des Herbstes reife Saamen gegeben haben, stirbt der ganze umgebende Stengel ab und trocknet aus, indem die Saamen reif wurden, und das Saamentragen ist dabei so bestimmt die Ursache der Vertrocknung des Stengels, daß Pflanzen mit jährlicher Wurzel (d. h. welche jährlich abgehen) mehrere Jahre lang am Leben erhalten werden können, wenn man immer den Stengel abschneidet, ehe er in Blüthe geht, worauf die Wurzel nach und nach einen neuen treibt. Man hat sogar hiervon in der Landwirtschaft Vortheil gezogen, indem man z. B. Winter Roggen so früh säet, daß er noch vor dem Herbst eine fette Grasmasse giebt, die man abmähet, um sie als Futter zu benutzen, und das nachher Aufwachsende im nächsten Jahre in Saamen gehen läßt. Was das Alter der vieljährigen Pflanzen betrifft, so weiß man nichts mit Sicherheit darüber. Bei den Sträuchern sterben alte Wurzeln und Stämme, während aus ihnen ausgeschossene neue Wurzeln und Stämme zu leben fortfahren. Hohe Bäume sterben selten an Alter; sieht man einen vertrockneten Baum, so ist er gewöhnlich in Folge von Zufälligkeit ausgegangen. Die Bäume nehmen beständig an Dicke zu, aber bei einem gewissen Alter stirbt und fault der Kern und dieß nimmt beständig zu, bis daß zuletzt nur der zunächst der Rinde sitzende Holz frisch ist, wo dann der Baum gewöhnlich durch Stürme abgebrochen und umgeworfen wird, und ausgeht.

Nähere Bestandtheile der Pflanzen.

Die Anzahl der einzelnen, in dem Pflanzenreich gebildeten Stoffe ist sehr groß; der größte Theil davon vielleicht noch unbekannt. Die im Thierreiche erzeugten Stoffe sind dagegen bei weitem nicht so mannigfaltig. Gewisse Stoffe sind allen Pflanzen gemeinschaftlich, und scheinen das Material zu sein, woraus die anderen näher bereitet werden sollen. Solche sind Zucker, Gum

Stärke, einige Säuren, der grüne Farbstoff der Blätter u. s. w., wiewohl auch diese bisweilen bei ungleichen Geschlechtern veränderlich sind. Einige Stoffe sind gewissen natürlichen Ordnungen eigenthümlich, andere gewissen Geschlechtern, und seltener ist ein Pflanzenstoff bloß einer einzigen Species eigenthümlich. Ich habe in dem Vorhergehenden erwähnt, daß die näheren Bestandtheile der Pflanzen, z. B. Zucker, fette Oele, flüchtige Oele, für sich eigene Genera ausmachen, in welchen sich mehrere Species finden; z. B. von Zucker kennen wir den Rohr-, Trauben-, Manna- und noch mehrere Arten von Zucker; von fetten Oelen ist die Anzahl der Arten noch größer. Es ist noch nicht möglich, durch Versuche mit voller Gewißheit auszumitteln, ob diese ungleichen Species von einer und derselben Art Stoffen von der Ungleichheit in den Proportionen ihrer Elemente herrühren, oder ob sie vielleicht von einer größeren oder kleineren Menge fremder Körper herrühren, die innig mit dem gemeinschaftlichen, allen Species gleichen Hauptstoffe verbunden sind, wie es durch Chevreul's Versuche höchst wahrscheinlich geworden ist, daß der Gerbstoff aus einem eigenen, mit einer Säure verbundenen Extract besteht, welche erstere bald die eine, bald die andere sein kann, und am häufigsten Galläpfelsäure ist. Dieses Verhältniß zur völligen Gewißheit ausgemacht zu haben, wäre für die Pflanzenchemie, zumal für die Lehre von der atomistischen Zusammensetzung der Stoffe, von der höchsten Wichtigkeit, und ich werde später darauf zurückkommen.

Die Ordnung, in welcher die Pflanzenstoffe abgehandelt werden, kann gleichgültig sein, wenn sie nur auf ein Prinzip gegründet ist. Das Richtigste wäre wohl, zuerst solche Stoffe abzuhandeln, welche allen Pflanzen gemein sind, darauf solche, welche größeren oder kleineren Pflanzengruppen angehören, und zuletzt diejenigen, welche nur einzelnen Species zukommen; so lange aber nicht die Art, wie die specielleren Stoffe aus den allgemeineren gebildet werden, bekannt ist, bleibt eine solche Eintheilung ohne besonderen Vortheil. Um die elektro-

chemische Ordnung zu befolgen, welche für die Aufstellung der unorganischen Natur vielleicht das einzige richtige Prinzip ist, wiewohl sie weniger leicht auf die organische anwendbar ist, will ich die Pflanzenstoffe in drei Hauptklassen eintheilen: saure, basische und indifferentente.

Unter der ersten Klasse, oder den sauren, verstehe ich solche, welche auf blaue Pflanzenfarben sauer reagieren, mehr oder weniger deutlich sauer schmecken, und mit Salzbasen unorganischen Ursprungs neutrale Salze bilden, also mit einem Wort Pflanzensäuren.

Die zweite Klasse, oder die basischen Pflanzenstoffe, umfaßt die sogenannten Pflanzenalkalien, oder richtiger, die vegetabilischen Salzbasen, welche erst seit 1816 entdeckt wurden, und wovon wir also wahrscheinlich noch erst eine sehr geringe Anzahl kennen, im Vergleich mit allen, welche existiren, und die mit der Zeit wahrscheinlich entdeckt werden.

Die dritte Klasse, oder die indifferenten, ist die größte. Sie begreift alle solche Stoffe, welche nicht deutlich sauer oder basisch sind. Es fehlt ihnen dessen ungeachtet nicht die Verwandtschaft zu stärkeren Säuren und Basen, sie heben aber nicht durch die Vereinigung mit diesen ihre Eigenschaften als Säure oder als Salzbasis auf. Zu dieser Klasse gehören Zucker, Gummi, Stärke, Oel, Indigo u. s. w.

1. Klasse. Pflanzensäuren.

Mehrere Pflanzensäuren sind dem größeren Theile der Pflanzen gemein, z. B. Essigsäure, Aepfelsäure, Citronensäure u. a. Diese zeichnen sich im Allgemeinen dadurch aus, daß sie starke Säuren, mit einer großen Sättigungscapacität, sind. Andere dagegen gehören nur gewissen Pflanzengeschlechtern an, z. B. die Chinasäure. Freie Pflanzensäuren finden sich meist in Früchten und dem gröberen zelligen Gewebe, welches ihr Fleisch ausmacht, und bisweilen in Pflanzenblättern, die dann von

der Natur sind, daß sie jährlich abfallen. Man findet gegen niemals in Saamen, in Wurzeln oder in herzigen Pflanzen. Mit Kalk oder Kali gesättigt, finden sie in den Pflanzensäften in allen Theilen der Pflanzen.

Die Anzahl dieser Säuren ist sehr groß. Wir kennen mehr als 20 davon, und fast jede gut analysirt uns mit neuen bekannt. Es ist einleuchtend, daß je mehr die Anzahl derselben zunimmt, desto weniger die ausführlichen Kenntniß einer jeden Säure in chemischer Hinsicht vermindert wird, und wenn auch alle die Säuren, welche jetzt hinsichtlich ihrer Eigenschaften mehr oder weniger gut untersucht, vollständig gekannt wären, eine so ausführliche Beschreibung derselben, wie von den unorganischen Säuren für den Leser doch nicht von Interesse sein würde. Die gemeinen Pflanzensäuren dagegen interessieren eben so sehr, wie die unorganischen; sie werden, wie diese, in chemischen Versuchen als Reagentien angewendet, und manche sind oft von einer bedeutenden technischen oder medicinischen Anwendbarkeit. Ich habe dieselben schon früher abgehandelt. Sie sind: Essigsäure, Weinsäure, Citronensäure, Aepfelsäure, Gallensäure, Benzoësäure. Ich werde mich also hier auf die Beschreibung der weniger allgemeinen Säuren beschränken. Diejenigen Säuren dagegen, welche sich nicht in der Natur vorfinden, sondern durch Einwirkung chemischer Reagentien aus Pflanzenstoffen erzeugt werden, wie die Talgsäure, Oelsäure, Margarinsäure, Kampher-, Korksäure u. a., werde ich bei den Substanzen behandeln, woraus sie entstehen.

Chinasäure. (*Acidum kinicum.*)

Diese Säure wurde von Vauquelin entdeckt. Man hat gefunden zu haben, daß ein aus der Chinarinde bereitetes Salz zu Lyon bereitetes Salz die fieberver-

treibende Kraft der China habe; dieses Salz wurde von Vauquelin analysirt, welcher es aus Kalkerde in Verbindung mit einer Säure zusammengesetzt fand, welcher er den Namen *Acidum kinicum* gab. Diese Säure ist wahrscheinlich, aufer in der Rinde des Chinabaumes, noch in mehreren anderen Rinden enthalten; ich habe sie im Splinte der Tanne gefunden, und halte es für wahrscheinlich, daß sie ein Bestandtheil des Splintes der meisten Baumarten ist.

Aus der Chinarinde erhält man sie auf folgende Art: Die Rinde wird so lange mit kaltem Wasser ausgezogen, als dieses noch etwas auflöst, worauf die Flüssigkeit zur Extractdicke abgedampft wird. Dieses wird dann mit Alkohol übergossen, welcher eine braune, zähe Materie ungelöst läßt, die man mit Alkohol wohl abwäscht. Man löst sie dann in Wasser auf, filtrirt, dampft zur Consistenz von Syrup ab, und läßt sie an einem warmen Orte eine Woche lang stehen. Während dessen schießt aus der Auflösung ein bräunliches Salz in tafelförmigen Krystallen an. Die nicht mehr krystallisirende Flüssigkeit wird abgessen, die Krystalle auf Löschpapier getrocknet und dann umkrystallisirt, bis sie farblos erhalten werden. Diese Krystalle sind chinasaurer Kalkerde. Pelletier und Caventou schreiben vor, eine Infusion von China mit kaustischer Talkerde zu kochen, von der man so lange zusetzt, bis die Flüssigkeit die Farbe verloren hat und nur noch gelb ist. Sie wird nun zur Consistenz von Syrup abgedampft und einige Tage lang stehen gelassen, wobei sie in körnigen Krystallen anschießt. Diese werden mit Alkohol ausgezogen, welcher ein fast farbloses Salz von chinasaurer Talkerde ungelöst läßt. Dieses Salz wird in Wasser aufgelöst, die Talkerde mit Kalkerde niedergeschlagen, deren Ueberschuß nachher mit Kohlensäure abgeschieden wird, und das Kalksalz zum Anschiefen abgedampft. Auf diese Art erhält man weit mehr chinasaurer Kalkerde als auf die vorige. Zur Gewinnung der Säure aus dem Kalksalze schreibt Vauquelin die Zersetzung mit Oxalsäure vor, von der man so viel zu-

dafs die Kalkerde gerade ausgefällt wird. Diefs
 schwer, wenn nicht unmöglich. Ich habe diese Säure
 die Weise dargestellt, dafs die braune, in Alkohol
 lösliche Substanz, in Wasser aufgelöst, mit frisch
 em Thonerdehydrat vermischt und damit so lange
 kochte, bis die Flüssigkeit fast farblos geworden
 war, worauf die Auflösung zum Anschiefen abgedampft
 wurde. Das in Wasser aufgelöste Salz wurde mit basisch
 saurem Bleioxyd zersetzt, und der Niederschlag, wel-
 cher basisch chinasaures Bleioxyd ist, darauf mit Schwefel-
 wasserstoffgas zersetzt. Nur auf diese Weise kann man
 sein, dafs die Säure frei von Kali sei, weil das in
 Alkohol unauflösliche Salz aus der Chinarinde neben dem
 auch eine nicht unbedeutende Portion chinasaures Kali
 enthält. Aus dem Tannensplint wird diese Säure ganz
 derselben Art, wie aus der Chinarinde erhalten; aber
 das Salzsalz aus jenem hält kein chinasaures Kali, und hat
 einen kleinen Ueberschufs an Säure, der mit Ammoniak
 abgetrieben werden muß, um eine kleine Menge phosphor-
 kalk- und Talkerde abzuscheiden, die darin auf-
 gelöst sind; wenn man aber aus der China $2\frac{1}{2}$ Procent
 Alkohol unlöslicher chinasaurer Salze erhält, so erhält
 man aus dem Tannensplint nur $\frac{1}{2}$ Procent. Deschamps
 hat, man erhalte aus 100 Th. Chinarinde bis zu 7 Pro-
 cent gereinigtes Salz; ich erhielt indessen daraus zusam-
 men nicht mehr als $2\frac{1}{2}$ Procent in Alkohol unlöslicher
 Salze *).

Auf eine dieser Arten bereitet, erhält man die Chi-
 nasäure mit Wasser verdünnt; dasselbe wird abgedampft,
 worauf sie gewöhnlich gelb wird, und zuletzt einen scharf-
 schmeckenden rein sauren Syrup zurückläßt, aus dem Va-
 uerianische Krystalle erhielt, als er ihn, eine Woche lang
 stehen gelassen, schnell umrührte, wobei die Säure in die
 stehenden Blättern anschoß. Ich habe sie nicht krystal-

*) Ich erlaube mir übrigens auf meine vergleichende Untersuchung
 der Chinarinde und des Tannensplintes zu verweisen in *Asth. i
 sik, Kemi och Mineral. III. 347.*

lisirt gesehen. Sie ist nicht flüchtig. Bei der trocknen Destillation giebt sie Wasser, welches freie Säure und brenzliches Oel, und hinterläßt eine poröse Kohle. Camphor findet sich nicht unter den Destillationsprodukten. In ihrem Verhältnisse zu den Salzbasen zeichnet sich die Chinasäure dadurch aus, daß sie mit den meisten in Wasser auflösbaren Salzen giebt, so daß die china-säurehaltigen Salze nicht von neutralen Blei- oder Silber-Salzen gefällt werden, und die freie Säure fällt nicht die Salze von Quecksilberoxydul, Chromoxyd, Kupferoxyd, Manganoxydul u. a., nicht einmal Chlorgold. Diese Eigenschaft, wie die, von basischen Bleisalzen gefällt zu werden, daß ihre neutralen Salze, mit Alkalien und Erden mischbar, in Alkohol unauflöslich sind, unterscheiden diese von anderen Pflanzensäuren.

Von chinasäurehaltigen Salzen sind sehr wenige unter den Salzen bekannt. Das einzige, bis jetzt etwas bekannte ist die china-säurehaltige Kalkerde, deren Darstellung schon angeführt ist. Dieses Salz krystallisirt schwierig; dampft man es ab, so trocknet es zu einer gummiartigen Masse ein. Wenn man seine Auflösung sich selbst überlassen, so schießt es in schweben vierseitigen etwas biegsamen Blättern an; sie sind fast geschmacklos und lösen sich in 5 Th. kalten Wassers auf. Chinasäurehaltige Kalkerde, deren Darstellung schon erwähnt wurde, ist in Wasser leicht auflöslich, und die Lösung nur schwierig und beim freiwilligen Verdampfen in Krystallen an.

Brenzliche Chinasäure, *Acidum pyrokineticum*. Pelletier und Caventou fanden, daß, wenn die Chinasäure destillirt wird, mit dem brenzlichen Oel und stechende Dämpfe übergehen, die sich in der Vorlage condensiren, und daß sich im Retortenhalse kleine Krystalle absetzen. Die Säure des Destillats, so wie die Krystalle, sind diese brenzliche Säure. Man löst die Krystalle in dem sauren Wasser auf, filtrirt durch ein Filter vom Oele ab, und dampft die Flüssigkeit zur Trockne ab, worauf die Säure beim Erkalten in Krystallen, divergirenden, fast farblosen Krystallen an-

die man durch wiederholte Krystallisation noch weißer erhält. Diese Säure bildet mit den Alkalien, der Baryterde und Kalkerde leicht auflösliche, mit Bleioxyd und Silberoxyd aber schwer auflösliche Salze, und die neutralen Salze der beiden letzteren werden von brenzlicher Chinasäure schwach gefällt. Die ausgezeichnetste Eigenschaft dieser Säure ist, mit schwefelsaurem Eisenoxydul einen schönen grünen Niederschlag zu geben, und sie ist ein so empfindliches Reagens für Eisenoxydul, daß sie von Kalkerde oder Baryterde, welche mit Eisen verunreinigt sind, eine grüne Farbe bekommt. Sie trübt nicht die Auflösung von weinsaurem Antimonoxyd-Kali.

Mekonsäure. (*Acidum meconicum.*)

Diese Säure wurde zugleich mit dem Morphin, mit welchem sie im Opium verbunden ist, von Sertürner entdeckt. Den Namen Mekonsäure leitete er von *Meconium* ab, womit man in der Pharmacie die schlechteren Arten von Opium zu bezeichnen pflegt. Bis jetzt hat man dieselbe in keinem anderen Pflanzenstoffe gefunden. Sertürner erhielt die Mekonsäure auf folgende Art: Das Opium wurde mit Wasser ausgezogen, und das Morphin mit kaustischem Ammoniak gefällt. Die filtrirte Flüssigkeit wurde mit Chlorbaryum vermischt, der Niederschlag wohl gewaschen und durch verdünnte Schwefelsäure zersetzt. Die Auflösung wurde bis zur Krystallisation der Mekonsäure abgedampft, die Krystalle wurden herausgenommen, gut getrocknet und sublimirt.

Robiquet, welcher gefunden zu haben glaubte, daß nach dem Verfahren von Sertürner viel Säure unausgefällt in der Opium-Infusion bleibe, schreibt vor, dieselbe mit 2 Procent vom Gewicht des Opiums kaustischer Talkerde zu kochen, wodurch das Morphin von der Mekonsäure geschieden, und zugleich mit mekonsaurer Talkerde und gefärbten extractiven Stoffen gefällt wird. Der Niederschlag wird zuerst, zur Ausziehung dieser färbenden Stoffe, mit kaltem Spiritus behandelt, darauf mit kochen

dem, absolutem Alkohol, welcher als Morphin anzieht und zuletzt wird er in verdünnter Schwefelsäure aufgelöst. Diese saure Flüssigkeit ist braun; sie wird nun mit Chlorbaryum gefällt, wodurch ein in's Rosenrothe ziehender Niederschlag erhalten wird, der aus schwefelsaurer und mekonsaurer Baryterde besteht, verbunden mit einem färbenden Stoff, welcher ihn in Wasser unauflöslicher macht als er in seinem reinen Zustande sein würde. Dieser Niederschlag wird wohl gewaschen, und hierauf lang mit verdünnter Schwefelsäure digerirt, worauf man die Flüssigkeit filtrirt und zur Krystallisation abdampft; die Krystalle bilden dendritische oder feine divergirende Nadeln von brauner Farbe; sie werden schnell mit etwas kaltem Wasser abgespült, gut getrocknet und in einer Glasretorte mit flacher Kugel und weitem Halse bei schwacher, aber lange fortgesetzter Hitze sublimirt, weil bei einer stärkeren der mit der Säure verbundene, nicht flüchtige Farbestoff zerstört wird und ein brenzliches Oel erzeugt, welches das Sublimat verunreinigt. Im Allgemeinen sublimirt diese Säure eben so leicht wie Benzoösäure.

Die sublimirte Säure ist farblos. Sie bildet gewöhnlich, wenn man die Sublimation in einem Kolben vornimmt, wo das Sublimat so leicht schmilzt und wieder herunter rinnt, auf der inneren Fläche des Glases einen den Eisblumen auf den Fensterscheiben ähnliche krystallinische Kruste; wird sie aber in einer Retorte sublimirt, wo dies nicht geschehen kann, so erhält man sie entweder in langen Nadeln, in vierseitigen Blättern oder in sehr ausgezogenen Octaëdern. In Wasser aufgelöst und zur Krystallisation abgedampft, schießt sie in Schuppen an. Sie schmilzt zwischen $+120^{\circ}$ und 125° , und fließt wie ein Oel; bei dieser Temperatur fängt sie an sich zu verflüchtigen, und verdampft ohne Zersetzung und Rückstand, wenn die Hitze nicht zu stark wird. Sie hat einen sauren, kühlenden, hintennach bitteren Geschmack. Sie ist in Alkohol auflöslich. Mit der Auflösung von Goldchlorid vermischt und erhitzt, wird sie zersetzt, und es schlägt sich metallisches Gold nieder. Ein ausgezeichneter Che-

Charakter dieser Säure, wodurch sie sich von allen übrigen ihrer ähnlichen Säuren unterscheidet, ist, daß sie den Eisenoxydsalzen, und sogar, nach Vogel, der Dinte und dem damit Geschriebenen eine rothe Farbe ertheilt, ganz ähnlich derjenigen, welche durch Schwefelcyanwasserstoffsäure entsteht. Bei medico-legalen Untersuchungen benutzt man diese Reaction auf Eisenoxydsalze, um Vergiftungen mit Opium zu entdecken. Die Zusammensetzung der Mekonsäure ist noch nicht näher bestimmt. Eben so unbekannt ist ihre Sättigungscapacität. Sie scheint, aus einigen, mit ihren Salzen angestellten Analysen zu schließen, sehr groß zu sein; sie stimmen aber nicht so miteinander überein, daß man sie für richtig halten könnte.

Die mekonsauren Salze sind von Sertürner, Choulant und John untersucht worden. In der Glühhitze werden sie zersetzt und die Mekonsäure zerstört. Im Allgemeinen sind sie in Alkohol unauflöslich. Mekonsaures Kali schießt in Tafeln und Blättern an, ist in 2 Th. kalten Wassers auflöslich und enthält Krystallwasser. Mekonsaures Natron erhält man, nach Sertürner, wenn eine spirituöse Infusion von Opium mit einer spirituösen Auflösung von essigsauerm Natron vermischt wird, wobei sich niederschlägt und mit Alkohol gewaschen werden kann. Auch wird es aus der mekonsauren Baryterde erhalten, wenn diese mit einer Auflösung von schwefelsaurem Natron in Wasser digerirt wird. Dieses Salz bedarf zur Auflösung 5 Th. Wassers, und schießt nach dem Abampfen in feinen Nadeln an. Es enthält viel Krystallwasser. Nach John's Versuchen giebt es ein saures und ein basisches mekonsaures Natron, welche beide krystallisirbar und in Wasser leicht auflöslich sind. Das basische Salz verwittert in der Luft. Mekonsaures Ammoniak schießt in vierseitigen Prismen an, löst sich in 1 $\frac{1}{2}$ fachen seines Gewichts Wasser auf, verliert beim Erhitzen Wasser, und läßt sich dann ohne Zersetzung sublimiren. Mekonsaure Baryterde ist in Wasser schwer auflöslich; Barytwasser wird jedoch nicht von Mekonsäure gefällt. Ihre Unauflöslichkeit beim Ausfäll-

len aus dem Opiumextract rührt von Einmengung anderer Stoffe her. Mekonsaure Kalkerde schießt in Krystallen an, enthält Krystallwasser und bedarf Wassers zur Auflösung. Mit Ueberschuß an Säure schießt sie in Prismen an und ist in Wasser schwerlöslich. Mekonsaure Talkerde ist neutral schwer auflöslich; saures Salz ist leicht auflöslich; schießt in glänzenden, platten Nadeln an; schmeckt sauer und bitter. Mekonsaures Silberoxyd bildet ein unlösliches, hellgelben Niederschlag. Quecksilberoxyden nicht von mekonsauren gefällt. Mekonsaures Kupferoxyd bildet einen smaragdgrünen, und mekonsaures Bleioxyd einen weißen Niederschlag. Mekonsaures Eisenoxydul giebt ein leicht auflösliches, ungefärbtes Salz, das an der Luft, und noch durch Zusatz von Salpetersäure, roth wird. Mekonsaures Eisenoxyd bildet ein auflösliches, schön rothes Salz, das im Sonnenlichte, durch schwefelichte Säure und Zinnoxydul die rothe Farbe verliert, sie aber durch Oxidation wieder bekommt. Goldchlorid zerstört, färbt gelb, nicht seine rothe Farbe, wodurch es sich von dem rothen Schwefelcyaneisen unterscheidet, das dadurch weiß wird.

Lactucasäure.

Diese Säure ist neuerlich von Pfaff im Saft der *Lactuca virosa* gefunden worden. Sie soll erhalten werden, wenn man den ausgepressten und geklärten Saft mit schwefelsaurem Kupferoxyd oder essigsaurem Kupferoxyd fällt, und den Niederschlag nach dem Auswaschen mit Schwefelwasserstoffgas zersetzt, worauf man die Lactucasäure abdampft. Sie schießt in farblosen Krystallen an, ist scharf sauer und gleicht der Oxalsäure, unterscheidet sie sich jedoch dadurch, daß sie nebst Eisenoxydsalzen reichlich mit grüner, und das schwefelichte Kupferoxyd mit brauner Farbe fällt. Mit Talkerde schießt sie ein schwer auflösliches Salz. Im Uebrigen ist die Lactucasäure in den Verhältnissen nicht näher untersucht.

Senfsäure. (*Acidum sinapicum.*)

iese Säure wurde von Henry d. j. und Garot
kt. Sie kommt in der Natur in verschiedenen Cru-
, in mehreren Theilen aber vorzüglich im Saamen
en vor. Henry und Garot fanden sie zuerst in
sgepressten Oele vom Senf, und da sie zugleich fan-
als Schwefel einen Bestandtheil derselben ausmacht,
nten sie dieselbe *acide sulfosinapique*; mit dem
aber anzudeuten, daß die Säure Schwefel enthält,
h für ganz überflüssig.

e Säure wird auf folgende Art erhalten: Das aus-
e fette Oel von Senfsaamen, zumal vom gelben,
am meisten giebt, wird kalt einige Wochen lang
n 1½fachen seines Gewichts Alkohol von wenig-
827 oder noch stärkerem, zusammengestellt, und
nische während dessen öfters umgeschüttelt. Nach-
r Alkohol abgegossen ist, wird er mit etwas Was-
nisch und die Hälfte vom Alkohol abdestillirt.
kalten schießen perlmutterglänzende Schuppen an,
vom Alkohol aufgenommenes krystallinisches Fett
Die Flüssigkeit wird abgegossen, von diesem Fett
und freiwillig verdampfen gelassen, worauf die
nrein in Gestalt einer körnig angeschossenen, röth-
masse zurückbleibt. Sie enthält nun einen fetten
en man mit Aether auszieht, indem man sie da-
wiederholten Malen in einer verschlossenen Fla-
cerirt; die ersten Antheile Aether färben sich von
gelösten Fett carminroth. Sobald der Aether nichts
fnimmt, wird das übriggebliebene in wenigem
aufgelöst, filtrirt, und freiwillig verdampfen ge-
oder im luftleeren Raum über Schwefelsäure ab-
t. Die gereinigte Senfsäure schießt dann in klei-
zenden, halb kugelförmigen, krystallinischen Grup-
er in kleinen sternförmigen Figuren an, ähnlich
wirten Eisenblech. Die krystallisirte Säure hat
wach gelbliche Farbe, schmeckt bitter, stechend,
cht schwefelartig. Sie röthet nicht die Lackmus-

tinctur, sondern bleicht sie, gerade so wie eine Auflösung eines unterschweflichtsauren Salzes; aber eine Malvenblau-Tinctur wird davon geröthet. Ob diese Krystalle eine wasserhaltige Säure sind, ist unbekannt. Sie ist wohl in Wasser als in Alkohol, und auch in geringe Menge in Aether auflöslich. Die Auflösung kann vollkommen eingetrocknet werden, und die trockne Säure wird von einer Temperatur, welche nicht über $+110^{\circ}$ geht, nicht zersetzt. In der trocknen Destillation wird sie zersetzt, ein kleiner Theil der Säure sublimirt unverändert, das meiste wird zerstört und bildet Kohlen-säure, Schwefelwasserstoffgas und Ammoniak, und hinterläßt Kohle. Auch wenn eine Auflösung der Säure in Wasser bei Zutritt der Luft längere Zeit gekocht wird, zersetzt sie sich, und ein über die Auflösung gehängtes mit einem Bleisalze bestrichenes Papier schwärzt sich durch Entwicklung von Schwefelwasserstoffgas, und dies ist die Ursache, weshalb metallische Destillationsgefäße sich schwärzen, wenn man darin Wasser über Senf oder Meerrettig destillirt. — Diese Säure ist wegen ihrer Zusammensetzung höchst merkwürdig; sie besteht nämlich aus nicht weniger als 5 einfachen Körpern, und enthält, außer den gewöhnlichen drei Elementen der Pflanzensäuren, auch Stickstoff und Schwefel. Durch Zersetzung der Senfsäure mittelst Königswasser wurde der Schwefelgehalt mit einiger Sicherheit zu 17,33 Procent vom Gewichte der Säure bestimmt. Im Uebrigen fanden Henry und Garot, daß die Säure in 100 Th. enthält 11,91 Th. Sauerstoff, 49,5 Th. Kohlenstoff, 8,3 Th. Wasserstoff und 12,96 Th. Stickstoff. Diese letzteren Angaben möchten jedoch nicht so zuverlässig wie der Schwefelgehalt sein. Die Sättigungscapazität dieser Säure ist nicht ausgemittelt, und fiel für die Salze verschiedener Basen ungleich aus, vermuthlich wegen der Krystallwasser-Gehalt des Salzes zur Säure gerechnet wurde, und die höchste, welche Henry und Garot fanden, war beim Natronsalze, nämlich 2,46, was $\frac{1}{2}$ vom Sauerstoff der Säure ist. — Man kann wohl fragen, ob diese Säure wirklich eine selbstständige Säure sei, oder

vielleicht eine Verbindung von unterschweflichter mit einer organischen Materie sein könnte, analog den Verbindungen der Säuren des Schwefels mit organischen Stoffen, die ich später erwähnen werde, und die durch Einwirkung von Schwefelsäure auf Alkohol, brenzliches Oel, Naphthalin u. a. bilden, die durch Salzbasen zersetzt werden, sondern die organische Materie mit in die Salze nehmen, welche sie bilden.

Die Senfsäuren Salze mit den Alkalien und alkalischen Erden sind farblos, und durch einen eigenen bitersamen Geschmack ausgezeichnet. Senfsaures Kali und Senfsaures Natron schießen beim freiwilligen Verdampfen in kleinen Krystallgruppen von der Größe von Körnern an. Senfsaures Ammoniak bildet kleine rhomboedrische, wie es scheint octaëdrische Krystalle. Senfsaure Baryterde schießt theils in kleinen, in der Luft zerfallenden Nadeln, theils in einer warzigen Masse an, die in Wasser sehr leicht auflöslich. Senfsaure Strontianerde gleicht dem Baryterdesalz, hat aber wegen der Neigung zu krystallisiren. Senfsaure Kalkerde ist ebenfalls leicht auflöslich und schießt warzig an. Die Senfsäure färbt neutrale Eisenoxydsalze purpurroth, und diese Reaction ist so empfindlich, daß man auch sehr kleine Mengen dieser Säure dadurch entdeckt. Henry und Berzelius zeigten mittelst dieser Reaction, daß die Senfsäure in dem Saamen von Meerrettig, Rothkohl, Rüben, Petersilien, und in dem in Glasgefäßen über Meerrettig getrockneten Wasser vorkomme. Dagegen fand sie sich nicht in dem Saamen oder dem Kraut von Kresse oder Senebier. Die Senfsäure fällt eine Auflösung von basischen Bleioxyd, von salpetersauren Quecksilberoxydul und salpetersauren Silberoxyd, die letzteren in Gestalt von käsigen Flocken, die sich bei Erhitze zersetzen und schwärzen. Der Niederschlag von Silberoxyd wird nicht von Salpetersäure aufgelöst. Senfsäure färbt eine Auflösung von schwefelsaurem Eisenoxyd grün, und schlägt nach einer Weile ein weißes Präzipitat daraus nieder.

Schwammsäure. (*Acidum fungicum.*)

Diese Säure wurde von Braconnot entdeckt. Sie kommt in einem großen Theil der Schwämme vor; theils frei, wie in *Peziza nigra*, theils als schwammsaures Kali, wie in *Hydnum hybridum*, *H. repandum*, *Boletus juglandis*, *B. pseudoigniarius*, *Merulius cantharellus*, *Phallus impudicus* u. a. Diese Säure wird auf folgende Weise dargestellt: Der Schwamm (Braconnot machte den Versuch mit *Boletus juglandis*) wird zerstoßen, der Saft ausgepresst und erhitzt, bis das vegetabilische Eiweiß geronnen ist, dann wird filtrirt und bei gelinder Wärme zum Syrups-Consistenz abgedampft. Der Rückstand wird mit Alkohol vermischt, welcher das schwammsaure Kali aufgelöst läßt, das mit Alkohol gut gewaschen wird. Man erhält eine braune Masse unaufgelöst, die in Wasser aufgelöst, filtrirt und mit salpetersaurem Bleioxyd gefällt wird. Der Niederschlag, welcher unreines schwammsaures Bleioxyd ist, wird mit Schwefelsäure zersetzt, die mit dem 10fachen ihres Gewichts Wasser verdünnt ist. Die so erhaltene Schwammsäure wird mit Ammoniak gesättigt und zur Krystallisation abgedampft, was mehrere Male wiederholt werden muß, um sie von allen aus dem Schwamm mitfolgenden Materien zu befreien. Sobald man das schwammsaure Ammoniak vollkommen farblos erhalten hat, wird es wieder in Wasser aufgelöst und mit Bleizucker gefällt, worauf man den Niederschlag gut auswäscht, und entweder mit schwacher Schwefelsäure oder mit Schwefelwasserstoffgas zersetzt. Die filtrirte saure Flüssigkeit wird zum Syrups-Consistenz abgedampft.

Diese Säure ist farblos, scharf sauer, läßt sich nicht krystallisirt erhalten, und zerfließt wieder nach dem Eintrocknen.

Schwammsaures Kali und Natron sind beide in Wasser sehr leicht auflöslich, können nicht krystallisirt erhalten werden, und sind in Alkohol unauflöslich. Schwammsaures Ammoniak krystallisirt leicht mit Ueberschuß an Säure in großen regelmäßigen sechsseitigen

Prismen. Ist in 2 Th. kalten Wassers löslich. Schwamm-saure Baryterde bildet beim Abdampfen eine krystal-linische Salzmasse, und ist in 15 Th. kalten Wassers lös-lich. Schwammsaure Kalkerde ist in Wasser schwer auflöslich, von dem sie, bei gewöhnlicher Temperatur, 80 Th. bedarf. Beim Abdampfen schießt sie in kleinen vierseitigen, in der Luft unveränderlichen Prismen an. Schwammsaure Talkerde schießt in körnigen, in Wasser leicht auflösliehen Krystallen an. Schwamm-saure Thonerde trocknet zu einer gummiartigen Masse ein. Eben so schwammsaures Manganoxyd u. l. Schwammsaures Zinkoxyd schießt in leicht auflös-lichen Parallelepipeden an. Schwammsaures Blei-oxyd wird als ein weißes unauflösliches Pulver gefällt, wenn Schwammsäure oder eines ihrer Salze in eine Auf-lösung von essigsurem Bleioxyd getropft wird. Der Nie-derschlag ist in Essigsäure auflöslich. Schwammsaures Silberoxyd ist in Wasser unauflöslich, aber in einem Ueberschuß von Säure so leicht auflöslich, daß es nicht von freier Schwammsäure aus salpetersaurem Silberoxyd gefällt wird.

Boletsäure. (*Acidum boleticum.*)

Diese Säure wurde ebenfalls von Braconnot ent-deckt. Sie kommt im *Boletus pseudoignarius* vor, aus dem er sie auf folgende Art erhielt: Der, bis zur Syrups-consistenz abgedampfte, ausgepresste Saft wurde mit Alko-hol behandelt, der eine weiße Materie unaufgelöst liefs. Nach dem Auswaschen mit Alkohol wurde dieselbe in Wasser aufgelöst und mit salpetersaurem Bleioxyd gefällt. Der mit Wasser angemachte Niederschlag wurde mit Schwe-felwasserstoffgas zersetzt, und die so erhaltene verdünnte Säure abgedampft, wobei sie in Krystallen anschoß und eine sehr saure Mutterlange hinterliefs, die aus Schwamm-säure und Phosphorsäure bestand. Die Krystalle wurden wieder in Alkohol aufgelöst, welcher ein Kalksalz zurück-liefs, und als diese Auflösung abgedampft wurde, erhielt er die Säure in noch reineren Krystallen.

Die Boletsäure ist weiß, bildet vierseitige prismatische Krystalle von saurem Geschmack, ähnlich dem Weinstein, röthet Lackmus, verändert sich nicht in Luft, knirscht wie Sand zwischen den Zähnen und löset sich in 180 Th. Wassers von $+20^{\circ}$, aber nur 45 Th. Alkohol auf. Sie ist flüchtig und läßt sich dem Theil nach unverändert sublimiren, wobei sie ein weißes Mehl, theils vierseitige Nadeln bildet; gegen die Operation kommt jedoch etwas braunliches und eine stark nach Essigsäure riechende Flüssigkeit. Setzt man sich durch die Eigenschaft aus, das Eisenoxyd aus seinen Salzen auszufällen, das Oxyd fällt sie nicht.

Boletsaures Kali krystallisirt schwierig, ist in Wasser auflöslich, aber unauflöslich in Alkohol. Boletsaures Ammoniak schießt leicht in vierseitigen der Luft unveränderlichen Prismen an; bei höherer Temperatur schmilzt es, bläht sich auf und sublimirt sich. Boletsaure Baryterde ist sowohl in Wasser als in Salpetersäure schwer auflöslich. Sie krystallisirt, ist schwach säuerlich, brennt, auf glühendes Eisen gelblich mit rother Flamme und Knistern. Boletsaure Baryterde bedarf 100 Th. kalten Wassers zur Auflösung; sie schießt in vierseitigen Prismen an. Boletsaure Strontianerde ist in Wasser auflöslich. Eben so Boletsaure Manganoxydul. Boletsaures Eisenoxyd ist in Wasser auflöslich; die freie Säure löst das Eisen mit Wasserstoffgas-Entwicklung auf; die Auflösung ist trübe und trübt sich bald an der Luft. Boletsaures Eisenoxyd wird sowohl von der freien Säure als ihren niedergeschlagen, wenn sie mit Auflösungen von Ammoniakoxydsalzen vermischt werden; der Niederschlag ist weißlich-roth, und die Ausscheidung des Oxydes auf dem Filter vollkommen. Die Zukunft wird zeigen, welche Anwendung man hiervon in der chemischen Analyse machen können. Boletsaures Bleioxyd ist unauflöslich, löst sich aber in einem Ueberschuß von Säure auf; die freie Säure fällt salpetersaures Bleioxyd, beim

tein löst sich aber der Niederschlag wieder auf. Bolet-saures Kupferoxyd ist schwer auflöslich, und schlägt sich nach einer Weile, wenn man es durch doppelte Zersetzung bildet, in feinen, seidenglänzenden Nadeln nieder. Boletsaures Silberoxyd ist unauflöslich; auch die freie Säure fällt das salpetersaure Silberoxyd, aber ein Ueberschuß von Säure löst es wieder auf.

Igasursäure. (*Acidum igasuricum.*)

Diese Säure wurde von Pelletier und Caventou bei der Analyse verschiedener Strychnos-Arten entdeckt, nämlich *Ignatii*, *Nux vomica* und *colubrina* (Schlangenhholz), in welchen sie mit Strychnin verbunden ist. Der Name der Säure ist vom Malayischen Namen der Ignatiusbohne genommen *).

Man erhält sie am besten auf folgende Art: Gerspelte Kräbenaugen (*Nux vomica*), oder besser Ignatiusbohnen werden zuerst mit Aether und hierauf mit Alkohol ausgezogen. Die Auflösung in Alkohol wird abgedampft, mit Wasser vermischt, filtrirt und das Durchgelaufene hierauf mit kaustischer Talkerde digerirt, welche das Strychnin fällt und mit der Igasursäure ein unauflösliches Salz bildet. Diese unauflöste Masse wird zuerst mit kaltem Wasser gewaschen, getrocknet und hierauf so lange mit Alkohol gekocht, als dieser noch Strychnin auflöst. Hierauf wird der Rückstand mit einer großen Menge Wassers gekocht, welches die igasursäure Talkerde auflöst, worauf man die filtrirte heiße Auflösung mit essigsaurem Bleioxyd fällt und den Niederschlag mit Schwefelwasserstoffgas zersetzt. Beim Abdampfen bildet die saure Flüssigkeit einen bräunlichen Syrup, aus welcher nach einiger Zeit die Säure in krystallinischen Körnern anschießt. Sie hat einen sauren und zugleich herben Ge-

*) Caventou hat ihn nachher in *acide strychnique* umgeändert; da dieß aber mit Strychnin zu viele Aehnlichkeit hat, so möchte der zuerst angenommene Name der passendste sein.

schmack. In Wasser und Alkohol ist sie leicht auflöslich, mit den Alkalien giebt sie eigene, in Wasser und Alkohol leicht auflöslliche Salze; mit Baryterde bildet sie ein in Wasser leicht auflöslliches Salz, das sich beim Abdampfen in schwammartigen Vegetationen absetzt. Eisen-, Quecksilber- und Silber-Salze werden von iganersauren Ammoniak nicht gefällt oder verändert; Kupferoxydsalze nehmen davon eine grüne Farbe an, und nach einer Weile entsteht ein hellgrüner, in Wasser wenig auflösllicher Niederschlag, den Pelletier und Caventon als charakteristisch für diese Säure ansehen.

Lacksäure, Stocklacksäure. (*Acidum laccicum.*)

Diese Säure ist von John entdeckt worden. Er fand sie im Stocklack (*Lacca in bacalis*), woraus er sie auf folgende Art erhielt: Das rohe Schellack wurde in Alkohol aufgelöst, die Auflösung filtrirt und mit kochend heissem Wasser vermischt; das dadurch niedergeschlagene Harz wurde abfiltrirt und die Flüssigkeit zur Trockne abgedampft. Die trockne Masse wurde gepulvert und entweder mit Aether übergossen, welcher die Säure auflöst, die nach dem Abdestilliren des Aethers ungefärbt zurückblieb, oder auch in wenig Alkohol aufgelöst, welche Auflösung nachher mit Aether gefällt, filtrirt und abgedampft wurde; aber in diesem Falle wurde die Säure gefärbt erhalten. Sie wurde nun in Wasser aufgelöst, mit Bleiauflösung gefällt, und das lacksaure Bleioxyd durch Schwefelsäure oder Schwefelwasserstoffgas zersetzt, und die Säure zum freiwilligen Abdampfen hingestellt, wobei sie in körnigen Krystallen ansohls. Sie wird an der Luft feucht, schmeckt sauer, fällt weder Kalk- noch Baryt-Salze, wohl aber Quecksilber- und Bleioxyd-Salze. Eisenoxydsalze werden mit weisser Farbe gefällt. Mit den Alkalien und mit Kalkerde giebt sie zertlicsende, in Wasser und Alkohol auflöslliche Salze.

Gallertsäure. (*Acidum pecticum.*)

Diese Säure ist von Braconnot entdeckt worden. Sie ist zwar schon vor ihm in dem Saft verschiedener Früchte, zumal der Aepfel, beobachtet und Pflanzengallert genannt worden, aber ihre eigentlichen Eigenschaften waren unbekannt. Braconnot zeigte, daß sie in den meisten Pflanzen und Pflanzentheilen enthalten sei, wie in Wurzeln, im Holz, in Rinden, Stengeln, Blättern, Früchten, und wahrscheinlich ist sie nur sehr selten ganz abwesend. Braconnot gab ihr den Namen *Acide pectique*, vom griechischen Worte $\piυκτ\eta$, *coagulum*. Die leichteste und wohlfeilste Bereitungsart ist folgende: Man zerreibt gelbe Rüben oder Rüben zu einem Brei, welchen man durch Auspressen gut vom Saft befreit, worauf man ihn noch mehrere Male entweder mit destillirtem oder mit Regenwasser abspült und auspresst. (Die Erdsalze im gewöhnlichen Quellwasser machen die Gallertsäure unauflöslich.) Hierauf rührt man 50 Th. ausgepresste Masse mit 300 Th. Regenwasser an, und mischt, nach und nach in kleinen Antheilen, eine Auflösung von 1 Th. kaustischem Kali unter beständigem Umrühren zu. Das Gemische wird darauf erhitzt, ungefähr $\frac{1}{2}$ Stunde lang gekocht, und dann kochend heiß durch Leinen geseiht. Eine Probe, daß das Gemische hinlänglich gekocht hat, ist, daß wenn man etwas davon abfiltrirt und ein wenig von einer Säure zusetzt, es zu einer Gallert gerinnt. Die geseigte Flüssigkeit enthält nun, außer anderen aus den Wurzeln ausgezogenen Stoffen, gallertsaurer Kali aufgelöst. Durch eine stärkere Säure kann die Gallertsäure ausgefällt werden, ist aber dann schwieriger auszuwaschen, weshalb man sie mit einer Auflösung von Chlorcalcium ansfällt; hierdurch wird gallertsaurer Kalkerde in Gestalt eines gallertartigen, in Wasser gänzlich unauflöslichen Coagulums abgeschieden, das man auf einem leinenen Sehtuch gut mit Wasser auswäscht. Diese gallertsaurer Kalkerde wird hierauf mit Wasser gekocht, zu dem man etwas Chlorwasserstoffsäure gesetzt hat, welche die Kalk-

erde auszieht, mit Zurücklassung der Gallertsäure, die man nun mit kaltem Wasser auswäscht. Sie bleibt in Gestalt einer farblosen, schwach säuerlichen Gallert zurück, (die aus gefärbten Pflanzentheilen bisweilen hartnäckig etwas von der Farbe zurückbehält). Sie röthet das Lackmuspapier, ohne daß dies von einem Hinterhalte von Chlorwasserstoffsäure verursacht wäre. Von kaltem Wasser wird sie nur sehr unbedeutend aufgelöst, kochendes nimmt davon mehr auf. Die filtrirte Auflösung ist farblos, geseht nicht beim Erkalten und röthet das Lackmuspapier kaum bemerklich; sie wird aber von Alkohol, Kalkwasser, Barytwasser, Säuren und Salzen, sowohl mit alkalischer als metallischer Basis, zu einer durchsichtigen, farblosen Gallert coagulirt. Sogar Zucker, den man darin auflöst, verwandelt sie nach einer Weile in eine Gelée, und auf diesem Umstande beruht die Bildung von Gelée aus dem Saft von Aepfeln, Kirschen, Stachelbeeren, Johannisbeeren und anderen, indem er, mit Zucker versetzt, nach einigen Tagen gesehet. Wird die feuchte aufgequollene Gallertsäure auf einem Glasgefäße eingetrocknet, so erhält man eine farblose, durchsichtige, gesprungene Masse, die sich leicht vom Glase ablöst, in kaltem Wasser wenig aufschwillt, von kochendem aber aufgelöst wird, und eine Flüssigkeit mit den eben genannten Eigenschaften bildet. In der trocknen Destillation wird die Gallertsäure, ohne sich aufzublähen, zersetzt, giebt viel brenzliches Oel, kein Ammoniak, keine Chlorwasserstoffsäure, und hinterläßt sehr viel Kohle. Salpetersäure zersetzt sie in Oxalsäure und Schleimsäure, welche letztere, nach der Krystallisation der Oxalsäure und Abraunchung der Salpetersäure, als ein weißes Pulver zurückbleibt.

Die Salze der Gallertsäure behalten ihre Eigenschaft, Gallert zu bilden, bei, aber nur die mit alkalischer Basis sind in Wasser löslich, wiewohl nur in reinem, salzsäurefreiem Wasser, aus welchem sie durch Auflösung der Salze darin gelatiniren, wenn sie auch nicht von Wasser zersetzt werden. Sie besitzen in diesem Zu-

stand durchaus keinen Geschmack, und sind nur durch ihre Schlüpfrigkeit auf der Zunge bemerkbar. Die Salze der Gallertsäure mit Erden oder Metalloxyden zur Basis werden durch doppelte Zersetzung erhalten und in gallertartigen Klumpen niedergeschlagen, die bei gefärbten Basen diese Farbe beibehalten, und die Verwandtschaft der Gallertsäure zu den Oxyden von Kupfer und Blei ist so ausgezeichnet, daß Braconnot dieselbe für ein vortreffliches Gegengift gegen diese und ihre Salze hält. Dagegen betrachtet er sie oder ihre Salze bei Vergiftungen mit Quecksilber-, Silber- oder Antimonoxyd-Salzen als nicht wirksam, weil der Niederschlag, welchen diese damit in gallertsaurem Kali bilden, zum Theil wieder in einem Ueberschuß des Kalisalzes aufgelöst wird. — Die Gallertsäure treibt bei gelinder Erwärmung die Kohlensäure aus.

Gallertsaures Kali erhält man in aufgelöster Form, wenn eine schwache Auflösung von kohlensaurem oder lieber kaustischem Kali in der Wärme mit Gallertsäure neutralisirt wird. In trockner Form erhält man es entweder durch Abdampfen, oder, sicherer frei von überschüssiger Basis, wenn es mit Alkohol gefällt, mit Branntwein gewaschen und hierauf getrocknet wird. Man erhält es dann als eine durchsichtige gesprungene Masse, ähnlich arabischem Gummi, die sich leicht vom Glase ablöst. In diesem Zustand ist es geschmacklos; in warmen Wasser löst es sich wieder auf. Bei gelindem Erhitzen auf einer Eisenplatte wird die Gallertsäure zerstört, das Salz wird braun, in Wasser leicht auflöslich, und hat die Eigenschaft verloren, mit Säuren zu gelatiniren, die daraus eine braune, dem Dammerdeextract ähnliche Materie fallen. Bei stärkerer Hitze bläht es sich auf, treibt Verästelungen mit einer wurmförmigen Bewegung aus, und wird zuletzt in mit Kohle gemengtes köhlensaures Kali verwandelt. Das trockne Salz hinterläßt einen Rückstand, der 15 Procent reinem Kali entspricht. Wird eine Auflösung dieses Salzes in Wasser mit kohlensaurem Kali vermischt, so wird es dadurch ausgefällt, und überhaupt, wie schon gesagt, von allen auflöselichen Salzen. Dieses

einer unbedeutenden Quantität von den Säuren ge-
 werden, im Vergleich mit den unorganischen Salzen
 welche aus einer sehr geringen Anzahl einfacher
 bestehen. Ihre Salze werden meistens vollkommen
 tral, und sie können auch Salze mit der doppelten
 tion Säure hervorbringen. Basische Salze von den
 sind noch nicht mit Sicherheit bekannt. Diese Salze
 nen sich, wie die Basen selbst, durch einen bitteren
 schmack aus. Sie sind meistens krystallisirbar, aber
 derselben bilden auch nur gummiähnliche Massen;
 rere werden in Gestalt unauflöslicher Flocken gefällt,
 che jedoch mehrentheils in einem Ueberschuß von
 auflöslich sind. Concentrirte Schwefelsäure, so wie
 starke Salpetersäure, zerstören die vegetabilischen Sa-
 sen, gleich wie die anderen Pflanzenstoffe. Salpeter
 verwandelt sie alle in Oxalsäure, und mit den u-
 erwogenen Weisheit's Salze, verpuffendes Mater-
 Mit Schwefel oder Phosphor läßt man sie noch nicht
 brennen können. Aber sie verbinden sich mit Chlor
 mit Jod, bilden ein Chlorid ein chlorsaures oder
 saures, und ein anderes eine Verbindung mit Ch-
 lorkohlensäure oder Chlorkohlwasserstoffsäure bildet. —
 über am besten von Kochsalz, wasserfreiem Salz
 gelöst, und wenn diese Auflösung gesättigt war
 sich der größte Theil beim Erkalten ab. Eine
 Menge von Jod ist zugefügt, andere wieder in
 Kochsalz durch angedehnt. Als bei den
 Manganen aller bis jetzt bekannten vegetabilischen
 wird die Base von Sulfidation niederge-
 fällen. Hinsichtlich ihrer Zusammensetzung, von
 gewöhnlichen darin überein, daß sie aus, S-
 stoff, Wasserstoff und Sauerstoff, zum Theil
 Sie gelöst in der verdünnten Essigsäure, die
 wöl- in verdünnter Essigsäure, in
 Je in verdünnter Essigsäure, in
 verdünnter Essigsäure, in
 mit verdünnter Essigsäure, in
 die verdünnter Essigsäure, in

menden Extract der Ratanhiawurzel (*Crameria triandra*) entdeckte. Man versuchte nachher, dieselbe aus der in den Apotheken vorkommenden Ratanhiawurzel darzustellen, welche aber nicht die geringste Spur davon gab, und welche, nach dem, was Peschier über das Verhalten des Extracts angiebt, eine andere Wurzel sein muß, als die, woraus das aus Indien eingeführte Extract bereitet wird. Um diese Säure zu gewinnen, löst man das Extract in Wasser auf und schlägt den Gerbstoff mit Leimauflösung nieder. Die mit Ammoniak genau neutralisirte Flüssigkeit wird mit einem Bleisalz gefällt, und der ausgewaschene Niederschlag durch Schwefelsäure oder Schwefelwasserstoffgas zersetzt. Diese Säure ist farblos und trocknet zu einem sehr sauren Syrup ein. Peschier hat daraus die Säure in Krystallen erhalten. Ihre ausgezeichnete Eigenschaft ist, daß sie mit Baryterde ein Salz bildet, das zwar schwierig in Wasser auflöslich ist, aber das, was sich davon auflöst, wird nicht durch Schwefelsäure gefällt; aber sowohl kohlen-saures als schwefelsaures Alkali schlägt die Baryterde daraus nieder. Diese Eigenschaft ist höchst merkwürdig, und ich habe Gelegenheit gehabt, mich aus eigener Erfahrung von ihrer Wirklichkeit durch Versuche mit einer Portion von dieser Säure zu überzeugen, welche ich von Peschier erhalten hatte.

(Zu den Säuren vegetabilischen Ursprungs gehört auch der sogenannte Gerbstoff, welcher hinsichtlich seiner Charaktere als Säure viel bestimmter sauer ist, als z. B. die Gallertsäure; aber aus Gründen, die ich an ihrem Orte anführen werde, will ich seine Abhandlung bis zur Beschreibung der Pflanzenextracte aufschieben, wo ich zu gleicher Zeit Braconnot's *Acide ellagique* in der Kürze erwähnen werde. Verschiedene Pflanzensäuren sind von mehreren Chemikern angegeben worden, welche aber nachher nicht so untersucht worden sind, daß ihre Selbstständigkeit mit Sicherheit angenommen werden könnte; wie z. B. die Maulbeersäure, als maulbeersaure Kalkerde auf der Rinde von *Morus alba*, angegeben von Klaproth; eine eigene Säure in den Stengeln von *Phytolaca de-*

candra, angegeben von Braconnot; eine mit Kalkerde verbundene Säure in *Acer campestre*, angegeben von J. A. Scherer; eine eigene Säure im Rhabarber, von Henderson; eine eigene krystallisirende Säure in *Daphne gnidnium*, angegeben von Göbel, so wie noch einige mehr.)

2. Klasse. Vegetabilische Salzbasen.

Im Pflanzenreiche giebt es mehrere Körper, welche die Eigenschaften von Salzbasen haben, und die man eine Zeit lang Pflanzenalkalien nannte. Die erste derselben wurde 1816 von Sertürner entdeckt, welcher ihre basischen Eigenschaften erwies. Dieses damals ganz unerwartete Verhalten eines Pflanzenstoffes erregte bald die Aufmerksamkeit der Chemiker, und Sertürner's Entdeckung einer vegetabilischen Salzbasis wurde bald von mehreren vollkommen bekräftigt. Diese Salzbasis war das Morphin, welches man aus dem Opium erhält, und dies veranlaßte die Idee, diese Salzbasen hauptsächlich in narcotischen und giftigen Pflanzen suchen zu müssen. Pelletier und Caventou entdeckten bald ähnliche Salzbasen in den Strychnosarten, in *Veratrum album*, in *Brucea antidysenterica*, und späterhin in der Chinarinde. Nachher wurden noch mehrere von anderen Chemikern entdeckt, und wahrscheinlich ist erst nur eine geringe Anzahl von denen bekannt, welche wirklich existiren. Man glaubte anfangs diese Salzbasen am ersten in narcotischen Stoffen erwarten zu müssen, nachdem man sie aber vergebens in mehreren derselben gesucht und Salzbasen in der Chinarinde und der Brechwurzel gefunden hatte, so ist es ziemlich wahrscheinlich geworden, daß sie bei allen analytischen Untersuchungen von Pflanzen oder ihren Theilen gesucht werden können und müssen. Sie kommen in den Pflanzen immer als Salze und mehrentheils als saure Salze vor, in Verbindung mit Pflanzensäuren, am gewöhnlichsten Aepfelsäure, aber auch mit Galläpfelsäure und bisweilen

einer der Pflanze ganz eigenthümlichen Säure. Die bis jetzt als Salzbasen einigermassen gekannten Pflanzenstoffe sind: Morphin, Narcotin, Strychnin, Brucin, Chinin, Cinchonin, Veratrin, Emetin, Delphinin, Solanin.

Sie werden am leichtesten aus dem wässrigen, mit einer freien Säure versetzten Aufguß der Pflanzensubstanz erhalten; aus welcher Auflösung sie dann, nach Einkochung der Flüssigkeit zu einem geringeren Volum, entweder mit Alkali, oder durch Kochen der Flüssigkeit mit dem Hydrate einer Erde, und vorzugsweise der Talkerde, niedergeschlagen werden können. Die bis jetzt entdeckten sind alle sowohl in kaltem als kochendem Wasser bedeutend schwer auflöslich. Sie schlagen oft vegetabilische Farbstoffe mit sich nieder, welche, nach Umständen, theils mit sehr schwacher Kali-Auflösung, theils mit schwachem, kaltem oder lauem Spiritus ausgezogen werden können. Die niedergeschlagene Salzbasis wird hierauf in kochendem, wasserfreiem Alkohol aufgelöst, aus dem sie theils beim Erkalten, theils durch Abdestilliren desselben erhalten werden kann; oft hängen ihnen die fremden Farbstoffe so innig an, daß sie hierauf mit einer Säure zu einem Salz verbunden werden müssen, dessen Auflösung in Wasser mit Blutlaugenkohle gekocht wird, wodurch sich die Auflösung entfärbt und die Base rein zurückläßt, worauf man sie mit einem Alkali niederschlägt.

Mehrere dieser Salzbasen haben die Eigenschaft, die blaue Farbe sowohl auf Lackmuspapier als von Lackmurstinctur, wenn sie durch eine Säure schwach geröthet waren, wieder herzustellen, so wie auch den Veilchensyrup grün zu färben; sie wetteifern daher in ihren alkalischen Eigenschaften mit den alkalischen Erden, mit Bleioxyd, Eisen- und Manganoxydul, und sie schlagen die meisten Metalloxydsalze nieder. Sie haben gewöhnlich einen höchst bitteren und unangenehmen Geschmack, den sie dem Wasser mittheilen, selbst wenn dieses nur unmerkliche Spuren von ihnen aufnimmt. Viele derselben krystallisiren; alle geben mit Säuren Salze, wobei sie jedoch, durch die große Anzahl einfacher Atome, welche sie enthalten, von

einer unbedeutenden Quantität von den Säuren gesättigt werden, im Vergleich mit den unorganischen Salzbasen, welche aus einer sehr geringen Anzahl einfacher Atome bestehen. Ihre Salze werden meistens vollkommen neutral, und sie können auch Salze mit der doppelten Portion Säure hervorbringen. Basische Salze von denselben sind noch nicht mit Sicherheit bekannt. Diese Salze zeichnen sich, wie die Basen selbst, durch einen bitteren Geschmack aus. Sie sind meistens krystallisirbar, aber viele derselben bilden auch nur gummiähnliche Massen; mehrere werden in Gestalt unauflöslicher Flocken gefällt, welche jedoch mehrentheils in einem Ueberschuß von Säure auflöslich sind. Concentrirte Schwefelsäure, so wie auch starke Salpetersäure, zerstören die vegetabilischen Salzbasen, gleich wie die anderen Pflanzenstoffe. Salpetersäure verwandelt sie alle in Oxalsäure, und mit dem meisten erzeugt sie Welter's bittere, verpuffende Materie. — Mit Schwefel oder Phosphor hat man sie noch nicht verbinden können. Aber sie verbinden sich mit Chlor und mit Jod, indem ein Theil ein chloresaures oder ein jodsaures, und ein anderer eine Verbindung mit Chlorwasserstoffsäure oder Jodwasserstoffsäure bildet. — Sie werden am besten von kochendem, wasserfreiem Alkohol aufgelöst, und wenn diese Auflösung gesättigt war, so setzt sich der größte Theil beim Erkalten ab. Einige werden leicht von Aether aufgelöst, andere wieder nur sehr unbedeutend davon aufgenommen. Aus den neutralen Auflösungen aller bis jetzt bekannten vegetabilischen Salzbasen wird die Base von Galläpfelinfusion niedergeschlagen.

Hinsichtlich ihrer Zusammensetzung kommen die vegetabilischen darin überein, daß sie alle, neben Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, noch Stickstoff enthalten. Sie geben bei der trocknen Destillation, außer den gewöhnlichen Producten der Pflanzenstoffe, eine Portion kohlenaures Ammoniak und hinterlassen viel Kohle. Die am besten untersuchten derselben sind von Pelletier und Dumas mit vieler Sorgfalt analysirt worden, und an ihrem Orte werde ich die Resultate ihrer Versuche angeben.

ben. Hier will ich nur im Allgemeinen erwähnen, daß sie alle zwischen $\frac{2}{3}$ und $\frac{3}{4}$ ihres Gewichts Kohlenstoff enthalten, welcher also ihr reichlichster Bestandtheil ist. Ihr Gehalt an Sauerstoff ist dagegen weniger bedeutend, und das Verhältniß, in welchem sie die Säuren sättigen, hat mit dem keine Aehnlichkeit, in welchem die unorganischen Salzbasen davon neutralisirt werden. So z. B. fanden Pelletier und Dumas in den neutralen schwefelsauren Salzen der vegetabilischen Salzbasen, daß der Sauerstoff der Schwefelsäure, statt das 3fache von dem der Base zu sein, entweder damit gleich, oder daß der Sauerstoff der Base ein Multiplum von dem der Säure mit 2, $1\frac{1}{2}$ oder 5 war. Die Ursache hiervon liegt darin, daß diese, nach den Verhältnissen der organischen Natur zusammengesetzten Salzbasen, mehr Atome Sauerstoff enthalten, als es bei den unorganischen gewöhnlich ist, und wenn sich ein Atom der Base mit einem Atom der Säure vereinigt, und die Base z. B. 6 Atome Sauerstoff, und die Säure 3 enthält, so wird der Sauerstoffgehalt der Base das Doppelte von dem der Säure. Im Uebrigen, so weit man sich nach den schon gemachten Analysen richten kann, geben mehrere von diesen Basen neutrale Salze, wenn sich 3 Atome von der Base mit 2 Atomen von der Säure vereinigen, und viele dieser Salze geben krystallisirende saure Verbindungen, welche aus 3 Atomen Basis und 4 Atomen Säure zusammengesetzt sind. Es ist gewiß anzunehmen, daß es unter diesen sauren Salzen auch solche gebe, worin sich ein Atom Basis mit einem Atom Säure verbindet. Dabei bleibt gleichwohl noch zu untersuchen übrig, ob ihre Sättigungscapacität für alle Säuren gelte, ohne Rücksicht auf die gewöhnlichen Verhältnisse zwischen dem Sauerstoff in der Säure und dem der Base, so daß Säuren, welche 3 Atome Sauerstoff halten, und Säuren mit 2 Atomen gleiche relative Quantitäten von diesen Basen, wie von den unorganischen sättigen; wodurch es käme, daß wenn z. B. Veratrin in seinem schwefelsauren Salz 5 Mal den Sauerstoff der Säure enthält, es in dem neutralen schweflichtsauren Salz $7\frac{1}{2}$ Mal den Sauerstoff der Säure

enthalten würde; ein gewiß ungewöhnliches Verhältniß, was aber mit dem im Zusammenhang stehen kann, ich später über die verschiedenen Ansichten von der natürlichen Natur dieser Basen erwähnen werde. Bis jetzt man durch Versuche ausgemittelt, daß wenigstens Schwefelsäure und Chlorwasserstoffsäure von diesen Basen demselben relativen Verhältniß; wie von den unorganischen, gesättigt werden.

Auch die Beschaffenheit ihrer Natur als Salzbasen zu verschiedenen Meinungen Veranlassung gegeben, kann noch nicht als richtig ausgemittelt betrachtet werden. Im Allgemeinen können die verschiedenen Ansichten unter 3 verschiedenen Gesichtspunkten aufgefaßt werden.

1) Die vegetabilische Salzbasis vereinigt sich mit Säure auf dieselbe Weise, wie ein unorganisches Oxyd, kann ein wasserfreies, aus beiden zusammengesetztes Salz geben. Dies scheint die allgemeinste Vorstellung davon zu sein.

2) Diese Salzbasen enthalten eine Portion Ammoniak, welches ihren eigentlichen alkalischen Bestandtheil ausmacht, mit welchem ein organischer Stoff auf eine gewisse Art verbunden ist, wie sich mehrere Pflanzenalkalien mit der Schwefelsäure verbinden, so daß sie in dem gebildeten Salz beibehalten werden. Diese Vorstellung ist von Robiquet für diese Salzbasen im Allgemeinen, und von Lindbergson für das Morphin insbesondere aufgestellt und vertheidigt worden. Sie wurde von Pelletier und Dumas aus dem Grunde bestritten, wenn der Stickstoff in diesen Salzbasen als Ammoniak enthalten wäre, ihr Vermögen, die Säuren zu sättigen sich wie ihr Stickstoffgehalt verhalten würde, was nicht ganz der Fall ist. Diese Salzbasen sättigen entweder gleich viel, oder $\frac{2}{3}$, oder halb so viel Säure, als aus ihrem Stickstoffgehalt gebildete Ammoniak erfordern würde, und überdem findet man, daß Morphin, welches nur $5\frac{1}{2}$ Procent Stickstoff enthält, $1\frac{1}{2}$ Säure mehr sättigt als z. B. Chinin, welches $8\frac{1}{2}$ Procent Stickstoff enthält. Daraus folgt also, daß wenigstens nicht der ganze Stick-

gehalt darin als Ammoniak enthalten sein kann. Im Allgemeinen scheint gleichwohl der Stickstoffgehalt die Zusammensetzung der Salze zu bestimmen. Bei den analysirten findet man, daß wenn die Stickstoffatome in einem Atome Basis 3 betragen, sich 3 Atome mit 2 Atomen Säure verbinden, daß wenn sie aber nur 2 sind, das neutrale Salz aus einem Atom Basis und einem Atom Säure gebildet wird.

3) Können diese Salzbasen mit dem Ammoniak ein bestimmtes Verhältniß darin haben, daß sie nicht ohne Zusatz von einem Atom Wasser ordentliche Salzbasen werden, wobei dann ihr Verhältniß zu der Quantität von Wasser, welche sie sättigt, von diesem Wassergehalt bestimmt wird; das heißt mit anderen Worten, sie können, dieser Hypothese aus betrachtet, sich mit keinen andern, als wasserhaltigen Säuren vereinigen, deren Wasser nicht entbinden. Ohne eine solche Analogie mit Ammoniak, würde es schwierig sein, eine richtige Vorstellung von ihren Verbindungen mit Wasserstoffsäuren, mit Chlorwasserstoffsäure oder Jodwasserstoffsäure, zu haben, in welchen der Wasserstoff der Säure entweder zu der wasserfreien Salzbasis hinzugerechnet wird, damit das Metall repräsentirt, welches in Verbindung mit Chlor oder Jod das Salz bildet, oder auch der Salzbase eine entsprechende Menge von ihrem Sauerstoff entzogen, um in diesem weniger sauerstoffhaltigen Zustand das Metall in den unorganischen Haloïdsalzen zu repräsentiren. Es ist einleuchtend, daß es nicht ohne hinlängliche genaue Versuche auszumachen ist, welche von diesen die richtigen den Vorzug verdient.

Mehrere von diesen Salzbasen haben in der Heilkunde eine ausgezeichnete Anwendung bekommen.

Morphin.

Das Opium, welches der aus den verletzten Saamen des Mohns ausgeflossene, eingetrocknete Milchsaft und eines der ausgezeichnetsten Mittel in der Heil-

kunde ausmacht, enthält nicht weniger als zwei Sabbasen, die sich einander sehr ähnlich sind. Die eine davon wurde schon 1803 von Desrosne entdeckt, und lange Desrosne's krystallisirtes Opium-Salz genannt, und die andere wurde 1804 gleichzeitig von Sertürner und Seguin aufgefunden, ohne daß jedoch damals ihre Eigenschaft als Salzbasis bemerkt wurde. Bei einer erneuerten Arbeit über das Opium erwies Sertürner 1816 diese Eigenschaften bei dem von ihm entdeckten krystallinischen Stoff, welchen er Morphinium nannte, was man später in Morphin umgeändert hat. Desrosne's krystallisirende Substanz wurde zum Unterschied Narcotin genannt.

Der Vorschriften zur Darstellung des Morphins giebt es viele, und es würde zwecklos sein, sie hier alle anzuführen; ich muß jedoch bemerken, daß bei den meisten derselben keine gehörige Rücksicht zur Erhaltung eines von Narcotin gänzlich befreiten Morphins genommen worden ist.

Sertürner's Darstellungsweise war, das Opium mit verdünnter Essigsäure anzurühren, die erweichte Masse so lange mit Wasser auszulaugen, als dieses noch etwas aufnahm, und die hierauf concentrirte Flüssigkeit mit kautischem Ammoniak niederschlagen. Dadurch wurde das Morphin in Gestalt eines grauen Niederschlags und offenbar mit Narcotin vermischt erhalten, und warsch wer von seinem Farbstoff zu befreien.

Robiquet hat vorgeschlagen, man solle die Infusion von Opium, nachdem man sie stark concentrirt hat, $\frac{1}{4}$ Stunde lang mit ungefähr 2 Procent vom Gewicht des Opiums Magnesia kochen. Diese Anwendung von Magnesia vor anderen Alkalien hat indessen keinen anderen bestimmten Vorzug, als daß ein Ueberschuß davon für die übrigen der in der Flüssigkeit aufgelösten Stoffe unschädlich ist, was jedoch auch mit Ammoniak der Fall ist, dessen Anwendung aber Robiquet vermeiden wollte, um sich überzeugen zu können, daß die alkalischen Eigenschaften des Niederschlags nicht davon herrührten. Der auf diese Art erhaltene Niederschlag besteht, wie wir

schon bei der Darstellung der Mekonsäure gesehen haben; aus mehreren Substanzen. Der färbende Stoff darin und eine Portion Narcotin wird mit *Spiritus vini rectificatus* durch Digestion bei $+50^{\circ}$ bis 60° ausgezogen, worauf das Unaufgelöste mit etwas kaltem Spiritus gewaschen, ausgepresst, getrocknet und darauf mit wasserfreiem Alkohol gekocht wird, so lange sich noch bei wiederholtem Kochen mit frischem Alkohol etwas auflöst. Die kochende Flüssigkeit wird sogleich filtrirt und setzt beim Erkalten Morphin in Krystallen ab, die aber von Neuem in Alkohol aufgelöst und umkrystallisirt werden müssen, damit sie völlig farblos werden. Aber auch auf diese Art bekommt man das Morphin sehr durch Narcotin verunreinigt.

Eine von den Methoden, wodurch diese Basen am besten von einander getrennt zu werden scheinen, ist folgende: Das Opium wird mit Wasser ausgezogen, worauf man zur Extractdicke abdampft. 3 Th. von diesem Extract werden mit $1\frac{1}{2}$ Th. Wassers angerührt und hierauf in einer Retorte mit 20 Th. Aether vermischt. Die Retorte wird mit einer Vorlage versehen; die Masse in's Kochen versetzt, und nachdem 5 Th. Aether überdestillirt sind, hat der in der Retorte bleibende Aether das Narcotinsalz aus dem Extracte ausgezogen, wo man dann die Operation unterbricht, den Aether, so heiß er ist, in ein besonderes Gefäß ausgießt, und den Theil der Aether-Auflösung, der nicht vollkommen von der Extract-Auflösung abgossen werden kann, mit den 5 Th. überdestillirten Aethers abspühlt. Das übrige dünne Extract wird nach dem Erkalten mit sehr wenig Wasser verdünnt, und nach einer Weile von einem krystallinischen Niederschlag abgossen, welcher ebenfalls hauptsächlich aus Narcotinsalz besteht. — Hierauf verdünnt man es mit noch mehr Wasser und schlägt mit kaustischem Ammoniak nieder *). Der Niederschlag wird auf's Filtrum genommen;

*) Im Fall man nicht das Opiumextract mit Aether behandelt, sondern sogleich die Opiuminfusion niederschlägt, muß man, nach

aus der filtrirten Flüssigkeit setzt sich beim Erwärmen noch eine kleine Portion Morphin ab, das man wegnimmt. Der mit kaltem Wasser gut ausgewaschene Niederschlag wird getrocknet und dann mit 3 Mal so viel Spiritus von 0,84, als man Opium angewendet hat, und 6 Procent vom Gewichte des angewandten Opiums Blutlaugenkohle gekocht; die hierauf kochend heiß filtrirte Auflösung setzt beim Erkalten Morphin in farblosen Krystallen ab. Die erkaltete Flüssigkeit wird von Neuem mit dem Rückstand gekocht, so lange sich noch beim Erkalten Krystalle absetzen, worauf man den Alkohol bis auf $\frac{2}{3}$ abdestillirt und das darin noch aufgelöste Morphin sich absetzen läßt. — Man kann auch das durch Ammoniak niedergeschlagene Morphin in verdünnter Chlorwasserstoffsäure auflösen, mit Blutlaugenkohle kochen, und dann das reine Morphin durch kaustisches Ammoniak ausfällen, und es ist klar, daß wenn man Morphinsalze bereiten will, man die Behandlung mit Alkohol nicht nöthig hat, sondern daß man das Morphin in der Säure auflöst, die Auflösung mit Kohle reinigt und zur Krystallisation abdampft.

[Auf die Eigenschaft des Narcotins, von Kochsalz-Auflösung niedergeschlagen zu werden, hat Wittstock in Berlin folgende Bereitungsart eines narcotinfreien Morphins gegründet: 1 Th. gepulvertes Opium wird mit 8 Th. Wasser, dem $\frac{1}{2}$ Th. concentrirte Chlorwasserstoffsäure zugesetzt ist, 6 Stunden lang digerirt. Nach dem Erkalten wird die dunkelbraune Extraction abgesehen, und die ganze Operation noch zweimal wiederholt. In den vermischten Extraktionen werden hierauf 4 Th. Kochsalz aufgelöst. Die milchigt gewordene Flüssigkeit klärt sich nach einigen Stunden, indem sich ein bräuner, käseartiger Niederschlag absondert; die davon abgesehene Flüssigkeit hat die Farbe von Franzwein. Sie wird nun mit Ammo-

Hottot's Vorschrift, die freie Säure der Auflösung erst genau mit Ammoniak neutralisiren, wobei, neben etwas Narcotin, eine eigene fette Materie gefällt wird, welche sich auf keine andere Weise vollständig vom Morphin trennen läßt, und die bei Behandlung mit Aether von demselben ausgezogen wird.

niak im Ueberschuß versetzt, etwas erwärmt und 24 Stunden stehen gelassen, worauf man den Niederschlag abfiltrirt, mit ein wenig Wasser auswäscht und trocknet. Die Menge desselben beträgt gewöhnlich $\frac{1}{4}$ vom Gewicht des Opiums. Er wird hierauf mit Alkohol von 0,82 vollständig ausgezogen, wobei $\frac{1}{4}$ vom Niederschlag zurückbleibt, der aus mekonsauren, äpfelsauren und phosphorsauren Salzen und Farbestoff besteht. Der Alkohol wird abdestillirt, wobei $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{2}$ von angewandtem Opiumpulver wenig gefärbtes, krystallinisches Morphin zurückbleibt. Dasselbe kann indessen noch etwas Narcotin enthalten, zumal wenn man anfangs den Opiumauszug nicht völlig mit Kochsalz gesättigt hatte. Man löst daher das erhaltene Morphin in verdünnter Chlorwasserstoffsäure auf, filtrirt und dampft zur Krystallisation ab. Das Ganze gerinnt dann zu einer federartigen Salzmasse, welche man zwischen Leinwand oder Löschpapier stark auspresst, wobei das mit der Säure nicht krystallisirende Narcotin mit der Länge abfließt. Durch Umkrystallisiren des so erhaltenen chlorwasserstoffsäuren Morphins, erhält man ein silberweißes Salz, das durch Zersetzung mit Ammoniak, Auflösung in Alkohol und Abdampfen ein farbloses, narcotinfreies Morphin liefert.

Ein nach anderen Methoden gewonnenes, narcotinhaltiges Morphin kann man, nach Wittstock, auf folgende Arten reinigen: Man löst ein solches Gemenge in verdünnter Chlorwasserstoffsäure auf, dampft zur Krystallisation ab, wobei nur Morphinsalz krystallisirt, welches man durch starkes Auspressen von der narcotinhaltigen, nicht krystallisirenden Mutterlauge befreit. Oder man sättigt die Auflösung des Gemenges in Chlorwasserstoffsäure mit Kochsalz, wobei die Flüssigkeit milchigt wird, und das Narcotin sich nach einigen Tagen in warzenförmigen, krystallinischen Zusammenhäufungen abscheidet, worauf man das Morphin durch Ammoniak fällt. Oder endlich, man setzt zu der Auflösung des Gemenges in verdünnter Chlorwasserstoffsäure verdünnte kaustische Kalilauge; ein kleiner Ueberschuß davon löst augenblicklich

das ausgeschiedene Morphin auf, während sich das Narcotin käseartig ausscheidet. Ein großer Ueberschuß von Lauge würde, wenn sie längere Zeit mit dem Narcotia in Berührung bleibt, auch etwas von diesem auflösen, weshalb es auf jeden Fall gut ist, gleich nach Behandlung mit der Lauge die alkalische Morphin-Auflösung abzufiltriren. *W.*]

Der nach der Ausziehung mit Wasser übrig bleibende Theil vom Opium enthält noch sowohl Morphin als Narcotin, die man durch Digestion mit verdünnter Essigsäure auszieht, worauf man die filtrirte Flüssigkeit zur Syrupconsistenz abdampft, zur Abscheidung der Basen mit Aether behandelt, und das im Aether unauflösliche Morphin-salz auf die erwähnte Art durch Ammoniak zersetzt. — Man hat auch vorgeschlagen, den ausgewaschenen Rückstand vom Opium zuerst mit kaustischem Ammoniak auszuziehen, das, außer Harz und Farbstoff, die Säuren aufnimmt, dann mit kaltem Spiritus auszuwaschen und zuletzt den Rückstand mit Alkohol zu kochen, welcher die Basen auflöst.

In reinem, isolirtem Zustand aus seiner Auflösung in Alkohol angeschossen, bildet das Morphin kleine, farblose, glänzende Krystalle. Durch kaustisches Ammoniak aus einer Auflösung eines seiner Salze niedergeschlagen, bildet es weiße, käseartige Flocken, die bisweilen, indem sie sich ansammeln, krystallinisch werden. Behutsam erhitzt, schmilzt es ohne Zersetzung, und bildet eine gelbe, geschmolzenem Schwefel nicht unähnliche Flüssigkeit, die beim Erstarren weiß und krystallinisch wird. An offener Luft stärker erhitzt, riecht es wie Harz, raucht und entzündet sich mit einer lebhaften, rothen und rufenden Flamme, mit Hinterlassung unverbrannter Kohle. — Von kaltem Wasser wird es nicht aufgelöst, schmeckt aber doch auf der Zunge bitter, und kochendes Wasser nimmt etwas mehr als $\frac{1}{100}$ seines Gewichts auf, das beim Erkalten wieder anschießt. Die warme Auflösung stellt nicht allein die blaue Farbe auf geröthetem Lackmuspapier wie-

der her, sondern färbt auch die gelbe Curcumä- und Rhabarber-Farbe braun. Es wird von 40 Th. kalten und von 30 Th. kochenden, wasserfreien Alkohols aufgelöst. In Aether ist es wenig oder nicht auflöslich, wodurch es ziemlich gut von Narcotin getrennt werden kann, welches sich darin ziemlich leicht auflöst. Es löst sich auch in fetten und flüchtigen Oelen auf, und kann mit Campher zusammengeschmolzen werden.

Wir haben mehrere Angaben über seine Zusammensetzung, diejenigen zu verschweigen, welche bedeutend abweichen, nämlich von Bussy, Pelletier und Dumas, und Brande.

	Bussy.	Pellet. u. Dumas.	Brande.
Kohlenstoff	69,0	72,02	72,0
Wasserstoff	6,5	7,61	5,5
Stickstoff	4,5	5,53	5,5
Sauerstoff	20,0	14,84	17,0.

Von diesen giebt Bussy's folgende Anzahl von Atomen: 36 Kohlenstoff, 40 Wasserstoff, 2 Stickstoff und 2 Sauerstoff; Pelletier's und Dumas's giebt, wie schon geführt wurde, 38 Kohlenstoff, 49 Wasserstoff, 2 Stickstoff und 6 Sauerstoff. Nach der ersteren Angabe wiegt ein Atom von Morphin 3934, und nach der letzteren 3734. Berechnen wir aber das Atomgewicht nach der Quantität von Schwefelsäure, welche davon genau neutralisirt wird, so wird es 4020,6, was sich mehr dem analytischen Resultate der beiden letzteren nähert. Dagegen aber verhält sich im schwefelsauren Morphin der Sauerstoff der Säure zum Sauerstoff der Base, nach Bussy, 1:8, aber nach Pelletier und Dumas = 3:6; ersteres hat keine Wahrscheinlichkeit für sich, und letzteres also wahrscheinlich das richtigere.

Die Morphinsalze erhält man durch Auflösung Morphins in verdünnten Säuren bis zur Sättigung und Abdampfen der Auflösung. Sie sind farblos und krystallisiren. Sie haben einen sehr scharfen und

unangenehm bitteren Geschmack. Ihre Auflösung wird von Alkalien gefällt; werden sie in sehr verdünntem Zustand mit Ammoniak im Ueberschuss vermischt, so entsteht kein Niederschlag, oder er löst sich wieder auf, aber beim Erwärmen setzt er sich ab. Von Galläpfelinfusion werden sie gefällt, und diese Reaction ist so empfindlich, daß eine Flüssigkeit, welche nur $\frac{1}{10000}$ ihres Gewichts Morphinsalz aufgelöst enthält, dadurch deutlich getrübt wird. Da dies aber auch mit den Salzen mehrerer anderer vegetabilischer Salzbasen der Fall ist, so ist dies kein charakterisirendes Kennzeichen *). Als solche betrachtet man 1) daß Morphin und seine Salze, in fester Form, mit gewöhnlichem Scheidewasser übergossen, roth gefärbt werden, was nachher in Gelb übergeht; aber dies ist auch mit Strychnin, Brucin und ihren Salzen der Fall; und 2) daß Morphin, so wie auch seine neutralen Salze, mit einer Auflösung von neutralem Eisenchlorid; oder im Allgemeinen mit einem aufgelösten neutralen Eisenoxysalze vermischt, dem Gemische eine schöne und nach ungleicher Verdünnung mehr oder weniger tief blaue Farbe ertheilen, welche durch zugesetzte überschüssige Säure verschwindet, aber wieder zum Vorschein kommt, wenn diese mit Alkali gesättigt wird. Die Farbe wird durch Erhitzen, durch Alkohol und durch Essignaphtha, aber nicht durch Aether zerstört. Diese merkwürdige Reaction ist von Robinet entdeckt worden; was eigentlich die blaue Materie sei, ist noch nicht untersucht. Die neutralen Morphinsalze bestehen aus einem Atom Basis und einem Atom Säure; da aber das Atom der Base bedeutend mehr wiegt, als das der Säure, so bedarf es zur

*) Nach Wittstock werden narcotinfreie Morphinsalze von Galläpfelinfusion nicht gefällt, und nur bei starker Concentration ein wenig getrübt, was beim Erwärmen oder Verdünnen mit Wasser wieder verschwindet. Dagegen entsteht bei der geringsten Beimengung von Narcotin ein Niederschlag. — Nach demselben ist reines Morphin in kautischem Kali oder Natron leicht auflöslich, die deshalb nicht als Fällungsmittel angewandt werden dürfen, und aus dieser Auflösung krystallisirt das Morphin heraus, in dem Maasse, als das Alkali Kohlensäure anzieht. *W.*

Neutralisation nur einer sehr geringen Menge Säure. Bei den unorganischen Basen kann man ihr Vermögen, die Säuren zu sättigen, durch die Kenntniß ihres Sauerstoffgehaltes vergleichen, weil ersteres absolut auf letzterem beruht. Da dieß nicht mit den organischen Salzbasen der Fall zu sein scheint, so kann man gleichwohl einen allgemeinen Ausdruck für ihr Sättigungsvermögen bekommen, wenn man den procentischen Gehalt von Sauerstoff berechnet, welchen man bei ihnen voraussetzen würde aus der Quantität von Säure, die zu ihrer Sättigung erfordert wird, im Fall sie unorganische Basen wären. Ich will dieß ihre Sättigungscapacität nennen. Diese ist für Morphin 2,49, und will sagen, daß 100 Th. Morphin eine Quantität Schwefelsäure sättigen, deren Sauerstoff 3-Mal so viel beträgt; eine Portion Salpetersäure, welche 5, und eine Portion Phosphorsäure, welche $2\frac{1}{2}$ Mal so viel Sauerstoff enthält.

Schwefelsaures Morphin schießt in bündelförmig sammengehäuften Nadeln an, und ist in Wasser sehr leicht auflöslich, wovon es nicht mehr als ungefähr sein doppeltes Gewicht braucht. Zweifach schwefelsaures Morphin erhält man durch Uebersättigung des Salzes mit Schwefelsäure und Wegnahme des Säure-Ueberschusses mittelst Aether, welcher das saure Salz unauflöslich zurückläßt. Salpetersaures Morphin. Wird Morphin in fester Gestalt mit Salpetersäure behandelt, so wird es zuerst schön orangeroth gefärbt; diese Farbe geht dann in Gelb über, und durch fortgesetzte Einwirkung der Säure wird die Base in Oxalsäure verwandelt. Wird dagegen Morphin bis zur Sättigung in verdünnter Salpetersäure aufgelöst, so erhält man ein neutrales Salz, welches nach dem Abdampfen in sternförmig sammengehäuften Krystallen anschießt. Es bedarf nur das $1\frac{1}{2}$ fache seines Gewichts Wassers zur Auflösung. Phosphorsaures Morphin schießt in Würfeln an, und mit Ueberschuß an Säure in strahligen Bündeln. Kohlensaures Morphin soll erhalten werden, wenn ein Gemenge von Morphin und Wasser mit Kohlensäuregas übersättigt wird, wobei sich

das Morphin auflöst, und wenn die Auflösung gesättigt war, so schießt das Salz bei künstlicher Abkühlung in kurzen prismatischen Krystallen an, die in 4 Th. Wassers auflöslich sind. Nach Anderen soll das Morphin von kohlen-saurem Natron in Flocken gefällt werden, die nach einigen Tagen Krystallform annehmen; aber Sertürner giebt an, daß das Morphin ohne Kohlensäuregehalt sowohl von kohlen-saurem, als zweifach kohlen-saurem Kali gefällt werde, und daß nur, wenn es nicht rein ist, etwas kohlen-saures Alkali mit dem Extractivstoffe gefällt werde, und bei Zusatz von Säuren Spuren von Aufbrausen zeige. Essigsäures Morphin schießt in feinen, büschelförmig vereinigten Nadeln an, ist in Wasser leicht, in Alkohol weniger leicht auflöslich. Weinsäures Morphin scheint ein neutrales und ein saures Salz zu bilden, schießt in feinen Prismen an, und ist in 3 Th. kalten Wassers auflöslich. Galläpfelsäures Morphin ist unauflöslich und wird niedergeschlagen. Der in einer Morphin-Auflösung durch Gerbstoff bewirkte Niederschlag ist in Spiritus auflöslich. Mekonsäures Morphin ist im Opium enthalten. Man erhält es nicht krystallisirt; es ist sowohl in Wasser als in Alkohol leicht auflöslich. Gallertsaures Morphin erhält man durch Digestion von noch feuchter Gallertsäure mit Morphin und Wasser, wobei sich beide auflösen, und aus dem Wasser durch Alkohol als Gallert gefällt werden kann. Von den Verbindungen des Morphins mit Wasserstoffsäuren ist nur die mit Chlorwasserstoffsäure bekannt. Dieses Salz schießt, ähnlich den vorhergehenden, in Nadeln oder federförmigen Krystallen an, bedarf 16 bis 20 Th. Wassers zur Auflösung, und wenn man sie zu weit abdampft, so geseht die ganze Masse beim Erkalten. Wird in einer Auflösung von Opiumextract Kochsalz bis zur Sättigung aufgelöst, so werden eine Menge von in der Flüssigkeit aufgelöster Stoffe ausgefällt. Wird die filtrirte Flüssigkeit dann zur Trockne abgedampft und mit kochendem, wasserfreiem Alkohol behandelt, so löst dieser daraus chlorwasserstoffsäures Morphin auf, welches man durch Abdampfen des Alkohols krystallisirt er-

hält; zugleich hat sich eine Portion mekonsaures Natron gebildet.

Man hat versucht, Morphin mit Schwefel zusammenzuschmelzen, aber dabei entwickelte sich Schwefelwasserstoffgas. Es ist übrigens nicht untersucht, was daraus wurde, wie es sich zu Schwefelwasserstoff oder den elektronegativen Schwefelmetallen verhält.

Das Morphin und seine Salze hat man in der Medicin anzuwenden angefangen. Wird Morphin in isolirter Gestalt innerlich genommen, so ist es ohne alle Wirkung, wird es aber mit einer Säure verbunden oder nur in Oel aufgelöst, so soll es dieselben Wirkungen wie das Opium hervorbringen. Essigsaures Morphin hält man für diejenige Form, in der es am wirksamsten ist, und man glaubt von ihm, daß es in großer Dosis tödlich sei. Man scheint seit der ersten Entdeckung des Morphins diesen Stoff für die Ursache der eigenthümlichen medicinischen Wirkungen des Opiums gehalten zu haben. Lindbergson suchte dies zu bestreiten und erklärte, daß Morphin und seine Salze, außer daß sie einen geringen Ekel erregten, sowohl auf Menschen als Thiere ohne alle Wirkungen seien, und daß die Wirksamkeit des Opiums in seinem extractiven Theile liege. Lindbergson verwechselte indessen offenbar Narcotin und Morphin, d. h. wandte sie beide zusammen an. Seine Versuche reichen indessen hin, um über die Sicherheit unseres Wissens über diesen Gegenstand bedeutende Zweifel zu erregen. Was durch Versuche entschieden zu sein scheint, ist, daß von Morphin-Präparaten eine größere Dosis zur Hervorbringung einer bestimmten Wirkung erfordert wird, als von Opium, wovon ein, höchstens zwei Gran eine hinreichend große Dosis ist, um Schlaf zu machen, und einige wenige Gran den Tod bewirken können, während man dagegen Angaben hat, nach welchen essigsaures Morphin, in Dosen von $\frac{1}{2}$ bis eine ganze Drachme, theils innerlich gegeben, theils in die Venen eingesprützt wurde, ohne zu tödten. Demnach sieht es aus, als beruhe die Wirksamkeit des Opiums nicht allein auf dem Morphin allein, sondern auf

den Verbindungen, in denen es sich im Opium befindet, und auf jeden Fall muß dies näher untersucht werden, um unsere Kenntniß darüber zu befestigen.

Narcotin *).

Sertürner hielt das Narcotin lange für ein basisches Morphinsalz, weshalb es einige Zeit dauerte, ehe man sich von seiner Verschiedenheit vom Morphin überzeugete, die zuerst mit Zuverlässigkeit von Robiquet erwiesen wurde. Mehrere Schriftsteller nehmen dasselbe nicht unter die vegetabilischen Salzbasen auf, aus dem Grunde, weil es nicht alkalisch reagirt. Ich betrachte es jedoch als zu dieser Klasse gehörend, weil es sich mit Säuren und Salzen verbindet, wovon einige krystallisiren, und es in dieser Verbindung die flüchtigen Säuren bindet, wie z. B. Chlorschwefelwasserstoffsäure und Essigsäure; aber diese Salze reagiren wie die der schwächeren unorganischen Basen, sauer.

Die Darstellung des Narcotins ist im Allgemeinen dieselbe wie die des Morphins, von welchem es in den Fällen, wo sie zusammen erhalten werden, sowohl in isolirter Form, als auch als Salz durch Behandlung mit Aether getrennt wird, indem das Narcotin und seine Salze davon ausgezogen und nach Abdestillirung des Aethers erhalten werden. Wird pulverförmiges Opium, oder, wie vorher angeführt ist, sein mit Wasser bereitetes Extract mit Aether behandelt, so zieht dieser, im ersteren Falle unvollständig, aber in letzterem besser, die Narcotinsalze aus, aber mit diesen auch fremde Stoffe, welche, bei Anwendung von rohem Opium, aus Cautschuck und einem eigenen Fett, aber bei Anwendung des Extractes bloß aus diesem Fett bestehen. Nach Abdampfung des Aethers bleiben diese, nebst einer verworrenen, braunen Salzmasse

*) Es wird von einigen deutschen Schriftstellern Opian genannt, ich sehe indessen keinen Grund ein, warum man diesen, vielleicht weniger merkwürdigen Bestandtheil vorzugsweise nach dem Opium benennen soll.

rück, welche das Lackmuspapier röthet und aus einem arcotinsalz besteht, dessen Säure noch nicht bestimmt. Man löst dieses Salz in warmen Wasser oder in kochendem Spiritus auf, digerirt mit Blutlaugenkohle, und bläht das Narcotin aus der erkalteten Auflösung durch saures Ammoniak nieder. Ist dann der Niederschlag leicht farblos, so löst man ihn wieder in Chlorwasserstoffsäure auf, behandelt von Neuem mit Kohle und schlägt mit Ammoniak nieder *).

Der Narcotin wird auf diese Art in weissen, leichten Flocken erhalten. In kochendem Spiritus oder Aether aufgelöst, schießt es in farblosen Krystallen an, welche gewöhnlich größer, als die vom Morphin ausfallen, oder auch in perlmutterglänzenden Schuppen. In fester Form ist es ohne Geschmack. Es schmilzt bei einer wenig erhöhten Temperatur und verliert 2 bis 3 Procent an Gewicht. Läßt man die geschmolzene Masse langsam abkühlen, so sieht man auf ihrer Oberfläche sich mehrere Krystallcentra bilden, die sich allmählich vergrößern und vollkommen isolirte krystallinische Halbkugeln bilden; kühlt man aber die geschmolzene Masse schnell ab, so bleibt sie durchsichtig und bekommt Sprünge. — Im Feuer verhält es sich wie das Morphin. Von kaltem Wasser wird es nicht aufgelöst, und kochendes nimmt kaum $\frac{1}{15}$ davon auf. Kalter Alkohol löst davon $\frac{1}{20}$, aber kochendes $\frac{1}{4}$ seines Gewichts auf. Aether löst dasselbe reichlich auf, und weit mehr noch in der Wärme. Keine von diesen Auflösungen reagirt alkalisch. Auch von fetten und flüchtigen Oelen wird es aufgelöst. Die dasselbe vom Morphin unterscheidenden Merkmale sind folgende: 1) in isolirter Form ist es geschmacklos, während Morphin bitter schmeckt; 2) ist es in Aether auflöslich, wovon Morphin nicht, oder in weit geringerem Grade aufgenommen

*) Nach Wittstock erhält man das Narcotin aus dem, beim Morphin erwähnten, durch Kochsalz in dem sauren Opium-Auszug erhaltenen Niederschlag, worin es noch mit Farbstoff verunreinigt ist.

wird und 2. Menge 3. weicher es wird nach 10
mit Essigsäure die des Narcotin mit dem
charakteristische harte Farbe verliert.

Es ist nur von Belladonna und Datura analysirt
von welche Tabelle aus 1000 Theilenstoff. 1.21
stoff 1.21 Stickstoff und 1.00 Wasserstoff
gesetzt fanden. — Die nächste Anzahl von 1000
nen, welcher aus diese Zahlen hervorgeht
1.21 Stickstoff 1.21 Wasserstoff 1.21 Stickstoff und 1.00
stoff. Ein Atom wegt kann 1.21. Seine Molekül
capazität ist nicht angegeben.

Die Narcotinsalze erhält man so, daß man
verdünnten Säuren so viel Narcotin auflösen läßt, als
aufnehmen können, worauf man die Flüssigkeit abdampt
bis ihnen alle einen unangenehm Geschmack als die Mor-
phin-salze, und in Wasser leicht auflöslich und rüthet
Lackmuspapier. Sie werden sowohl von Alkalien als
Galäpfelnlösung, und von letzterer mit heftigerer Fe-
gefällt. Mehrere derselben sind in Alkohol und wenig-
lich in Aether auflöslich: es sind nur wenige derselben
näher untersucht. Salpetersäure löst das Narcotin
zerstört so; war aber die Säure mehr concentrirt, s-
färbt sie sich gelb (nicht roth) damit, und giebt, wenn
sie damit erhitzt wird, Oxalsäure und eine eigene bittere
Materie. Man weiß, daß essigsäures Morphin we-
basisch essigsäurem Bleioxyd gefällt wird, dadurch, daß
das Bleioxydsalz neutral wird, indem es die Säure des
Narcotinsalzes entzieht, was mit essigsäurem Morphin nicht
der Fall ist *). Von Chlorwasserstoffsäure wird es
zu einer Verbindung aufgelöst, die nach dem Abdampfen
nicht krystallisirt erhalten werden kann.

Narcotin äußert keine besonders ausgezeichneten Wir-
kungen als innerliches Heilmittel. Orfila giebt an, daß
es, in jeder Form, von Menschen zu einigen Drachmen
des

*) Nach Wittstock sind die aus der Auflösung des Narcotins
in Essigsäure angeschossenen Krystalle reines Narcotin. W.

s ohne alle Wirkung genommen werden kann. Eine Drachme davon, in Oel aufgelöst, tödtet Hunde schnell; kleinere Dosen langsamer und unter Erscheinens Stupors, mit offenen Augen, aus dem sich nicht erwecken läßt. Die Einsprützung dieser in die Jugularvene tödtet sogleich; dagegen das Zellgewebe gebracht, ohne Wirkung. Essig-arcotin ist bei Hunden fast ohne Wirkung, so Säure offenbar seinen Einfluß auf den lebenden vernichten scheint.

Strychnin.

Substanz wurde 1818 von Pelletier und Caventou entdeckt. Es kommt in der Natur in mehreren von *Strychnos* vor. Sie fanden dasselbe in der *Str. Faba Ignatii* (in der Pharmacie Ignatiusbohne genannt), von *Str. Nux vomica* (Krähenaugen) im Holze von *Strychnos Colubrina*. Sie fanden auch nachher noch in einem giftigen Präparat, *Upas Torara* genannt, womit die Eingebornen auf ihre Pfeile zu vergiften pflegen. In allen diesen ist Strychnin mit Igasursäure verbunden und meistens mit noch einer anderen vegetabilischen Salzbasis, in, vermischt vor, von welchem letzteren man die Darstellung zu befreien suchen muß. Das *Upas Torara* enthält nur Spuren von letzterem.

Strychnin erhält man am leichtesten aus der Ignatiusbohne, aber seine Bereitung daraus wird kostbar. Pelletier und Caventou schreiben vor, die Bohnen zu zerhacken und sie mit Aether zu digeriren, welcher ein eigenes Extract ist, und sie hierauf mehrere Male mit Alkohol zu waschen, diesen abzudestilliren und darauf das übrigbleibende Extract mit Wasser und Magnesia zu kochen. Das Extract erschlag wird wohl ausgewaschen, getrocknet und mit wasserfreiem Alkohol gekocht, welcher das Strychnin enthält. Die Ignatiusbohne enthält sehr wenig Brucin. Theils ist die Ignatiusbohne nicht immer so leicht

zu bekommen, theils ist die Behandlung mit Aethr kostbar, während dagegen die Krähenaugen übe haben sind. Sie enthalten zwar weniger Strychn sind schwer zu zerkleinern, aber dessen ungeacht nen sie mit größerem Vortheil angewendet werder trocknet die Krähenaugen im Backofen, wodurch spröde werden, das sie, noch heiß und ehe sie Feuchtigkeit angezogen haben, zu Pulver gestosse den können; dieses wird mit Alkohol digerirt, s dieser noch etwas auflöst, und die Auflösung abd bis der größte Theil vom Spiritus abgedampft ist. man befeuchtet auch die Krähenaugen mit ganz Wasser oder Essig, bis sie so weich geworden sir sie sich zerrühren lassen, worauf sie mit Spiritu gossen und mehrere Male mit neuen Portionen werden. Der Spiritus wird dann abdestillirt. Di den Fällen zurückbleibende Masse wird mit viel vermischt und mit Magnesia gekocht, welche das nin ausfällt *). Der Niederschlag wird gut mit Wasser gewaschen und mit kochendem Alkohol v behandelt. Diese Auflösung wird bis zur dünnen consistenz abdestillirt; sie bildet nach dem Erka Magma, welches nach einiger Zeit körnig wird. dies geschehen ist, wird es durch Waschen mit Spiritus von 0,88 spec. Gewicht vom Extractiv- ur stoff, so wie von Brucin befreit; das Strychnin bl bei unaufgelöst, man löst es in kochendem Alko und läßt es anschieseln. Schlägt man bei dieser lung die Salzbase, statt mit Magnesia, mit kau Kali oder Ammoniak nieder, so scheidet sie sich zähe, klebrige Masse aus, die nach einigen Tager Luft aufschwillt und zu Pulver zerfällt, indem s ser anzieht. Dies rührt von dem darin enthalten

*) Aus der filtrirten, dem freiwilligen Verdampfen übe Flüssigkeit werden, nach Pelletier und Caventou, Pfund Med. Gewicht Krähenaugen 10 Gran krystallisi cin erhalten.

her, welches wasserfrei niedergeschlagen wird, und in Hydrat verwandelt. 1 Pfund Med. Gew. Krähenaugen giebt 17, höchstens 18 Gran Strychnin *).

Das Strychnin schießt aus einer mit Wasser etwas verdünnten Alkohol-Auflösung beim freiwilligen Verdampfen in sehr kleinen, weissen, vierseitigen, von allen 4 Flächen aus zugespitzten Prismen an. Bei schneller und zeit getriebener Abdampfung setzt es sich als körniges Pulver ab. Auf Pflanzenfarben reagirt es sehr deutlich alkalisch, und hat einen höchst bitteren, fast unerträglich und hintennach etwas metallischen Geschmack. Es hat keinen Geruch, ist an der Luft unveränderlich, schmilzt

*) Nach Wittstock erhält man nach folgender Methode aus 16 Unzen Krähenaugen 40 Gran salpetersaures Strychnin und 50 Gran salpetersaures Brucin. Die Krähenaugen werden mit Branntwein von 0,94 einmal aufgeköcht, die Flüssigkeit abgeseigt, die Krähenaugen im Trockenofen getrocknet, worauf sie sich leicht pulvern lassen. Sie werden dann noch 2—3 Mal mit Branntwein ausgezogen, die Flüssigkeit alle zusammengegossen und der Weingeist abdestillirt. Die übrigbleibende Flüssigkeit wird mit essigsauerm Bleioxyd vermischt, so lange noch ein Niederschlag entsteht, wodurch Farbstoff, Fett und Pflanzensäuren ausgefällt werden. Der Niederschlag wird gut ausgewaschen. Die davon abfiltrirte Flüssigkeit wird so weit eingedampft, daß für jede 16 Unzen Krähenaugen 6—8 Unzen Flüssigkeit bleibt, auf diese Menge 2 Drachmen Magnesia zugesetzt, und damit mehrere Tage lang stehen gelassen, damit sich auch alles Brucin ausscheidet. Der Niederschlag wird auf Leinwand gebracht, ausgepresst, mit kaltem Wasser wieder angerührt, wieder ausgepresst, und dies einige Mal wiederholt. Hierauf wird er getrocknet, gepulvert, mit Alkohol von 0,835 ausgezogen, und von diesem Auszug der Alkohol dann abdestillirt, wobei sich das Strychnin als weisses, krystallinisches Pulver ausscheidet und schon so ziemlich rein erhalten wird, während in der Mutterlauge das Brucin bleibt. Es ist aber nun am besten, sowohl diese als das Strychnin zusammen in sehr verdünnter Salpetersäure, von der man keinen Ueberschuß zusetzen darf, aufzulösen, und bei mässiger Wärme abzdampfen, wobei das Strychninsalz in federartigen, völlig weissen und reinen Krystallen anschießt, die man wegnimmt. Später krystallisirt ein Theil Brucinsalz in festen Krystallen, das meiste aber bildet wegen fremder Einmengungen eine gummiähnliche Masse, die man wieder mit Magnesia, Alkohol u. s. w. zu behandeln hat, um das Brucinsalz krystallisirt zu bekommen. Beim Ausfällen des Brucins bleibt immer viel aufgelöst, das sich erst nach 6—8 Tagen in krystallinischen Körnern absetzt. *W.*

nicht beim Erhitzen, verliert dabei kein Wasser und zersetzt sich schon bei einer Temperatur zwischen $+312^{\circ}$ und 315° . Bei trockner Destillation giebt es eine schwarze, sich aufblähende Masse, entwickelt die gewöhnlichen Destillationsproducte, welche wenig Ammoniak enthalten, und hinterläßt eine aufgeschwollene Kohle. In Wasser ist es äußerst schwer auflöslich; von kochendem bedarf es 2500 und von kaltem 6667 Theile zur Auflösung, und diese letztere Auflösung, mit noch 100 Mal so viel Wasser verdünnt, schmeckt bemerklich bitter. Von Alkohol wird es leicht aufgelöst, auch wenn er nicht gänzlich wasserfrei ist. Von Aether dagegen wird es wenig oder nicht aufgenommen. Flüchtige Oele lösen dasselbe auf, und aus einer solchen in der Wärme gesättigten Auflösung schießt beim Erkalten ein Theil vom Aufgelösten an. Fette Oele lösen höchst unbedeutend davon auf, nehmen aber einen bitteren Geschmack davon an. Mit Schwefel vermischt und erhitzt, zersetzt es sich bei der Schmelzhitze des Schwefels und entwickelt Schwefelwasserstoffgas.

Das Strychnin ist von Pelletier und Dumas analysirt, welche es zusammengesetzt fanden aus Kohlenstoff 78,22, Wasserstoff 6,54, Stickstoff 8,92 und Sauerstoff 6,38. Diese Zahlen kommen folgenden ganzen Atomgewichten am nächsten; 32 Kohlenstoff, 33 Wasserstoff, 3 Stickstoff und 2 Sauerstoff. Ein Atom Strychnin wiegt dann 3117,36. Wird aber das Atomgewicht nach der Quantität von Schwefelsäure berechnet, welche von Strychnin gesättigt wird, so wiegt es 4779,33 oder $1\frac{1}{2}$ Mal so viel, und Sauerstoff in der Säure und in der Base sind sich gleich.

Die Strychninsalze sind mehr untersucht, als die Salze der übrigen vegetabilischen Salzbasen. Das Strychnin gehört zu den basischen und schlägt die meisten nicht alkalischen unorganischen Basen nieder, von denen mehrere Doppelsalze damit geben. Der Geschmack der Salze ist höchst bitter und unangenehm. Sie werden vom Gerbstoff gefällt, und nehmen, in trockner Form mit Salpetersäure vermischt, eine rothe Farbe damit an; eine Er-

scheinung, wovon indessen ein fremder Bestandtheil die Ursache ist, welcher, wie ich nachher zeigen werde, sich schwer entfernen läßt. Das Strychnin hat eine sehr geringe Sättigungscapacität, die mit 2,0925 ausgedrückt werden kann, und seine neutralen Salze bestehen aus 3 Atomen Basis und 2 Atomen Säure.

Schwefelsaures Strychnin: *a*) neutrales, schießt in kleinen, cubischen Krystallen an, die an der Luft unklar werden, ohne dabei bemerkenswerth an Gewicht zu verlieren. Das Salz schmilzt bei einer sehr gelinden Hitze in seinem Krystallwasser und erstarrt wieder, nachdem es ausgetrieben ist; es hat dann 3 Procent Wasser verloren, dessen Sauerstoff halb so viel wie der der Base beträgt. Es bedarf zur Auflösung 10 Th. Wassers.

b) Zweifach schwefelsaures erhält man durch Zusatz eines Ueberschusses von Schwefelsäure, den man nach dem Abdampfen mit Aether wegnimmt. Es schießt in feinen, zugleich sauer und bitter schmeckenden Nadeln an. Schwefelsaures Kupferoxyd-Strychnin erhält man, wenn die Auflösung eines Kupferoxydsalzes mit Strychnin gekocht, vom niedergeschlagenen Kupferoxyd abfiltrirt, und die blafsgrüne Flüssigkeit zum Anschließen abgedampft wird. Das Salz krystallisirt in langen, grünen Nadeln.

Salpetersaures Strychnin: *a*) neutrales, wird durch Sättigen von verdünnter Salpetersäure mit Strychnin erhalten. Es schießt nach dem Abdampfen in perlmutterglänzenden, büschelförmig vereinigten Nadeln an. In warmen Wasser ist es bedeutend auflöslicher als in kaltem, es löst sich unbedeutend in Alkohol und gar nicht in Aether auf. In trockner Form wird es, etwas über $+100^{\circ}$ erhitzt, leicht zerstört, es wird gelb, bläht sich auf, verpufft, aber ohne Feuer, und hinterläßt eine kohlige Masse.

b) Zweifach salpetersaures entsteht, wenn zu einer gesättigten lauen Auflösung des neutralen Salzes einige Tropfen Salpetersäure gemischt werden. Beim Erkalten schießt das saure Salz in äußerst feinen Nadeln an. Beim Trocknen wird es roth, und beim Erhitzen zersetzt es sich mit Verpuffung und mit Entwicklung von

Feuer. Wird salpetersaures Strychnin mit einer concentrirten freien Säure vermischt, oder wird Strychnin in concentrirter Salpetersäure übergossen, so färbt es sich roth, bis blutroth, und diese Farbe geht allmählich in Gelb, und zuletzt in Grüngelb über. Durch fortgesetzte Einwirkung entsteht Oxalsäure. Diese Veränderungen werden mit Hilfe der Wärme auch durch eine weniger concentrirte Säure hervorgebracht, aber eine sehr verdünnte verändert das Strychnin nicht. Wird die rothe Masse durch Ammoniak oder Magnesia gefällt, so erhält man ein röthgelbes, in geringem Grade in Wasser mit pomeranzengelber Farbe auflösliches Pulver. Von Säuren wird es wieder mit rother Farbe aufgelöst. Ist das Salz durch die Einwirkung der Säure gelb geworden, so wird von Alkali oder Magnesia nichts mehr gefällt. Wird das rothe Salz mit schweflichter Säure oder mit Oxydulsalzen von Zinn oder Eisen vermischt, so verliert es seine Farbe wieder, gerade so, als hätte die Salpetersäure das Strychnin auf eine höhere Oxydationsstufe gebracht, von der es wieder reducirt würde. Nachdem die rothe Farbe in Gelb übergegangen ist, wird sie nicht mehr von diesen Reagentien weggenommen. Pelletier und Caventou glaubten anfangs, diese Erscheinungen rührten wirklich davon her, daß das Strychnin von Salpetersäure höher oxydirt werde, und eine oxydirtere Base bilde, die durch ihre Eigenschaft, rothe Salze zu geben, ausgezeichnet wäre; aber bei Untersuchung des Upasgiftes erhielten sie ein Strychnin, welches, bei allen wesentlichen Charakteren dieser vegetabilischen Salzbasis, sich davon darin unterschied, daß es von Salpetersäure grün gefärbt wurde. Wenn das so beschaffene Strychninsalz mit Wasser und Blutlaugenkohle digerirt wurde, so wurde der fremde grün färbende Stoff abgeschieden, und dann veränderte Salpetersäure die Farbe des Strychnins nicht mehr. Bei dieser Untersuchung des Upasgiftes glückte es ihnen, obwohl diese, durch Salpetersäure grün werdende Materie für sich darzustellen, als auch einen gelben Farbstoff abzuscheiden, welcher von Salpetersäure blutroth und durch

schweflichte Säure oder Oxydulsalze wieder farblos wurde. Es war also offenbar, daß letztere Materie dieselbe war, welche in den Krähenaugen das Strychnin begleitet, und welche im Upasgifte von dem grünfärbenden Stoffe vom Strychnin verdrängt war. Als sie nachher Strychninsalze aus Krähenaugen mit Blutlaugenkohle behandelten und sie umkrystallisirten, so wurden sie fast gänzlich, jedoch nicht vollkommen, von dem mit Salpetersäure roth werdenden Stoff befreit, der also nichts anderes als eine fremde Einmischung ist. Phosphorsaures Strychnin ist schwer neutral zu bekommen, was sich nur durch doppelte Zersetzung bewirken läßt. Wenn Phosphorsäure bis zur Sättigung Strychnin auflöst, so entsteht nur ein saures Salz, welches beim Abdampfen in vierseitigen Prismen anschießt. Kohlensaures Strychnin erhält man sowohl durch doppelte Zersetzung, als dadurch, daß man Strychnin mit Wasser vermischt und Kohlensäuregas hineinleitet. Das Strychnin wird davon aufgelöst, und an der Luft fällt aus der Auflösung nach und nach das neutrale Salz in kleinen Krystallkörnern heraus. Es ist in Wasser etwas auflöslich. Oxalsaures Strychnin ist in Wasser sehr leicht auflöslich; mit Ueberschuß an Säure krystallisirt es. Weinsaures Strychnin eben so. Essigsaures Strychnin ist sehr leicht auflöslich und schießt schwer an, wenn es neutral ist; mit Ueberschuß an Säure aber krystallisirt es leicht.

Von den Haloïdsalzen des Strychnins sind mehrere untersucht. Chlorwasserstoffsäures Strychnin schießt in warzenförmig zusammengehäuften vierseitigen Nadeln an, welche an der Luft unklar werden. In Wasser löst es sich viel leichter auf, als das schwefelsaure Salz. Beim Erhitzen des Salzes, bis zur anfangenden Zersetzung der Base, entwickelt sich Chlorwasserstoffsäure. Wird Chlorgas in mit Wasser vermisches Strychnin geleitet, so löst sich die Base, wahrscheinlich zu chlorsaurem und chlorwasserstoffsäurem Salz auf; aber beim Abdampfen wird die Masse braun. Jodwasserstoffsäures Strychnin schießt in weißen Nadeln an. Wird

Strychnin mit Jod digerirt, so röthet es sich, wie mit Salpetersäure; ist aber die Flüssigkeit sehr verdünnt, wird sie gelb und giebt nach dem Abdampfen das bromdriodsaure Salz. Cyanwasserstoffsäures (blausaures) Strychnin wird durch Auflösung der Base in der Säure erhalten. Die Auflösung kann abgedampft werden, oder daß die Säure entweicht, und schießt in Krystallen ab, oder kann selbst eingetrocknet werden, worauf es sich wiederum leicht in Wasser auflöst und Eisensalze in blauer Farbe fällt.

Das Strychnin und seine Salze gehören zu den wichtigsten und gefährlichsten Giften, welche wir kennen, und die Salze sind im Allgemeinen wegen ihrer Anflöslichkeit weit giftiger, als die Base selbst. Sie sind gleich tödtlich, sie mögen verschluckt oder z. B. durch damit vergiftete Pfeile in Wunden gebracht werden. Der Tod erfolgt gewöhnlich sehr schnell, oft innerhalb weniger Minuten. Die Wirkungen äußern sich durch krampfhaftes Zusammenziehen der Rückenmuskeln, wodurch der ganze Körper nach hinten gezogen wird (Tetanus, Starrkrampf) und das Leben verlöscht. Man kommt selten früh genug dazu, etwas dagegen versuchen zu können. Man hat das Strychnin nicht ohne Erfolg als inneres Heilmittel gegen Lähmungen aller Art und gegen örtliche Atrophien, aber in sehr kleinen Dosen, wie $\frac{1}{\text{xx}}$ Gran, angewendet.

Brucin.

Diese Salzbasis wurde von Pelletier und Caventou in der Rinde von *Brucea antidysenterica*, gewöhnlich falsche Angustura genannt, entdeckt. Sie kommt außerdem, wie schon erwähnt wurde, mit Strychnin in den Strychnosarten, zumal in der *Nux vomica*, vor. In der *Brucea* ist sie mit Galläpfelsäure verbunden, und in den Strychnosarten mit Igasursäure.

Nach Pelletier und Caventou kommt seine Darstellungsweise aus der Rinde von *Brucea* ganz mit der Ausziehung des Strychnins aus der Ignatiushohne überein.

Der das erhaltene Brucin muß zur Reinigung von färbenden Stoffen mit Oxalsäure gesättigt, zur Trockne abgedampft und kalt, d. h. nahe am Gefrierpunkt, mit wasserfreiem Alkohol macerirt werden, welcher die Farbstoffe, mit Hinterlassung des oxalsauren Salzes, auflöst. Dieses wird dann in Wasser aufgelöst, durch Magnesia ersetzt, und der Niederschlag mit Alkohol behandelt.

Magendie schreibt vor, den Niederschlag durch Magnesia mit ganz wenig Wasser zu waschen, weil das Brucin in Wasser nicht unauflöslich ist, und den Alkohol mit Aether zu vermischen, um die Auflösung des oxalsauren Salzes in ersterem zu verhindern.

Thénard schreibt vor, die Rinde mit Wasser auszuziehen, die Auflösung mit etwas Oxalsäure zu vermischen, zur Extractdicke abzdampfen, und dieses bei 0° Temperatur mit wasserfreiem Alkohol zu behandeln, welcher alles andere, nicht aber das oxalsaure Brucin auflöst. Nach dem Kochen dieses Salzes mit Wasser und Magnesia, wird das gefällte Brucin mit kochendem Alkohol ausgezogen, woraus es nachher beim Erkalten krystallisirt. Das von Brucea erhaltene Brucin ist frei von Strychnin.

Die Gewinnung des Brucins aus den Krähenaugen habe ich schon beim Strychnin erwähnt. Man erhält es dabei aus allen Alkohol-Auflösungen des Strychnins, nachdem letzteres herauskrystallisirt ist. Ich werde nachher anführen, wie man sie als salpetersaure Salze von einander trennt.

Das Brucin schießt aus einer mit etwas Wasser versetzten Alkohol-Auflösung, wenn man sie freiwillig abdampfen läßt, in farblosen, durchsichtigen, geschobenen vierseitigen Prismen an. Bei einer schnelleren Abdampfung bildet es entweder perlmutterglänzende Blättchen oder eine blumenkohlähnliche Auswachsung. Diese Krystalle sind das Hydrat vom Brucin. Sie haben einen starken und lange anhaltenden bitteren Geschmack. Wird das Hydrat etwas über +100° erhitzt, so schmilzt es und giebt bis gegen 19 Procent von seinem Gewicht Wasser

sind. Oxalsaures Brucin krystallisirt in langen Nadeln, zumal mit Ueberschuß an Säure. Essigsaares Brucin ist leicht auflöslich, krystallisirt aber nicht.

Von den Holoïdsalzen sind folgende untersucht: Chlorwasserstoffsaares Brucin schießt leicht in vierseitigen, schief abgestumpften Prismen an, die bisweilen haarfein sind. An der Luft verändert es sich nicht. Jodwasserstoffsaares Brucin bildet sich, wenn Brucin und Jod zusammen in Wasser aufgelöst werden, wobei zugleich jodsaures Brucin entsteht; die Salze sind aber nicht für sich untersucht.

Auf den lebenden Körper äußert das Brucin giftige Wirkungen ganz gleich denen, welche durch Strychnin hervorgebracht werden; aber um sie in demselben Grade zu bewirken, wird eine bedeutend größere Dosis von Brucin, als von Strychnin erfordert.

Chinin und Cinchonin.

Von diesen beiden Salzbasen ist das Cinchonin, wegen seiner Eigenschaft, leicht zu krystallisiren, von Duncan, Gomès, Laubert und Pfaff bemerkt und für das hauptsächlich Wirksame der Chinarinde angesehen worden; aber die alkalischen Eigenschaften des Cinchonins wurden zuerst von Pelletier und Caventou dargethan, welche zugleich das Chinin entdeckten. Diese beiden Salzbasen kommen in den meisten Arten von Chinarinde vor, in denen sie sich mit Chinasäure zu Salzen vereinigt finden. Die graue Chinarinde enthält das meiste Cinchonin, und die gelbe das meiste Chinin.

Die Methoden, nach welchen man diese Salzbasen aus der Chinarinde auszieht, sind sehr verschieden. Im Allgemeinen ist zu bemerken, daß Wasser allein dieselben nicht vollständig auszuziehen vermag, weil sich die neutralen Salze in der Rinde durch die Einwirkung des Wassers in unauflöslichere saure Salze und schwerlösliche basische verwandeln. Deswegen enthält solche Chinarinde, welche in den Apotheken zu Infusionen oder Decocten

braucht worden ist, noch den größten Theil dieser Salzbasen. Als Auflösungsmittel wendet man eines der folgenden an:

1) Alkohol. Pelletier und Caventou schreiben vor, mit Alkohol ein Extract von der Rinde zu bereiten, aus diesem mit warmer und sehr verdünnter Chlorwasserstoffsäure Alles auszuziehen, was sie aufzulösen vermag, die saure Flüssigkeit mit Magnesia zu sättigen, und sie dann mit einem Ueberschuß davon zu kochen, abzuseihen, den Niederschlag zu trocknen und ihn mit kochendem Alkohol auszuziehen.

2) Verdünnte Säuren. Henry's Methode verdient hierbei den Vorzug. Er kocht gewöhnlich gepulverte Chinarinde mit dem 8fachen Gewichte Wassers, das mit 1 Procent Schwefelsäure versetzt ist, und wiederholt dies, noch ein Mal mit einer neuen Portion saurem Wasser, filtrirt und preßt das Unaufgelöste aus, vermischt die Auflösung mit $\frac{1}{4}$ vom Gewichte der Chinarinde ungelöschtem Kalk, rührt wohl um, und seigt die Flüssigkeit, sobald sie alkalisch reagirt, ab, wäscht die Kalkmasse mit ein wenig Wasser aus, preßt sie aus und trocknet sie, worauf er sie 3 Mal mit Alkohol von 0,836 kocht; der Alkohol wird abfiltrirt, mit ein wenig Wasser vermischt und abdestillirt, worauf die Basen in Gestalt einer bräunlichen festen Masse zurückbleiben, und also noch nicht völlig rein sind.

3) Zuerst Alkali und dann Säure. Dieses Verfahren hat zum Endzweck, in der Rinde die Salzbasen zurückzubehalten, indem man mit alkalischem Wasser Säuren, Farbstoff, Extract, Gummi u. a. auszieht. Baillier kocht ein Pfund Chinarinde eine Stunde lang mit 4 Pfund Wasser, wozu er nach und nach so viel Kalihydrat setzt, daß die Flüssigkeit nach beendigtem Kochen alkalisch schmeckt. Er läßt sie erkalten, filtrirt, wäscht den Rückstand mit wenig Wasser und preßt ihn aus. Darauf wird er mit lauem Wasser angerührt, welches man nach und nach in kleinen Antheilen mit Chlorwasserstoffsäure versetzt, bis das Gemische, nach fortge-

setzter Maceration, deutlich das Lackmuspapier röthet. Es
 wird hierauf abgeseiht, und, zur Ersparung der Magnesia,
 mit schwefelsaurer Talkerde versetzt, und dann mit einem Ueberschuß
 zugesetztem Kali gefällt. Der Niederschlag wird gewaschen, getrocknet
 und mit Alkohol behandelt. Der Zusatz des Talkerdesalzes, welcher zur
 Fällung der Base nicht nöthig wäre, geschieht darum, weil man bei der
 zuerst erwähnten Preparation zu bemerken glaubte, daß die Talkerde
 eine Portion Farbstoff zurückhält, welcher dann nicht vom Alkohol mit
 den Basen aufgenommen wird. — Stoltze schreibt folgende Bereitungs-
 methode vor: 1 Th. grob gestoßener Chinarinde wird mit dem 6fachen
 Gewichte gutem Kalkwasser eingekocht, bis Alles einen Brei bildet,
 worauf man erkalten läßt und das Flüssige auspresst. Dies wird
 noch zwei Mal mit der ausgepressten Masse wiederholt. Die so
 ausgekochte Chinarinde wird mit Wasser angerührt, zu welchem man
 $\frac{1}{7}$ vom Gewicht der Rinde Chlorwasserstoffsäure von 1,175 setzt,
 so daß das Gemische einen Brei bildet, welchen man 24 Stunden lang
 bei einer, $+50^{\circ}$ nicht übersteigenden, Temperatur digeriren läßt;
 denn bei einer höheren Wärmegrad färbt sich die Flüssigkeit. Die
 Auflösung wird abgeseiht und der Rückstand noch einmal mit saurem
 Wasser behandelt, worauf die klare Flüssigkeit bei gelinder Wärme
 durch Abdampfen concentrirt und hierauf mit kaustischem Kali gefällt
 wird; der Niederschlag ist das Gemenge von beiden Basen.

Auf eine dieser Arten ausgeschieden, sind sie gleichwohl noch nicht
 vollkommen farblos, weil die Chinarinde einen Farbstoff enthält,
 der ihnen hartnäckig anhängt; man befreit sie davon, indem man
 sie in einer Säure auflöst und mit Blutlaugenkohle digerirt. Um
 alle diese färbenden Stoffe völlig los zu werden, hat man sich auch
 mit Vortheil folgender Methode von Geiger bedient: Die Chinarinde
 wird durch Digestion mit Wasser, welches 1 Procent Chlorwasserstoffsäure
 enthält, ausgezogen. Die saure Flüssigkeit wird bis zu 1,109 spec.
 Gew. abgeklopft, und dann mit Zinnchlorür (salzsaurem Zinnoxyd)

1) gefällt, worauf die Flüssigkeit nur gelb erscheint. Das Zinn wird aus der filtrirten Flüssigkeit durch Schwefelwasserstoffgas ausgefällt, dessen Ueberschuß man abdestilliren läßt, und hierauf die Basen durch kaustisches Kali gefällt. Man hat sich auch, wiewohl mit geringerem Erfolg, statt des Zinnsalzes, des neutralen essigsauren Bleiäthers bedient.

Zur Trennung der beiden Basen hat man mehrere Methoden: 1) Man löst sie in Spiritus auf, dampft die Auflösung bis zu einem gewissen Grad ab, wo beim Erkalten das Cinchonin in Krystallen anschießt, und das leicht auflösliche Chinin, mit sehr wenig Cinchonin vermischt, in der Auflösung zurückläßt. 2) Man digerirt sie mit Aether, welcher das Chinin auflöst und das Cinchonin zurückläßt, und 3) man sättigt das Gemenge der Basen mit Schwefelsäure, wovon man einen geringen Ueberschuß zusetzt. Dadurch entstehen saure Salze, von welchen das Chininsalz ziemlich schwer auflöslich ist. Nach mäßig getroffener Abdampfung schießt es beim Erkalten an, und läßt das sehr leicht auflösliche Cinchoninsalz in der Auflösung zurück, verunreinigt mit sehr wenig Chinin, welches man durch die zuvor erwähnte Behandlung mit Alkohol oder Aether, nach Ausfällung der Basen, abscheiden kann. Aus einem Pfund bürgerl. Gewicht Chininarinde erhält man selten mehr als $1\frac{1}{2}$, höchstens 2 Drachmen von den Basen. Graue China gab, bei Pelletier's und Caventou's Versuchen, nur $18\frac{1}{2}$ Gran, aber aus zusammengerollter rother Rinde erhielten sie 14 Gr. Cinchonin und 107 Gr. Chinin von einem Pfund.

Chinin. Diese Salzbasis wird erhalten, wenn das krystallisirte saure schwefelsaure Salz in Wasser aufgelöst und mit kaustischem Alkali gefällt wird. Es scheidet sich dann in weißen, käseähnlichen Flocken aus, die nach dem Trocknen selten vollkommen weiß ausfallen. Es ist sehr schwierig, es krystallisirt zu erhalten; man wurde deshalb lange zur Vermuthung verleitet, es könne nicht krystallisirt erhalten werden. Aber Pelletier hat gezeigt, daß wenn man es bis zur völligen Sättigung in Alkohol

von 0,815 auflöst und die Auflösung im Winter an trocknen Stelle der freiwilligen Verdunstung über dasselbe in kleinen Krystallen anschießt, deren Form der der Cinchoninkrystalle verschieden ist. Sowohl käseartig gefällte Chinin, als das krystallisirte, sind Hydrat der Base. Bei gelindem Erhitzen entweicht Wasser, welches zwischen 3 und 4 Procent beträgt (das Gewicht von einem Atom Wasser auf ein Atom Base), die Masse schmilzt zu einer durchsichtigen Flüssigkeit, welche, nach dem Erstarren durchscheinend, einem Eiskügelchen ähnlich ist, und wie dieses beim Reiben stark negativ elektrisch wird. Wird es im luftleeren Raume geschmolzen, so wird es beim Erstarren krystallinisch, auf der Oberfläche zeigen sich mehrere Krystallsterne und der Bruch ist krystallinisch. Wird die geschmolzene Masse in Wasser gelassen, so schwillt sie allmählich auf, sinkt zu Boden und fällt zu Hydrat. Das Chinin hat einen äußerst bitteren Geschmack, welcher vollkommen der eigentlichen Bitterkeit der Chinarinde gleich ist, die auch von herzurühren scheint. Es stellt die blaue Farbe des gerötheten Lackmuspapieres wieder her. In Wasser ist es ziemlich auflöslich, weshalb man mit seinem Ansichten nicht zu lange fortfahren darf, und bei der Bereitung des Chinins im Großen, thut man am besten, zuvor mit etwas Säure versetztes Waschwasser wieder zudampfen, und es aus der concentrirten Flüssigkeit auf einem Filter niederschlagen. 200 Th. kochenden Wassers lösen 1 Th. Chinin auf. Von Alkohol wird es in großer Menge aufgelöst, woraus es sich nach dem Abdampfen in Wärme als eine weiche, klebrige Masse absetzt. Solches Chinin erhält man aus der Alkohol-Auflösung; nach der Krystallisation des Cinchonins ist es oft sehr unrein, was man am besten durch Behandlung mit Zinnchlorür oder essigsaurem Bleioxyd abhilft, wie schon erwähnt wurde. Es wird auch von Aether aufgelöst, und auch in gelindem Grad und mit Hülfe der Wärme von flüchtigen fetten Oelen.

Die Zusammensetzung des Chinins ist von Pellet

und Dumas bestimmt worden. Sie fanden es zusammengesetzt aus: Kohlenstoff 75,00, Wasserstoff 6,66, Stickstoff 8,45, Sauerstoff 10,40, was, zur nächsten Anzahl ganzer Theile reducirt, ausmacht: Kohlenstoff 30, Wasserstoff 32, Stickstoff 3 und Sauerstoff 3. Das Atom wiegt dann 3058,3, und wenn man aus der Analyse des neutralen schwefelsauren Chinins berechnet, wie viel Chinin das Gewicht von einem Atom Schwefelsäure sättigt, so beträgt diefs das Gewicht von $1\frac{1}{2}$ Atom Base, und der Sauerstoff der Base verhält sich zum Sauerstoff der Säure = 3:2.

Die Chininsalze zeichnen sich durch ihren intensiven Chinageschmack, und die krystallisirten durch einen perlmutterglanz aus. Viele sind in Wasser und einige derselben auch in Alkohol und Aether auflöslich. Die unlöslichen werden von Oxalsäure, Weinsäure und Gallussäure und ihren Salzen gefällt. Eben so auch von Galläpfelinfusion. Die Sättigungscapacität des Chinins ist 1,18, und seine neutralen Salze bestehen aus 3 Atomen Basis und 2 Atomen Säure.

Schwefelsaures Chinin: a) neutrales, schieft sich nach richtiger Abdampfung in schmalen, langen, etwas biegsamen, perlmutterglänzenden Nadeln oder Blättchen ab. In kaltem Wasser ist es schwer auflöslich, aber sehr leicht in kochendem, leicht in Alkohol und wenig in Aether. Beim Erhitzen schmilzt es leicht und sieht wie geschmolzenes Wachs aus; bei stärkerem Erhitzen wird es schön roth und verbrennt endlich ohne Rückstand. Die Krystalle enthalten 15,254 Proc. Krystallwasser, welches beim Schmelzen entweicht; diefs beträgt auf ein Atom Salz (d. h. mit 3 At. Basis und 1 At. Säure) 16 Atome Wasser. An einen trocknen und warmen Ort gelegt, verliert es $\frac{2}{3}$ von seinem Wasser und behält nur 4 Atome, welche dann 4,31 Procent vom Gewichte des Salzes betragen. b) Zweifach schwefelsaures. Dieses Salz schieft in farblosen, durchsichtigen, rechtwinkligen, vierseitigen Prismen mit zweiflächiger Zuspitzung an; es röthet Lackmuspapier, schmeckt aber nicht sauer. Zur Auflösung bedarf es 11 Th. Wassers von $+12^{\circ}$ Temperatur;

in Spiritus ist es leicht auflöslich, aber schwer in wasserfreiem Alkohol. Es verwittert an der Luft. Es enthält 24,66 Procent Wasser, was auf 3 Atome Basis und 4 Atome Säure, d. h. auf 1 Atom saures Salz, 32 Atome Wasser ausmacht. Die hier vorkommenden Multipla von Wasser sind nach Baup's Analyse von diesen Salzen angegeben. Da sie keine geraden Sauerstoffmultipla, weder vom Sauerstoff der Base, noch dem der Säure enthalten, so verdienen aus diesem Gesichtspunkt eine nähere Untersuchung. Wodurch getrocknetes schwefelsaures Chinin hat die Eigenschaft, wenn es bis gegen $+100^{\circ}$ und etwas darüber erwärmt wird, im Dunkeln leuchtend zu werden, d. h., ähnlich z. B. dem Flußspath, zu phosphoresciren. Unterschwefelsaures Chinin erhält man, wenn eine kochendheiß gesättigte Auflösung von neutralem schwefelsaurem Chinin mit etwas überschüssig zugesetzter unterschwefelsaurer Baryterde gefällt, kochendheiß filtrirt und erkalten gelassen wird, wobei das Salz in Krystallen anschießt, die man mit kaltem Wasser, worin es schwer auflöslich ist, abwaschen kann. Salpetersaures Chinin bildet, wenn seine Auflösung beim Abdampfen bis zu einem gewissen Grad von Concentration gekommen ist, ölartige Tropfen, welche nach dem Erstarren wachähnlich werden. Wenn man diese halbrunden, wachähnlichen Perlen einige Tage lang mit etwas Wasser bedeckt, so verändern sie nach und nach ihr Ansehen und verwandeln sich in Gruppen von glänzenden, regelmässigen Krystallen, und bisweilen wird sogar aus dem Tropfen ein einziger ganzer Krystall. Diese Erscheinung beruht darauf, daß sich in der Wärme das Salz geschmolzen und ohne Krystallwasser absetzt, und dasselbe allmählich wieder aufnimmt und damit krystallisirt. Das Salz bildet dabei ein kurzes rhomboidales auf die Basis schief aufgesetztes Prisma, das sich nicht nach natürlichen Durchgängen spalten läßt. Phosphorsaures Chinin schießt leicht in farblosen, durchsichtigen, etwas perlmutterglänzenden Nadeln an, und ist sowohl in Wasser als in Alkohol leicht auflöslich. Arsensäures Chinin verhält sich in Allem dem phosphor-

sauren ähnlich. Oxalsaures Chinin wird durch Fällung eines auflösliehen Chininsalzes mittelst eines neutralen oxalsauren Salzes erhalten; es ist in kaltem Wasser schwer auflöslieh und fällt als ein weißes Pulver nieder. Von kochendem Wasser wird es besser aufgelöst, woraus es beim Erkalten in seidenglänzenden Nadeln anschießt. Eine gesättigte kochendheisse Auflösung gesehet beim Erkalten. Es ist in Alkohol, zumal in warmen, leicht auflöslieh, woraus es sich beim Erkalten zum Theil krystallisirt absetzt. Mit Ueberschufs an Säure ist das Salz in Wasser leicht auflöslieh und krystallisirt in Nadeln. Weinsaures Chinin gleicht dem vorbergehenden, ist aber etwas auflöslieher. Essigsäures Chinin krystallisirt in feinen, seidenglänzenden, bisweilen warzenähnlich vereinigten Nadeln, ist in kaltem Wasser schwer, aber in kochendem leicht auflöslieh. Galläpfelsäures Chinin fällt als ein weißes Pulver nieder, wenn ein auflösliehes Chininsalz mit einem galläpfelsäuren Salze vermischt wird. In heißem Wasser löst es sich ziemlich gut auf, und fällt beim Erkalten wieder nieder. In Spiritus und in überschlüssiger Säure löst es sich leicht auf. Der durch Galläpfelinfusion gebildete Niederschlag kann in kochendheißem, mit freier Säure vermischem Wasser aufgelöst, und durch eine Auflösung von Leim in Wasser zersetzt werden, welcher den Gerbstoff abscheidet, worauf man die Base mit Alkali ausfällt.

Haloïdsalze. Chlorwasserstoffsäures Chinin ist schwer auflöslieh, wiewohl in geringerem Grade als das neutrale schwefelsäure Salz; es schießt in perlmutterglänzenden Nadeln an. Jodwasserstoffsäures Chinin erhält man, zugleich mit jodsäurem, wenn Chinin und Jod mit warmen Wasser vermischt werden; beide Salze schlagen sich beim Erkalten als ein weißes Pulver nieder.

Cinchonin erhält man, wenn die nicht krystallisirte Mutterlauge vom schwefelsäuren Salze mit kaustischem Alkali gefällt, der Niederschlag gut ausgewaschen und nach dem Trocknen in kochendem Alkohol aufgelöst wird, woraus es beim Erkalten krystallisirt. Sobald der

Alkohol bei erneuertem Abdampfen keine Krystalle mehr giebt, enthält die Mutterlauge nur Chinin. Durch eine zweite Krystallisation erhält man das Cinchonin ganz frei von Chinin. Es schießt in kleinen, farblosen, durchsichtigen, geschoben vierseitigen Prismen mit zweiflächiger Zuspitzung an. Anfangs schmeckt es wenig, hintennach aber sehr stark und anhaltend; der Geschmack ist dem des Chinins ähnlich. Es stellt die blaue Farbe des getrockneten Lackmuspapiers wieder her. Erhitzt, verliert es nichts an Gewicht, und schmilzt nicht eher, als bis es sich zu zersetzen angefangen hat, wobei sich aber ein Theil unverändert in glänzenden Nadeln sublimirt. In kaltem Wasser ist es fast unauflöslich, und von kochendem bedarf es 2500 Th. In Alkohol ist es viel schwerer auflöslich, als das Chinin. Die Auflösung schmeckt wie Chinarinde. Von Aether wird es fast nicht aufgelöst, und nur in sehr geringer Menge von fetten und flüchtigen Oelen, so wie von Steinöl; in den warmen Oelen ist es jedoch auflöslicher, und beim Erkalten krystallisirt es wieder heraus.

Das Cinchonin ist von Brande, so wie auch von Pelletier und Dumas analysirt worden. Brande giebt an, das Cinchonin enthalte keinen Sauerstoff. Wird es in trockenem Zustande in kochendem Steinöl aufgelöst und Kalium hineingelegt, so wird es nicht zersetzt, das Kalium oxydirt sich nicht, und das Cinchonin schießt beim Erkalten auf den blanken Perlen von Kalium an. Bei der trocknen Destillation giebt es keine Spur von Wasser, und in Chlorgas erhitzt, wird das Gas nicht absorbirt, sondern erst, wenn sich die Base bei einer höheren Temperatur zersetzt, bildet sich Chlorwasserstoffgas, ohne Spur von entwickeltem Wasserstoffgas. Bei der Analyse fand Brande das Cinchonin zusammengesetzt aus: Kohlenstoff 78,4, Stickstoff 14,6 und Wasserstoff 7,5.

Pelletier und Dumas dagegen fanden im Cinchonin: Kohlenstoff 76,97, Wasserstoff 6,22, Stickstoff 9,02 und Sauerstoff 7,70, was, zu der nächsten Anzahl ganzer Atome reducirt, ausmacht: Kohlenstoff 39, Wasserstoff 39, Stick-

stoff 4 und Sauerstoff 3. Das Atom wiegt dann 3879,76, was auch genau die Quantität von Cinchonin ist, welche das Gewicht von einem Atom Schwefelsäure sättigt, wodurch der Sauerstoff der Base gleich dem Sauerstoff der Säure wird.

Die Cinchoninsalze zeichnen sich durch einen sehr bitteren, dem der Chininsalze nicht unähnlichen Geschmack aus. Es giebt sowohl völlig neutrale, als saure Salze. Sie werden, wie die Chininsalze, von oxalsauren, weinsauren und galläpfelsauren Salzen, so wie von Galläpfelinfusion gefällt. Die neutralen Salze bestehen aus einem Atom Basis und einem Atom Säure. Die Sättigungscapacität ist 2,6.

Schwefelsaures Cinchonin: a) neutrales, schießt in Prismen mit rhombischer Basis und zweiflächiger Zuspitzung, oder mit gerade angesetzter Endfläche an. Es ist in Wasser sehr schwer auflöslich, wovon es, bei gewöhnlicher Temperatur, 54 Th. bedarf. Es braucht $6\frac{1}{2}$ Th. Spiritus von 0,85 und $11\frac{1}{2}$ Th. wasserfreien Alkohols. Im Aether ist es unauflöslich. Ueber $+100^{\circ}$ erhitzt, schmilzt es wie Wachs, und bei noch höherer Temperatur wird es erst roth und zersetzt sich darauf. Die Krystalle enthalten 4,865 Procent Wasser, welche 2 Atome auf 1 Base ausmachen, wodurch der Sauerstoff des Wassers zu dem der Base wird $= 2 : 3$. b) Zweifach schwefelsaures ist in Wasser sehr leicht auflöslich, und schießt beim Erkalten einer concentrirten Auflösung in großen regelmäßigen Krystallen an, deren Form ein Octaëder mit rhombischer Basis ist, die man aber gewöhnlich nur segmentförmig angeschossen erhält. Sie lassen sich leicht parallel mit der größeren Achse spalten, und die Spaltungsfläche ist glatt und glänzend. Bei $+14^{\circ}$ bedarf dieses Salz nicht mehr als 0,46 seines Gewichts Wassers zur Auflösung. Es wird von 0,9 Alkohol, von 0,85 und von gleichen Theilen wasserfreien Alkohols aufgelöst; aber in Aether ist es unauflöslich. In trockner Luft wird es unklar, und mit Hülfe von Wärme verwittert es. Das krystallisirte Salz besteht nach Baup aus 1 At. Basis, 2 At. Säure und 8 At. Wasser (15,518 "

cent); und hier fehlt dasselbe multiple Verhältniß zwischen dem Sauerstoff der Base und dem des Wassers, welches wir schon bei den Chininsalzen bemerkt haben. Diese Salze phosphoresciren beim Erwärmen, wie die Chininsalze. Unterschwefelsaures Chinin erhält man auf gleiche Weise, wie das entsprechende Chininsalz, dem es ähnlich ist. Salpetersaures Cinchonin verhält sich ganz so wie das Chininsalz; läßt man die abgetrennten ölartigen Tropfen unter Wasser anschleifen, so bilden sie rechteckige, auf die Basis schief aufgesetzte Prismen, woran zwei entsprechende Flächen perlmutterglänzend sind. Es hat Durchgänge, nach denen es sich leicht parallel mit diesen Flächen spalten läßt. Phosphorsaures Cinchonin verhält sich ähnlich dem salpetersauren. In Wasser ist es sehr leicht auflöslich. Arseniksaures Cinchonin ist in Wasser leicht auflöslich und schwer krystallisirt zu bekommen. Kohlensaures Cinchonin wird durch kohlensaures Alkali niedergeschlagen; reines Cinchonin zieht aus der Luft Kohlensäure an. Oxalsaures Cinchonin fällt als ein weißes Pulver nieder. Von kochendem Wasser, von kochendem Alkohol und von überschüssiger Oxalsäure wird es aufgelöst. Weinsaures Cinchonin ist dem vorhergehenden ähnlich, ist aber etwas leichter auflöslich. Essigsäures Cinchonin bildet, wenn Essig mit der Base gesättigt wird, eine saure Flüssigkeit, aus welcher beim Abdampfen ein körniges neutrales Salz anschießt. Beim freiwilligen Verdampfen erhält man eine gummiähnliche Masse, welche das saure Salz ist. Galläpfelsaures Cinchonin wird aus der Auflösung niedergeschlagen. Von kochendheißem Wasser wird es aufgelöst, welches beim Erkalten opalisirt, und dann körnige, durchscheinende Krystalle absetzt.

Sowohl das Cinchonin, als vorzüglich das Chinin haben in der letzteren Zeit eine große Berühmtheit wegen ihrer Anwendung in der Medicin erlangt. Die Erfahrung scheint es entschieden zu haben, daß die Chinarine diesen Salzbasen ihre Wirksamkeit zu verdanken hat, in-

dem man mit einigen wenigen Granen von den Salzen dieser Basen dasselbe ausrichtet, wie mit mehreren Drachmen der widerlichen Rinde. Man glaubt gefunden zu haben, daß das Chinin das Cinchonin an Wirksamkeit übertriffe, und im Allgemeinen wendet man vorzugsweise zweifach schwefelsaures Chinin in verwittertem Zustande an. Als eine große Sonderbarkeit muß ich noch die Angabe erwähnen, daß man aus der sogenannten China de Carthagena, welche gegen Wechselfieber unwirksam ist, ein Chinin auszieht, welches hinsichtlich der Krystallform und der übrigen Verhältnisse seiner Salze nicht von dem aus gewöhnlicher Chinarinde abweicht, welches aber, so wie jene Rinde, unwirksam sein soll. — Man giebt an, daß der in einem Aufguss von Chinarinde durch Galläpfelinfusion bewirkte Niederschlag galläpfelsaures Cinchonin und Chinin sei, und daß diese Eigenschaft, von Galläpfelinfusion gefällt zu werden, folglich eine wirksame Chinasorte anzeigen würde; aber dieß verhält sich nicht so. Wenn die Chinarinde nicht zugleich von Leimauflösung und von weinsaurem Antimonoxyd-Kali gefällt wird, so ist sie kein wirksames Mittel gegen Wechselfieber. Aber die Salze dieser Basen wirken nicht auf die letztgenannten Reagentien; es sieht demnach aus, als enthielte die Chinarinde noch etwas anderes Wirksames, als diese Basen, welche vielleicht, wenigstens einem Theile nach, mit den Stoffen vereinigt sind, die von der Leimlösung und dem Antimonoxydsalz gefällt werden. Eine vollständige Ausmittelung dieses Punktes wäre gewiß für die Heilkunde von großer Wichtigkeit.

Veratrin.

Diese Salzbasis wurde von Pelletier und Dumas, und zu gleicher Zeit von Meißner entdeckt. Sie findet sich im Saamen von *Veratrum Sabadilla* (Sabadillsaamen), in der Wurzel von *Veratrum album* (weiße Nieswurzel) und in der Wurzel von *Colchicum autumnale* (Herbstzeitlose). Sie ist meistens verbunden mit Galläpfelsäure.

Man zieht das Veratrin am gewöhnlichsten aus dem Sabadilla-Saamen, der am leichtesten zu haben ist. Der Saamen wird zerkleinert und durch Kochen mit Wasser ausgezogen. Die abgeseigte Abkochung wird mit einer Auflösung von neutralem essigsäurem Bleioxyd vermischt, welches eine Menge vegetabilischer Stoffe ausfällt; die Flüssigkeit wird filtrirt, das überschüssig zugesetzte Bleisalz durch Schwefelwasserstoffgas ausgefällt; die Flüssigkeit zur Verjagung des Schwefelwasserstoffgases digerirt, filtrirt, und dann mit Talkerde gekocht, welche das Veratrin ausfällt. Man löst dasselbe in kochendem Alkohol auf, woraus man es dann durch Abdampfen oder durch Fällung mit Wasser erhält. Der Niederschlag ist gewöhnlich gelblich, und muß, um völlig rein zu werden, noch einmal aufgelöst und niedergeschlagen, oder als Salz mit Blutlaugenkohle behandelt werden.

Das Veratrin hat nicht krystallisirt erhalten werden können, sondern es bildet ein weißes Pulver. Es hat einen scharfen und brennenden, aber nicht bitteren Geschmack; es ist ohne Geruch, erregt aber, wenn es in die Nase kommt, heftiges und gefährliches Niesen. Es schmilzt leicht, schon bei $+50^{\circ}$, und erstarrt beim Erkalten zu einer durchsichtigen, gelblichen Masse. Beim Schmelzen im luftleeren Raum bläht es sich stark auf, scheint Wasser zu verlieren, und gesteht dann in Gestalt eines Schaumes, welcher nicht mehr ohne Zersetzung schmilzt. Es stellt die blaue Farbe auf geröthetem Lackmuspapier wieder her. In kaltem Wasser ist es fast unauflöslich; kochendes Wasser nimmt davon $\frac{1}{1000}$ auf, und bekommt davon einen scharfen Geschmack. In Alkohol ist es sehr leicht auflöslich, in Aether schwer auflöslich, und fast unauflöslich, wenn er frei von Alkohol ist. Mit Hülfe von Wärme löst es sich in Terpentinöl auf.

Die Zusammensetzung des Veratrin ist von Pelletier und Dumas ausgemittelt. Sie fanden es zusammengesetzt aus: Kohlenstoff 66,75, Wasserstoff 8,54, Stickstoff 5,04 und Sauerstoff 19,60, was, zu einer solchen Anzahl von ganzen Atomen reducirt, die seiner geringen

Sättigungscapacität entspricht, ausmacht: Kohlenstoff 44, Wasserstoff 70, Stickstoff 3 und Sauerstoff 10. Ein Atom wiegt dann 5054,7, und das Gewicht von einem Atom Schwefelsäure erfordert zur Sättigung das Gewicht von $1\frac{1}{2}$ Atom Veratrin, wobei der Sauerstoff der Base 5 Mal der der Säure wird.

Die Veratrinsalze haben einen scharfen und brennenden Geschmack. In concentrirten Auflösungen können sie so neutral erhalten werden, daß sie das Lackmuspapier nicht röthen; aber durch Verdünnung verlieren sie diese vollständige Neutralität. Diese Salze können nicht krystallisiren, sie trocknen zu gummiähnlichen Massen ein; man hat bis jetzt nur bei einem einzigen, nämlich dem sauren schwefelsauren Veratrin, Spuren von Krystallisation bemerkt. Deshalb sind auch diese Salze nicht mit gleicher Ausführlichkeit, wie die vorhergehenden, untersucht. Die neutralen Veratrinsalze bestehen aus 3 Atomen Basis auf 2 Atome Säure; seine Sättigungscapacität ist 1,32.

Das Veratrin ist in seinen Wirkungen dem Strychnin und Brucin darin ähnlich, daß es in großen Gaben Tetanus erzeugt und tödtet. In geringerer Menge bewirkt es verschiedene, eigenthümliche Symptome; so bringt es, in die Nase als Pulver eingeathmet oder als aufgelöstes Salz eingesprützt, das heftigste Niesen hervor; im Munde erregt es einen häufigen Speichelfluß, und in den Magen und die Gedärme gebracht, bewirkt es zugleich Erbrechen und Durchfall. Die Heilkunde möchte gleichwohl in Zukunft aus diesen Wirkungen Vorthail ziehen können.

Emetin.

Diese Salzbasis wurde von Pelletier in der Ipecacuanha-Wurzel entdeckt, nachdem er indessen, vor Entdeckung der vegetabilischen Salzbasen, in Gesellschaft mit Magendie, aus dieser Wurzel eine emetinhaltige Substanz abgeschieden hatte, welcher sie anfangs diesen Namen gaben. Das Emetin findet sich in den verschiedenen

Arten von Wurzeln, die im Droguerihandel unter d Namen *Ipecacuanha* vorkommen, und die von *Cephae emetica*, *callicocca*, *ipeacacuanha* und *Viola emeti* abstammen.

Das Emetin wird, nach Pelletier's Vorschrift, s folgende Art ausgezogen: Die Wurzel wird gepulve zuerst mit Aether extrahirt, welcher ein riechendes Fe aufnimmt, und hierauf mit kochendem Alkohol. Die la tere Auflösung wird abfiltrirt, mit etwas Wasser vermiscl und der Alkohol abdestillirt, worauf der mit etwas mel Wasser vermischte Rückstand von einem abgesetzten fe ten Stoff abfiltrirt, und dann mit gebrannter Magnesia g kocht wird, welche das Emetin ausfällt; nach dem Au waschen mit etwas abgekühltem Wasser wird aus da getrockneten Niederschlag das Emetin mit Alkohol ausg zogen, welcher nach dem Verdampfen dasselbe noch etw gefärbt zurückläßt. Es wird in einer Säure aufgelöst, m Blutlaugenkohle behandelt, filtrirt und niedergeschlage wodurch man es rein erhält. Es verdient hierbei erwah zu werden, daß, bei Bereitung des Emetins im Groß zu pharmaceutischem Behuf, die Waschwasser aufbewah und abgedampft werden müssen, weil sie noch eine Po tion Emetin enthalten.

Bei dieser Bereitungsart bleibt noch die Verbesserung zu machen übrig, den Aether und Alkohol zur Ausziehu der Wurzel zu entbehren, und dieselbe, wie bei den vo hergehenden Substanzen, mit saurem Wasser zu beha deln, was, so viel ich weiß, noch nicht versucht wo den ist.

Das Emetin erhält man selten vollkommen weiß; e zieht etwas in's Gelbe, und färbt sich noch mehr in Be rührung mit der Luft. Es stellt die blaue Farbe auf ge röthetem Lackmuspapier wieder her. Es hat einen seh schwachen bitteren Geschmack und keinen Geruch. I kaltem Wasser ist es schwer auflöslich, auflöslicher in wa men. Es ist ausgezeichnet leicht schmelzbar, und wie schon bei einer noch nicht ganz bis $+50^{\circ}$ gehenden Tem peratur flüssig. In Alkohol ist es sehr leicht auflöslich

Aether und in Oelen aber fast ganz unauflöslich. Es tigt die Säuren, wiewohl seine Salze noch schwach er reagiren. Keines seiner Salze wird krystallisirt erlten, sondern geben beim Abdampfen gummiähnliche assen, in welchen man bisweilen nur Spuren von Kryllisation bemerkt. Von concentrirter Salpetersäure wird znerst in einen gelben, harzartigen, bitteren Stoff, und erauf in Oxalsäure zersetzt; aber mit verdünnter Säure ebt es Salz. Mit Oxalsäure und Weinsäure bildet es flösliche Salze, aber Galläpfelsäure und Galläpfelinfon fallen dasselbe mit weißer Farbe. Seine auflöslichen ilze werden nicht durch basisch essigsäures Bleioxyd nieergeschlagen, zum Beweis, daß das Emetin nicht von em im Bleiessig überschüssigen Bleioxyd ausgefällt weren kann.

Die Zusammensetzung des Emetins ist von Pelleer und Dumas bestimmt worden; der Versuch wurde it Emetin aus der Wurzel von *Cephaëlis emetica* angeellt. Es besteht aus: Kohlenstoff 64,57, Wasserstoff 7,77, ickstoff 4,30 und Sauerstoff 22,95; was, zur nächsten nzahl ganzer Atome reducirt, beträgt: Kohlenstoff 37, Wasserstoff 54, Stickstoff 2 und Sauerstoff 10. Das Atom rieht dann 4342,13. Dieß hat nicht controllirt werden önnen, da bis jetzt die Sättigungscapacität des Emetins icht untersucht werden konnte.

Das Emetin hat seinen Namen vom griechischen *εμεω*, ch erbreche, weil es in einem ausgezeichneten Grade as Vermögen besitzt, innerlich genommen, Erbrechen zu erregen, wozu bisweilen $\frac{1}{\text{V}}$ Gran schon hinreichend ist. Die brechenerregende Kraft der Ipecacuanha beruht also gänzlich auf dieser Salzbasis. Wahrscheinlich wird das Emetin künftig als Salz statt der Wurzel allgemein angewendet, da die Emetinsalze viel leichter zu nehmen sind, und man damit den Grad von Wirkung, welchen man erhalten will, viel mehr in der Gewalt hat. In Frankreich hat man schon damit angefangen, wo im Codex medicamentarius, unter dem Namen Emetina, eine zerfließliche Substanz aufgenommen ist, welche dadurch

gewonnen wird, daß das zuvor erwähnte Alkohol-Extrat der Brechwurzel mit Wasser ausgezogen, und, nach Sättigung der freien Säure mit etwas kohlensaurer Talkerde (*Magnesia alba*), filtrirt und zur Trockne abgedampft wird. Die Franzosen nennen dieses emetinhaltige Extrat gefärbtes Emetin (*Emétine colorée*).

Nachdem ich nun diejenigen vegetabilischen Salze beschrieben habe, deren Zusammensetzung näher untersucht ist, glaube ich, daß eine tabellarische Zusammenstellung der Zahlen-Resultate für den Leser von einigem Nutzen sein werde, da sie die Vergleichung zwischen diesen Körpern erleichtert.

Folgende Tabelle ist so eingerichtet, daß alle zu einer und derselben Base gehörenden Angaben unter einander stehen, während dagegen die bei den verschiedenen Basen sich einander entsprechenden Quantitäten in derselben Reihe stehen.

Namen der Basen.	Morphin.	Narcotin.	Strychnin.	Brucin.	Chinin.	Cinchonin.	Veratrin.	Emetin.	
Resultat vom directen Versuch	Kohlenstoff	72,02	68,88	78,22	75,04	75,02	76,97	66,75	64,57
	Wasserstoff	7,61	5,91	6,54	6,52	6,66	6,22	8,54	7,77
	Sauerstoff	14,84	18,00	8,92	7,92	8,45	9,02	5,04	4,30
Giebt folgende Atomen-Anzahl auf ein Atom Basis	Kohlenstoff	38	20	32	35	30	39	44	37
	Wasserstoff	49	21	33	37	32	39	70	54
	Sauerstoff	6	4	2	4	3	4	3	2
Das Resultat der Berechnung von der Anzahl der einfachen Atome	Kohlenstoff	72,84	68,34	78,46	74,89	74,98	76,86	66,39	65,13
	Wasserstoff	7,67	5,86	6,61	6,47	6,53	6,28	8,63	7,76
	Sauerstoff	15,05	17,88	8,52	7,44	8,68	9,13	5,24	4,08
Das Atom wiegt	Ein Atom Säure sättigt	3987,56	2236,88	3117,56	3571,84	3058,44	3878,59	5065,82	4342,34
	Das Salz besteht aus Atomen	1	—	3	3	3	1	3	—
	Der Sauerstoff der Base zu dem der Säure	2:1	—	2	2	2	1	2	—
100 Th. werden gesättigt von Schwefelsäure	—	—	—	1:1	2:1	3:2	1:1	5:1	—
	—	—	—	10,71	9,36	10,93	12,915	6,595	—
	—	—	—	9,73	8,50	9,92	11,73	5,99	—
Sättigungscapacität	—	—	2,137	1,867	2,18	2,577	1,316	—	

Ich bemerke noch, daß man mit Hülfe dieser Tabelle die Zusammensetzung aller Salze berechnet, welche diese Basen mit denjenigen Säuren bilden, deren Aequivalente bekannt sind.

Delphinin.

Dasselbe wurde zu gleicher Zeit von Lassaigne und Feneulle in Frankreich und von Brandes in Deutschland entdeckt. Es findet sich als äpfelsaures Salz in den Saamen von *Delphinium Staphisagria* (Stephanskörner).

Das Delphinin erhält man ganz leicht aus diesen Saamen, indem man sie mit Wasser digerirt, dem etwas Schwefelsäure zugesetzt ist, die saure Flüssigkeit dann mit Alkali oder Magnesia fällt, und den ausgewaschen und getrockneten Niederschlag mit Alkohol kocht, wodurch das Delphinin auszieht. Es kann vollkommen von fremden färbenden Stoffen befreit werden, wenn es als Salz mit Blutlaugenkohle gekocht, und dann mit kauschem Ammoniak ausgefällt wird, wobei es, ähnlich der frisch gefällten Thonerde, gelatinös niederfällt. Durch Abdampfen aus seiner Auflösung in Alkohol erhalten, hat es das Ansehen eines krystallinischen Pulvers, welches beim Trocknen undurchsichtig wird. Nach dem Trocknen des gelatinösen Niederschlags bildet es ein weißes Pulver, von unangenehmem, bitterem Geschmack, reagirt auf geröthetes Lackmuspapier schwach alkalisch, schmilzt ganz leicht wie Wachs, und bildet nach dem Erstarren eine harzähnliche Masse. Mit Wasser soll es in geringem Grade verflüchtigt werden können, denn Brandes fand es in dem über Stephanskörnern destillirten Wasser. Es ist in Wasser fast unauflöslich, welches jedoch den Geschmack davon annimmt; aber in Alkohol und in Aether löst es sich sehr leicht auf. Aus diesen kochendheiß gesättigten Auflösungen schlägt es sich beim Erkalten in Flocken nieder. Es wird sowohl von fetten als flüchtigen Oelen aufgelöst.

Seine Zusammensetzung ist nicht untersucht. Mit der

äuren bildet es neutrale Salze, die indessen selten zum Crystallisiren zu bringen sind. Ihr Geschmack ist bitter und scharf. Sie sind nicht so untersucht, daß sich darüber im Einzelnen etwas sagen ließe. Feneulle giebt an, daß das Delphinin sowohl saure, als neutrale und selbst auch basische Salze bilde. So fand er mit Schwefelsäure ein neutrales Salz, worin 100 Th. Delphinin von 116 Th. Schwefelsäure gesättigt werden, und ein anderes basisches, worin es nur halb so viel aufnahm. In diesem Falle wäre die Sättigungscapacität des Delphinins nur 0,623. — Schwefelsaures und essigsaures Delphinin bilden nach dem Abdampfen ein hartes, durchscheinendes Gummi. Salpetersaures Delphinin wird beim Abdampfen gelb und giebt eine zerfließliche Salzmasse. Chlorwasserstoffsäures Delphinin ist ebenfalls deliquescent. Oxalsaures Delphinin bildet weiße Blättchen.

Solanin.

Das Solanin wurde von Desfosses in den Beeren vom schwarzen Nachtschatten (*Solanum nigrum*) entdeckt. Man hat es nachher auch in den Beeren von *Solanum verbascifolium*, in den Stengeln, Blättern und Beeren von *Solanum dulcamara*, und selbst auch von *tuberosum* (Kartoffeln) gefunden. Man erhält es, wenn der ausgepresste Saft der reifen Beeren filtrirt und mit kautischem Ammoniak gefällt wird. Aus unreifen Beeren erhält man es wohl auch, es ist aber dann durch den schwer abscheidbaren, grünen Farbstoff verunreinigt. Der Niederschlag, welcher graulich ist, wird wohl gewaschen und getrocknet, und darauf in kochendem Alkohol aufgelöst, woraus sich das Solanin beim langsamen Abdampfen als ein weißes Pulver absetzt, das etwas perlmutterartiges in seinem Ansehen hat. Es hat einen schwach bitteren und ekelhaften Geschmack. Bei etwas über $+100^{\circ}$ schmilzt es, und bildet, nach dem Erkalten und Erstarren, eine citrongelbe Masse. Auf geröthetes Lackmuspa-

pier reagirt es alkalisch, nicht aber auf die Farbe Curcuma. In kaltem Wasser ist es unauflöslich, und kochendem bedarf es 8000 Th. In Alkohol löst es leicht auf; nur wenig in Aether. In Oelen ist es unlöslich. Mit den Säuren giebt es völlig neutrale, schmeckende Salze. Schwefelsaures, Salpetersaures, saures und chlorwasserstoffsaures Solanin trocknen allgummiähnlichen Massen ein, die sich leicht pulvern lassen. Desfosses fand, daß 100 Th. Solanin 10,981 Schwefelsäure neutralisiren, in Folge dessen seine Sättigungscapacität 2,19 wäre. — Seine Zusammensetzung übrigens unbekannt.

Solanin soll, aus Versuchen an einer Katze zu sehen, zugleich emetisch in hohem Grade und hierauf schlafmachend wirken. Bei Hunden hat man seine emetische Wirkung bestätigt gefunden, nicht aber seine schlafmachende. In größerer Dosis scheint es giftig zu sein. Verschiedentlich hat es Theil an der Wirksamkeit der Datura, so wie an den der Gesundheit nachtheiligen Wirkungen, welche man bisweilen schon nach dem Genuß zu frühzeitiger Kartoffeln bemerkt hat.

Vegetabilische Salzbasen, welche noch zu wenig untersucht sind, als daß sie mit Sicherheit als solche angenommen werden könnten.

Picrotoxin.

Dieser Stoff wurde von Boullay bei einer Art der Beeren von *Menispermum cocculus* (Kockelsköckchen) entdeckt, indem dabei die Eigenschaft desselben, zu krampfen, seine Aufmerksamkeit auf sich zog. Nach Entdeckung der vegetabilischen Salzbasen, suchte er darzutun, daß dieser Stoff zu den schwächsten vegetabilischen Salzbasen gehöre und Salze gebe, die jedoch nicht vollkommen neutral werden. Casaseca hat hierauf zu zeigen gesucht, daß es keine Salzbasis sei; indessen sind seine Be-

och nicht entscheidend. — Bei der Frage, ob ein vegetabilischer Körper Salzbasis sei oder nicht, darf man sich nicht ausschliessend bei dem Umstande halten, dass die Säuren davon vollständig neutralisirt werden, denn in einem grossen Theile unorganischer Salzbasen fehlt diese Eigenschaft, sondern man muß zusehen, ob er mit den Säuren Verbindungen eingeht, von welchen die flüchtigen Säuren nicht abdampfen, oder aus welchen die Base nicht in isolirter Form, wie aus einem neutralen Auflösungs- mittel, anschießt, welche Umstände aber für das Picrotoxin nicht erwiesen sind.

Das Picrotoxin erhält man, nach Boullay's Vorschrift, auf folgende Weise: Die Kockelskörner werden von der Schaafe befreit, zerstoßen und mit Wasser ausgekocht, so lange dasselbe noch etwas auflöst, worauf das Decoct zum Extract abgedampft wird. Dieses wird mit Alkohol von 0,827 ausgezogen. Diese Auflösung wird filtrirt und einige Tage lang an einem kühlen Ort gelassen, während dessen sich auf den Seiten des Gefäßes Tropfen von einem eigenen festen und krystallinischen Fett absetzen. Die klare Flüssigkeit wird abgegossen und der Alkohol abdestillirt. Der extractartige Rückstand wird mit etwas Wasser angerührt, und mit $\frac{1}{2}$ seines Gewichts gebrannter Talkerde gut vermischt, worauf man die Masse eintrocknet. Das Extract enthält viel freie Säure und noch mehr von dem erwähnten Fett, welche sich nun mit der Talkerde verbinden und unauflöslich werden. Die Masse wird hierauf mit Weingeist von 0,87 so lange gekocht, als dieser noch etwas auflöst. Die Flüssigkeit wird abgegossen und mit Blutlaugenkohle vermischt, wodurch sie ihre Farbe größtentheils verliert. Sie wird hierauf filtrirt und abgedampft, wobei das Picrotoxin verworren anschießt. Von Neuem in Weingeist aufgelöst und dem freiwilligen Abdampfen überlassen, schießt es in Gruppen aus kleinen, glänzenden, farblosen, durchsichtigen, vierseitigen Prismen an *).

*) Wittstock erhielt aus 96 Unzen Kockelskörnern beim Entschälen 31 Unzen inneren Kern; dieser gab beim Auspressen

Das Picrotoxin hat einen unerträglich bitteren Geschmack. Es reagirt nicht alkalisch. Kaltes Wasser löst davon $\frac{1}{73}$, kochendes $\frac{1}{23}$ auf; von Wasser, welches freies Alkali enthält, wird es in noch größerer Menge aufgelöst. Kochender Alkohol von 0,8 löst $\frac{1}{5}$ seines Gewichts davon auf; Aether von 0,716 spec. Gew. löst $\frac{4}{10}$ auf; von fetten und flüchtigen Oelen wird es nicht aufgenommen. Seine Zusammensetzung ist nicht untersucht. Es wird von Säuren aufgelöst, die gesättigten Auflösungen reagiren aber sauer. Mehrere dieser Salze sollen krystallisiren; sie schmecken sehr bitter und sind schwer auflöslich. Die Sättigungscapacität des Picrotoxins ist, nach Boullay's Analyse vom schwefelsauren Salz, 2,22, oder 100 Th. Picrotoxin sättigen 11,10 Th. Schwefelsäure.

Schwefelsaures Picrotoxin schießt in seidenglänzenden, büschelförmig vereinigten Nadeln an; ist in 120 Th. kochenden Wassers auflöslich. Salpetersaures Picrotoxin bildet eine saure und zugleich bittere, klebrige Masse, welche sich beim Eintrocknen wie Alaun aufbläht. Die überschüssige Säure kann davon abgedampft werden. Nach einer späteren Angabe von Boullay erhält man das salpetersaure Salz in schönen Krystallen angeschossen. Phosphorsaures Picrotoxin schießt aus der Auflösung der Base in verdünnter, kochendheißer Phosphorsäure beim Erkalten in feinen Nadeln an, welche auch nach gutem Auswaschen das Lackmuspapier röthen. Es bedarf 50 Th. kochenden Wassers zur Auflösung. Oxalsaures Picrotoxin schießt in dreiseitigen Tafeln an, und ist in 6 Th. kochenden Wassers auflöslich. Weinsaures Picrotoxin verhält sich ähnlich, bedarf aber 20 Th. kochenden Wassers zur Auflösung.

10 $\frac{1}{2}$ Unzen fettes Oel und 18 $\frac{1}{2}$ Unze ausgepresste Masse. Diese zieht, er einige Mal mit Alkohol aus, destillirt diesen dann ab, kocht den erstarrten Rückstand mit Wasser, wobei sich Oel abscheidet, das man abschöpft, und läßt dann das Picrotoxin an einem warmen Orte anschleifen. Durch Umkrystallisiren aus alkoholhaltigem Wasser wird es weiß erhalten. Aus 16 Unzen Kokkelskörnern erhielt er so 2 Drachmen oder $\frac{1}{4}$ Picrotoxin. W.

essigsäures Picrotoxin schießt in größeren, weissen Adeln an, die nach dem Abwaschen nicht mehr sauer reagiren. Schwefelsäure entwickelt daraus nicht die Essigsäure, wird es aber zuvor mit etwas zweifach kohlen-säurem Kali zusammengerieben, und dann mit Schwefelsäure ersetzt, so entwickelt sich Essigsäure. Salpetersäure dagegen macht die Essigsäure daraus frei. Die Ursache des Nichtwirkens der Schwefelsäure scheint in der Schwerlöslichkeit des neugebildeten schwefelsauren Salzes in der Säure zu liegen. Chlorwasserstoffsäures Picrotoxin löst sich bei überschüssiger Säure in Wasser auf, hinterläßt aber beim Abdampfen derselben eine krystallinische Salzmasse, die 400 Th. kochenden Wassers zur Auflösung braucht, und woraus sich das Salz beim Erkalten größtentheils wieder abscheidet. Von Chlor wird das Picrotoxin nicht zersetzt.

Das Picrotoxin ist sehr giftig, bewirkt Hitze, Schwindel, Convulsionen und den Tod. 10 Gran tödten einen Hund innerhalb $\frac{1}{2}$ Stunde. Seine Salze scheinen weniger giftig zu sein. Die Anwendung der Kockelskörner zur Betäubung der Fische ist bekannt. Der Name Picrotoxin kommt vom griechischen πικρός, bitter, und dem lateinischen *Toxicum*, Gift *).

Daphnin. Vauquelin hat gezeigt, daß, wenn man den mit kochendheißem Wasser infundirten, zerschnittenen Seidelbast (von *Daphne mezereum*) einige Stunden lang in einem verschlossenen Gefäß maceriren läßt, die Flüssigkeit dann abseiht, sie mit Magnesia vermischt und aus einer Retorte destillirt, so weit, als es ohne Anbrennen geschehen kann, man ein Destillat von charfem, reizendem Geruch und Geschmack bekommt, welches deutlich alkalisch reagirt, von Säuren gesättigt wird, und dann concentrirt und zu einem krystallisirten Salze gebracht werden kann. Wird dieses nun in sehr wenigem Wasser aufgelöst und mit Magnesia umdestillirt,

*) Dieß wird jedoch vom griechischen Worte τοξικός, *Sagittarius*, hergeleitet, weil man die Pfeile vergiftete.

so erhält man den basischen Stoff concentrirt. Ist es eigenthümliche Salzbasis, so kann sie Daphnia ge werden; aber Vauquelin läßt es dahin gestellt ob er nicht eine Verbindung von Ammoniak mit flüchtigen Pflanzenstoff sei.

Digitalin. Le Royer giebt an, daß wenn trocknen Blätter von *Digitalis purpurea* in einem geschlossenen Gefäße mit Aether digerirt werden, und Auflösung in einem Destillationsgefäße zum Extract dampft werde, Wasser dann daraus ein saures Salz einer eigenen Salzbasis ausziehe und einen grünen Sal rücklasse. Diese saure Auflösung wird mit Bleioxy sättigt, zur Trockne abgedampft und wieder mit A behandelt, welcher das Bleisalz unaufgelöst läßt und Salzbase aufnimmt, die nach Verdampfung des A als eine braune, schmierige Masse zurückbleibt, scharfen Geschmack hat und auf geröthetes Lackm pier schwach alkalisch reagirt. In Alkohol aufgelöst in der Wärme auf einer Glasscheibe eingetrocknet es microscopische Krystalle, die an der Luft schnell wurden. Das Digitalin wäre dann eine in Wasser auflösliche Salzbasis, was gewiß von den vorhergeh sehr verschieden sein würde. Le Royer giebt an die Auflösung dieser Materie dieselben medicinischen kungen wie die Digitalis hervorbringe.

Jalappin. Hume giebt seine Darstellung an gende Weise an: Gröblich zerstoßene Jalappenwurzel einige Wochen lang in verdünnter Essigsäure ma Es entsteht eine dunkel gefärbte Auflösung, die ma sieht, mit kaustischem Ammoniak vermischt und c sehr stark umschüttelt. Hierdurch entsteht ein sandige derschlag von einer körnig krystallisirten Substanz, w man mit Wasser auswäscht. Nach wiederholter l sungen in Essigsäure und Fällung mit Ammoniak erhält sie in kleinen Nadeln. Sie ist ohne Geschmack un ruch. Sie ist in kaltem Wasser unauflöslich und nu nig löslich in kochendem. In Alkohol löst sie sich auf, nicht aber in Aether. Sie ist leicht ganz schneew bekommen, Eine Unze Wurzel giebt ungefähr 5 G

Pariljin und Smilacin. Pallotta giebt an, daß wenn man die Infusion von Sassaparillwurzel mit etwas Kalkhydrat digerirt, dasselbe eine Salzbasis ausscheidet, welche, nach dem Auswaschen und Trocknen, sich aus der kochendheiß gesättigten Auflösung in Alkohol beim Erkalten als ein weißes Pulver, von unangenehmem, bitterem Geschmack, absetzt; sie färbt die Curcumactinctur braun, wird leicht von Säuren aufgelöst und bildet damit Salze, welche, eingenommen, Ekel erregen und zugleich die Schnelligkeit des Pulses vermindern. Er nennt dieselbe Pariljin. Folchi giebt an, daß wenn das innere Mark der Sassaparillwurzel mit Wasser macerirt, und dieses, nach Behandlung mit Blutlängenkohle, dem freiwilligen Abdampfen überlassen werde, daraus eine Substanz in kleinen, hellgelben Krystallen anschießt, die in Alkohol wenig auflöslich sind, wenig Geschmack haben, im Schlunde aber einen Reiz zurücklassen, und den Tincturensyrup grün färben. Er nennt dieselbe Smilacin.

Rhabarberin soll, nach Carpenter, eine basische Substanz in der Rhabarberwurzel sein, welche den eigentlichen wirksamen Bestandtheil darin ausmacht *). Carpenter schreibt vor, die grob zerstoßene Wurzel mehrere Male mit Wasser auszukochen, das mit 1 Proc. Schwefelsäure versetzt ist, so lange als noch etwas aufgelöst wird. Das Decoct wird abgeseiht und mit Kalkhydrat versetzt, worin man es wohl umrührt, und wenn so viel Kalkhydrat zugesetzt ist, daß die Flüssigkeit freie Kalkerde enthält, wird sie durch Leinen abgeseiht, auf dem Filter eine flockige, rothe Masse zurückbleibt, welche Gyps und Kalkhydrat enthält. Sie wird getrocknet und mit Alkohol behandelt. Nach einer diger Digestion mit demselben, wird die Flüssigkeit abgeseiht und $\frac{3}{4}$ vom Alkohol abdestillirt. Die zurückbleibende basische Lösung wird genau mit Salzsäure gesättigt, und bei gelinder Wärme zur Trockne gedampft.

*) Wir kommen noch einmal auf die Rhabarberin bei den einzelnen Arten der Wurzel zurück.

Die Masse ist nun rothbraun, in Wasser leicht auflöslich, hat einen zusammenziehenden Geschmack, und enthält schwefelsaures Rhabarberin.

Atropin aus *Atropa Belladonna*, Violin aus *Viola odorata*, und Salicin aus der Rinde mehrerer Weidenarten, sind noch zu problematisch, als daß sie hier aufgenommen werden könnten.

3. Klasse. Indifferente Pflanzenstoffe.

Unter indifferenten Pflanzenstoffen werden solche verstanden, welche nicht bestimmte Säuren oder Basen enthalten. Eine vollkommene chemische Indifferenz bei einem Stoff ist an sich unmöglich, denn sie würde voraussetzen, daß diesem Stoff alle Fähigkeit, sich mit anderen zu verbinden, mangle. Wir werden aber finden, daß die unter dieser Abtheilung begriffenen Stoffe sich bald mit Säuren, bald mit Salzbasen, und bald unter einander vereinigen können, aber in Folge von Verwandtschaften, welche nicht so bestimmt sind, wie die, welche zwischen Säuren und Basen bestehen.

Diese Substanzen können unter zwei Abtheilungen gebracht werden, nämlich 1) solche, welche in einer großen Anzahl Pflanzen von verschiedener Art vorkommen, und die als die allgemeinen näheren Bestandtheile des Pflanzenreichs betrachtet werden können, wie z. B. Stärke, Zucker, Oele, Harze u. s. w.; und 2) solche, welche entweder einer besonderen Species, oder einigem Species von einem gewissen Genus, oder höchstens einigen wenigen Geschlechtern eigenthümlich und gemeinschaftlich sind, wie z. B. Caffein, Gentianin, Piperin u. a.

Bei der ersteren dieser Abtheilungen ist es der Fall, daß die unter einer gemeinschaftlichen Benennung begriffenen Stoffe nicht durchaus identisch, sondern in gewissen Verhältnissen von einander unterschieden sind, wenn sie auch in den meisten übereinstimmen; so z. B. haben wir eine große Anzahl von einander bestimmt unterschiede-

er, fetter und flüchtiger Oele, mehrere verschiedene von Zucker, von Gummi u. s. w., wodurch wir B. mit dem Namen fettes Oel das Genus bezeichnen, das mehrere Species, wie Leinöl, Baumöl, Mandelöl u. s. w., enthält. Die Erfahrung hat uns hinlänglich gelehrt, daß die generische Aehnlichkeit nicht darauf besteht, daß ein gewisser Stoff, z. B. ein für alle fette Oele gemeinschaftliches fettes Oel, in diesen enthalten sei, und daß die speciellen Verschiedenheiten folglich nicht aus dem gleichen, mit diesem Oele vereinigten Stoffen entspringen; es wird dadurch zu einem wichtigen Gegenstand der Untersuchung, die Ursache dieser generischen Aehnlichkeit zwischen specifisch unterschiedenen Körpern aufzufinden. Daß sie in der Zusammensetzung liegt, ist offenbar, was aber das generisch Aehnliche in der Zusammensetzung ausmacht, ist nicht so leicht zu entdecken. Man geht dabei zuerst auf die Vermuthung, daß die zu demselben Genus gehörenden Körper eine einigermaßen gleiche procentische Zusammensetzung haben, daß sie aus einer größeren Anzahl einfacher Atome bestehen, und in einem oder dem anderen Atom desselben Elementes variiren, wodurch kleine Veränderungen in der Zusammensetzung kleine Abänderungen in den Eigenschaften bewirken, und wobei specifische Unterschiede unter Beibehaltung der generischen Aehnlichkeit entstehen. Aber diese so wahrscheinliche Vermuthung wird gleichwohl nicht durch die analytischen Untersuchungen bekräftigt; denn Gummi, Stärke und Zucker haben eine fast so gleiche procentische Zusammensetzung, daß die Ungleichheiten in den Resultaten ihrer Analysen kaum die Größe von Beobachtungsfehlern mittelmäßig gut angestellter Analysen übersteigen, und gleichwohl besitzen diese Körper bestimmte generische Ungleichheiten, während dagegen zwischen dem Rohrzucker und dem Traubenzucker, welche einander so ähnlich sind, eine sehr bedeutende Ungleichheit in der procentischen Zusammensetzung statt findet. Die procentische Zusammensetzung des flüchtigen Lavendelöls kommt der des trocknenden fetten Leinöls sehr nahe, dessen letz-

teren Zusammensetzung dagegen weit mehr von dem ebenfalls fetten und trocknenden Wallnufsöls abweicht. Es geht hieraus hervor, daß diese generischen Aehnlichkeiten nicht hauptsächlich auf einer Aehnlichkeit der relativen Proportionen ihrer Bestandtheile beruhen; als diesem Fall bleibt nur übrig, eine Aehnlichkeit in der Art zu vermuthen, nach welcher die Atome der einfachen Körper, indem sie das zusammengesetzte Atom der ersten Ordnung bilden, zusammengepaart liegen, in welchem Falle die Aehnlichkeit in der Construction des Atoms die Ursache der generischen Aehnlichkeit und Ungleichheit in der procentischen Zusammensetzung d. h. der Unterschied in der relativen Anzahl der einfachen Atome in den zusammengesetzten macht den Grund ihrer specifischen Ungleichheiten aus. Aber wenn eine solche Ahnung der inneren Ursachen dieser Erscheinungen als völlig wahrscheinlich oder sogar nicht in Betrachtet werden könnte, so sind wir doch deshalb reeller Kenntniß nicht weiter gekommen, weil es scheinlich niemals glücken wird, die Eigenthümlichkeiten dieser Construction in den zusammengesetzten Atomen bestimmen, wenn anders nicht von Seiten der Kristallographie ein Mal eine Möglichkeit, hier weiter einzugehen, eröffnet wird.

A. Pflanzenstoffe, welche in einer großen Anzahl Pflanzen von verschiedener Art vorkommen, und als die allgemeinen näheren Bestandtheile des Pflanzenreichs betrachtet werden können.

Stärke.

Dieser Stoff kommt in einer großen Anzahl von Pflanzen vor. Nach Wahlenberg findet sie sich 1) in den Saamen, mit Ausnahme der der herzblattlosen Pflanzen und in größter Menge wird sie aus den Saamen

dearten und der Gräser gewonnen; 2) in zapfenförmigen, runden, mehrjährigen Wurzeln, mit jährigem Sten über der Erde; die größte Menge liegt in den knollen, wie Kartoffeln, *Convolvulus batatas* und *edulis*, *Lianthus tuberosus*, *Jatropha Manihot* u. a.; 3) im Stamme mehrerer einherzblättriger Pflanzen, zumal der Palmen, wie *Sagus Rumphii*, *Cycas revoluta* und *circulata* u. a.; dagegen aber findet man sie selten in dem Stamme und den Aesten zweierherzblättriger Pflanzen; 4) in verschiedenen Flechtenarten.

Von der Stärke giebt es mehrere ungleiche Abänderungen, nämlich a) gewöhnliche Stärke, b) Inulin, Moosstärke.

a) Gewöhnliche Stärke erhält man am reinsten aus Kartoffeln, welche man zerreibt, auf ein Seihetuch gießt, und auf diesem mit Wasser abspühlt. Das Wasser fließt milchicht durch und setzt dann die Stärke ab. Man läßt das Wasser ab, wäscht die Stärke einige Mal mit reinem Wasser aus und trocknet sie an der Luft. — Die beste Stärke wird aus Roggen oder Waizen bereitet;

Bereitung geschieht auf zwei Arten: 1) Man läßt den Weizen in Wasser quellen, bis daß er mit Leichtigkeit gedrückt werden kann, worauf er entweder durch Mühle unter Wasser zermahlen, oder auch unter Wasser in einem Keil zerprefst wird, so lange als noch das Wasser nach neuem Nassen und Pressen der Säcke milchicht wird, wobei sich die Stärke im Wasser aufschlämmt, welches durch wie Milch wird, und die Stärke in der Ruhe auf dem Boden absetzt.

Die Saamen der Getreidearten enthalten, neben der Stärke, eine eigene Materie, welche man Pflanzenleim nennt, und die ich weiter unten beschreiben werde; diese Leime bleiben bei der Zerreibung der Saamenkörner zum Theil mit der Stärke aufgeschlämmt, und läßt sich nicht mehr mechanisch davon trennen; da aber diese Substanz in verdünnten Säuren auflöslich ist, so läßt man das die Stärke haltende Wasser über der Stärke stehen und sauer werden, wobei sich dann der meiste Pflanzenleim auflöst.

2) Der Waizen oder Roggen wird geschrotet und in großen hölzernen Gefäßen mit Wasser vermischt, dem man eine Portion schon gesäuerten Stärke - Wassers zusetzt. Die Masse kommt dann in Gährung, und der Pflanzenleim wird theils zerstört, theils aufgelöst. Nach 12 bis 14 Tagen nimmt man die saure Flüssigkeit weg und gießt frisches Wasser auf, welches wiederum abgezapft wird, sobald sich die Masse wieder gesetzt hat. Nun wird die Masse durch ein Haarsieb geseiht, auf dem der größte Theil der Kleye zurückbleibt. Nachdem sich die Stärke von Neuem abgesetzt hat und das Wasser abgeflossen ist, liegt die mit durchgelaufene feinere Kleye obenauf und wird weggenommen. Hierauf wird die Masse mit Wasser angerührt und durch ein feines Tuch von Seide geseiht, welches die noch übrige Kleye zurückbehält und die Stärke durchläßt. — Die feuchte Stärke wird gewöhnlich in größern Massen von der Form und Größe eines Mauersteins zusammengedrückt, an der Luft getrocknet, und zum völligen Austrocknen nachher noch zwischen den Händen in kleinere Stückchen zerbröckelt.

Wird die noch feuchte Stärke in einer, ungefähr bis zu $+60^{\circ}$ gehenden Wärme getrocknet, so gelatinirt sie mit dem Wasser zu einer halb durchsichtigen Masse, welche nachher nicht mehr mehlig wird, und nach dem völligen Austrocknen halb durchscheinend und hart wird. Auf diese Art bereitet man den Sago, welcher Stärke aus dem Mark einer Palmenart, des *Sagus Rumphii*, ist, und die Cassava oder Tapioka, welche die Stärke einer übrigen giftigen Wurzel, *Jatropha Manihot*, ist.

Die Stärke liegt in den Höhlungen der Pflanzenzellen in Gestalt kleiner, weißer, glänzender Körner, die jedoch unter dem Microscope keine Krystalltextur zeigen. Sie vermengen sich sehr leicht mit Wasser und erhalten sich darin lange suspendirt. Die Körnchen der Kartoffelstärke sind etwas größer, als die von Waizenstärke, zwischen denen übrigens weiter kein Unterschied statt findet, als die mechanische Einmischung von Pflanzenleim in der Waizenstärke, welche letztere indessen größtentheils durch

Maceration sowohl mit destillirtem Essig, als mit sehr verdünnter, kalter Lauge davon befreit werden kann.

So wie die Stärke im Handel vorkommt, bildet sie schneeweiße Klumpen, die sich zwischen den Fingern leicht zum feinsten Pulver zerdrücken lassen, oder sie ist auch schon in ein solches Mehl verwandelt (Haarpuder), und giebt beim Drücken einen knarrenden Laut. Ihr spec. Gewicht ist 1,53.

Die charakterisirenden und generischen Eigenschaften, welche allen Arten von Stärke zukommen, sind unter Folgendem begriffen: Sie ist in kaltem Wasser unauflöslich, wird aber von kochendem zu einer schleimigen Flüssigkeit aufgelöst; in Alkohol ist sie unauflöslich. Beim Kochen mit verdünnten Säuren wird sie in Zucker verwandelt, und mit Salpetersäure in Aepfelsäure und Oxalsäure, ohne Spur von Schleimsäure; ihre Auflösung in warmen Wasser wird von Bleiessig oder im Allgemeinen von basischen Bleisalzen, und ihre erkaltete Auflösung wird von Galläpfelinfusion gefällt.

Die Stärke verändert sich leicht bei Behandlung mit chemischen Reagentien, und geht in eine, dem Gummi ähnliche Substanz über. Setzt man sie einer höheren Temperatur aus, so daß sie gelinde geröstet wird, ohne aber anzubrennen, so riecht sie wie frisches Brod, und wird dann vollkommen in Wasser auflöslich; diese Auflösung liefert nach der Verdampfung des Wassers eine Substanz, welche sich dem Gummi so ähnlich verhält, daß sie in den Künsten statt dessen gebraucht werden kann. Stärker erhitzt, schmilzt sie halb, verkohlt sich, raucht, entzündet sich mit Flamme und wird zerstört. Bei der Destillation liefert sie die gewöhnlichen Producte der Pflanzenstoffe, saures Wasser, brenzliches Oel und brennbare Gase, und hinterläßt eine blasige Kohle.

Unter den einfachen Körpern verbinden sich nur Chlor und Jod damit. Ersteres wirkt auf nassem Wege wenig darauf; wird aber trockne Stärke in Chlorgas gebracht, so wird das Gas absorbirt und die Stärke flüssig, es entwickelt sich etwas Kohlensäuregas, und die Masse

wird braun und salzsäurehaltig. Die Verbindung dagegen ist sehr merkwürdig, und es wurde ihrer im ersten Theile als eines der besten Entdeckung des Jods erwähnt. Nach der ungleichen Menge der ist sie röthlich, violett, blau oder sogar schwarz. Verbindung erhält man, wenn ein Gemenge von und Wasser entweder mit einer Auflösung von Alkohol übergossen oder bloß mit pulverförmige vermischt wird. Die Verbindung beruht indessen auf sehr schwachen Verwandtschaften, so daß die aus der trocknen Verbindung durch Verdampfen Theil nach, aus der feuchten aber nach einiger Zeit kommen weggeht. Wird die Jodstärke destillirt, weicht zuerst Jod, und dann wird die Stärke, noch e Jod abgeschieden ist, zerstört, wodurch zugleich Jod stoffsäure gebildet wird, die überdestillirt. Die Jodstärke ist in kaltem Wasser auflöslich, und um so mehr, je reicher sie an Jod ist. Die schwarzblaue löst sich leicht mit violetter Farbe auf, die blaue schwerer und in gelber Farbe. Von concentrirter Schwefelsäure wird die Stärke brauner, beim Verdünnen violett werdender Farbe verdünnter Schwefelsäure dagegen mit blauer Farbe gelöst. Chlorwasser zerstört die Farbe der Jodstärke, davon gelblich wird. Verdünnte Salpetersäure bildet dieselbe in eine blaue Gelée, stärkere Salpetersäure löst sie zu einer röthlichen Flüssigkeit auf. Mit concentrirter Chlorwasserstoffsäure gelatinirt sie; von verdünnter aber; so wie auch von Phosphorsäure und Essigsäure wird sie nicht angegriffen. Schweflige Säure, Schwefelwasserstoff zerstören die Farbe; eben so auch Salpetersäure, aber in letzterem Falle bringt eine verdünnte Salpetersäure sie wieder hervor. Die Alkalien zerstören die Farbe ebenfalls, aber Säuren stellen sie wieder her. Quecksilberchlorid zerstört die Farbe so, daß sie nicht durch Säuren hervorzurufen ist.

So lange die Stärke ihre anfängliche Mehlform behält, wird sie nicht von kaltem Wasser aufgelöst, sie aber mit Wasser bis zu ungefähr $+60$ bis 70°

so schwillt sie im Wasser auf und verwandelt sich in einen Kleister, welcher von reiner Stärke geschmacklos ist. Man hat bemerkt, daß Stärke von ungleichen Pflanzen ungleiche Temperatur erfordert, und das Wasser ungleich stark schleimig macht. Diese Kleisterbildung ist nicht als eine Auflösung zu betrachten, sondern sie ist eine Aufquellung im Wasser, wobei sie, wie ein Schwamm, dieses einsaugt, und es wieder fahren läßt, wenn man sie auf eine poröse Masse legt, deren Poren das Bestreben haben, das Wasser mit der Stärke oder dem Kleister zu füllen; wird sie z. B. auf vielfach zusammengelegtes Filterpapier gelegt, und dieses, so oft es feucht geworden ist, mit neuem vertauscht, so vermindert sich ihr Volumen und Wassergehalt unaufhörlich, bis sie zuletzt zu einer hornartigen Masse eintrocknet, die nach dem Pulvern bei neuer Behandlung mit heißem Wasser, dieselben Erscheinungen darbietet. Diese Eigenschaft, im Wasser zu einer nicht aufgelösten gallertartigen Masse anzuschwellen, die wir schon oben bei der Gallertsäure und anderen Salzen kennen gelernt haben, macht das Charakteristische des Schleimes im Thierreich aus, und wir werden sie später noch bei einem und dem anderen Pflanzenstoffe wieder finden. Aber außer diesem Aufquellen wird auch wirklich eine Portion Stärke im Wasser aufgelöst; das warme Wasser enthält viel mehr aufgelöst, als kalte, und daher kommt es, daß wenn Stärke mit dem 40 bis 50fachen Gewichte Wassers gekocht wird, die warme Flüssigkeit eine ordentliche Auflösung ist, die beim Erkalten die Stärke absetzt und zu Kleister wird, und wird die Stärke in dem 60 bis 80fachen Gewichte Wassers aufgelöst, so setzt sie erst nach langer Ruhe und der Kälte die aufgequollene Masse in gallertartigen Klumpen ab. Durch eine hinreichende Menge Wassers kann sich die ganze Menge von Stärke nach dem Erkalten aufgelöst erhalten. Nach Vogel kann aus einer kleisterartigen Auflösung die Stärke durch Gefrieren und Aufthauen der Flüssigkeit wieder in Pulverform erhalten werden, was auf keine andere Art glückt. Langes Kochen

wird braun und salzsäurehaltig. Die
 lagegen ist sehr merkwürdig, und
 in ersten Theile als eines der besten
 les Jods erwähnt. Nach der ungleich
 st sie röthlich, violett, blau oder
 Verbindung erhält man, wenn ein
 und Wasser entweder mit einer A
 Alkohol übergossen oder bloß mit
 ermischt wird. Die Verbindung
 uf sehr schwachen Verwandtschaft
 us der trocknen Verbindung dur
 Theil nach, aus der feuchten aber
 ommen weggeht. Wird die Jod
 veicht zuerst Jod, und dann wird d
 od abgeschieden ist, zerstört, wod
 toffsäure gebildet wird, die über
 st in kaltem Wasser auflöslich, u
 her sie an Jod ist. Die schwarzb
 nit violetter Farbe auf, die bla
 Farbe. Von concentrirter Schw
 rauner, beim Verdünnen violett
 erdünter Schwefelsäure dagege
 elöst. Chlorwasser zerstört die
 lavon gelblich wird. Verdünnte
 elt dieselbe in eine blaue Gelée
 öst sie zu einer röthlichen Flüssig
 rirter Chlorwasserstoffsäure gelat
 er aber, so wie auch von Phosph
 wird sie nicht angegriffen. Schw
 chswefelwasserstoff zerstören die
 ichte Säure, aber in letzterem Fe
 äure sie wieder hervor. Die Al
 benfalls, aber Säuren stellen sie
 erchlorid zerstört die Farbe so
 urch Säuren hervorzurufen ist.

So lange die Stärke ihre
 ält, wird sie nicht von kaltem
 e aber mit Wasser bis zu ungefa

er nach wenigen Tagen flüssig wird er nach Verlauf eines Monats und bei $+100^{\circ}$ getrocknet als $\frac{1}{3}$ vom Gewicht der Anfangsmenge, beim Ausschluss der Luft sehr nahe das Gewicht der ursprünglichen Masse. Die Veränderungen, welche er erleidet, sind von der Sauerung und die einzelnen Resultate das Verhältniß deutlich.

Die Darstellung ist der Rückstand von 1200 Th. Wassers zu Kleister lang auf einer flachen Schale auf ein grauer, schimmlicher, gelblich-flüssiger Teig zurückblieb, und, bei $+100^{\circ}$ getrocknet ebenfalls bei $+100^{\circ}$ getrock-

net. Dieser Kleister, welcher 38 Tage lang, ganz wenig Luft enthielt, die getrocknete Masse angewandten Stärke.

Die Masse lang unter öfterem Umrühren dem Zutritt der Luft ohne Rückstand wog 0,83.

Die Masse aber von Kartoffelstärke, in einer Glasröhre 42 Tage lang unter 10 Centimeter Gas auf jeden Liter Wasserstoffgas und 1,48 Kohlenstoffgas dem Gewichte nach, zu geringer Quantität ausmangelt 100 oder eben so viel,

die Masse lange Zeit der Luft ausge-

oder Abdampfung der Auflösung der Stärke verändert sie nach und nach, und bringt sie dem auflösliehen Zustand nahe, in welchen die Stärke durch Rösten versetzt wird. Dadurch geschieht es auch, daß die aufgelöste Stärke nach Abdampfung der Flüssigkeit dem größten Theile nach wieder von kaltem Wasser aufgenommen wird. Vogel giebt dagegen an, daß Stärke, vier Tage lang mit Wasser gekocht, das beim Abdampfen immer wieder ersetzt wurde, ein bitteres, in der Flüssigkeit aufgelöstes Gummi, aber zugleich auch eine hornartige, in der Flüssigkeit unauflösliehe Masse gab. Sowohl die schleimige Stärke, als die Auflösung sind wasserklar und durchsichtig. Die Unklarheit, welche der Kleister oft hat, kommt theils von unaufgelöster Stärke, theils von anderen unaufgelösten, derselben eingemengten Stoffen. Sowohl der aufgelöste, als der bloß gelatinirte Theil zeigen gleiche Reaction auf Jod; Bleiesstg und Galläpfelinfusion.

Wird eine mit Wasser gekochte Stärke, bei oder ohne Zutritt der Luft, sich selbst überlassen, so verändert sie sich sehr bedeutend, zumal wenn man das An-trocknen dabei verhindert *); die Stärke verwandelt sich dabei in Zucker, der nach einem oder zwei Monaten und bei gewöhnlicher Sommertemperatur ($+19^{\circ}$ — 24°) zwischen $\frac{1}{4}$ und der Hälfte vom Gewicht der angewandten Stärke ausmacht, in Gummi, wenig veränderte kleisterartige Stärke und bisweilen eine harzähnliche Materie. Dabei wird die Luft wenig von der Stärke verändert, etwas Sauerstoffgas wird in Kohlensäuregas verwandelt, und stellt man den Versuch in verschlossener Gefäßen an, so findet man, daß sich kleine Mengen sowohl von Wasserstoffgas als Kohlensäuregas entwickeln. Hieraus sieht man, daß der Zutritt der Luft keine nothwendige Bedingung zu diesen Veränderungen ist; hat aber die Luft vollkommenen Zutritt, und wird das verdunstete Wasser täglich

*) Weizenstärke wird dabei gewöhnlich stinkend, wie faulendes Fleisch, was von eingemengtem Pflanzenleim und Pflanzeneiweiß herrührt.

ersetzt, so wird der Kleister nach wenigen Tagen flüssig, ohne zu schimmeln, und wird er nach Verlauf eines Monats zur Trockne abgedampft und bei $+100^{\circ}$ getrocknet, so wiegt er wenig mehr als $\frac{2}{3}$ vom Gewicht der angewandten Stärke, während dagegen, beim Ausschluß der Luft, die getrocknete Masse sehr nahe das Gewicht der angewandten Stärke hat. Die Veränderungen, welche die Stärke auf diese Weise erleidet, sind von de Saussure untersucht worden, und die einzelnen Resultate davon machen am besten das Verhältniß deutlich.

A in der folgenden Aufstellung ist der Rückstand von 100 Th. Waizenstärke mit 1200 Th. Wassers zu Kleister gemacht, was zwei Jahre lang auf einer flachen Schaal stehen gelassen wurde, worauf ein grauer, schimmlicher, geschlossener, nicht klebriger, halbflüssiger Teig zurückblieb, welcher Lackmus nicht röthete, und, bei $+100^{\circ}$ getrocknet, 0,8 vom Gewicht der ebenfalls bei $+100^{\circ}$ getrockneten Stärke betrug.

B ist ein gleich beschaffener Kleister, welcher 38 Tage lang in einer wohl verkorkten, ganz wenig Luft enthaltenden Flasche gelassen wurde. Die getrocknete Masse wog 100,2 vom Gewicht der angewandten Stärke.

C ist ein ähnlicher, 38 Tage lang unter öfterem Umrühren und Ersetzen des Wassers dem Zutritt der Luft ausgesetzter Kleister. Der trockne Rückstand wog 0,83.

D ein ähnlicher Kleister, aber von Kartoffelstärke, in einer Flasche mit Gasentwickelungsröhre 42 Tage lang stehen gelassen. Gab 8,7 Cubikcentimeter Gas auf jeden Gramm Stärke, wovon 7,22 Wasserstoffgas und 1,48 Kohlensäuregas waren, welche also dem Gewichte nach, zu dem der Stärke, eine höchst geringe Quantität ausmachen. Die trockne Masse wog 100 oder eben so viel, wie die Stärke.

E dieselbe Masse, gleich lange Zeit der Luft ausgesetzt, der Rückstand wog 0,853.

Die Analyse dieser Rückstände gab:

	A.	B.	C.	D.
Zucker	37,00	47,4	49,7	35,4
Gummi	10,00	23,0	9,7	17,5
Etwas veränderter Kleister	14,30	8,0	5,2	18,7
Unaufgelöste Stärke	5,83	4,0	3,8	9,4
Holzartige Stärke	10,53	10,3	9,2	7,0
Koble	Spur	Spur	0,3	Spu
Weiches Harz	0,30	—	—	—
Verlust	—	—	—	6,0
	77,96	92,7	77,9	49,0

Beim Behandeln dieser Rückstände mit kaltem Wasser lösten sich Gummi und Zucker auf, die durch Holz getrennt wurden, indem dieser den Zucker und das Gummi fällt. Wird das in kaltem Wasser aufgelöste mit kochendheißem behandelt, so löst sich wenig veränderte, kleisterförmige Stärke auf, welche man Amidine nennt. Sie ist in kaltem Wasser schwer löslich, löst sich aber in allen Verhältnissen Wasser von $+60^{\circ}$ auf, und eine Auflösung, welche $\frac{1}{4}$ ihres Gewichts enthält, gelatinirt nicht mehr. Koncentrirt, schlägt sich daraus eine weiße, unsichtige Masse nieder, und völlig eingetrocknet, wird halbdurchscheinend, hart und leicht zu pulvern. Sie hält alle Reactionen der Stärke auf Jod, Barytwasser, Bleiessig und Galläpfelinfusion bei. — Die unaufgelöste Portion, von eingemengter mehlförmiger Stärke im Wasser, welche allen Veränderungen entgangen war, mit lauer, sehr verdünnter Schwefelsäure ausgekocht. Hierauf blieb noch eine Materie unaufgelöst, die in einer verdünnten ($\frac{1}{12}$ Hydrat enthaltenden) Auflösung von kaustischem Kali aufgenommen, und daraus durch verdünnte Schwefelsäure in Gestalt eines leichten, feinen Pulvers gefällt wurde, welches sich mit Jod bläute, trocken zusammenbackte, schwarz wurde und beim Erhitzen glasigen, glänzenden Bruch bekam. Dies ist die Substanz, welche de Saussure holzartige Stärke nannte.

ist ungewiß, ob diese Materie aus der Stärke gebildet wird, oder darin enthalten ist und abgeschieden wird, denn in sehr vielen Pflanzen ist das Gewebe, in welchem die Stärke sich abgesetzt findet, von gleicher Natur mit dieser Materie, wie ich beim Holze noch anführen werde. Nach Ausziehung dieser Substanz löst Alkohol aus dem Rückstand bisweilen ein Harz auf, und zuletzt bleibt eine Kohle übrig, die während der Veränderung der Stärke abgeschieden wurde, und die Producte braun färbt.

Ist die Stärke bei dieser freiwilligen Veränderung mit Pflanzenleim vermischt, so verwandelt sie sich öfters innerhalb 12 Stunden in Zucker. Beim Pflanzenleim werde ich auf diese wichtige Erscheinung zurückkommen.

Die Stärke ist in Alkohol und Aether unauflöslich, und aus ihrer Auflösung, sowohl in Wasser als in verdünnten Säuren, wird sie von ersterem niedergeschlagen.

Die Stärke wird von verdünnten Säuren zu einer klaren und dünnfließenden Flüssigkeit aufgelöst. Durch längere Zeit fortgesetztes Kochen dieser Auflösung verwandelt sich die Stärke zuerst in Gummi und nachher in Zucker. Ich werde weiter unten beim Traubenzucker diesen Prozeß anführen. Die Auflösung der Stärke von den Säuren scheint zum Theil auf einer wirklichen Verbindung mit der Säure zu beruhen. De Saussure hat eine krystallisirte Verbindung von Schwefelsäure mit Stärke entdeckt, welche man erhält, wenn man 1 Th. Stärke bei gelinder Wärme in 3 Th., zuvor mit 36 Th. Wassers verdünnter, Schwefelsäure auflöst, und die Auflösung mit Alkohol vermischt, welcher eine, mit Stärke gemengte, krystallinische Verbindung niederschlägt; der Niederschlag wird mit Spiritus gewaschen und darauf in einer geringen Menge kalten Wassers aufgelöst, welches beim freiwilligen Abdampfen lange, schmale Nadeln von schwefelsaurer Stärke giebt. Die Mutterlauge enthält freie Säure, die man von den Krystallen mit Spiritus abspült. Die Krystalle werden nicht vollständig von Wasser aufgelöst, welches immer etwas Stärke abscheidet und sauer wird. Die ausgeschiedene Stärke wird von Jod nicht blau, son-

dern weinroth. — Von concentrirter Schwefelsäure die Stärke langsam zu einer steifen, schwarzen Masse gelöst, die schweflichtsaures Gas entwickelt, und wo Wasser eine kohlige Materie abscheidet. Salpetersäure löst die Stärke leicht auf, und zersetzt sie in der Wärme in Aepfelsäure und Oxalsäure, ohne Spur von zugabildeter Schleimsäure. Von Stärke aus den Getreidearten erhält man dabei zugleich ein gelbliches, auf der Oberfläche der Flüssigkeit sich abscheidendes Fett, welches von eingemengtem Pflanzenleim herzurühren scheint. — Concentrirte Chlorwasserstoffsäure löst die Stärke langsam auf, und wird die Flüssigkeit damit gesättigt wird sie braun und dick.

Mit Salzbasen vereinigt sich die Stärke begieriger als mit Säuren. Eine concentrirte Auflösung von Kaliumcarbonat bildet, mit Stärke zusammengerieben, eine dichte, gallertartige, sowohl in Alkohol als in Wasser auflösliche Verbindung, woraus die Stärke durch Säuren gefällt wird. Verdünnt man die klare Gelée mit Wasser, so wird sie opalisirend. Kartoffelstärke ist leichter auflöslich, als Waizenstärke. Mit Baryterde und mit Kalkerde bildet die Stärke eine unlösliche Verbindung, welche sich beim Vermischen mit wässriger Auflösung von Stärke mit Baryt- oder Kaliumwasser niederschlägt. Mit Bleioxyd erhält man die Stärke verbunden, wenn eine kochendheiße Auflösung von Stärke mit einem Ueberschuß entweder von basisch essigsaurem oder basisch salpetersaurem Bleioxyd (letzteres in der im Kochen gesättigten Auflösung) vermischt wird, wo sich die Stärke mit der überschüssigen Base vereinigt und das Salz in neutrales verwandelt. Der Niederschlag ist weiß, käseartig und schwer. Er besteht aus 72 Th. Stärke und 28 Th. Bleioxyd. Nimmt man diese Verbindung für neutral an, so hat die Stärke, als elektronegative Körper betrachtet, eine Sättigungscapacität von 2,78, aus welcher sich dann die Zusammensetzung ihrer Verbindung mit Kali, Baryterde etc. berechnen lassen.

Von Verbindungen der Stärke mit Salzen hat man nur sehr wenige bemerkenswerthe. Buchholz und Schiller haben gezeigt, daß Auflösungen von Stärke durch Borax coagulirt werden, indem sich dieser mit der Stärke vereinigt und damit niederschlägt. Dieß kommt nicht der Borsäure zu, und der Niederschlag wird durch alle freie Säuren, selbst durch Essigsäure, so wie von weinsauerm Sali verbindert, weil die Säuren die Borsäure frei machen, und das letztere Salz den Borax in *Tartarus boraxatus* verwandelt. Vauquelin hat gefunden, daß eine Auflösung von Stärke in kochendheißem Wasser so viel phosphorsaure Kalkerde aufnimmt, daß sie sowohl von Oxalsäure als neutralen Bleisalzen gefällt wird. — Man hat eine Verbindung von Stärke mit Berlinerblau, welche im Handel als eine schöne hellblaue Farbe vorkommt, deren Bereitung nicht bekannt ist. Wird 1 Th. Berlinerblau mit 4 Th. Stärke und viel Wasser gekocht, so wird die Flüssigkeit, noch ehe sie aufkocht, zuerst grün, dann braun, und setzt eine Substanz ab, die von Säuren nicht blau wird. Die filtrirte Flüssigkeit dagegen läßt beim Vermischen mit Eisenoxydsalzen Berlinerblau fallen, und giebt nach dem Abdampfen eine glatte Masse, die sich nach dem völligen Eintrocknen wieder leicht in Wasser auflöst, und deren eigentliche Zusammensetzung wohl ausgemittelt zu werden verdient.

Mit Galläpfelinfusion bildet die Stärke einen hellgelben, in kochendheißem Wasser leicht auflöselichen Niederschlag. Man erhält ihn am besten in Menge, wenn Stärke, durch Kochen in einer Infusion von Galläpfeln aufgelöst, kochendheiß filtrirt wird, worauf sich beim Erkalten die Verbindung absetzt. Sie fängt nicht eher an, sich abzuscheiden, als bis die Temperatur unter $+49^{\circ}$ gekommen ist. Nach dem Trocknen ist sie braungelb, durchscheinend, spröde und von zusammenziehendem Geschmack. Spiritus zieht daraus einen Theil Gerbstoff aus und färbt sich braun. Mit Ueberschuß an Gerbstoff ist die Verbindung in kaltem Wasser etwas leichter auflöselich. Eine

entsprechende Verbindung mit Stärke erhält man auch mit dem Gerbstoff aus der Chinarinde; aber künstlicher Gerbstoff giebt keinen Niederschlag.

Die Zusammensetzung der gewöhnlichen Stärke von Gay-Lussac und Thénard, von de Saussure und von mir untersucht worden. Gay-Lussac's und Thénard's Versuche stimmen so nahe, als man nur erwarten kann, mit den meinigen überein, ungeachtet Waizenstärke und ich Kartoffelstärke analysirten. Die Resultate fielen folgendermassen aus:

	G. L. u. Th.	Meine An.	Atome.	Darzu berechn.
Wasserstoff	6,77	6,674	39=13	6,67
Kohlenstoff	43,55	44,250	21=7	44,00
Sauerstoff	49,68	49,076	18=6	49,33

Diese Aufstellung zeigt, daß das Resultat der Analyse vollkommen mit dem Verhältniß übereinstimmt, daß die Stärke aus 13 Atomen Wasserstoff, 7 Atomen Kohlenstoff und 6 Atomen Sauerstoff besteht, oder aus der dreifachen Anzahl, wenn man die zuvor erwähnte Verbindung mit Bleioxyd als neutral betrachtet. Im ersten Falle wiegt das Atom der Stärke 121,622 und in letzterem 364,866, und sie enthält 18 Mal den Sauerstoff der damit vereinigten Base. Die Stärke scheint kein chemisch gebundenes Wasser zu enthalten, weil sie sowohl in freier und bei +100° im luftleeren Raume über Schwefelsäure getrockneten Zustand, als in Verbindung mit Bleioxyd ebenfalls bei +100° im luftleeren Raum getrocknet, dieselben analytischen Resultate giebt, nämlich von 100 Th. Stärke 60,125 Th. Wasser und 159,87 Th. Kohlensäure.

De Saussure's Analyse der Waizenstärke weicht etwas von den vorhergehenden ab. Sie gab Kohlenstoff 45,36, Wasserstoff 5,9, Stickstoff 0,40 und Sauerstoff 48,31.

b) Inulin. Diese Stärkeart ist von Valentin Rose in der Wurzel von *Inula Helenium* (Alantwurzel) entdeckt worden, von der sie ihren Namen hat. Sie ist nachher Helenin, Alantin, Datscin und Dahlin genannt.

worden. Man hat sie in den Wurzeln von *Angelica Archangelica*, von *Anthemis Pyrethrum*, von *Colchicum autumnale*, von *Georgina (Dahlia) purpurea*, in den Erdäpfeln (*Helianthus tuberosus*) gefunden, und wahrscheinlich findet sie sich im Allgemeinen in der Familie der Astereen; sie ist außerdem gefunden worden im Hanf (*Datisca cannabina*), in *Lichen fraxineus* und in *Lichen fastigiatus*. — Das Inulin erhält man in der größten Menge aus der Wurzel der Georgina; es ist aber auch leicht aus der Alantwurzel und aus den Erdäpfeln zu gewinnen. Die letzteren werden zerrieben, ausgepresst, hierauf mit Wasser gekocht und die Auflösung kochendheiß durch Leinen geseiht. Wenn sie nicht klar ist, so kann sie mit Eiweiß geklärt werden. Sie wird hierauf abgedampft, bis sich auf ihrer Oberfläche eine Haut zeigt; man läßt sie dann erkalten, und dabei setzt sich das Inulin pulverförmig ab. Man nimmt es auf's Filtrum, wäscht es gut aus und trocknet es. Die Wurzel von Georgina enthält 10, und die Erdäpfel 3 Proc. davon.

Das Inulin ist weiß, pulverförmig und äußerst fein, hat keinen Geschmack und Geruch, und 1,356 spec. Gewicht. Bis etwas über $+100^{\circ}$ erhitzt, verliert es Wasser und schmilzt; nach dem Erkalten bildet es eine grauliche, schuppige Masse, die sich leicht pulvern läßt. In offenem Feuer und bei der Destillation verhält es sich wie Stärke. Von Jod wird es gelb und in kaltem Wasser auflöslich.

Es wird in sehr geringer Menge von kaltem Wasser aufgelöst; 100 Th. davon nehmen 2 Th. Inulin auf; in kochendem Wasser löst es sich aber in Menge auf; die Auflösung ist schleimig, aber nicht kleisterartig. Beim Einkochen setzt es sich in Gestalt einer schleimigen Haut auf die Oberfläche und beim Erkalten in Pulverform ab. Wird es oft aufgelöst und lange gekocht, so verliert es die Eigenschaft, beim Erkalten wieder niederzufallen, und wird gummiähnlich. Wird Inulin in der Wärme getrocknet, so bildet es, wie Sago, harte, gelbliche, durchscheinende Massen.

In kaltem Alkohol ist es unauflöslich und wird durch aus Wasser niedergeschlagen, aber von kochend wird es etwas aufgenommen und setzt sich daraus bei Abdampfen wieder unverändert ab.

Von verdünnten Säuren wird es leicht aufgelöst. Durch Kochen mit denselben bildet es noch leichter Zucker, als gewöhnliche Stärke. Von Salpetersäure wird in Aepfelsäure und Oxalsäure, ohne Zeichen von Schleim, verwandelt.

Zu Salzbasen verhält sich das Inulin gerade wie die Stärke. Es wird von kaustischem Kali aufgelöst und daraus durch Säuren niedergeschlagen. Von Barytwasser wird seine Auflösung gefällt, aber dieser Niederschlag in kochendem Wasser auflöslich. Von Strontian- und Kalk-Wasser wird es nicht gefällt.

Seine Auflösung wird von Galläpfelinfusion niedergeschlagen, und beim Erhitzen des Gemisches bis zum Kochen löst sich der Niederschlag wieder auf. Wenn Inulin und gewöhnliche Stärke in einer Auflösung einander vermischt sind, so fällt Stärke mit dem Inulin nieder, wenn letzteres vorherrscht, ist aber die Stärke Ueberschuß, so bleibt das Inulin in der Auflösung.

Die Zusammensetzung des Inulins ist nicht untersucht.

a) Moosstärke. Mehrere Flechten enthalten Stärke, welche der gewöhnlichen sehr ähnlich ist, ausgenommen daß sie sich nicht mehlartig in der Pflanze absondert. Sie ist vorzüglich in dem Isländischen Moos (*triaris Islandica Ach.*) gefunden worden; sie findet sich aber auch in *Lichen plicatus* und *Lichen barbatus*.

Dem Isländischen Moos erhält man sie auf folgende Weise. Es wird fein zerhackt und auf jedes Pfund mit 18 Pfund Wassers übergossen, worin man vorher 2 Loth gereinigte Pottasche aufgelöst hat. Das Gemenge wird, unter öfters Umrühren, 24 Stunden lang stehen gelassen.

Alkali zieht aus dem Moose einen in Wasser fast unlöslichen bitteren Bestandtheil, und die Flüssigkeit färbt sich ganz braun. Man legt das Moos auf Leinen, da die Lauge abfließt, und macerirt es dann mit erneuerter

Antheilen Wassers, so lange als dieses noch bitter oder alkalisch wird. Das Moos darf nicht gepresst werden, weil während dieser Behandlung viel Stärke lose geworden ist, und dem Wasser in kleinen, durchsichtigen Klumpen mit folgt. Hierauf wird das Moos mit 9 Pfund Wasser gekocht, bis daß nur 6 Pfund übrig sind, die Auflösung noch kochendheiß durch Leinen geseiht und das Unaufgelöste ausgepresst. Die geseihete Flüssigkeit ist klar und farblos, sie bedeckt sich beim Erkalten mit einer Haut und gestehet zuletzt zu einer undurchsichtigen, graulichen Gallert, die sich nach und nach zusammenzieht, springt und die Flüssigkeit, worin sie zuvor aufgelöst war, auspresst; wird sie in einem leinenen Tuche aufgehängt oder auf Löschpapier gelassen, so fließt die Flüssigkeit allmählich aus. Vollkommen ausgetrocknet, ist sie schwarz, knochenhart und im Bruche glasig. In Wasser schwillt sie wieder auf, und verliert die Farbe, die von einem unauflöslich gewordenen Extractivstoff herrührt; in kochendheißem Wasser aufgelöst, giebt sie nun nach dem Erkalten eine ganz farblose Gelée, die indessen undurchsichtig ist. Sie ist ganz ohne Geschmack, hat aber einen geringen Moosgeruch, welcher im Allgemeinen allen aus Moosarten ausgezogenen Stoffen hartnäckig anhängt. In Alkohol oder Aether ist sie nicht auflöslich. Sie enthält keinen Stickstoff und liefert gleiche Verbrennungs- und Destillations-Producte wie Kartoffelstärke. In geringem Grad ist sie in kaltem Wasser auflöslich, und das Wasser, welches aus der zum zweiten Mal aufgelösten Gelée der Stärke abfließt, enthält höchst unbedeutend davon aufgelöst. Wird ihre Auflösung in kochendheißem Wasser durch Kochen concentrirt, so setzt sich die Stärke auf der Oberfläche in Gestalt einer Haut ab, die allmählich zu einem runzlichen Körper zusammenschrumpft und eintrocknet, und, für sich genommen, alle Eigenschaften der Stärke unverändert zeigt. Diese Haut verhindert sehr bedeutend die Concentrirung der Flüssigkeit durch Einkochen. Durch lange fortgesetztes oder öfters wiederholtes Kochen verliert die Moosstärke ihre Eigenschaft zu gelatiniren. 1 Th.

frische Moosstärke giebt mit 23 Th. Wassers Gelée. Chlor, in eine warme concentrirte Auflösung geleitet, ändert dieselbe nicht wesentlich, und die Stärke gelatinirt nachher eben so gut. Jod färbt dieselbe schwach zwischbraun und grün. Wird Jod, in Alkohol aufgelöst, in einer warmen Auflösung der Stärke in Wasser vermischt, so schlägt es sich anfangs nieder, hierauf löst es sich aber wieder zu einer grünbraunen Flüssigkeit auf, die nach 24 Stunden nur einen schwachen Stich in's Blaue zeigt. Verdünnte Säuren lösen die Moosstärke mit Verlust ihrer Eigenschaft, zu gesehen, auf, zumal wenn sie etwas damit digerirt werden, und durch ihre fortgesetzte Einwirkung bei anhaltendem Kochen verwandelt sich die Stärke in Gummi und darauf in Zucker. Salpetersäure löst die trockne Gelée in der Digestion sehr leicht auf, und läßt ein schwarzbraunes Pulver, ähnlich dem vom Wasser zurückgelassenen, unaufgelöst zurück. Die Auflösung giebt bei fortgesetzter Digestion Aepfelsäure und Oxalsäure, aber keine Schleimsäure.

Gleich der gewöhnlichen Stärke verbindet sie sich mit Salzbasen; sie wird von kaustischem Kali aufgelöst, wird nicht von Barytwasser, dagegen aber stark von basischen Bleisalzen gefällt. Zu borsaurem Natron und zu Galläpfelinfusion verhält sie sich ganz so, wie gewöhnliche Stärke.

Wir haben noch andere, von der eben beschriebenen verschiedene, Species von Moosstärke, z. B. a) Stärke aus *Lichen fastigiatus*. Sie wird eben so wie die vorhergehende erhalten. Sie giebt eine schleimige Flüssigkeit, welche sich beim Einkochen mit einer schleimigen Haut überzieht, die aber bei keinem Grad der Concentration gelatinirt. Völlig eingetrocknet, ist sie in kaltem Wasser fast unauflöslich, worin sie aufquillt und schleimig wird. In Alkohol ist sie unauflöslich und wird davon gefällt. Von basisch essigsaurem Bleioxyd wird sie gefällt, aber der Niederschlag ist durchscheinend und schleimig. Auch von salpetersaurem Quecksilberoxyd wird sie niedergeschlagen, nicht aber von Galläpfelinfu-

n. b) Stärke aus *Lichen fraxineus* erhält man in gleicher Art, wie die vorigen. Ihre Auflösung in kochendem Wasser ist schleimig, bildet beim Abdampfen an der Oberfläche eine Haut, gelatinirt nicht und giebt beim Eintrocknen eine, in kaltem Wasser nicht mehr auflösbare Substanz. Die Auflösung wird weder von essigsaurem Bleioxyd, noch von Galläpfelinfusion gefällt. Beide letztere Stärkearten kommen in Begleitung mit Inulin vor, welches sich beim Erkalten der Abkochung pulverförmig absetzt.

Die Stärke hat eine ausgedehnte Anwendung. Sie ist für Menschen und Thiere einer der nährendsten Stoffe der Pflanzen; man benutzt auch die Stärke von Kartoffeln, den Sago und vor allen, als Stärkungsmittel für Kranke, zumal Hectische, die Moosstärke, deren vorzügliche Wirkungen eine lange Erfahrung bekräftigt hat. Man hat neuerlich als Stärkungsmittel eine pulverförmige Stärke, unter dem Namen Arrowroot, aus Westindien einzuführen angefangen, welche aus den Wurzelknollen von *Maranta arundinacea* bereitet wird; sie scheint aber mit der Kartoffelstärke ganz identisch zu sein, womit sie auch wahrscheinlich verfälscht wird, wenn man es anders so annehmen kann, daß man die eine für die andere giebt. Auch hat man für besonders stärkehaltig den Salep gehalten, welcher aus den getrockneten Wurzeln der Orchideen besteht, diese enthalten aber wenig Stärke, sondern hauptsächlich Pflanzenschleim. — Die Weizenstärke wurde in der Zeit lag in der ganzen cultivirten Welt zu dem höchst lächerlichen Zweck angewendet, in das Haar geputzt und darin mit animalischem Fett befestigt zu werden, was man Pudern nannte. Beim Waschen macht man die leinenen Kleidungsstücke mit einem Kleister von Weizenstärke steif, und bereitet das Garn zu Geweben damit, die sie wird außerdem sehr häufig in den Künsten gebraucht, und ein nicht unbedeutender Theil der Stärke wird entweder zu Gummi geröstet, oder durch Kochen mit verdünnter Schwefelsäure in Zucker umgewandelt.

Gummi und Pflanzenschleim.

Diese Substanzen kommen im Pflanzenreich noch häufiger als die Stärke vor, denn es giebt fast keine ein Pflanze, die nicht einen Bestandtheil enthält, der hier gerechnet werden kann; aber bis jetzt bringt man unter diese generische Benennung eine Menge von Stoffen von wirklich ungleichen chemischen Eigenschaften, welche die beiden Hauptcharaktere mit einander gemein haben, nämlich mit kaltem Wasser dickflüssige oder schleimige Flüssigkeiten zu geben, und aus dieser Auflösung durch Alkohol gefällt oder coagulirt zu werden. Sie begreift gleichwohl hauptsächlich zwei bestimmt verschiedene Substanzen, die oft mit einander vorkommen und deshalb einander verwechselt worden sind. Die eine derselben nenne ich Gummi, und ihr Prototyp ist das arabische Gummi, oder dasjenige Gummi, welches von selbst *Acacia vera* ausfließt. Das andere nenne ich Pflanzenschleim, und der Prototyp davon ist der Theil Tragantgummi, welcher, nach Behandlung mit kaltem Wasser, in Gestalt einer aufgequollenen, schleimigen Substanz unauflöst bleibt. — Gummi ist in kaltem und kochendem Wasser auflöslich, und bildet eine Flüssigkeit, welche bei einem gewissen Grade von Concentration dickfließend und klebrig ist, und in diesem Zustande Mucilage genannt wird; es ist unauflöslich in Alkohol, es wird von basischen Bleisalzen gefällt, nicht aber von Galläpfelinfusion, und giebt, wenigstens meistens, Schleim, wenn es mit Salpetersäure behandelt wird. — Der Pflanzenschleim ist sowohl in kaltem, als größtentheils auch in kochendem Wasser unauflöslich, worin er nur zu einem zähen, schleimigen Körper anschwillt, welcher auf Linienspapier oder anderen porösen Körpern sein Wasser abgibt und sich zusammenzieht, gerade so, wie wir es bei der kleisterförmigen Stärke, oder bei der Gelée Moosstärke gesehen haben. Er unterscheidet sich von letzteren durch seine Unauflöslichkeit in kochendem

und seine Eigenschaft, von Borax-Auflösung oder von Äpfelinfusion nicht coagulirt zu werden.

A. Gummi kommt wahrscheinlich in allen Pflanzen vor. a) Es wird, als concentrirte Auflösung, in Äpfeln ihren geführt bei verschiedenen Species von *Apple* *malus* u. a., und fließt beim Bersten derselben aus, wo es auf der Rinde zu klaren, gelben oder orangefarbenen, tropfenförmig gebildeten Massen erstarrt und erstarrt, nachdem es sich lange weich erhalten hat. Es wird außerdem aus fast allen Pflanzenschleimen erhalten, nachdem sie mit Wasser extrahirt worden sind und eine Auflösung, nach dem Verdampfen bis zur Consistenz der Symplicia, mit Alkohol vermischt wird, wobei das Gummi niederschlägt, wiewohl oft verunreinigt durch andere in Alkohol unauflösliche Pflanzenstoffe, wie z. B. Stärke, welche hinsichtlich ihrer physikalischen Eigenschaften in vielen Fällen mit Gummi Aehnlichkeit hat. b) Verschiedene Pflanzen enthalten dasselbe in so großer Menge, als ihre Infusion fast nur Gummi enthält, z. B. *Almond* und *Malva officinalis*, die Wurzel von *Ipomea* *virginale* u. a. d) Gummi wird durch Lösung von Stärke in Wasser, Zersetzung der Stärke, oder auch durch Lösung in Wasser, wohl von Stärke, als auch von Säure, wie z. B. Schwefelsäure erzeugt.

Die meisten Versuche über die Eigenschaften des Gummi's sind mit dem Gummi von *Apple* *malus* angestellt, was ich deshalb erwähnen will, weil es wohl möglich ist, dass mehrere der in Gummi enthaltenen Pflanzenstoffe häufig auch ganz wie Gummi bestimmt gefunden werden können, was ich auch in ihren werde.

Das Gummi erhält man niemals in reinem Zustande, es ist et größere oder kleinere Klumpen, Löcher von unregelmäßigen Tropfen, ist durchsichtig, klar, farblos und manchmal gelblich oder braun, welche Farben durch verschiedene Pflanzen anzeigen; es hat glasigen Bruch, ist ohne Geschmack und Geruch, und sein spez. Gewicht ist 1,48. Es enthält kein eigentliches

Wasser; wenn es sich aber aus einer allmählich eintrocknenden Auflösung bildet, so behält es, wenn es ganz trocken zu sein scheint, bis 17 Proc. Wasser, welches bei $+100^{\circ}$ im luftleeren Raum über Schwefelsäure entweicht.

Einer höheren Temperatur ausgesetzt, wird das Gummi mit denselben Erscheinungen und Producten wie die Pflanzenstoffe im Allgemeinen zersetzt, es giebt nämlich saures Wasser, brenzliches Oel, Kohlensäuregas und Kohlenwasserstoffgas, und hinterläßt eine blasige Kohle.

Es wird langsam, aber vollkommen, in allen Verhältnissen von Wasser aufgelöst, und schneller von kochendem, als von kaltem. Die Auflösung ist schleimig, klebrig und ohne Geschmack und Geruch. Ihre Schleimigkeit verhindert fein vertheilte Stoffe sich daraus abzusetzen, weshalb man das Gummi zur Dinte braucht, worin es das galläpfelsaure Eisen suspendirt erhält. Löst man in der Auflösung ein Metallsalz, z. B. essigsäures Bleioxyd, auf, und fällt dieses durch Schwefelwasserstoffgas oder ein wasserstoffschwefliges Alkali, so setzt sich der Niederschlag ebenfalls nicht ab; auch verhindert diese Auflösung das Anschiefen von Zucker und von leicht auflösliehen Salzen, wenn sie damit vermischt wird. Ungleiche Gummiarten ertheilen der Auflösung ungleiche Schleimigkeit, z. B. arabisches Gummi eine grölsere, als ein gleiches Gewicht Kirschbaumgummi. Wird eine Gummi-Auflösung sich selbst überlassen, so wird sie nach und nach sauer. — Gummi wird nicht von Alkohol oder Aether aufgelöst; Alkohol schlägt es aus seiner Auflösung nieder, jedoch nicht vollständig; daher bleibt die gefällte Flüssigkeit lange unklar, wie Milch.

Von Säuren wird das Gummi nicht leichter aufgelöst als von Wasser; die concentrirten verändern seine Zusammensetzung. Wird Pulver von Gummi mit concentrirter Schwefelsäure zusammengerieben, so vereinigen sie sich, und man erhält eine wenig gefärbte Masse, die nach 24 Stunden dunkler wird; mit Wasser verdünnt und die Säure mit Kreide gesättigt, bekommt man in der Auflösung ein Gummi von ganz gleicher Modifikation, wie das

Welches man durch gleiche Behandlung von Sägespäbnen oder Lumpen mit Schwefelsäure erhält. Wird das Gemische von Gummi und Schwefelsäure erbitzt, so zersetzt sich das Gummi, es entwickelt sich schweflichtsaures Gas, und beim Verdünnen fällt eine kohlige Substanz nieder, welche bis 0,29 vom Gewicht des Gummi's beträgt. Durch Kochen von Gummi mit verdünnter Schwefelsäure, wird die Auflösung dunkel und setzt eine braune Substanz ab. Dabei soll auch, wie mit Stärke, Zucker gebildet werden. — Salpetersäure zersetzt das Gummi; gelinde mit einander erbitzt, entwickelt sich Stickstoffoxydgas, und beim Erkalten der Flüssigkeit setzt sich 0,14 bis 0,26 vom Gewicht des Gummi's Schleimsäure ab. Fortgesetzte Digestion erzeugt Aepfelsäure und Oxalsäure. — Versuche von Vauquelin scheinen darzuthun, daß Chlorgas, in der Auflösung von Gummi geleitet, Citronsäure bildet. Chlorgas, von Gummipulver absorbirt, giebt eine flüssige, braune Masse, die beim Verdünnen eine schwarzbraune Materie absetzt. Dieselbe Flüssigkeit wird durch Auflösung des Gummi's in rauchender Chlorwasserstoffsäure erhalten. Man erhält eine weiche, zusammenhängende, schwarze Masse, wenn man Gummipulver Chlorwasserstoffsäuregas absorbiren läßt. Schwefelsäure entbindet daraus Chlorwasserstoffsäure. Jod verändert das Gummi nicht.

Mit Salzbasen vereinigt sich das Gummi leicht. Wird eine concentrirte Auflösung von Gummi mit einer Auflösung von kaustischem Kali vermischt, so coagulirt sich die Masse zuerst durch Bildung einer chemischen Verbindung zwischen dem Gummi und dem Alkali, die sich nachher wieder auflöst. Wird die Auflösung dieser Verbindung mit überschüssigem kaustischen Kali mit Alkohol vermischt, so wird die Gummi-Verbindung mit dem Alkali ausgeschieden, während das überschüssige Kalihydrat in der Flüssigkeit aufgelöst bleibt. Sie bildet einen käseartigen Niederschlag, der sich nach dem Trocknen leicht pulvern und wieder in Wasser auflösen läßt. Die Verbindungen von Gummi mit den übrigen Alkalien und den

Erden sind in Wasser auflöslich, und können durch Alkohol niedergeschlagen werden. — Mit Bleioxyd verbindet sich das Gummi, wenn seine Auflösung mit dem geschlämmten Oxyd digerirt wird. Die Verbindung ist unauflöslich. Sie entsteht auch durch Vermischen einer Gummi-Auflösung mit basisch essigsaurem oder salpetersaurem Bleioxyd, oder wenn man zu einer mit kaustischem Ammoniak vermischten Gummi-Auflösung salpetersaures Bleioxyd mit der Vorsicht setzt, daß alle Reaction von Ammoniak verschwindet, aber nicht alles Gummi ausgefällt wird. Die Masse ist käseartig. Nach dem Auswaschen und Trocknen ist sie weiß und leicht zu pulvern. Die Verbindung von Bleioxyd mit arabischem Gummi besteht aus 61,75 Th. Gummi und 38,25 Th. Bleioxyd, und wenn man sie als die neutralste Verbindung des Gummi's mit einer Basis betrachtet, so ist die Sättigungscapacität des Gummi's, als elektronegativen Körpers, 4,45.

Die angewendeten Sorten von Gummi sind von zweierlei Art, natürliche und künstlich bereitete. Von den natürlichen haben wir:

a) *Gummi arabicum* von *Acacia vera* und *Acacia arabica*, und *Gummi Senegal* von *Acacia Senegal*, welche die oben beschriebene Gummiart ausmachen. Als charakteristisches Kennzeichen für *Gummi Acaciarum* verdient sein Verhalten zum kieselsauren Kali (der Auflösung von Wasserglas) angeführt zu werden, welches dadurch gefällt wird, indem eine Verbindung von Gummi mit Kali aufgelöst bleibt, und eine Verbindung von Gummi mit Kali und Kieselsäure niederfällt. Durch diese Reaction entdeckt man selbst eine sehr geringe Menge in Wasser aufgelösten Gummi's.

Das Acacien-Gummi verbindet sich mit einigen Salzen. Wie die Stärke, wird es von Borax-Auflösung coagulirt, und dieses Coagulum wird von freier Säure oder bei Zusatz von weinsaurem Kali aufgelöst. Durch diese Coagulirung gleicht das Gummi der Stärke, unterscheidet sich aber wesentlich vom Pflanzenschleim, welcher dadurch nicht coagulirt. Es vereinigt sich ferner mit schwe-

saurem Eisenoxyd zu einem pomeranzengelben, in kaltem Wasser unauflöslichen Coagulum, welches sich in Salzsäure und überhaupt freien Säuren, so wie auch in kalter Lauge von kaustischem Kali auflöst. Mit Wasser geschüttelt, zieht dieses viel vom Gummi, und ein wenig vom Eisen- und Kupfersalze aus, und läßt eine Verbindung von geringerem Eisen- und größerem Eisensalz-Gehalt zurück. Die Auflösung von 1 Th. Gummi in 1000 Th. Wassers giebt, nach der Vermischung mit schwefelsaurem Eisenoxyd, nach 24 Stunden einen gelben Niederschlag. Wird eine concentrirte Gummi-Auflösung mit Eisenchlorid (salzsaurem Eisenoxyd) vermischt, so entsteht eine braune, durchscheinende Gallert, welche in Wasser schwer auflöslich ist, und beim Trocknen dunkelt. Eisenchlorid bis zum Verschwinden der Farbe verdünnt, wird durch zugesetztes Gummi gelb, und bildet nach einiger Zeit einen weißen, in Salpetersäure unauflöslichen Niederschlag. Diese Reactionen mit Eisenoxydsalzen treffen mit keinem andern Gummi und nicht mit Pflanzenschleim ein. — Von salpetersaurem Quecksilberoxydul wird eine Gummi-Auflösung ebenfalls gefällt; das anfangs Niedergeschlagene löset sich beim Umschütteln wieder auf, nachher aber wird ein Niederschlag, besonders beim Verdünnen der Flüssigkeit, beständig.

Die Zusammensetzung von diesem Gummi ist von Gay-Lussac und Thénard, von de Saussure und von mir untersucht worden, und auch hier stimmen meine Versuche mit Gay-Lussac's und Thénard's überein, und weichen etwas von denen von Saussure ab. Das Gummi besteht aus:

	G. L. u. Th.	Mein Vers.	Atome.	Berechnetes Resultat.
Wasserstoff	6,93	6,374	24	6,395
Kohlenstoff	42,23	42,682	13	42,400
Sauerstoff	50,84	50,944	12	51,205

Nach diesem Resultat wiegt ein Atom Gummi Aequivalente 2343,53, und wird von einer Quantität Basis gesättigt, deren Sauerstoff $\frac{1}{2}$ von dem des Gummi's ist. — Daß

das Gummi kein chemisch gebundenes Wasser enthält daraus klar, daß 100 Th. Gummi, in Verbindung Bleioxyd, so wie 100 Th. im luftleeren Raum getrocknetes Gummipulver, beide beim Verbrennen 57,425 Th. Wasser und 154,25 Th. Kohlensäure geben.

De Saussure fand. das Gummi zusammengesetzt 5,46 Th. Wasserstoff, 45,84 Th. Kohlenstoff, 48,26 Sauerstoff und 0,44 Th. Stickstoff.

Mehrere Chemiker erwähnen einer Asche, als standtheiles vom Gummi; dies ist nur fremde Einmengung. Das aus dem Niederschlage mit Bleioxyd abgeschiedene Gummi hinterläßt beim Verbrennen keine Asche.

b) *Gummi Cerasorum*, oder Kirschgummi schwitzt im Sommer aus den Kirschen- und Pflaumbäumen aus. Im Ansehen gleicht es dem arabischen Gummi aber nicht im Verhalten. Beim Auflösen hinterläßt es viel Pflanzenschleim unaufgelöst, und die Gummi-Auflösung ist nicht so schleimig, wie die von arabischem Gummi. wird nicht vollständig von Alkohol gefällt, und erst 24 Stunden giebt sie mit basisch essigsaurem Bleioxyd einen aus feinen Fäden bestehenden Niederschlag. wird nicht von schwefelsaurem Eisenoxyd coagulirt, wohl sie bisweilen damit auf Galläpfelsäure reagirt; trübt sie nicht die Auflösung von kieselsaurem Kali von salpetersaurem Quecksilberoxydul; dagegen aber reagirt sie mit Zinnchlorid (salzsaurem Zinnoxid) ein Coagulum in Gestalt einer steifen Gallert. Weder dieses, noch vorhergehende Gummi wird von Galläpfelinfusion gefällt.

Von den künstlich bereiteten haben wir:

a) Gummi von gerösteter Stärke. Wird Stärke geröstet, bis daß sie grau zu werden anfängt, so löst $\frac{1}{2}$ davon mit gelber Farbe in Wasser auf, und wird bis zur gelbbraunen Farbe geröstet und bis sie zu braun anfängt, so löst sie sich vollkommen und mit brauner Farbe auf. Wird die Auflösung filtrirt und abgedampft, so erhält man ein rothgelbes Gummi, wie angebranntes Brod riecht, glasigen Bruch hat sich leicht pulvern läßt. Alkohol zieht daraus eine k

enge brauner und brenzlicher Materie aus, durch welche das Gummi gefärbt war. Die mit ein wenig Schwefelsäure versetzte Auflösung dieses Gummi's in Wasser nun nicht durch Kochen in Zucker umgewandelt werden. Salpetersäure zersetzt dasselbe schon bei gewöhnlicher Temperatur in Oxalsäure, ohne gleichzeitige Bildung von Schleimsäure. Es wird, wie die Stärke, von Barytwasser, von salpetersaurem Quecksilberoxydul, von basisch essigsaurem Bleioxyd und von Galläpfelinfusion gefällt, und der letztgenannte Niederschlag ist in heißem Wasser auflöslich. Es fällt nicht das kieselsaure Kali.

b) Gummi von der freiwilligen Zersetzung des Stärkekleisters. Dieses Gummi erhält man durch Ausziehung des zersetzten Kleisters (p. 304.) mit kaltem Wasser und Fällung der concentrirten Auflösung mit Alkohol. Dieses Gummi löst sich in allen Proportionen in Wasser auf, und wird weder von basisch essigsaurem Bleioxyd, noch von Galläpfelinfusion gefällt. Von Jod wird es nicht verändert, und von Barytwasser nur schwach geübt. Mit Salpetersäure giebt es nicht Oxalsäure.

c) Gummi durch Behandlung von Leinen, Holz, Stärke oder arabischem Gummi mit Schwefelsäure. Dieses Gummi erhält man, wenn z. B. zu 8½ concentrirter Schwefelsäure nach und nach, unter Umrühren, 6 Th. leinener Lumpen oder Sägespähne gefügt werden, mit der Vorsicht, daß sich die Masse nicht erhitzt. Sie wird gut und lange umgerührt, bis daß Alles einen eichförmigen Brei bildet, den man 24 Stunden lang stehen läßt. Hierauf verdünnt man ihn, sättigt ihn mit dem kohlen-sauren Salz von Bleioxyd, Kalk oder Barytde, filtrirt den Niederschlag ab und verdampft. Dieses Gummi enthält unterschwefelsaures Salz eingemengt. Aus Stärke oder arabischem Gummi erhält man es durch mehrindiges Kochen mit verdünnter Schwefelsäure, die man vorher auf gleiche Weise wegnimmt, das Gummi enthält aber dann kein unterschwefelsaures Salz. Das erhaltene Gummi ist nach dem Trocknen blaßgelb, durchscheinend, von muschlichem, glänzendem Bruche, schmeckt

schleimig und ist geruchlos. In Wasser löst es sich zu einer schleimigen Flüssigkeit auf, welche weniger dicker als die von arabischem Gummi ist. Es wird sowohl von Baryt-, als Kalk-Wasser, so wie auch von basisch-essigsauerm Bleioxyd gefällt, und diese Niederschläge sind Verbindungen des Gummi's mit der angewandten Base. Es wird von Zinnchlorür gefällt, nicht aber von salzsaurem Eisenoxyd.

Das Gummi wird in der Heilkunde angewendet, man unter andern durch seine Schleimigkeit den natürlichen Schleim in der Luftröhre, dem Darmkanal und den Urinwegen ersetzen zu können glaubt. Man gebraucht es in der Färberei, in der Malerei, und es wird sehr häufig angewendet, um verschiedenen feineren Geweben Festigkeit und Elasticität zu ertheilen. Da das arabische Gummi theurer ist, als das künstlich bereitete, so bedient man sich zum letztgenannten Zweck sehr häufig des künstlich bereiteten.

B. Pflanzenschleim. Diese Substanz ist von den Pharmaceuten, welche bloß ihre Schleimigkeit nach dem Befeuchten mit Wasser beachteten, lange mit Gummi verwechselt worden. Vauquelin lenkte zuerst die Aufmerksamkeit auf eine Substanz, welche beim Aufweichen von Gummi Bassora in Wasser in aufgequollener, gallertiger Gestalt zurückblieb, und welche er Bassorin nannte. Nachher wurde diese Substanz von Buchholz im Kirschgummi, von John im Kirschgummi, von Boissier im Leinsaamen, den Quittenkörnern, den Wurzeln verschiedener Hyacinthen, in der Althewurzel, in mehreren andern Gattungen, und endlich von Caventou im Salep gefunden und bekam davon die Namen Cerasin, Prunin, Ganthin.

Den Pflanzenschleim erhält man in der größten Menge und am leichtesten aus dem Leinsaamen, indem man denselben mit kaltem oder kochendem Wasser behandelt und auspresst. Man erhält ihn auch dadurch, daß man Kirschgummi in dem 1000 bis 1200fachen Gewichte Wassers einweicht, und das Aufgelöste von der aufgequollenen schleimigen Masse abgießt.

In dieser Gestalt ist er ein farbloser, mehr oder weniger durchscheinender Schleim, welcher durch große Verdünnung und Umrühren mit Wasser zuletzt so dünn erhalten werden kann, daß er als zähe Flüssigkeit durch das Papier geht, indem jeder Tropfen einen Faden bildet, der sich wieder aufzieht. Er befindet sich in dieser Gestalt so auf dem Punkte zwischen Auflösung und bloßer Aufquellung, daß man es wohl Auflösung nennen könnte; läßt man aber den Schleim sich mit einer kleinen Quantität Wassers bilden, so sieht man, daß es keine bloße Aufquellung ist, und in das Löschpapier, worauf man die Masse legt, zieht sich eine nicht schleimige Flüssigkeit ein. Nach dem Trocknen bildet er eine weißliche oder gelbliche, durchscheinende, harte Masse, welche weder Geschmack, noch Geruch besitzt, und von Neuem in Wasser aufschwillt. Mehrere Arten Schleim geben bei der Destillation Ammoniak unter den Producten; es ist aber unbestimmt, ob es vom Schleim selbst, oder von fremden Einmengungen herrührt. Der Leinsaamenschleim quillt am meisten, und nächst diesem das Traganthgummi. Salpetersäure, so wie kaustische Alkalien, lösen den Pflanzenschleim auf und zerstören seine Schleimigkeit; gelindes Kochen mit denselben soll gewisse Arten Schleim in eine, dem Gummi völlig gleiche Materie verwandeln.

Vom Pflanzenschleim kennen wir mehrere Varietäten:

a) Traganthgummi, welches von selbst aus einem Wurzelstocke, dem *Astragalus creticus* und *gummifer*, ausgeleitet ist. Es bildet hellgelbe, undurchsichtige, wie aus einer natürlichen Oeffnung herausgepreßte, und dann fest gewordene Massen, ist zähe und kann nicht zu Pulver gegeben werden. Es besteht dem größten Theile nach aus Pflanzenschleim und enthält nur sehr wenig Gummi. In Wasser schwillt es zu einem mehrere hundert Mal größeren Volum auf, und wird durch Kochen zu einem leimenden Kleister. Mit viel Wasser $\frac{1}{2}$ Stunde lang gekocht, wird es in eine Substanz verwandelt, die dem arabischen Gummi völlig ähnlich sein soll. Mit Salpetersäure giebt es Schleimsäure, Aepfelsäure, Oxalsäure

und oxalsaure Kalkerde. Es wird unbedeutend von neutralem essigsäurem Bleioxyd, aber stark von dem basischen Salz, so wie auch von Zinnchlorür gefällt. Auch von salpetersäurem Quecksilberoxydul wird es niedergeschlagen, und von Galläpfelinfusion etwas getrübt.

b) Gummi von Pflaumen, so wie vom Stamme von *Prunus avium*, besteht mehrentheils von $\frac{2}{3}$ bis $\frac{3}{5}$ aus Pflanzenschleim.

c) Leinsaamenschleim. Wird Leinsaamen in kaltes Wasser gelegt, so sieht man nach einer Weile den Saamen sich mit einer Lage von Schleim umgeben, die immer mehr zunimmt. Das überstehende Wasser wird mehr oder weniger schleimig. Wird das Gemenge gekocht und dann ausgepresst, so bekommt man eine scheinige, graugelbe Masse, welche gerade so wie geriebene Kartoffeln riecht. Nach dem Eintrocknen giebt sie eine dunkle, in Wasser wieder aufschwellende Masse. 1 Th. Leinsaamen mit 16 Th. Wassers gekocht, giebt einen Schleim, der sich in Fäden ziehen läßt. Dieser Schleim wird von Alkohol, von sowohl neutralem als basischem essigsäurem Bleioxyd und von Zinnchlorür coagulirt. Dagegen wirken weder Chlor, Jod, kieselsaures Kali, Borax, schwefelsaures Eisenoxyd, noch Galläpfelinfusion darauf. Mit Salpetersäure giebt er viel Schleimsäure.

d) Quittenschleim. Werden die Kerne von Quitten (*Pyrus cydonia*) in Wasser gelegt, so überziehen sie sich, wie der Leinsaamen, mit Schleim; aber dieser Schleim ist wasserklar, farblos, und 1 Th. Kerne machen 10 Th. Wassers zu einem, wie Eiweiß dicken Schleim. Derselbe wird von Säuren coagulirt; Alkohol fällt ihn in Flocken. Er wird etwas von essigsäurem Bleioxyd, Zinnchlorid, Goldchlorid, schwefelsäurem Eisenoxyd und salpetersäurem Quecksilberoxydul gefällt, und von basischem essigsäurem Bleioxyd und von Zinnchlorür vollkommen coagulirt. Dagegen wird er nicht von kieselsäurem Kali oder von Galläpfelinfusion niedergeschlagen.

e) Salep nennt man die Wurzeln von mehreren *Orchis*-Arten (*mascula*, *moris*, *pyramidalis* u. a.), wel-

e von den Wurzelfasern gut gereinigt, in kaltem Wasser gewaschen, und dann 20 bis 30 Minuten lang in vielem Wasser gekocht werden, welches eine Substanz von angenehmem Geschmack auszieht, worauf sie herausgenommen und getrocknet werden. Sie bilden harte, durchscheinende, längliche Knollen. Diese Wurzeln enthalten ihr wenig Gummi und Stärke, aber viel Pflanzenschleim. Durch anhaltendes Kochen lösen sich dieselben zu einem durchsichtigen Schleim auf, und, gepulvert und mit kaltem Wasser angerührt, verwandeln sie sich schon ohne Erhitzen zu einem solchen, schwellen auf und saugen solche Mengen Wassers ein. Chlorwasserstoffsäure löst den Schleim zu einer dünnflüssigen Flüssigkeit auf. Salzersäure verwandelt ihn in Oxalsäure.

f) Ringelblumenschleim, *Calendulin*, scheint sich am ersten der Klasse des Pflanzenschleims anzureihen, von der er sich gleichwohl durch seine Auflöslichkeit in Spiritus unterscheidet. Er ist von Geiger beschrieben worden. Man behandelt die Blumen und Blätter von *Calendula officinalis* mit Alkohol, dampft die Auflösung zur Dicke von Extract ab, behandelt dieses zuerst mit Aether, welcher eine grüne, wachsartige Masse auszieht, und hierauf mit Wasser. Dieses hinterläßt eine schleimige, aufgequollene, in kaltem und kochendem Wasser fast unauflösliche Substanz, die nach dem Trocknen gelblich, durchscheinend und spröde wird. Beim Benetzen mit Wasser quillt sie wieder zu Schleim auf. In unreinem Zustand, so wie er sich in der Pflanze findet, wird er von Wasser aufgelöst, aber beim Erkalten gelatinirt die Flüssigkeit. In verdünnten Säuren ist er unauflöslich; auflöslich in concentrirter Essigsäure. Von verdünnten kaustischen Alkalien, nicht aber von Kohlensäuren wird er aufgelöst; auch nicht von Kalkwasser. In wasserfreiem und in dem etwas wasserhaltigen Alkohol ist er leicht auflöslich. Aus ersterem setzt er sich als eine trockne Haut, und aus letzterem als Gallert ab. Von Galläpfelinctur wird er nicht gefällt; in Aether und fetten, so wie flüchtigen Oelen ist er unauflöslich.

Der Pflanzenschleim wird wie das Gummi angewendet; sein Gebrauch in der Heilkunde ist größer, als der des Gummi's, und es ist wirklich auffallend, in welchem Grad der Pflanzenschleim den natürlichen thierischen Schleim auch in solchen Fällen ersetzen kann, wo der Pflanzenschleim zuvor die ganze Blutmasse passiren muß, wie z. B. beim Catarrh des Blasenhalses. Leinsaamen und Quittenkörner werden am meisten angewendet. Salep wird am gewöhnlichsten, wie Moosstärke, als Nahrungsmittel für Absehbende, benutzt. Das Traganthgummi wird auch in den Künsten zu gleichen Zwecken wie das Gummi gebrannt.

Zucker.

Der Zucker kommt weniger allgemein im Pflanzenreich, als die beiden vorher abgehandelten Stoffe vor, gehört aber dessen ungeachtet zu den allgemeineren Bestandtheilen desselben. Er findet sich in den Blüthen der meisten Pflanzen in einem eigenen kleinen Behälter, dem sogenannten Nectarium, und außerdem auch in den Stängeln, Blättern, Wurzeln, der Rinde, den Früchten, und seltener in den reifen Saamen.

Im Pflanzenreich kommen viele Species von Zucker vor; und bei vielen Pflanzen, in denen man Zucker fand, hat man es unbestimmt gelassen, zu welcher Species die süße Substanz gehörte. Das generische Kennzeichen für Zucker ist nur sein süßer Geschmack, weshalb man auch einige Substanzen hierher rechnet, die hinsichtlich ihrer chemischen Verhältnisse sehr von einander abweichen. Mit ziemlicher Sicherheit hat man unterschieden Rohrzucker, Syrup, Traubenzucker, Mannazucker, Schwammzucker und die süße Substanz in der Süßholzwurzel.

A. Rohrzucker, sowohl der krystallisirte, als der nicht krystallisirte oder Syrup, kommt in verschiedenen Pflanzen in so großer Menge vor, daß er aus denselben zum allgemeinen Verbräuche fabrikmäßig gewonnen wird. Der größte Theil desselben wird in den beiden Indien aus einem angebauten Rohrgewächse, dem

Zuckerrohr, *Saccharum officinarum*, gewonnen. Man erhält ihn auch in Menge aus dem Zuckerahorn, *Acer saccharinum*, und einigen anderen *Acer*-Species, so wie aus den Runkelrüben, *Beta vulgaris*, var. *altissima*.

Ich will in der Kürze die merkwürdigsten Operationen durchgehen, mittelst welcher der Zucker aus diesen Pflanzen gewonnen wird.

Zuckerbereitung aus dem Zuckerrohr. Das Zuckerrohr wächst in den in der Nähe der Linie gelegenen Theilen von Asien und Amerika, und macht da den Gegenstand großer Anpflanzungen aus. — Wenn das Zuckerrohr reif geworden ist, wird es an der Wurzel abgeschnitten, und von den Blättern und Spitzen befreit; hierauf wird es ausgepresst, indem man es zwischen eine Walze von Gulseisen aus 3 Cylindern bringt, wobei es zuerst durch die oberste und mittelste, und dann zwischen die mittelste und unterste kommt. Der Saft rinnt von den Walzen in ein darunter befindliches Gefäß ab. — Alle süße Pflanzensäfte haben eine große Neigung, von dem Augenblick an, wo sie mit der Luft in Berührung kommen, eine Art Zerstörungs-Prozess zu erleiden, welchen wir Wein-Gährung nennen, und wobei der Zucker in Alkohol verwandelt wird. Dies tritt um so schneller ein, je höher die Temperatur ist, und diese Veränderung gehört nicht dem Zucker selbst als solchem an, sondern entsteht, wenn sich in dem Saft Pflanzenleim oder vegetabilisches Eiweiß aufgelöst findet, durch dessen Einwirkung auf den Zucker diese Veränderung, schon nach Verlauf von 20 Minuten, in der unter den Walzen aufgefangenen Flüssigkeit ihren Anfang nimmt. Man eilt daher, so viel wie möglich, sie wegzunehmen; man vermischt sie mit Kalkhydrat in einem unbestimmten Verhältnisse, gewöhnlich 1 Th. Kalk auf 800 Th. Saft, und erwärmt sie bis zu $+60^{\circ}$ in einem Kessel. Der Pflanzenleim oder das Eiweiß verbinden sich dann mit dem Kalk und schwimmen auf der Oberfläche der Flüssigkeit, wo sie eine zusammenhängende Masse bilden, von welcher die darunter stehende Flüssigkeit abgezapft kann.

Diese wird dann, unter beständigem Abschäumen, eingekocht, bis sie gehörige Consistenz erlangt hat, worauf sie in ein flaches Reservoir ausgegossen wird, um darin zu erkalten, und aus diesem wird sie, noch ehe sie ganz kalt geworden ist, in Tonnen abgezapft, deren Boden mit mehreren, mit Zapfen verschlossenen Löchern versehen ist. Nach 24 Stunden wird sie stark mit Stäben umgerührt, um das Anschließen des Zuckers zu beschleunigen, was nach 6 Stunden vollendet ist. Man zieht dann die Zapfen aus und läßt das noch Flüssige abfließen, was durch neue Abdampfung noch mehr Zucker giebt. Der gut abgetropfte Zucker ist körnig, gelblich und etwas klebrig; man legt ihn zum Trocknen in die Sonne, packt ihn in Tonnen und verschickt ihn so in den Handel. Er wird nun *Muscovade* oder Rohzucker genannt. Der Syrup, welcher nicht weiter zum Krystallisiren gebracht werden kann, ist noch sehr süß, aber schwarz und dickflüssig. Er wird *Melasse* genannt, und wird, nach vorhergegangener Gährung, zur Branntwein-Bereitung angewendet. In den Zuckerplantagen der französischen Colonien unterwirft man bisweilen den rohen Zucker einer Umkochung mit Kalkwasser und Krystallisation des eingekochten Syrups in sehr großen konischen Gefäßen, die ein mit einem Zapfen verschlossenes Loch im Boden haben, durch welches das Unkrystallisirte abgezapft wird, worauf man den körnigen Zucker von dem braunen Syrup-Rückstand abspühlt, indem man den Zucker in dem unteren, nach oben gewandten Ende des Kegels mit einer Schicht von feuchtem Thon bedeckt, welcher sein Wasser langsam durch die poröse Zuckermasse fließen läßt, dadurch weiß wird. Dieser Rohzucker wird im *Fidel Terris* (*Sucre terré*, von *terre*) genannt. Dieser Zucker ist jedoch noch nicht so gereinigt, wie der Handel vorkommende Hutzucker, auf dessen Bereitung ich unten zurückkomme.

Ahornzucker wird in Nord-Amerika aus dem Saft von *Acer saccharinum* bereitet. Zu diesem Endzweck man im Frühling, zwischen der Mitte der Monat

l Mai, ein Loch durch die Rinde des Baumes
 eines Stück weit in das Holz selbst. In dieses
 eine Röhre gebracht, unter deren äußere Mündung
 ein Gefäß anbringt, das den auslaufenden Saft

Je höher hinauf das Loch gebohrt wird, um
 haltiger wird der Saft, aber um so mehr leidet
 Baum dadurch. Von mittelgroßen Bäumen er-
 in 24 Stunden ungefähr 48 Quart Saft; von
 men ist er süßer als von jungen, aber auch der
 ch geringer. Nach einer Mittelzahl beträgt der
 alt 5 Proc. vom Gewichte des Saftes. Das Auf-
 des Saftes dauert 5 bis 6 Wochen lang. Mehr
 och darf nicht in den Baum gebohrt werden,
 nicht im folgenden Jahre ausgehen soll. Einige
 vor, ein Loch auf die südliche Seite zu boh-
 , wenn dieses aufhört Saft zu geben, eins auf
 iche zu machen. Der aufgesammelte Saft darf
 er als 24 Stunden lang aufbewahrt werden, und
 so weit eingekocht, bis er die gehörige Con-
 langt hat, um durchaus zu gestehen. Er wird
 gegossen, worin er nach und nach zu einer
 en Zuckermasse erstarrt. Der Ahornzucker wird,
 iergegangenene Umkochung, bloß im Lande con-
 id kommt nicht in den allgemeinen Handel. Er
 ssen, wie der Zuckerrohrzucker, mit Hülfe von
 Ochsenblut, zu Hutzucker gereinigt werden.

elrübenzucker. Marggraf entdeckte, daß
 dem eingekochten Saftes verschiedener Wurzeln,
 aus dem der Runkelrüben, einen krystallisiren-
 er erhalten kann, wenn dieses Extract mit Alko-
 idelt wird, welcher die gummiartigen Bestand-
 aufgelöst läßt. Achard machte den Versuch,
 deckung von Marggraf im Großen anzuwen-
 wurde in dieser Unternehmung sehr bedeutend
 reussischen Regierung unterstützt. Es glückte ihm
 dem gewissen Grade, er konnte aber mit dem
 on den Colonien nicht Preis halten. Während
 als Napoleon, durch das sogenannte Conti-

nentalsystem, dem größten Theile von Europa die Zucker von England, sowohl von eigenen Industrie-Produkten als von Colonialwaaren, abschnitt, wurde der Colonien Zucker so theuer, daß der Runkelrübenzucker mit Gewinn bereitet und verkauft werden konnte, und die Zölle wurden so verbessert, daß der Runkelrübenzucker auch nachdem wieder Zucker von den Colonien frei geführt werden darf, noch jetzt mit einigem Gewinn bereitet werden kann.

Die Hauptsache von den Operationen, durch welche der Zucker aus den Runkelrüben erhalten wird, besteht in Folgendem: Die reifen Runkelrüben werden zu Ende Octobers eingesammelt (ein zu langer Aufenthalt in der Erde soll den Zuckergehalt vermindern, und darin einen Gehalt von Salpeter erzeugen), von den Blättern abgewaschen und zu Brei gequetscht, der stark ausgepresst wird. Der ausgepresste Saft hat eine gleiche Neigung zu gähren, wie der Saft aus dem Zuckerrohr, obgleich ärmer an Zucker ist, und selten mehr als 2, höchstens 3 Proc. vom Gewichte der angewandten Wurzel Zucker enthält. Er wird deshalb auf ähnliche Weise behandelt bis zu $+80^{\circ}$ erhitzt, und dann auf jedes Litre (38,7 Cub. Zoll) mit $2\frac{1}{2}$ Gramm ungelöschtem Kalk, de 18 Gramm Wasser zu einer milchichten Flüssigkeit gemacht ist, vermischt. Das Gemische wird umgerührt wenn es bis zu $+100^{\circ}$ gekommen ist, so wird das Gemische ausgelöscht und die Masse klären gelassen. Ein Theil schwimmt oben auf und wird abgeschäumt, ein anderer Theil sinkt zu Boden, und das Klare, welches zwischen beiden liegt, wird durch einen besonderen, etwas über dem Boden des Kessels angebrachten Hahn abgelassen. Sowohl der Schaum, als das, was sich abgesetzt hat, abgetropft und gepresst, und das Ablaufende zu dem vorher Abgezapften gemischt. Die Flüssigkeit wird bei schwachem Feuer eingekocht, bis sie 1,035 bis 1,04 specifisches Gewicht hat. Dann wird in kleinen Portionen, unter fortgesetztem Kochen, nach und nach gut durchgebräunt Knochenkohle, zu 4 Proc. vom Gewichte des Saftes,

zt. Mit dem Kochen wird fortgeföhren, bis daß die Flüssigkeit zu einem spec. Gewicht von 1,12 bis 1,13 concentrirt worden ist. Sie wird dann durch grobe Leinwand geseiht, deren Poren durch ein auf den Grund getes eisernes Gewicht ausgespannt werden. Mehrere tren die Masse zuvor mit Ochsenblut, wodurch sie sich meller durchsiehen läßt. Das Einkochen darf nicht nell geschehen, und die Pfannen müssen deshalb platt n, und die Feuerung wird überall gleichförmig angeicht, so daß die Flüssigkeit auf allen Stellen im Kon ist. Ist die Masse hinreichend eingedampft, so wird in die sogenannte Kühlpfanne zum Abkühlen abgezapft, l wenn sie nur noch $+40^{\circ}$ hat, wird sie in große ische Thonformen gegossen, die zuvor mit Wasser bechtet worden sind, und die unten eine mit einem opfe verschlossene Oeffnung haben; nach drei Tagen die Krystallisation vor sich gegangen, und nun läßt n den Syrup von dem in der Form zurückbleibenden bzucker ablaufen.

Der Rohzucker, sowohl der aus den Runkelrüben als aus dem Zuckerrohr, durchläuft mehrere Reinigungsoperationen, ehe er, unter den verschiedenen Namen: stre oder Stambaster, Lumpen-, Melis-, Raffinade l Canarien-Zucker, in den Handel kommt. Der erste von diesen ist eigentlich nichts anderes als Terrsker, bei einer so hohen Temperatur in eine gulseine Form gestampft, daß die Körner in eine harte und hte, wie halbgeschmolzene Masse zusammengegangen d. Der zweite, oder der Lumpenzucker, ist das Proct von der ersten Umkochung des Rohzuckers, Melis n der zweiten, und Raffinade oder Canarien von erterten Umkochungen.

Wenige chemische Operationen sind so viel abgeändert worden, und so oft der Gegenstand versuchter Versierungen gewesen, als wie der Zuckerraffinerie-Prozess. r gewöhnlichste und der am meisten angewendete ist, ls man 2 Th. Zucker in 1 Th. gutem Kalkwasser zu em Syrup auflöst, welchen man erhitzt, mit Ochsen-

blut klärt, noch heiß durch ein wollenes Tuch seilt, und über Steinkohlenfeuer einkocht, bis die Temperatur der kochenden Masse bis zu $+110^{\circ}$ gestiegen ist, oder bis eine herausgenommene Probe zwischen dem Daumen und Zeigefinger sich in einen Faden ziehen läßt, welcher unten abgeht, sich biegt und sich wieder aufzieht. Das Feuer wird dann sogleich mit Wasser ausgelöscht, und die Flüssigkeit in eine Kühlpfanne abgezapft, aus welcher sie, nach der Abkühlung bis zu $+40^{\circ}$, in Zuckerhutformen von inwendig glasirtem Töpfergut abgelassen wird, welche in ihrer nach unten gewendeten Spitze ein Loch haben, das mit einem Pfropf verschlossen wird. Diese Formen sind mit der Spitze über steinerne Gefäße gestellt, welche nach dem Ausziehen des Pfropfens das nicht Krystallisirte aufnehmen. Nachdem die Masse in den Hutformen erkaltet ist, wird sie mit Stäben umgerührt, wodurch eine körnige Krystallisation bewirkt wird. Sobald der Zucker vollkommen fest geworden ist, wird der Pfropf ausgezogen und der Syrup abfließen gelassen. Um dann den Syrup wegzuschaffen, welcher noch durch die Capillar-Attraction der Zuckerkörner zurückgehalten wird, schabt man das nach oben gewendete breitere Ende des Hutes einen Zoll tief ab, und belegt ihn statt dessen ebenso hoch mit gepulvertem reinen Zucker, worauf man diesen mit Thon bedeckt, der zuvor bis zu einer gewissen Consistenz mit Wasser angerührt worden ist. Dieses Wasser sickert allmählig aus dem Thon, löst den reinen Zucker auf und treibt den gefärbten Syrup mit derjenigen Langsamkeit aus, welche seine geringe Flüssigkeit erfordert. Diese Operation wird mit dem technischen Ausdruck **Decken** bezeichnet, und muß, für die reinsten Arten, 3 bis 4 Mal wiederholt werden, ehe das Abfließende farblos wird. Nachdem der gefärbte Syrup abgelaufen ist, wird der Hut herausgenommen, auf einer Basis in eine Trockenstube gestellt, wo er in dieser Luft umgeben ist, die nach und nach die Zuckerkrystalle auflöst, womit die Poren des Hutes leer wird.

Bei diesem Raffinirungsprozesse wendet man das Kalkwasser an, damit es durch seine Vereinigung mit einem Theile des färbenden Extractivstoffes diesen unauflöslich macht; aber da sowohl dieser Niederschlag, als auch andere, dem rohen Zucker mit folgende, mechanisch eingeengte Unreinigkeiten, beim Durchsiehen der Zuckeraufreinigung, die Poren des Seihetuches verstopfen, so setzt man Ochsenblut, Eiweiß oder selbst Milch zu, welche, wenn sie in der Flüssigkeit gerinnen, die aufgeschwemmten Unreinigkeiten umschließen, und dadurch die Verstopfung des Seihetuches verhindern. Eiweiß und Milch sind zu vermeiden, man hält sich deshalb zum Ochsenblut; da aber auch dieses nicht immer verhältnißmäßig zum Behufe der Raffinirung erhalten werden kann, so wird es bisweilen durch Wein gewendet, nachdem es schon durch's Aufbewahren in einem schweißlichen Fäulniß übergegangen und voller Würmer ist. Dies hat zu vielen Versuchen Anlaß gegeben, dieses schmutzige Reinigungsmittel zu entbehren. An einigen Orten hat man mit Vortheil die Anwendung von Galtsäure aus der Rinde einer in Westindien wachsenden Gattung von *Ulmus* versucht, und welche nicht den Beischnack giebt, welchen der Zucker durch Anwendung der Rinde von *Ulmus campestris* bekommt. Wilson hat vorgeschrieben, auf 100 Pfund in Kalkwasser aufgesetzten Zuckers $8\frac{1}{2}$ Loth schwefelsaures Zinkoxyd zuzumischen, das in der geringsten erforderlichen Menge kochendheißes Wassers aufgelöst ist, die Masse wohl umrühren, und, wenn der Syrup sehr gefärbt ist, 5 Minuten hernach 2 Loth ungelöschten, in Hydrat verwandelten und mit wenig Wasser angerührten Kalk zuzusetzen. Die Kalkerde zersetzt das Zinksalz, das gelatinöse Zinkoxydhydrat vereinigt sich theils mit aufgelöstem Extractivstoff und schlägt ihn nieder, und theils umschließt es und sammelt Alles, was im Syrup unauflöst schwebt. Am besten von allen diesen Reinigungsmitteln ist indessen die Methode des Franzosen Constant, mit Knochenkohle zu reinigen, geglückt, und hat nun schon an mehreren Orten die alte Raffinirungsmethode verdrängt. Man löst den

Zucker auf die gewöhnliche Art in Kalkwasser mit von Wärme auf. Wenn die Auflösung $+65^{\circ}$ he wird fein gepulverte Knochenkohle, so wie sie b Salmiakfabriken oder durch trockne Destillation v chen gewonnen wird, bis zu 4 Proc. vom Gewic Zuckers zugesetzt; hierauf wird das Gemenge bis z chen erhitzt, und damit eine Stunde lang angehalten auf die Flüssigkeit kochend durch Wolle geseiht. Sobald die durchgeseihete Flüssigkeit bis zu $+40^{\circ}$ ist, wird sie, auf 1000 Pfund Zucker, mit dem, m ser wohl zerrührten, Weissen von 40 Eiern vermisc wird darauf bis zum Kochen erhitzt und das Feu gelöscht. Das Eiweiß gerinnt, schwimmt oben a wird abgeschäumt, nachdem man die Flüssigkeit d den ruhig stehen gelassen hat, worauf der klare bis zur gehörigen Concentrations-Probe eingekoch. Durch diesen Prozeß wird ein vollkommen weißer Zucker gewonnen. Der ohne Kohle bereitete ersche mer gelblich, wenn er neben diesen gehalten wir geachtet man gewöhnlich zu dem ohne Kohle bei Zucker etwas Indigo setzt, um ihm einen Stich in' zu geben *). Wendet man zur Reinigung des l Blutlaugenkohle statt Beinschwarz an, so braucht m $\frac{1}{10}$ so viel von ersterer als von letzterem.

Eine andere Schwierigkeit beim Raffinations- ist, daß die Temperatur, welche zu Ende des k der Zuckerauflösung zur Verjagung des Wassers er wird, so nahe an derjenigen liegt, wobei der Zu seiner Zusammensetzung verändert wird. Währe Einkochens erhöht sich der Kochpunkt allmählich $+110^{\circ}$. Wenn der Syrup diesen Wärmegrad zum punkt hat, so ist er gerade fertig, um anzuschiefen. er im Mindesten länger gekocht, so steigt die Te tur, es verändert sich die Zusammensetzung des l

*) Man hat Beispiele gehabt, daß statt des Indigo's Smalte men worden ist; ein Betrug, der leicht entdeckt werde weil die Smalte beim Auflösen des Zuckers unauflöst b

erhält mehr Syrup und weniger festen Zucker. Man muß man gegen diesen Punkt zu äußerst auf sein, und das Feuer auslöschten, so wie er erreicht kann deshalb zur Feuerung nur Steinkohlen ge die in einem Augenblick mit Wasser ausgelöscht önnen. Um in diesem Falle nicht von der Auf eit der Arbeiter abhängig zu sein, hat man Auswege versucht. Wilson leitet, in einem n Reservoir erhitzten, Fischthran durch Röhren, mehreren Richtungen mit Schlangenwindungen die Zuckerauflösung enthaltende Gefäße gehen. thran nimmt, ohne sich zu zersetzen, eine weit emperatur an, als zum Kochen des Zuckers nö und die Schnelligkeit seines Durchganges durch er, worauf die Temperatur dieses letzteren be d durch eine Pumpe bestimmt, die ihn wieder erwärmungspfanne zurückführt. In dem Augen s die Bewegung der Pumpe aufhört, hört auch mung auf. Howard macht den Apparat, worin er gekocht wird, luftleer, worauf die Verdam einer so gelinden Hitze, höchstens bei $+50^{\circ}$, geht, daß kein Zucker zersetzt werden kann. thoden sind mit Erfolg im Großen ausgeführt Zu denselben kann man noch die von den Ge Derosne rechnen, nämlich den Zucker mit icken Gewicht Alkohol zu maceriren, welcher auflöst und den reinen Zucker zurückläßt, von die braune, unklare Flüssigkeit abtropfen läßt, lann auspreßt und trocknet. Diese Methode ist it im Großen ausgeführt worden, und es sind e ökonomischen Vortheile oder Nachtheile noch gemittelt.

Theil vom Zucker, welcher nach der Krystalli ch das geöffnete Ende der Hutform ausfließt, up genannt. Er enthält eine andere Varietät er, welcher nicht krystallisirbar ist, und der sich dem krystallisirenden im Zuckerrohre selbst fin durch's Kochen gebildet wird. Der beim Ko-

chen zu Lumpenzucker erhaltene ist sehr concentrirt, flüssig, so daß er in Fäden gezogen werden kann. Farbe braun, in's Grüne schillernd, und enthält nur flüssigen Zucker. Er macht unseren gewöhnlichen nannten braunen Syrup aus. Der Syrup, welcher beim Umkochen von Lumpen- zu Melis-Zucker wird Zwischensyrup genannt, ist dünner, weniger und enthält viel krystallisirenden Zucker. Der Syrup, der bei der Bereitung von Raffinade gewonnen wird Zuckersyrup oder Nalop genannt, und wird zu erneuten Einkochungen verwandt.

Der Rohrzucker zerfällt also in zwei Varietäten

a) Krystallisirter oder Hutzucker, dessen äußere Eigenschaften allgemein bekannt sind. Als Hutzucker bildet er ein Aggregat von kleinen stückchen. Wird er bis zur vollen Sättigung in Wasser aufgelöst, und an einem warmen Orte langsam verdampfen gelassen, so schießt er dabei in klaren, sechs-, geschoben vierseitigen Prismen mit zweiflächiger Spitze an. Diese Krystalle werden häufig im Handel aus noch nicht völlig reinem Zucker bereitet, und durch Bindfaden anschießen gelassen. Dadurch entstehen stänglichen Zusammenhäufungen von gelben Krystallen die man Kandiszucker nennt. Das spec. Gewicht des krystallisirten oder des Hutzuckers ist 1,6065. Im Wasser zerfällt er, phosphorescirt er. Durch Erhitzen bis zur schmelzenden Schmelzen verliert er nichts an Gewicht, enthält aber dessen ungeachtet chemisch gebundene Wasser. Wird eine abgewogene Quantität Zucker in Wasser aufgelöst und mit dem 4fachen Gewichte fein gemahlenen, wasserfreien Bleioxyds vermischt und eingetrocknet, so verbindet sich der Zucker mit dem Bleioxyd und sein Wasser entweichen, so daß von 100 Th. auf 100 Th. Zuckers nur 94,7 Th. mit Bleioxyd vereinigt sind, übriges bleibt. Dieses Wasser, welches also 5,3 Proc. des Gewichtes des Zuckers beträgt, enthält $\frac{1}{10}$ so viel Wasserstoff, als der Zucker, und der krystallisirte Zucker besteht aus einem Atom wasserfreiem Zucker und

Atom Wasser. — Wird der Zucker gelinde erhitzt, so schmilzt er und gesehet nachher zu einer klaren, farblosen, durchsichtigen Masse; aber bei einer sehr unbedeutend über den Schmelzpunkt erhöhten Temperatur wird Gas daraus entwickelt und die Masse gelb oder braun gefärbt. Die theils farblosen, theils gelblichen Caramellen unserer Zuckerbäcker sind Producte einer solchen Schmelzung mit oder ohne Zersetzung. Bei der trocknen Destillation giebt der Zucker saures Wasser mit brenzlichem Oel, ein Gemenge aus 3 Th. Kohlenwasserstoffgas, Wasserstoffgas und Kohlenoxydgas und 1 Th. Kohlensäuregas, und hinterlässt $\frac{1}{4}$ von seinem Gewicht Kohle, die in offener Luft ohne Rückstand verbrennt.

In Wasser löst sich der Zucker in allen Verhältnissen auf, und aus der kochendheiß gesättigten Auflösung schießt er beim Erkalten, wie wir oben gesehen haben, körnig an, und kann nur durch Abdampfung in regelmäßigen Krystallen erhalten werden. Er wird von Alkohol aufgelöst, und um so schwieriger, je wasserfreier dieser ist, und eine kochendheiß gesättigte Auflösung schießt beim Erkalten in Krystallen an. 1 Th. Zucker löst sich in 80 Th. kochenden wasserfreien Alkohols auf, und schießt daraus beim Erkalten fast wieder gänzlich an. Dagegen bedarf er von Spiritus, von 0,83 spec. Gewicht, nur 4 Th.; aber auch daraus schießt der größte Theil wieder nach einiger Zeit an.

In der Luft ist der Zucker unveränderlich, auch in aufgelöster Form. Eine Auflösung von Zucker in reinem Wasser verändert sich nicht, wenn sie im Schatten steht und vor dem Hineinfallen fremder Stoffe verwahrt ist. Im Sonnenlicht erzeugt sich bisweilen Schimmel darauf; wird sie aber mit gewissen Pflanzen- oder Thier-Stoffen vermischt, so entsteht darin ein Zerstörungsprozess, dessen ich beim Zuckerrohrsafte erwähnte, und den wir Weingährung nennen. Der Zucker wird dabei in Kohlensäure, die sich mit Aufbrausen entwickelt, und in Alkohol verwandelt, welcher in der Flüssigkeit bleibt. (Siehe weiter unten: Weingährung.) Vauquelin fand das Zucker-

rohrsaft, der, nach Verkorkung der Flaschen, zur Zerstörung des Sauerstoffs der Luft über dem Saft bis zu $+100^{\circ}$ erhitzt worden war, sich auf der Reise von Martinique nach Frankreich in eine zähe, schleimige Masse verwandelt hatte, die kaum aus den Flaschen gebracht werden konnte. Dieser Pflanzenschleim hatte sich zum Theil aus der Flüssigkeit abgesetzt, war in Alkohol unlöslich, gab mit Schwefelsäure keinen Traubenzucker, aber mit Salpetersäure Oxalsäure, ohne Schleimsäure. Ich erwähnte schon, daß eine sehr concentrirte Auflösung von Zucker, wenn man sie lange kochend erhält, oder deren Temperatur über $+110^{\circ}$ steigt, auf die Art verändert wird, daß ein Theil des Zuckers nicht mehr anschiesst. Dieser so veränderte ist

b) die zweite Varietät des Rohrzuckers, welche wir Syrup genannt haben, und der einige Chemiker den Namen Schleimzucker geben, welchen er nicht verdient, weil er intensiver süß ist, als der feste Zucker. Er findet sich am reichlichsten in dem im Handel vorkommenden braunen Syrup; der meiste aber bleibt in der Melasse. Er kann durch vorsichtiges Abdampfen eingetrocknet und die trockne Masse geschmolzen werden. Er ist immer gefärbt, und es ist ungewiß, ob dies von fremder Einmischung herrührt. Die geschmolzene Masse ist hart, durchscheinend und glasig im Bruch. An der Luft wird er feucht und verwandelt sich wieder in braunen Syrup, hat aber gewöhnlich etwas brenzlichen Geschmack. Er wird leicht von Alkohol aufgelöst, ohne daraus krystallisirt erhalten werden zu können. Er scheint oft von selbst in Gährung kommen zu können, dies rührt aber dann von fremden Materien her, die dem braunen Syrup bei der Raffination, vorzüglich aus dem Ochsenblute, beigemischt wurden.

Ich muß hierbei bemerken, daß man nicht mit dieser Art von Zucker den nicht krystallisirenden Zucker verwechseln muß, den man bisweilen bei Analysen von Pflanzen erhält, und dessen Anschieszen durch Einmischung fremder Stoffe, z. B. Gummi, verhindert werden kann.

wird durch die Einwirkung der concentrirte Schwefelsäure zu die Säure schwarz und setzt Materie ab. Wird die Säure Gyps abgeseiht, so erhält Rückstand, welcher nicht an unterschweifelsaure Kalkerde Rohrucker in verdünnter Schwefelsäure damit lange gekocht, so verwandelt in Traubenzucker, oder dieselbe durch Einwirkung der Schwefelsäure erzeugt. Mit Salpetersäure verwandelt Salpetersäure und Oxalsäure, wie ich im ersten Theil der Beschreibung dieser Säuren beschrieben habe. Chlorwasserstoffsäure wird der Zucker durch Schwefelsäure verändert, und läßt man Chlorwasserstoffgas von gepulvertem Zucker absteht eine flüssige, braune Masse, welche Chlorwasserstoffsäure enthält und an der Luft raucht. Bei der Auflösung von Zucker geleitet, verwandelt sich in Weinsäure und bildet Chlorwasserstoffsäure. Chlorwasserstoffsäure oder Weinsäure, dem Zucker nur zu dem Gewicht zugesetzt, hat er nach dem Eigenschaft, zu krystallisiren, verloren, und nicht wieder, wenn die Säure durch Kalkerde oder kohlensaures Bleioxyd wegge-

nommen verbindet sich mit Salzbasen. Wird bei der Auflösung von Kalihydrat gemischt, so löst sich und verliert seine Süßigkeit und giebt nach dem Abgießen eine Masse, die sich in Alkohol nicht auflöst, sondern das Kali genau mit Schwefelsäure neu-unzersetzten, durch Alkohol ausziehbaren Salz. Wird feingeriebener, trockener Zuckersilber in Ammoniakgas gelassen, so lange absorbirt wird, so schrumpft er zusammen, wird hängend, dicht, weich, so daß er mit einem Messer geschnitten werden kann, und

Ammoniak. Völlig mit Gas gesättigt, besteht diese Verbindung aus 90,28 Th. Zucker, 4,72 Th. Ammoniak 5,00 Th. Wasser, oder aus einem Atom Zucker, e Atom Wasser und einem Atom Ammoniak *). In Luft zersetzt sie sich, und das Ammoniak dunstet vollkommen mit Hinterlassung des Zuckers ab. Der Zucker die Hydrate der alkalischen Erden auf, und verbindet damit zu einer nicht krystallisirenden, kaum süßen Masse welche nach dem Abdampfen zähe wird, und zuletzt einer gelblichen, im Bruche muschlichen und gummiartigen Substanz erhärtet. Sie ist in Alkohol unauflöslich und wird dadurch aus der Auflösung in Wasser nicht geschlagen. Nach Daniell's Versuchen kann Zucker halbes Gewicht Kalkerde auflösen. Daniell fand, wenn diese Auflösung, in einigermaßen concentrirtem Stande, einige Zeit lang stehen gelassen wird, die Erde nach und nach kohlen-sauer wird, sich in kleinen rhomboëdrischen Krystallen absetzt, und die Masse in einen farblosen Kleister ohne Geschmack verwandelt, der beim Abdampfen eine feste, bräunliche, durchsichtige gummiähnliche Masse giebt, die in Wasser wieder lösbar ist, und aus dieser Auflösung von essigsäurem Oxyd, Zinnchlorür und Alkohol gefällt wird **). Bleioxyd giebt der Zucker zwei Verbindungen, von denen die eine auflöslich, die andere unauflöslich ist. Eine Auflösung von Zucker mit Bleioxyd digerirt, setzt sich das Oxyd auf, und man erhält eine gelbliche Flüssigkeit, welche alkalisch reagirt, und nach dem Abdampfen eine nicht krystallisirende zähe Masse giebt, die in der Luft wieder feucht wird. Kocht man eine Zi-

*) Das Atom des Ammoniaks = NH^3 angenommen.

**) Man hat gefunden, daß die von Cruikshank angegebene Reduction des Zuckers zu Gummi, durch Phosphorcalcium, derselben Art von Veränderung bestanden hat, welche die Kalkerde allein bewirkt. Vogel giebt jedoch an, daß Phosphor durch Anschluß der Luft, auf Kosten des Zuckers zu phosphoriger Säure oxydirt werde, und eine schwarze, klebrige Masse hinterlasse.

auflösung mit Bleioxyd im Ueberschuß und filtrirt die Auflösung kochendheiß, so setzt sie in dem verschlossenen Gefäße nach 24 Stunden weiße, voluminöse Flocken ab. Dieselbe Verbindung erhält man in fester Form, wenn die Zuckerauflösung so lange in einem verschlossenen Gefäße mit Bleioxyd digerirt wird, als dieses noch Zucker aufnimmt. Sie ist weiß, voluminös, leicht, ohne Geschmack, und sowohl in kaltem als kochendem Wasser unauflöslich. Um nicht zersetzt zu werden, muß sie im luftleeren Raume getrocknet werden. Diese Verbindung brennt wie Zunder, wenn sie an einem Punkt angezündet wird, und hinterläßt Bleikugeln. Sie wird von Säuren, und selbst auch von neutralem essigsauren Bleioxyd aufgelöst, welches mit dem Bleioxyd ein basisches Salz bildet und den Zucker in Freiheit setzt. Mit Wasser vermischt, wodurch man Kohlensäure leitet, erhält man den Zucker wieder in Auflösung, und kohlen-saures Bleioxyd bleibt unauflöst. Die Verbindung des Bleioxyds mit Zucker ist in Alkohol unlöslich. Sie besteht, nach Versuchen, aus 58,26 Th. Bleioxyd und 41,74 Th. Zucker, oder aus einem Atom Zucker und 2 Atomen Bleioxyd, was nach der Rechnung 57,65 Bleioxyd und 42,35 Zucker giebt.

Der Rohrzucker verbindet sich, so viel man bis jetzt weiß, mit keinem Salz; er verändert aber mehrere Metallsalze. Am merkwürdigsten ist seine Eigenschaft, sowohl kohlen-saures als basisch essigsaures Kupferoxyd zu einer grünen Flüssigkeit aufzulösen, woraus das Kupferoxyd nicht von Alkali, wohl aber von Cyaneisenkalium und Schwefelwasserstoffgas niedergeschlagen wird. Ure behauptet, daß aus der Auflösung von basisch essigsaurem Kupferoxyd das Kupfer von keinem Reagens gefällt werde. — Werden Auflösungen von Kupfersalzen mit Zucker gekocht, so wirkt dieser reducirend darauf. Aus schwefel-saurem Kupferoxyd wird metallisches Kupfer gefällt, in der Flüssigkeit bildet sich eine kleine Menge Oxydulsalz, und mit dem Metalle schlägt sich zugleich eine braune, in Ammoniak auflösliche Substanz nieder. Aus dem sal-petersauren Salz wird nichts gefällt, aber t sich

Oxydulsalz, und kaustisches Kali schlägt Oxydulhydrat mit gelber Farbe nieder. Aus essigsäurem Kupferoxyd wird beim Kochen sehr viel Oxydul niedergeschlagen, wird Essigsäure frei, und die übrigbleibende Salzauflösung giebt nach dem Verdampfen ein nicht krystallisirendes Magma. Aus salpetersäurem Silberoxyd schlägt der Zucker im Kochen ein schwarzes Pulver von noch nicht gemittelter Zusammensetzung nieder. Aus Kupfer- und Quecksilberchlorid schlägt er Chlorür nieder, welches aus dem Kupfersalz erst beim Erkalten absetzt. Aus Chlorgold wird ein hellrothes, bald dunkelroth werdendes Pulver niedergeschlagen. Rose hat gezeigt, daß wenn man Zucker zu einer Auflösung eines Eisenoxydsalzes mischt, das Eisenoxyd von Ammoniak nicht vollständig niederschlagen wird.

Die Zusammensetzung des Rohrzuckers ist von G. Lussac und Thénard, von Prout und von mir untersucht worden. Die Zusammensetzung des wasserfreien Zuckers ist nur von mir bestimmt, und wurde durch Verbrennung der in Wasser unauflöslichen und wasserfreien Verbindung mit Bleioxyd gefunden, wobei von 100 wasserfreiem Zucker 57,5 bis 57,75 Th. Wasser und 11 bis 163 Th. Kohlensäure erhalten wurden. Die folgenden Resultate:

	Gefunden. Atomgew. Berechnet.		
Kohlenstoff	44,99	12	44,779
Wasserstoff	6,41	21	6,402
Sauerstoff	48,60	10	48,819.

Ein Atom Zucker besteht dann aus $12C + 21H + 10O$ und wiegt 2048,36. Wenn sich 1 Atom Zucker mit einem Atom Basis vereinigt, so enthält der Zucker 10 Mal, mit 2 Atomen Basis 5 Mal den Sauerstoff der Basis.

Der wasserhaltige krystallisirte Zucker, der aus einem Atom Zucker und einem Atom Wasser besteht, ist zusammengesetzt aus:

	Font.	G. L. u. Th.	Meine Anal.	Atome.	Berechnet.
Kohlenstoff	39,99	42,47	42,225	12	42,450
Wasserstoff	6,66	6,90	6,600	23	6,645
Sauerstoff	53,35	50,63	51,175	11	50,905.

Die Anwendung des Rohrzuckers, sein täglicher Verbrauch, sind allgemein bekannt. In Europa scheint er bis zu den Kriegszügen Alexander des Großen unbekannt gewesen zu sein, war aber auch nachher noch eine Seltenheit und wurde bloß in der Arzneikunde gebraucht, bis er endlich von venetianischen Kaufleuten während der Kreuzzüge im südlichen Europa verbreitet wurde. Die Entdeckung von Amerika, und die Anlegung von Zuckerplantagen daselbst, machten ihn erst so allgemein, wie er jetzt ist. Außer seinem angenehmen süßen Geschmack besitzt er auch die Eigenschaft, organische Stoffe vor Fäulniß zu bewahren. In der Pharmacie braucht man ihn zu Syrupen, welche gewöhnlich Pflanzensäfte und zuweilen auch Infusionen oder Decocte sind, in denen man so viel Zucker aufgelöst hat, daß sie Consistenz erlangen, worauf sie sich lange unverändert aufbewahren lassen; zu Conserven, welche Gemische sind von, in einem Holzmörser zerstoßenen, frischen oder aufgeweichten Pflanzenstoffen mit gleichen Theilen, oder noch einmal so viel feingeriebenen Zuckers, die gut zusammengeknetet werden; zu Conditis, welche aus Pflanzentheilen bestehen, die man, nach dem Kochen bis zum Weichwerden, in Syrup gelegt hat, und die sich so weich erhalten, ohne zu verderben. — In neuerer Zeit hat man den Zucker allgemeiner zur Bewahrung von Fleisch anzuwenden angefangen, indem er, in weit geringerer Menge angewendet, als von Kochsalz nöthig ist, die Fäulniß verhindert, ohne die Nahrhaftigkeit oder Schmackhaftigkeit des Fleisches zu vermindern. Auch bei Fischen hat man die fäulnißswidrige Kraft des Zuckers eben so wirksam gefunden, nachdem man zu diesem Endzweck das Innere der aufgeschnittenen Fische mit Pulver von Rohrzucker bestreut hat. — Der Zucker für sich ist nährend und besonders für Bejahrte passend.

Indessen würde er gewiss nicht allein zum Unterhalt des Körpers hinreichen können, da er unter seinen Bestandtheilen keinen Stickstoff enthält. Magendie füttert Hunde mit Zucker, ohne ihnen etwas anderes zu fressen zu geben; sie magerten ab, bekamen Geschwüre auf den Augen und starben.

B. Traubenzucker. Dieser Zucker hat seinen Namen von den Weintrauben, worin er in so bedeutender Menge enthalten ist, daß er daraus im Großen gewonnen werden kann. Er macht die zuckerartigen Körner in den getrockneten Trauben (Rosinen) und den mehligartigen Ueberzug auf den getrockneten Feigen aus; er findet sich im Honig, und er kann künstlich hervorgebracht werden durch Behandlung von Stärke, Gummi, Rohracker, Sägespännen, leinenen Lumpen u. dergl. mit Schwefelsäure.

Während des Continentalsystems von Napoleon wurde ein großer Preis auf die Entdeckung eines in hinlänglicher Menge zu habenden Ersatzmittels für den Zucker von den Colonien ausgesetzt. Bei den, sowohl durch den Mangel an Zucker, als durch die bedeutende Belohnung veranlaßten Bemühungen, wurden zwei Wege entdeckt, Zucker für einen niedrigeren Preis zu erhalten, und beide lieferten dieselbe Zuckerart, die man damals noch nicht mit Sicherheit von dem Rohrzucker unterschied, wiewohl schon Lowitz auf das Dasein mehrerer ungleichen Zuckerarten aufmerksam machte. Proust zeigte, daß man aus dem Saft völlig reifer Weintrauben, durch ganz einfache Bereitungsmethoden, Zucker in solcher Quantität gewinnen könne, daß er zum Bedarf des ganzen südlichen Europa's hinreiche; der große Preis wurde ihm anerkannt, mit dem Vorbehalt, daß er eine Fabrikanstalt im Großen anlegen solle; aber er willigte in diesen Vorbehalt nicht ein, und so bekam er nicht die ausgesetzte Belohnung. Einige Jahre später wurde von Kirchoff in Petersburg entdeckt, daß man durch Kochen von Stärke mit verdünnten Säuren Zucker erzeugen könne, welche Art von der russischen Regierung belohnt wurde.

Die Zuckerbereitung aus Trauben ist eine sehr einfache Operation. Der ausgepresste Saft der Trauben enthält in guten Jahren 30 bis 40 Proc. feste Stoffe, von denen der Zucker den größten Theil ausmacht, und nur der geringere aus Eiweiß, zweifach weinsaurem Kali, Gummi und Extractivstoff besteht. Er reagirt auf freie Säure, die erst durch Zusatz von feingestossenem Kalkstein (Kreide sinkt schwieriger) gesättigt werden muß; nach dem Sättigen wird der klar gewordene Saft abgepresst, mit Eiweiß vermischt, aufgeköcht und abgeschäumt, und, wenn er kochendheiß ein spec. Gewicht von 1,32 hat, erkalten gelassen. Nach einigen Tagen schießt er in einer körnigen Masse an, die man abtropfen läßt und auspresst. Die abgelaufene Flüssigkeit liefert bei erneuertem Einkochen noch mehr Zucker. Der Traubensaft enthält auf 3 Th. krystallisirenden Zucker 1 Th. Syrup, der nicht zum Anschiefen zu bringen ist. Der ausgepresste Zucker wird, um ihn weiß zu bekommen, noch einmal mit Kohle umgekocht.

Zuckerbereitung durch Behandlung von Pflanzenstoffen mit Schwefelsäure. a) Aus Stärke. Wasser wird mit Schwefelsäure vermischt, und in diesem sauren Wasser $\frac{1}{4}$ seines Gewichts Stärke von Waizen, Kartoffeln u. dergl. aufgelöst, und, unter Ersetzung des verdampfenden Wassers, so lange gekocht, bis das eine herausgenommene Probe, mit ihrem doppelten Volum Alkohol vermischt, nicht mehr gefällt wird. — Die zu dieser Operation erforderliche Zeit hängt von der Menge der Säure ab; mit 1 Proc. vom Gewicht des Wassers Schwefelsäure sind 36 bis 40 Stunden nöthig, mit $2\frac{1}{2}$ Procent 10 Stunden, mit 10 Proc. 7 bis 8 Stunden. Das letztere Verhältniß scheint das ökonomischste zu sein, wenn man die Bereitung nicht sehr im Großen vornimmt, in welchem Falle 1 Proc. Säure und längeres Kochen vortheilhafter ist. — Das Kochen kann in Kupfergefäßen geschehen; am besten aber geschieht es in einem offenen Holzgefäße, in welches man durch ein hölzernes oder gläsernes Rohr Wasserdämpfe leitet. — Wenn Alkohol aus einer

herausgenommenen Probe nichts mehr niederschlägt, so wird das Feuer weggenommen und die freie Säure mit gepulvertem Kalkstein gesättigt; die Masse wird hierauf geseiht, die durchgelaufene Flüssigkeit zum dünnen Syrup eingekocht und dann anschießen gelassen. Nach 3 Tagen ist sie gewöhnlich durchaus zu einer gelben, körnigkrystallinischen Masse erstarrt, die keine Mutterlauge mehr enthält. Wird die Flüssigkeit, vor dem Einkochen zu Syrup, mit 3 bis 4 Proc. vom Gewicht der Stärke Knochenkohle behandelt, so erhält man den angeschossenen Zucker schneeweiss. Durch Pulvern der gelben körnigen Masse bekommt der Zucker zwar auch ein weisses Ansehen, aber die Farbe seiner Auflösung bleibt doch braun-gelb.

Bei dieser Operation wird nichts aus der Luft absorbiert und nichts aus der Flüssigkeit in Gasgestalt entwickelt; sie geht gleich gut in verschlossenen und in offenen Gefässen vor sich, die Säure wird nicht zersetzt, und sättigt ganz dieselbe Quantität Basis nachher, wie vor der Bildung des Zuckers. Die Stärke ist demnach das Einzige, was hierbei in seiner Zusammensetzung verändert wird. Sie verwandelt sich, wie wir schon (p. 321.) gesehen haben, in Gummi und nachher in Zucker. Die Einmischung von Kleber verhindert die Zuckerbildung; man erhält deswegen keinen Zucker aus Mehl, wenn es auf dieselbe Art mit Schwefelsäure behandelt wird. Auch soll man keinen Zucker aus Kartoffeln bekommen, wenn man sie mit der Säure kocht. Die Natur der Säure ist ebenfalls ziemlich gleichgültig, denn sehr verdünnte Salpetersäure, Chlorwasserstoffsäure, Oxalsäure bewirken dieselbe Veränderung. Nach Kirchhoff sollen Phosphorsäure, Weinsäure und Essigsäure dabei unwirksam sein, was jedoch wahrscheinlich entweder von zu geringem Grad der Concentration, oder von zu kurzer Einwirkung herrührte. Welcher Austausch der Bestandtheile bei diesen Veränderungen der Stärke statt findet, ist unbekannt, möchte aber durch die Analyse des Gummi's und des Zuckers, die hier nach einander erzeugt werden, leicht

ausgemittelt werden können. De Saussure, welcher mit vieler Aufmerksamkeit diese Erscheinungen verfolgt hat, giebt an, daß 10 Th. Stärke 11 Th. Zucker hervorbringen, woraus demnach zu folgen scheint, daß die Bestandtheile des Wassers mit in die Zusammensetzung des neuen Zuckers eingegangen sind. De Saussure dachte sich denselben als eine Verbindung von Stärke mit Krystallwasser. Dies ist jedoch wahrscheinlich nicht die richtige Ansicht, da die Krystalle von diesem Zucker bestehen können aus Zucker mit Krystallwasser, ersterer entstanden aus den Bestandtheilen der Stärke, und letzteres aufgenommen einem Theile nach aus diesen, und einem anderen Theile nach aus dem bei der Operation angewendeten Wasser.

Ich habe schon oben angeführt, daß Stärkekleister von selbst in Zucker übergeht, und daß sowohl arabisches Gummi als gewöhnlicher Zucker durch Kochen mit verdünnter Schwefelsäure in Zucker umgewandelt werden.

b) Zuckerbereitung aus Holz. Braconnot hat entdeckt, daß mehrere Pflanzenstoffe, welche zu dem mit dem gemeinschaftlichen Namen Holz bezeichneten Genus gehören, wie z. B. Sägespähne, Stroh, Lumpen von Leinwand, gepulverte Rinde, die Eigenschaft mit einander gemein haben, ebenfalls zuerst in Gummi und nachher in Traubenzucker umgewandelt zu werden. Aber es ist hierbei nothwendig, diese Stoffe mit concentrirter Schwefelsäure zu vermischen und sie damit stehen zu lassen. Dabei bildet sich nun zuerst Gummi, und die Schwefelsäure erleidet dabei, wenigstens einem Theile nach, eine solche Zersetzung, daß sich Unterschwefelsäure erzeugt, ohne gleichzeitige Entwicklung von Kohlensäuregas oder sonst einem anderen Gase; wird hierauf die Masse mit Wasser verdünnt und gekocht, so entsteht Zucker. Braconnot giebt folgende Vorschrift zur Bereitung von Zucker aus Leinen: Man zerschneidet ganz fein 12 Th. leinene Lumpen und vermischt sie in einer Reibschale unter fleißigem Umrühren mit 17 Th. concentrirter Schwefelsäure, die man nach und nach in kleinen Antheilen zusetzt,

damit sich das Gemische nicht erhitzt. Nach Verlauf $\frac{1}{4}$ Stunde, nachdem die letzte Säure zugesetzt ist, hat man eine homogene, zähe, wenig gefärbte Masse, die man mit Wasser verdünnt und dann 10 Stunden lang kocht, worauf man die Säure mit kohlensaurem Kalk sättigt; die Flüssigkeit wird abgeseiht und zum dünnen Syrup abgedampft, woraus der Zucker nach einigen Tagen in einer körnigen Masse anschießt, die man gut auspresst, wieder auflöst, mit Kohlenpulver kocht und abdampft, worauf man einen ganz reinen und farblosen Zucker erhält.

c) Traubenzucker aus Honig. Der Honig ist eine, von den Bienen aus den Blumen gesammelte, concentrirte Auflösung von Zucker. Die Flüssigkeit aus den Honigbehältern der Blumen wird von den Bienen verschluckt, und von ihren Organen theils in Honig, theils in Wachs verwandelt; der für den Bedarf des Körpers überschüssige Theil von verschlucktem Zucker wird von der Biene wieder abgegeben, und in den leeren Räumen der Honigkuchen in Gestalt eines gelben Syrups angesammelt, dessen Geschmack und Geruch, je nach den verschiedenen Blumen, woraus er gesammelt wurde, etwas veränderlich ist, welcher aber die allgemeinen Charaktere hat, daß er gelblich, halbflüssig ist und eine, dem Honig eigenthümliche Süßigkeit besitzt. Der Honig enthält zwei Arten von Zucker, von welchen der eine kö nig krystallisirt, und, nach Allem, was man bis jetzt zu vermuthen Ursache hat, mit dem Traubenzucker identisch ist. Der andere dagegen kann nicht krystallisiren, und ist sehr nahe verwandt mit dem braunen Syrup aus dem Zuckerrohr, mit dem er aber noch nicht so genau verglichen worden ist, daß sich mit Gewißheit entscheiden ließe, ob sie gleiche oder verschiedene Species von nicht krystallisirendem Zucker seien. Außerdem enthält der Honig einen gelben Farbstoff, bisweilen etwas Mannazucker, Wachs und eine in Alkohol unauflösliche, gummi-
 le Substanz. Man trennt diese beiden Zuckerarten
 Alkohols von einander, welcher in der Kälte
 lisirten Zucker auflöst, aber den nicht

krystallisirenden aufnimmt. Man wäscht den unaufgelöst gebliebenen mit Alkohol aus, presst ihn, löst ihn in Wasser, behandelt ihn mit Knochenkohle und Eiweiß, und erhält ihn dann nach dem Abdampfen in einer körnig-krystallinischen Masse. Aber diese Zerlegung des Honigs hat keinen ökonomischen Vortheil; ich habe sie bloß als eine Probe angeführt, wie man den im Honig enthaltenen Traubenzucker abscheiden und untersuchen kann.

Der Traubenzucker schießt aus einem, nicht allzuweit abgedampften, Syrup sehr langsam an, und dann doch immer so unregelmäßig, daß sich seine Krystallform nicht leicht bestimmen läßt. So viel hat man bis jetzt mit Sicherheit gefunden, daß sie von der des Rohrzuckers verschieden ist. Er bildet gewöhnlich kleine, warzenförmige oder halbkugelförmige, aus feinen Nadeln, seltener aus sich durchkreuzenden Blättern zusammengesetzte, und vorstehende Theile von Rhomben zeigende Massen. De Saussure fand den durch freiwillige Zersetzung der Stärke erzeugten Zucker in kleinen quadratischen Tafeln oder Cuben angeschossen. Wird pulverförmiger Traubenzucker auf die Zunge gebracht, so schmeckt er zugleich stechend und mehlig, und nachher, wenn er sich auflösen anfängt, schwach süß und zugleich etwas schleimig. Es ist davon $2\frac{1}{2}$ Mal so viel nöthig, um einem gewissen Volum Wassers dieselbe Süßigkeit, wie von Rohrzucker, zu ertheilen. Dieser Zucker enthält viel mehr Wasser, als der Rohrzucker. Er schmilzt bei $+100^{\circ}$ oder etwas darüber, und verliert dabei bis zu 8 Proc. an Gewicht. Der geschmolzene bildet eine gelbliche, durchsichtige Masse, die zuerst Feuchtigkeit aus der Luft anzieht und flüssig wird, und hierauf zu einer körnigen Krystallisation erstarrt. Bei der Destillation liefert er dieselben Producte, wie der Rohrzucker.

Der Traubenzucker ist in Wasser schwerer auflöslich, als der Rohrzucker. Er bedarf das $1\frac{1}{2}$ fache seines Gewichts kalten Wassers, und bleibt, selbst beim Umrühren, lange darin liegen, ohne sich aufzulösen. Dieser Umstand macht, daß man diesen Zucker mit Vor-

theil als Strenzucker gebrauchen kann. In Kochendheißem Wasser löst er sich etwas schneller und in allen Verhältnissen auf; aber der Syrup bekommt nicht dieselbe Consistenz, wie von Rohrzucker, und läßt sich nicht in Fäden ziehen. Die Auflösung schmeckt süßser, als der Zucker selbst, und die beste Form, in welcher dieser Zucker zu ökonomischem Behufe angewendet werden kann, ist als Syrup, der hinlänglich dünn ist, um nicht anzu-schießen. Eine Auflösung dieses Zuckers in Wasser verändert sich nicht für sich, aber mit Hefe versetzt, geht sie in eine lang anhaltende Weingährung über. Der Traubenzucker ist in Alkohol viel schwerer auflöslich, als der Rohrzucker. Aus der kochendheiß gesättigten Auflösung schießt er beim Erkalten in unregelmäßigen Krystallen an.

Von concentrirten Säuren wird er in seiner Zusammensetzung, wie die Pflanzenstoffe im Allgemeinen, zerstört. Von Salpetersäure wird er in Aepfelsäure und Oxalsäure umgewandelt.

Der Traubenzucker hat zu Salzbasen eine schwächere Verwandtschaft, als der Rohrzucker. Er vereinigt sich indessen mit denselben, und schmeckt dann bitter und schwach alkalisch; wird aber ein Ueberschuß der Base zugesetzt und das Gemische auch nur bis zu $+60^{\circ}$ bis 70° erwärmt, so wird die Zuckerauflösung braun und riecht wie angebrannter Zucker. Man hat angegeben, daß dieser Zucker von Kalkwasser braun werde; aber dieß ist unrichtig. Man kann mit demselben so viel Kalkerde vereinigen, daß alle Süßigkeit verschwindet, und die Auflösung bei gelinder Wärme bis zur dünnen Syrupskonsistenz abdampfen. Die Verbindung erhält sich weich, klebt an den Fingern, und löst sich in Alkohol auf. Im Kochen wird sie braun und setzt kohlen-saure Kalkerde ab. Setzt man Kalkerdehydrat in größerer Menge zu, so verwandelt es sich in eine schleimige Masse, die sich allmählich zu einer basischen Verbindung auflöst, und dann von Alkohol in weißen, käseartigen Flocken gefällt wird. Mit Alkohol gewaschen, bildet sie eine weiße Masse, die

s der Luft Feuchtigkeit anzieht und durchscheinend wird. Beim Trocknen wird sie leicht braun. Sie enthält, nach völligem Austrocknen, 24,26 Proc. Kalkerde und 75,74 Proc. Zucker und chemisch gebundenes Wasser. Wird die Verbindung des Zuckers mit Kalkerde durch Kohlensäuregas zersetzt, so erhält man den Zucker unverändert wieder. Mit Bleioxyd verbindet sich der Traubenzucker schwieriger; eine Portion Bleioxyd löst sich leicht auf, aber die basische Verbindung bildet sich erst schwierig, und sie läßt sich nicht bis zum Kochen erhitzen, ohne braun zu werden und angebrannt zu stehen. Bei einem Versuche, den Wassergehalt dieses Zuckers mittelst der Verbindung mit Bleioxyd zu bestimmen, verlor er 11,14 Proc., wurde aber dabei beim Einkochen deutlich braun, und roch wie gebrannter Zucker, ungeachtet die Temperatur nie über $+60^{\circ}$ ging.

Dieser Zucker verbindet sich mitunter mit Salzen. Berzelius fand, daß wenn man in einer gesättigten Kochsalzlösung bis fast zur Sättigung Traubenzucker auflöst, beim freiwilligen Abdampfen das Salz in Dodecaëdern scheidet. Diese Krystalle enthalten $\frac{1}{4}$ ihres Gewichts Kochsalz und 7 Proc. Krystallwasser, welches beim Trocknen in der Wärme entweicht. In Wasser sind sie leicht löslich, und auch auflöslich in wasserfreiem Alkohol. Auf glühende Kohlen gelegt, erweichen sie und blähen sich auf. Basisch essigsaures Kupferoxyd wird in Menge von Traubenzucker aufgelöst. Die Auflösung ist grün, setzt, nach dem Filtriren stehen gelassen, ein rothes Pulver ab, welches nach dem Auswaschen seine Farbe verliert, ohne sich höher zu oxydiren. Es ist eine Verbindung von Kupferoxydul mit einem nicht sauren Stoff, welches sich durch Schwefelwasserstoffgas abscheiden läßt. Durch Kochen bildet sich mehr davon. Die Auflösung des Kupferoxydsalzes im Traubenzucker wird nicht von Alkohol gefällt. Dieser Zucker löst nicht das kohlen-saure Kupferoxyd auf.

Die Zusammensetzung dieses Zuckers ist von Berzelius untersucht worden; er fand ihn zusammengesetzt aus:

	Zucker v. Trauben,	v. Stärke.
Kohlenstoff	36,71	37,29
Wasserstoff	6,78	6,84
Sauerstoff	56,51	55,87.

Aus diesem analytischen Versuch läßt sich noch kein wissenschaftliches Resultat ableiten, weil unter die elementaren Bestandtheile des Zuckers noch eine unbekannt Quantität Wassers mit eingerechnet ist; auf jeden Fall sieht man daraus, daß seine Zusammensetzung von der des Rohrzuckers verschieden sein muß, und daß der Traubenzucker bedeutend weniger Wasserstoff enthalten muß. Zwischen den beiden angeführten Resultaten ist ein Unterschied von ungefähr $\frac{1}{20}$ Proc., was der eine mehr an Kohlenstoff und weniger an Sauerstoff enthält, was wohl ein Beobachtungsfehler ist. Man kann erwarten, daß die Zusammensetzungs-Formel des Traubenzuckers einfacher sei, als die des Rohrzuckers, weil dieser Zucker das letzte Verwandlungs-Stadium ist, zu welchem mehrere Pflanzenstoffe durch Einwirkung nicht oxydirender Säuren gebracht werden.

Man hat den Traubenzucker in der Haushaltung anzuwenden versucht, aber bis jetzt scheinen seine Vortheile die Ungelegenheiten nicht aufzuwiegen. Zu seinen Vortheilen gehört, daß er von dem Landwirth aus Substanzen producirt werden kann, die ihm seine Aecker liefern, und zwar durch einen Prozeß, der nicht einmal so künstlich ist, wie der des Bierbrauens oder Branntweinbrennens, und daß folglich ein Artikel, für welchen das Land an Indien und überhaupt an den Handel anderer Länder große Summen giebt, von den Consumenten selbst bereitet werden kann. Aber zu seinen Ungelegenheiten gehört, daß dieser Zucker eine so geringe Süßigkeit hat und so schwer auflöslich ist; süßt man mit seinem Syrup, so muß so viel zugesetzt werden, daß das süß gemachte ganz bemerklich verdünnt wird, und süßt man mit dem Pulver, so ist zur Auflösung oft $\frac{1}{4}$ Stunde und darüber **nothwendig**. Indessen sind diese Unvortheilhaftigkeiten nicht

nicht so ganz unüberwindlich, daß nicht die Bereitung und der Gebrauch dieses Zuckers bei dem weniger bemittelten Landmanne ganz vortheilhaftig werden könne. In Frankreich hat man diesen Zucker auch zur Branntwein-Gährung bereitet; dieß ist indessen ein unnöthiger Umweg, seitdem man schon die Stärke in Gährung zu bringen gelernt hat. In Frankreich gebraucht die weniger bemittelte Klasse einen Syrup von eingekochtem Traubensaft, welcher zur Verhinderung der Gährung geschwefelt wird, indem man Schwefel in einer bis zu $\frac{1}{3}$ mit Traubensaft angefüllten Tonne verbrennt, und diese dann gut umschüttelt, oder auch, indem man in den Saft etwas schweflichtsaure Kalkerde wirft und damit gut umrührt. Diese Operation wird *le mutisme* genannt; nachdem sie vorgenommen ist, wird der Saft bis zu 1,28 spec. Gewicht abgedampft und so zum Verbruche aufbewahrt. — Ich glaube, daß die schleimige Süßigkeit des Traubenzuckers, die an sich recht angenehm ist, ihm in der Pharmacie als Vehikel für Brustmittel einen Vorzug vor den Präparaten aus Rohrzucker verschaffen werde.

C. Mannazucker findet sich in verschiedenen Pflanzen, aber vorzüglich in dem zuckerartigen Saft, welcher von *Fraxinus ornus* und *rotundifolia*, einer im südlichen Europa wachsenden Eschenart, abgesondert wird. Er findet sich auch im Saft der Zwiebeln, Runkelrüben, des Selleri's, der Spargeln, dem Splinte verschiedener Pinus-species, zumal des Lerchenbaumes (*Pinus larix*), und ohne Zweifel in sehr vielen süßen Pflanzen, wenn man ihn auch noch nicht darin gefunden hat. Proust zeigte zuerst, daß die Süßigkeit der Manna von einem, vom gewöhnlichen verschiedenen Zucker herrühre.

Aus den erwähnten Species von *Fraxinus* und *Pinus* fließt während des Sommers ein klarer und dicker, sehr süßer Saft aus, welcher zu weißen oder schwach gelblichen Tropfen erstarrt, und dann gesammelt wird. Er macht, unter dem Namen Manna, einen in der Medicin angewandten Handelsartikel aus. Die von den Eschen erhaltene Manna ist die beste; die vom Lerchenbaume

heißt Manna Brigantina, und ist so unangenehm terpen-
thinhaltig, daß sie wenig zu gebrauchen ist. Die Manna
besteht hauptsächlich aus Mannazucker; sie enthält dabei
eine geringe Menge Rohrzucker, und eine eigene gelb-
liche, extractivartige Materie, welche den eigentlich wirk-
samen Bestandtheil derselben ausmacht, und durch wel-
chen sie ein gelindes Abführungsmittel ist. Aus der Manna
erhält man den Zucker durch Auflösung derselben in ko-
chendem Alkohol, aus welchem der Mannazucker beim
Erkalten krystallisirt. Man preßt ihn aus und krystalli-
sirt ihn um. Die Manna enthält etwas mehr als $\frac{2}{3}$ Man-
nazucker.

Aus dem Saft von Zwiebeln, Runkelrüben u. a.,
welche zugleich eine der vorhergehenden Zuckerarten ent-
halten, kann der Mannazucker nicht eher abgeschieden
werden, als bis diese durch die Weingährung zerstört
worden sind, wo dann der Mannazucker übrig bleibt und
abgeschieden werden kann *).

Der Mannazucker krystallisirt am besten aus der Auf-
lösung in Spiritus, die man langsam erkalten läßt; ge-
wöhnlich bildet er aber nur kleine, farblose, durchsich-
tige, vierseitige Nadeln. Er hat einen schwachen, aber
angenehm süßen Geschmack, und zergeht fast augenblick-
lich auf der Zunge. In der Wärme wird er unter glei-
chen Erscheinungen, wie der Rohrzucker, zersetzt, mit dem
Unterschied, daß er, ohne zu schmelzen, erweicht. In
Wasser löst er sich leicht zu einem Syrup auf, welcher
nach dem freiwilligen Verdampfen zu einer körnig-kry-
stallinischen Masse gesteht. Diese Auflösung erhält sich
sehr gut, und kann nicht in Gährung versetzt werden,

*) Pfaff führt, als eine eigene Species, einen Zucker an, den
man erhält, wenn das Extract der Graswurzel (*Triticum repens*)
mit Alkohol gekocht und die Auflösung erkalten gelassen wird,
wobei der Zucker in feinen, weißen, biegsamen Nadeln an-
schießt, die sich so verweben, daß der Alkohol von einem ein-
zigen Procent Zucker zu gestehen scheint. Diese Eigenschaften
stimmen so gut mit denen des Mannazuckers überein, daß man
sie wohl schwerlich, ohne entscheidende Beweise ihrer Verschie-
denheit, für verschiedene Arten halten kann.

weshalb man auch in einer mit den vorbergehenden Zuckerarten gemischten Auflösung desselben jene durch Gährung zerstören und den Mannazucker allein zurückbehalten kann. Von kaltem Alkohol wird er schwierig aufgelöst, leicht aber von kochendem, und überhaupt um so leichter, je mehr Wasser dieser enthält. Eine kochend-heiß gesättigte Auflösung von Mannazucker in Alkohol geseht beim Erkalten so völlig, daß das Gefäß umgekehrt werden kann; indessen kann der Alkohol aus dem Krystallgewebe ausgepreßt werden. Der Mannazucker giebt mit Salpetersäure Aepfelsäure und Oxalsäure, ohne Spur von Schleimsäure. Seine Auflösung in Wasser löst Bleioxyd zu einer alkalischen Flüssigkeit auf, welche von kaustischem Ammoniak gefällt wird. Im Uebrigen sind die Eigenschaften dieses Zuckers nicht weiter untersucht.

Seine Zusammensetzung ist von de Saussure untersucht worden, nach welchem er besteht aus Kohlenstoff 38,53, Wasserstoff 7,87 und Sauerstoff 53,60. Ob er chemisch gebundenes Wasser enthalte oder nicht, ist nicht ausgemittelt, und man hat keine Thatsache, nach welcher die Atomenanzahl berechnet werden könnte.

Der Mannazucker hat keine Anwendung; auch scheint er an der abführenden Eigenschaft der Manna keinen Theil zu haben.

D. Schwammzucker, ist von Braconnot in verschiedenen Schwämmen entdeckt worden, nämlich in *Agaricus acris*, *A. volvaceus*, *A. theogalus*, *A. campestris*, *Boletus juglandis*, *Peziza nigra*, *Merulius cantharellus*, *Phallus impudicus*, *Hydnum hybridum* und *H. repandum*, und Schrader fand denselben in den Morcheln, *Helvella mitra*. Er findet sich wahrscheinlich in noch mehreren Schwammarten.

Um ihn zu erhalten, zerreibt man den frischen Schwamm in einem Mörser mit ein wenig Wasser, seih die Masse, preßt sie aus, und dampft die Flüssigkeit bis fast zur Trockne ab. Der Rückstand wird mit Alkohol angerührt, so lange als dieser noch auflöst; die braune Flüssigkeit setzt, nachdem der größte Theil des Alkohols

abdestillirt und sie so concentrirt worden ist, Krystalle von unreinem Schwammzucker ab. Man löst ihn in kochendheißem Alkohol auf, und läßt ihn noch einmal krystallisiren.

Der Schwammzucker hat eine große Neigung zu krystallisiren, sowohl aus seiner Auflösung in Alkohol, als aus der in Wasser, und schießt beim freiwilligen Abdampfen in langen vierseitigen Prismen mit quadratischer Basis an. Ein Tropfen, selbst von einer verdünnten Auflösung, giebt beim Eintrocknen auf Glas eine Krystallvegetation. Er ist farblos, schmeckt weit weniger süß, als die vorhergehenden, und löst sich in Wasser und in Alkohol etwas schwieriger auf, als Rohrzucker. Die mit Hefe versetzte Auflösung in Wasser geht in Weingährung über. Beim Erhitzen schmilzt der Schwammzucker, und wird unter denselben Erscheinungen, wie gewöhnlicher Zucker, zerstört. Von concentrirter Schwefelsäure wird er mit rother Farbe aufgelöst; zugemischtes Wasser scheidet ein weißes Coagulum ab. Salpetersäure verändert ihn wie gewöhnlichen Zucker. Schrader bemerkt, daß dabei Zucker von *Helvella mitra* Dämpfe von Aether ausstofse. Die übrigen Säuren scheinen nicht darauf einzuwirken; aus der Auflösung in denselben schießt er wieder unverändert an. Seine Verbindungen mit Salzbasen sind nicht untersucht. Seine Auflösung fällt nicht die gewöhnlichen Reagentien.

E. Süßholzzucker, ist in der Wurzel von *Glycyrrhiza glabra* und in dem daraus bereiteten, unter dem Namen Lakritz allgemein bekannten Extract enthalten. Ein ähnlicher Zucker findet sich auch in den Blättern eines auf den Antillen sehr allgemeinen Strauchgewächses, des *Abrus praecatorius*. Diese Art Zucker, welche vielleicht eher ein Genus für sich ausmachen sollte, zeichnet sich dadurch aus, daß sie süß und zugleich bitter oder selbst ekelhaft schmeckt, und daß der Geschmack davon am stärksten hinten im Schlund und im oberen Theil der Luftröhre bemerkbar ist. Er krystallisirt nicht, und ist sowohl in Wasser, als in Alkohol auflöslich. Mit Salpe-

tersäure giebt er keine Oxalsäure, auch ist er nicht der Weingährung fähig.

a) Süßholzzucker aus der Süßholzwurzel (von *Glyc. glabra*). Diesen Zucker erhält man theils aus der in den Apotheken vorkommenden Wurzel, theils aus dem im Handel unter dem Namen Lakriz bekannten Extract davon, welches von diesem Zucker seinen süßen Geschmack hat, Aus der Wurzel erhält man ihn durch Ausziehen mit kochendheißem Wasser, und Abdampfen der Flüssigkeit bei sehr gelinder Wärme bis zu einem geringeren Volum und Vermischen mit Schwefelsäure, welche einen weißen Niederschlag bewirkt, der den Süßholzzucker, nebst einer aus der Wurzel ausgezogenen Portion Eiweiß enthält. Der Niederschlag wird mit Wasser gewaschen, welches freie Schwefelsäure enthält, und hierauf mit etwas reinem Wasser, worauf man ihn in Alkohol auflöst, welcher das Eiweiß zurückläßt. Zu der Auflösung setzt man tropfenweise eine Auflösung von kohlen-säurem Kali, bis daß die Flüssigkeit nicht mehr bemerklich sauer reagirt, worauf man filtrirt und abdampft. Der Zucker bleibt dann in Gestalt einer gelben durchscheinenden, gesprungenen, vom Gefäße leicht ablösbaren Masse zurück.

Aus Lakriz erhält man diesen Zucker, wenn man ihn in warmem Wasser auflöst, mit Eiweiß klärt, ohne welches die Flüssigkeit nicht filtrirt werden kann, und nach dem Filtriren mit Schwefelsäure fällt; der Niederschlag wird auf's Filtrum genommen und so lange gewaschen, als das Wasser noch gefärbt abläuft, worauf man ihn in Alkohol auflöst und wie oben behandelt. Dieser Niederschlag enthält kein Eiweiß, auch wenn der Lakriz nur in kaltem Wasser aufgelöst war.

Der Süßholzzucker, so wie man ihn aus der Wurzel erhält, ist eine gelbe durchscheinende Masse, die als größliches Pulver mit gepulvertem Bernstein Aehnlichkeit hat, welche den der Wurzel eigenthümlichen, erst im Schlunde bemerkbaren, intensiv süßen Geschmack hat, und welche sowohl in Alkohol, als in Wasser leicht auflöslich ist. Aus

dem Lakritz hat er einen etwas verschiedenen Geschmack und eine braune Farbe, welche selbst nicht von Borax verändert oder weggenommen wird. Wird Süßholzzucker in offener Luft erhitzt, so bläht er sich wie Borax auf, entzündet sich und brennt mit klarer Flamme und vielem Rauch. Pulver davon in die Lichtflamme geworfen, brennt mit derselben Lebhaftigkeit, wie Lycopodium, aber mit weißerem Feuer.

Der ausgezeichnetste Charakter des Süßholzzuckers ist eine große Verwandtschaft sowohl zu Säuren als zu Salzbasen und mehreren Salzen.

Mit Säuren bildet er in Wasser schwer auflöslche Verbindungen, die, wenn das Wasser freie Säure enthält, fast ganz unauflöslich sind. Aus verdünnten Auflösungen schlagen sie sich erst nach einiger Zeit nieder. Sie werden sowohl mit organischen, als mit unorganischen Säuren gebildet. Schwefelsaurer Süßholzzucker setzt sich anfangs als eine leichte Trübung ab, sammelt sich dann zu einer etwas zusammenhängenden Masse, die durch Kneten in lauem Wasser, gleich einem halbgeschmolzenen Harz, zusammenhängend und klebrig wird. Er schmeckt, nach völligem Auswaschen, nicht sauer, sondern süß, wie der reine Süßholzzucker, backt aber auf der Zunge zusammen, und löst sich nur langsam in Speichel auf. Von kochendem Wasser wird er aufgelöst, und wenn die Auflösung gesättigt war, so geseht sie beim Erkalten zu einer zitternden Gallert. Die Farbe der Auflösung ist hellgelb. In Alkohol aufgelöst, wird er nicht von Wasser gefällt, und beim Abdampfen der Auflösung bleibt eine durchscheinende, hellgelbe, extractartige Substanz zurück, die nach völligem Austrocknen undurchsichtig und strohgelb wird. Er verbrennt wie der reine Zucker, und hinterläßt keine Spur von Asche. Essigsaurer Süßholzzucker wird wie der vorhergehende niedergeschlagen, dem er ähnlich ist; aber in kochendem Wasser ist er viel auflöslcher und bildet beim Erkalten eine steifere Gallert; beim Eintrocknen hinterläßt er blasse, fast weiße, süß schmeckende Schuppen, die sich leicht vom Gefäß ablösen.

Mit Basen vereinigt sich dieser Zucker, so daß, wenn man ihn mit einer Säure niedergeschlagen hat und diese mit einer Base abscheidet, der Zucker sich mit der im Ueberschuß zugesetzten Base verbindet; es ist daher nothwendig, bei seiner Abscheidung nicht mehr davon zuzusetzen, als zur Sättigung der Säure nöthig ist, und zugleich die saure Verbindung in Auflösung zu haben, weil die Verbindung des Zuckers mit einer Base seine unauflösliche Verbindung mit einer Säure nicht zersetzt. Es ist nicht möglich, den Süßholzzucker nach der eben angeführten Methode absolut frei von Alkali zu bekommen, weil dieses in Alkohol nicht ganz unauflöslich ist, und man nicht eine geringe Portion der sauren Verbindung in der Auflösung unzersetzt läßt. Wird Süßholzzucker mit kohlen-saurem Kali, kohlen-saurer Baryterde oder Kalkerde vermischt und digerirt, so entweicht allmählich die Kohlensäure, indem sich der Zucker mit der Base zu einem in Wasser auflöslichen Körper verbindet, welcher, wenn er keinen Ueberschuß an Base enthält, nur süß schmeckt, und beim Uebergießen mit einer Säure nicht die geringste Spur von Kohlensäure entwickelt. Diese Verbindungen werden von Wasser leicht aufgelöst, und auch, wiewohl in geringerer Menge, von Alkohol. Sie krystallisiren nicht, sondern sehen nach dem Eintrocknen wie Extracte aus. Von Kohlensäuregas werden sie nicht zersetzt, wenn man es in ihre Auflösung leitet. Wird eine Auflösung von schwefelsaurem Süßholzzucker in Alkohol lange mit kohlen-saurer Baryterde oder Kalkerde digerirt, so erhält man eine in Alkohol auflösliche Portion, aber in dem Grade, als die Digestion fort-dauert, schlägt sich eine größere Portion nieder, welche in Wasser auflöslich und die kohlen-säurefreie Verbindung der Base mit dem Zucker ist.

Auch mit Salzen verbindet sich der Süßholzzucker, wiewohl der frische, aus der Wurzel gezogene weniger leicht, als der brenzliche aus dem Lakriz. Wird letzterer durch kohlen-saures Kali aus seiner Verbindung mit Schwefelsäure geschieden, so bekommt man einen brau-

nen, unauflöslchen Rückstand, der sich in Wasser voll-
 kommen auflöst, und nach dem Abdampfen eine schwarz-
 gesprungene, nicht im Mindesten krystallinische Masse vom
 süßem Geschmack zurückläßt. Vom frischen Zucker bei-
 kommt man nur krystallisirendes schwefelsaures Kali. Sonst
 wohl der frische, als der braune Zucker fallen die meis-
 ten Metallsalze, wie z. B. salpetersaures Kupferoxyd, neu-
 trales essigsäures Bleioxyd, schwefelsaures Eisenoxyd, Zinn-
 chlorür u. m.; Quecksilberchlorid-Auflösung wird aber-
 dadurch nicht gefällt. Diese Niederschläge sind wirkli-
 che Verbindungen mit dem Salze, und geben bei der Zer-
 setzung mit Schwefelwasserstoffgas nichts oder nur sehr
 wenig in kaltem Wasser Auflöslches; aber einige davon,
 z. B. der Niederschlag mit dem Zinnsalz, werden von
 Alkohol zersetzt, welcher ein Gemenge von reinem Zuk-
 ker und salzsaurem Zucker aufnimmt, und einen zinn-
 oxydulhaltigen Rückstand läßt. Tropft man eine Auflö-
 sung von Süßholzzucker in eine Auflösung von essigsäu-
 rem Bleioxyd, mit der Vorsicht, daß das Salz nicht neu-
 tral wird, so bekommt man einen Niederschlag, der aus
 Zucker und Bleioxyd besteht, und durch Schwefelwasser-
 stoffgas zersetzt werden kann, aber dann das Blei mecha-
 nisch zurückhält, so daß er sich weder bald klärt, noch
 sich klar filtriren läßt. Dieß wäre sonst die sicherste
 Art, den Süßholzzucker vollkommen frei von Säure und
 von Basis zu erhalten.

Der Süßholzzucker wird nicht von Galläpfelinfusion
 gefällt.

b) Süßholzzucker aus *Abrus praecatorius*
 (dieselbe Pflanze, von welcher die zu Perlenschnüren be-
 nutzten rothen, an dem einen Ende schwarzen Bohnen
 erhalten werden). Man macht eine Infusion von den zer-
 hackten tocknen Blättern, und schlägt diese Infusion mit
 Schwefelsäure nieder. Der Niederschlag wird gerade so
 wie der aus der Infusion der Süßholzwurzel behandelt.
 Er ist viel dunkler, ungefähr so wie der aus dem Lakriz.
 Der erhaltene Zucker ist gelbbraun, dunkel, extractartig
 und durchscheinend. Es hat einen mehr bitteren, als

süßen Geschmack, und zeigt erst im Schlunde einige, dem vom Lakritz ähnliche Süfsigkeit, obgleich immer das Bittere darin vorherrscht. Der ausgezogene Zucker ist bitterer, als die Blätter beim Kauen sind, woraus man schliessen kann, daß er bei der chemischen Behandlung etwas verändert wird. Werden die Blätter erst mit Alkohol ausgezogen, und das Extract nach der Abdestillirung desselben in Wasser aufgelöst, so bekommt man eine Einmischung von Grün, wahrscheinlich von grünem Wachs, das nachher nicht mehr abgeschieden werden kann, und den Zucker und seine Verbindungen färbt. Uebrigens verhält sich der Süfsholzzucker aus *Abrus prae-catorius* zu Säuren, Salzbasen *) und Salzen ganz wie der aus der Süfsholzwurzel. Er gehört daher zu demselben Genus, und der hauptsächlichste Unterschied liegt im Geschmack, der bei dem von *Abrus* weit unangenehmer ist.

Der Süfsholzzucker hat die Eigenschaft, den Gaumen und den oberen Theil der Luftröhre zu belegen, und bei dem gelinde entzündlichen Zustand dieser Theile den mangelnden natürlichen Schleim zu ersetzen, und er wird deshalb allgemein beim Husten und Brustleiden gebraucht, und macht einen Bestandtheil vieler Brustmittel aus. Der aus *Abrus* wird zu demselben Zweck auf den Antillen als Infusion angewendet. Ausserdem macht der Süfsholzzucker noch einen Bestandtheil der Tabackssaucen aus.

Als zu dieser Art Zucker gehörig, betrachtet man auch den süßen Stoff vom Engelsüß (*Polypodium vulgare*), welches gänzlich in sofern den Charakter der vorgehenden hat, daß es im Schlunde stark süß schmeckt, und welches selbst den Süfsholzzucker als Brustmittel übertrifft. Aber dieser süße Stoff hat ganz andere Eigenschaften. Eine Infusion dieser Wurzel wird nicht sogleich durch Säuren gefällt, sondern nach einigen Stunden bildet sich

*) Eine Verbindung von diesem Zucker mit Baryterde im Ueberschuß, aus welcher diese mit Kohlensäuregas ausgefällt war, gab nach dem Abdampfen, Filtriren und Eintrocknen eine Extractmasse mit eingemengten Krystallen.

ein weißer Niederschlag, und in der Flüssigkeit verschwindet die Süßigkeit. Dieser Niederschlag wird gelb, und giebt bei Behandlung mit einem Alkali einen durch die Einwirkung des Alkali's roth gefärbten Stoff, der in Wasser auflöslich und nicht süß ist. Die mit Schwefelsäure niedergeschlagene Infusion, mit kohlensaurer Kalkerde gesättigt und filtrirt, ist gelb, nicht im Mindesten süß, und setzt beim Zutritt der Luft, ungefähr wie eine Indigokü eine dunkel purpurfarbene Materie ab. — Wird dagegen eine Infusion von Engelsüß mit Bleiessig gefällt, filtrirt und durch Schwefelwasserstoffgas gefällt, so erhält man eine farblose Flüssigkeit, welche nach gelinder Verdampfung der Essigsäure ein schwach gelbliches Extract von fader Süßigkeit hinterläßt, das indessen nicht mehr den charakteristischen süßen Geschmack vom Engelsüß hat. Der Niederschlag mit Bleiessig giebt durch Zersetzung mit Schwefelwasserstoffgas eine zu einem Extract eintrocknende Substanz, die piquant und zusammenziehend schmeckt, die Eisenoxydsalze grün färbt.

Pflanzenleim und Pflanzeneiweiß.

Die Pflanzen enthalten Substanzen, welche sehr große Aehnlichkeit mit dem Eiweiß und dem Faserstoff der thierischen Flüssigkeit haben, und die man daher mit gemeinschaftlichen Namen vegetabilisch-animalische Substanzen bezeichnet. Diese Substanzen enthalten Stickstoff, und sehr oft Schwefel und Phosphor. Jede Pflanze enthält etwas davon; sie gehören daher zu den allgeringsten Bestandtheilen des Pflanzenreichs, obgleich sie in vielen Pflanzen nur in unbeträchtlicher Menge vorkommen.

Zuerst lenkte Beccaria die Aufmerksamkeit auf diese Stoffe bei einer Untersuchung des Körpers, welcher durch die Abscheidung der Stärke aus dem Weizen übrig bleibt, und der wegen seiner Eigenschaft, an allen ihn berührenden Gegenständen zu kleben, den Namen *Gluten getabile* erhielt. Rouelle d. j. zeigte nachher, daß ein ähnlicher Stoff sich in dem ausgepreßten Saft der

den Pflanzen aufgelöst findet, in welchem er durch Erhitzen gerade wie Eiweiß gerinnt. Man verglich nachher diese Substanzen und versuchte, sie unter ein gemeinschaftliches Genus zu bringen. Fourcroy bemühte sich zu zeigen, daß das Geronnene aus dem Saft der Pflanzen von gleicher Beschaffenheit wie das Eiweiß aus dem Thierreich sei. Proust glaubte gefunden zu haben, daß es mehr mit dem *Gluten vegetabile* übereinstimme. Einmal endlich zeigte bei einer sehr sorgfältigen Untersuchung von Roggen, Gerste, Erbsen, Bohnen und deren theils reifen, theils unreifen Stroh, daß es zwei bestimmt verschiedene vegetabilisch-animalische Substanzen gebe, von denen die eine dem thierischen Eiweiß gleiche, die andere aber, die er *Gluten* (Kleber) nannte, nicht bezieht einer thierischen Substanz entspräche.

Wir haben es daher hier mit zwei Genus zu thun, deren Species sich von einander nach den ungleichen Pflanzen ungefähr eben so unterscheiden, wie das Fleisch der verschiedenen Thierarten. Diese beiden Genera nennen wir Pflanzenleim und Pflanzeneiweiß.

A. Pflanzenleim (*Gluten vegetabile*) hat seinen Namen von seiner Eigenschaft, zu kleben und zusammenzuhalten, die er auch z. B. dem Mehlkleister mittheilt. Er findet sich in den Saamen der Gräser, vorzüglich der Getreidearten, so wie in den Hülsenfrüchten (Erbsen und Bohnen), in welchen allen er mit Stärke und Pflanzeneiweiß verbunden ist. Seine Hauptcharaktere sind, daß er im isolirten Zustand in Wasser fast unauflöslich ist, daß er im feuchten Zustand klebt, und daß er nach dem Trocknen gelb und durchscheinend wird. Er ist gewöhnlich schwach sauer von einer damit verbundenen Säure, welche theils Essigsäure, theils Phosphorsäure ist. Er ist in Alkohol, vorzüglich in kochendem, auflöslich. Aus seiner Auflösung in Säuren wird er durch Cyaneisenkalium gefällt, wobei sich nach und nach die innere Seite des Glases mit einem halbdurchsichtigen Absatz bekleidet. Von Galläpfelinfusion wird er gefällt, und der Niederschlag löst sich im Kochen nicht auf.

ensäuregas und $\frac{1}{4}$ reines Wasserstoffgas waren. —
trocknen Destillation geben sie ein ammoniakali-
Vasser, essigsäures und kohlenäures Ammoniak,
hes Oel, und hinterlassen eine poröse Kohle, die
r schwierig einäschern läßt, und die beim Glühen
lensäurem Kali Cyankalium giebt. Von Salpeter-
werden sie zersetzt, anfangs unter Entwicklung von
, nachher unter Bildung von Stickstoffoxydgas,
säure, Oxalsäure, Welter's bitterem Stoff (wovon
itere nachher bei der Zersetzung der Pflanzenstoffe
die Säuren) und einem talgartigen Fett, das auf
ssigkeit schwimmt.

Pflanzenleim und Pflanzeneiweiß aus
n. Wird Waizenmehl mit Wasser zu einem stei-
g angemacht, in ein leinenes Tuch gebracht, und
oben dicht zugebunden, so daß es einen Beutel bil-
d dieser hierauf unter Wasser so lange geknetet, als
noch davon milchicht wird, so bleibt zuletzt in
che eine graue, zusammenhängende, elastische, kle-
lasse, Beccaria's Gluten, zurück, welcher haupt-
aus einem Gemenge von Pflanzenleim mit Pflan-
eiß besteht, gemengt mit Kleye von den zermale-
aizenkörnern, und in den meisten Fällen auch mit
nig Stärke, die nicht vollständig getrennt wurde.
n ist dieß nicht der ganze Gehalt des Waizens an
Stoffen, da sie während des Knetens theils in Was-
elöst, theils mechanisch abgerieben werden, und so
Stärke gehen. Um aus Beccaria's Gluten Pflan-
und Pflanzeneiweiß von einander zu trennen, wird
kochendem Alkohol behandelt, so lange als dieser
kochendheiß filtrirt, sich beim Erkalten trübt. Er
bei den Pflanzenleim nebst einer anderen, noch
echt gekannten, Substanz auf, und läßt zuletzt das
eiweiß zurück.

Den Pflanzenleim erhält man durch Vermischen
kohol-Auflösung mit Wasser und Abdestilliren des
ls, worauf eine Flüssigkeit zurückbleibt, in welcher
anzenleim in großen, zusammenhängenden Flocken

schwimmt, und nur eine geringe Portion ist mit Gummi verbunden und im Wasser aufgelöst. Der abgeschiedene Pflanzenleim ist blafs gelb, klebt beim Umrühren zu einer einzigen zusammenhängenden Masse zusammen, die an den Fingern haftet, sich ausziehen läfst und nach dem Ausspannen wieder in ihre Gestalt zurückgeht, keinen Geschmack, aber einen eigenen Geruch hat. In trockner Luft sich selbst überlassen, wird er auf der Oberfläche glänzend, nimmt eine tiefer gelbe Farbe an, und trocknet nach und nach zu einer durchscheinenden, dunkelgelben, einer getrockneten thierischen Substanz ähnlichen Masse ein. Von Alkohol wird er mit blafs gelber Farbe aufgelöst, und wird die Auflösung ohne vorherige Vermischung mit Wasser abgedampft, so bleibt der Pflanzenleim in Gestalt eines gelben, durchsichtigen Firnisses zurück. Wird der Pflanzenleim mit kaltem Alkohol benetzt, so wird er weifs, scheidet eine schleimige Materie in Klümpchen ab, und bildet eine milchichte Auflösung. Jene Materie ist kein Pflanzenleim, aber nahe damit verwandt, und bisher noch wenig untersucht, weshalb ich nachher noch einige Worte darüber sagen will. Im Kochen wird sie aufgenommen, macht aber nach dem Erkalten eine concentrirte Auflösung schleimig. Wird Pflanzenleim im Kochen von einem wasserhaltigen Spiritus aufgelöst, so fällt er nach dem Erkalten mit seiner ganzen Klebrigkeit wieder nieder. In Aether, so wie in fetten und flüchtigen Oelen, ist er unauflöslich. Wird feuchter Pflanzenleim mit Essigsäure übergossen, so schwillt er auf, wird schleimig, verliert seine gelbe Farbe und wird halb flüssig. Wird er nun mit Wasser vermischt, so bleiben schleimige Flocken unaufgelöst, und die Auflösung hat das Ansehen von einer Flüssigkeit, die mit einigen Tropfen Milch vermischt ist. Kochen verändert dabei Nichts. Hierbei löst sich der eigentliche Pflanzenleim in der Säure auf, und die eben erwähnte, in Alkohol schwer auflösliche Materie, die auch in der Säure unauflöslich ist, wird schleimig, und ist schwer von der Auflösung zu trennen, so daß diese immer milchicht durch's Filtrum läuft. Gießt

man
jede
reicht
schleim
entst
langsa
der Sä
lichen I
richtige
Ammon
reich
die nach
lichen E
zustand
mit laue
teria a
kultur
schleimig,
mit ein
passen
über e
jede
mit W
der sch
Flüssig
kann
nach
schwe
niere
verh
wahr
zeit,
Sei
entw
Salp
vert
und

die dünne Auflösung ab, so kann der zurückbleibende schleimige Theil mit Spiritus gewaschen werden, welcher Pflanzenleim und Essigsäure aufnimmt, und der eigentlichen Materie die Eigenschaft, das Filtrirpapier zu stopfen, benimmt. Die Auflösung von Pflanzenleim in Essigsäure, so viel wie möglich von der schleimigen, in Wasser unlöslichen, oder wenigstens sehr schwerlöslichen Materie befreit, trocknet zu einem farblosen, durchsichtigen Firniß ein; von kaustischem oder kohlen-saurem Ammoniak, ungefähr in der zur Sättigung der Essigsäure erforderlichen Menge zugesetzt, wird er in Flocken gefällt, nach einiger Zeit zusammenbacken und alle ursprünglichen Eigenschaften des Pflanzenleims haben. In diesem Zustand fehlt ihm alle Reaction auf Säure oder Alkali; mit kaltem Wasser behandelt, löst sich eine geringe Menge auf, so daß die Flüssigkeit schwach von Galläpfel-tinctur getrübt wird. Nach dem Trocknen ist er durchsichtig, wie dunkelgelbes Glas. Wird der Pflanzenleim mit einer etwas verdünnten unorganischen Säure übersättigt und damit zerrührt, so löst er sich nicht auf, nimmt nur eine Portion Säure auf, und wird die darüber stehende Säure abgegossen und der Pflanzenleim einige Mal mit Wasser abgespült, so löst er sich, mit Hinterlassung einer schleimigen Substanz, zu einer von letzterer unklaren Flüssigkeit auf, die auch jetzt nicht durch Filtriren vollkommen klar zu erhalten ist. Die Verbindung des Pflanzenschleims mit Schwefelsäure ist in reinem Wasser sehr schwer auflöslich; dagegen lösen sich die mit Salpetersäure und mit Chlorwasserstoffsäure sehr leicht auf. Sie werden auch von hochendem Alkohol aufgelöst, und wird während des Kochens etwas kohlen-saure Kalkerde zugesetzt, so kann der Pflanzenleim aus der Auflösung dann wieder von Säure erhalten werden.

Wird eine gesättigte Auflösung von Pflanzenleim, entweder in Alkali oder in Essigsäure, mit Schwefelsäure, Salpetersäure oder Chlorwasserstoffsäure im Ueberschuß vermischt, so wird der Pflanzenleim niedergeschlagen, und bildet, wenn er sich abgesetzt hat, wieder dieselbe

klebrige Masse wie zuvor, welche aber nun, wie angeführt ist, eine Portion der Säure chemisch gebt enthält. Wird dagegen die Auflösung mit Phosphor oder Essigsäure vermischt, so trübt sie sich wohl sog aber der Ueberschuß einer Säure schlägt keinen Pfla leim nieder, sondern macht die Flüssigkeit, durch scheidung der in Säuren wenig löslichen, schleimigen terie, nur milchicht. Dagegen wirkt Phosphorsäure noch feuchten Pflanzenleim nicht viel auflösender, als übrigen Mineralsäuren.

Von verdünntem kaustischen Kali, welches man i und nach in kleinen Portionen zu mit Wasser vermi tem Pflanzenleim setzt, wird er zuerst schleimig, und sich nachher zu einer halbklaren, durch Filtriren u klar werdenden Flüssigkeit auf. Hat man mehr Pflanz leim genommen, als das Alkali auflösen kann, so ist Verbindung gesättigt, schmeckt nicht mehr alkalisch, dern eigen zusammenziehend, und ist fast farblos. Al dampft bei höchstens $+40^{\circ}$, setzt sie zuerst einen Ant vom Aufgelösten ab, und trocknet dann zu einer weiß undurchsichtigen Masse ein, die sich vom Glase ab und umbiegt. Von Wasser wird sie wieder aufgewe der Pflanzenleim löst sich auf, und nur die fremde s tanz bleibt in Gestalt eines Schleims zurück. Am niak, selbst concentrirtes, zeigt wenig auflösende kung auf den Pflanzenleim in seinem schon erwäh zusammenklebenden Zustand; wird aber die Auflö des Pflanzenleims in einer Säure in kaustisches Ammo getropft, so entsteht ein sogleich verschwindender derschlag. Eben so verhält sich Kalkwasser.

Die Verbindungen von Pflanzenleim mit anderen sen sind alle in Wasser unauflöslich, und werden l Vermischen von neutralem Pflanzenleim-Kali mit oder Metall-Salzen niedergeschlagen. Diese Niedersch von gefärbten Basen haben die gewöhnlichen Farben den Salzen der Base.

Von kohlen-sauren Alkalien wird er nicht unmi bar aufgelöst; sie schlagen ihn aus seiner Auflösun

uren nieder, und um so vollständiger, je mehr vom Fällungsmittel zugesetzt wird, und je concentrirter die Auflösung ist. Wird die alkalische Flüssigkeit abgegossen, so löst sich der Niederschlag in reinem Wasser zu einer etwas unklaren Flüssigkeit auf, wird aber daraus wieder, wenigstens theilweise, bei Zusatz einer concentrirten Auflösung vom kohlensauren Salz niedergeschlagen. Der Niederschlag mit überschüssigem kohlensauren Alkali hat seine Klebrigkeit verloren.

Aus den gesättigten Auflösungen des Pflanzenleims, sowohl in Säuren als in Alkali, wird er mit weißer Farbe und in Menge von Quecksilberchlorid niedergeschlagen, und wird der Pflanzenleim in feuchtem Zustand mit einer Auflösung dieses Salzes übergossen, so wird er undurchsichtig, schrumpft zusammen, wird hart und fault nicht mehr. Er verbindet sich dabei chemisch mit einem Antheile vom Salze, gerade so wie es mit mehreren thierischen Stoffen der Fall zu sein pflegt. Eine Auflösung von Pflanzenleim in Essigsäure wird nicht von neutralem oder basischem essigsäurem Bleioxyd, und auch nicht von schwefelsaurem Eisenoxyd gefällt, dagegen aber stark von Gallfelinfusion.

[Was die schleimige Substanz ist, welche den Pflanzenleim begleitet und seine Auflösungen unklar macht, ist noch nicht gehörig ausgemittelt. Es scheint diese Substanz zu sein, welche bewirkt, daß die Auflösung, welche man durch Kochen von Beccaria's Gluten mit Alkohol erhält, milchicht, und, wenn sie concentrirt war, dick und schleimig wird, so daß sie nach dem Erkalten nicht mehr filtrirt werden kann. Sie wird in weit geringerem Grade von Säuren aufgelöst, als der Pflanzenleim, dessen Auflösungen durch Einmischung derselben ein milchichtes Ansehen bekommen; sie wird aber von kaustischem Kali aufgelöst, wiewohl auch diese Auflösung nicht leicht klar wird. Man erhält diese Substanz am besten dadurch, daß man den Pflanzenleim in Essigsäure einweicht, und nach völliger Durchtränkung mit kaltem Spiritus vermischt und filtrirt. Sie bleibt dann als ein fast durchsichtiger Schleim

zurück, der zu einem durchsichtigen, farblosen Körper eintrocknet, welcher im Feuer wie gebranntes Horn riecht, und bei der Destillation Ammoniak giebt. In Alkohol schwillt er auf und wird schleimig, beim Kochen löst er sich in geringer Menge darin auf, mit Hinterlassung von unklaren Klümpchen. Die Auflösung wird beim Erkalten, so wie auch beim Vermischen mit Wasser, milchicht.

Ich erwähnte, daß bei Bereitung von Beccaria's Gluten eine Portion Pflanzenleim und Pflanzeneiweiß von Wasser aufgenommen werde. Läßt man dieses Wasser stehen, so setzt sich die Stärke ab. Aus der filtrirten Auflösung scheidet sich beim Abdampfen Pflanzeneiweiß ab und wird die bis zu einem gewissen Grade concentrirte Flüssigkeit von dem niedergefallenen Eiweiß abfiltrirt zur dünnen Extractdicke abgedampft und mit Alkohol vermischt, so scheidet dieser Gummi aus, und löst Pflanzenleim und Zucker auf, die man auf die Art trennt, daß man die spirituose Flüssigkeit mit Wasser vermischt, und den Alkohol abdestillirt, wo dann der Pflanzenleim bei einer Auflösung von Zucker schwimmt und weggenommen werden kann. Eine ganz ähnliche Verbindung von Pflanzenleim mit Gummi bleibt in der Flüssigkeit, aus welcher der Pflanzenleim, nach der Behandlung von Beccaria's Gluten mit Alkohol, abgeschieden wird, und Pflanzenleim und Gummi können daraus auf gleiche Weise von einander getrennt werden. Aus dieser Gummi enthaltenden Auflösung wird der Pflanzenleim nicht von Cyaneisenkalium gefällt, wenn sie nicht zuvor mit einer freien Säure vermischt war; aber von Quecksilberchlorid und von Galläpfelinfusion wird er stark gefällt und von kohlensaurem Alkali stark getrübt.

b) Das Pflanzeneiweiß bleibt, nach Auskochung von Beccaria's Gluten mit Alkohol, zurück *). Es hat dann

*) Ich muß hier etwas über die von Taddei mit Beccaria's Gluten angestellten Versuche anführen. Unbekannt mit dem, was Einhof vor ihm gethan hatte, behandelte er Beccaria's Gluten mit kochendem Alkohol, dampfte die Auflösung zur Trockne

entend an Volum abgenommen, hat alle Elasticität verloren und trocknet sehr leicht zu einer weissen oder eisgraunen, kantigen und harten Masse ein. Mit einer schwachen Lauge von Kalihydrat übergossen, schwillt zuerst auf und erweicht, und löst sich hierauf zu einer reinen, farblosen Flüssigkeit, mit Hinterlassung von Kleye und Spuren von anhängender Stärke, auf. Die Auflösung des Kalihydrat hat, wenn sie mit Pflanzeneiweiss gesättigt und frei von kohlen-saurem Alkali war, allen Geschmack verloren, und giebt beim Abdampfen zuerst etwas geronnenes Eiweiss, und hinterlässt dann eine weisse, am Glase sitzende Masse, die sich wieder, mit Hinterlassung des beim Abdampfen coagulirten Theiles, in Wasser auflöst. Wird eine Auflösung von Kalihydrat völlig mit Pflanzen-eiweiss gesättigt, und dieselbe mit Metall- oder Erd-Salzen vermischt, so entstehen entsprechende, meist unauflösliche Verbindungen vom Pflanzeneiweiss mit der ausgetauschten Base, gerade so, wie es mit dem thierischen Eiweiss der Fall ist. Die Verbindung mit Eisenoxyd ist nach dem Trocknen dunkelroth, die mit Eisenoxydul weiss, an der Luft gelb werdend, die mit Kupferoxyd blafs blaugrün, und die mit Quecksilber- und Bleioxyd schneeweiss. Ich habe schon oben das Verhalten seiner alkalischen Auflösung zu Säuren erwähnt. Das Pflanzeneiweiss aus Waiters, das einzige, womit ich Versuche gemacht habe, hat mit dem thierischen Eiweiss darin Aehnlichkeit, dass es bei seiner alkalischen Auflösung nicht durch überschüssig zugesetzte Phosphorsäure oder Essigsäure gefällt wird, sondern dass sich der im ersten Augenblick zeigende Niederschlag durch einen grösseren Ueberschuss von zugesetzter Säure wieder auflöst, und diese Auflösung kann durch

ab, und nahm das erhaltene gelbe Gemenge von Pflanzenleim, Gummi und der eigenen, oben erwähnten Materie für einen neuen Bestandtheil vom Pflanzenreich an, den er Gliadin (von γλιν, Leim) nannte. Das im Alkohol Unaufgelöste hielt er für den Grundstoff der Hefe, und nannte es Zimon (von ζυμη, Hefe). Diese Namen und die damit verknüpften Ansichten sind von einigen chemischen Schriftstellern angenommen worden.

freiwilliges Abdampfen concentrirt werden, ohne daß Pflanzeneiweiß coagulirt; aber durch Zusatz einer reinen Mineralsäure coagulirt es sogleich. Nach dem Gehen in der Wärme und nach dem Trocknen wird Pflanzeneiweiß nicht mehr von Phosphorsäure oder Essigsäure aufgelöst; es schwillt in beiden auf, wird klar, durchscheinend und gelblich, und wird es dann mit Säure und Wasser gekocht, so wird es klarer, voluminöser und farblos, aber nur unbedeutend wenig löst sich in Säure auf.

Das Pflanzeneiweiß wird nicht von kohlensaurem Alkali, und nach dem Gerinnen selbst nicht von kohlensaurem Ammoniak aufgelöst. Wird eine gesättigte Auflösung von Pflanzeneiweiß in Kalihydrat mit kohlensaurem Ammoniak vermischt, so schlägt sich ein Theil vom gelösten Eiweiß nieder, löst sich aber in mehr zugegebenem Wasser wieder auf. Aus seiner Auflösung in Säuren wird es am besten durch kohlensaures Ammoniak, obwohl nicht vollständig, in weißen, nicht zusammenhängenden Flocken gefällt; kaustisches Ammoniak aber tut diese Auflösungen nicht. Der Niederschlag mit kohlensaurem Ammoniak wird beim Auswaschen durchsichtig und schleimig, und eine Portion löst sich davon im Wasser auf. Die durchgelaufene Flüssigkeit coagulirt beim Kochen, wird aber von Chlorwasserstoffsäure, Quecksilberchlorid und von Galläpfelinfusion gefällt und getrübt. Daß die Auflösung des Pflanzeneiweißes in Lösungen von Cyaneisenkalium und von Galläpfelinfusion gefällt werde, habe ich schon, als zu den allgemeinen Eigenschaften des Pflanzeneiweißes gehörend, angeführt. Niederschlag mit Cyaneisenkalium ist weiß und flockig, der mit Galläpfelinfusion graugelb. Das Pflanzeneiweiß hat zum Quecksilberchlorid (Sublimat) gleiche Verwandschaft wie das thierische Eiweiß, und wird davon wohl aus völlig gesättigten Auflösungen in Kalihydrat, aus seinen neutralen Verbindungen mit den Säuren gefällt; aber seine Fällung wird von überschüssiger Säure aus den Auflösungen in Essigsäure und Phosphorsäure

den einzigen, welche Säure im Ueberschuss enthalten können, verhindert. Wird Pflanzeneiweiß, welches noch nicht getrocknet, oder welches durch Benetzung mit Essigsäure und Abspülen aufgequollen ist, mit einer Auflösung von Quecksilberchlorid übergossen, so verbindet es sich damit, wird undurchsichtig und erhärtet, gerade wie tierisches Eiweiß.

Der Pflanzenleim und das Pflanzeneiweiß in Vermischung, und vielleicht auch einzeln für sich, haben unter der Wirkung von Wärme und Wasser eine höchst merkwürdige Wirkung auf die Stärke, welche von Kirchoff entdeckt und von de Saussure weiter untersucht worden ist. Man vermischt 2 Th. Kartoffelstärke mit 1 Th. Wasser, und rührt sie nach und nach in 20 Th. kochenden Wassers ein, wodurch sich ein Kleister bildet; mit demselben vermischt man 1 Th. fein gestoßenen, getrockneten Gluten von Beccaria, und setzt das Gemenge 8 Stunden lang einer Temperatur von $+50^{\circ}$ bis $+60^{\circ}$ aus. Schon nach 2 Stunden hat seine Consistenz abgenommen, was nachher schnell fortfährt, so daß die Flüssigkeit dünnflüssig, klar und süß wird. Dabei ist ein Theil der Stärke in Gummi und ein anderer Theil in Zucker verwandelt worden, ohne daß etwas aus der Luft genommen wird; nur ein kleiner Theil Kohlensäure geht hierbei weg. Wird daher das Gemenge eingetrocknet, so wiegt es noch, wie zuvor, 3 Theile. Nach

Saussure zieht kalter und verdünnter Alkohol aus dem eingetrockneten Gemische $\frac{1}{3}$ vom Gewicht der Stärke Zucker aus, und Wasser nachher $\frac{1}{3}$ Gummi. Der Rückstand besteht aus noch unveränderter Stärke mit Gluten, welcher dabei sauer wird, und das Vermögen, auf neue Stärke einzuwirken, gänzlich oder größtentheils verloren ist. Dieses Verhalten erklärt die Zuckerbildung, wenn man mit Wasser durchweichtes Getreide keimen läßt, und nachher in der Hitze zu Malz trocknet. Kirchoff hat an, daß die zuckerbildende Eigenschaft des Pflanzenleims und Pflanzeneiweißes sich auf eine größere Menge bezieht, als in den Saamenkörnern enthalten ist, erstreckt,

so daß, wenn ein Theil Malzschrot (gröblich zermahlen Malz) und 2 Th. Stärke sehr genau mit 4 Th. Wasser durchmengt, hierauf 14 Th. kochenden Wassers zugesetzt werden, und das Gemenge vor zu schnellem Erkalten bewahrt wird, diese Flüssigkeit schon nach Verlauf einer Stunde ganz süß geworden ist. Wir haben bei der Stärke gesehen, daß dieselbe mit der Zeit von selbst in Zucker übergeht, aber offenbar wird dieß hier durch die Gegenwart des Pflanzenleims und Pflanzeneiweißes beschleunigt, und dieser Versuch erklärt den Vorgang beim Bierbrauen, wobei man mit kochendem Wasser Malzschrot übergießt, welches jene Stoffe mit einander vermischt enthält, wohl damit umrührt, nach dem Erkalten der Flüssigkeit sie abzupft, erwärmt und wieder aufgießt. Da bildet sich nun, nach hinreichend oft wiederholtem Aufgießen, die Flüssigkeit, welche Würze genannt wird, und welche nun nicht allein den beim Keimen gebildeten Zucker enthält, sondern auch noch eine neue größtenteils Portion davon, die durch fortgesetzte Mitwirkung des warmen Wassers entstanden ist. Von der besseren oder schlechteren Leitung der Operation hängt die Bildung einer süßeren oder weniger süßen Würze ab, d. h. e wird dadurch hinreichend oder unzureichend die Zuckerbildung aus der im Schrote noch vorhandenen unveränderten Stärke befördert.

Wird Mehl, welches ein inniges Gemenge von Pflanzenleim, Pflanzeneiweiß und Stärke in ganz unverändertem Zustand ist, in kleinen Antheilen in Wasser, welches im Kochen ist, eingerührt und gut damit vermischt, so lösen sich Pflanzenleim und Pflanzeneiweiß mit der Stärke zu einer flüssigen, dicken, durchscheinenden Masse auf, welche, wenn sie sehr steif und concentrirt ist, unter dem Namen Mehlbrei, oder, wenn sie sehr dünn und verdünnt ist, unter dem Namen Mehlsuppe bekannt ist, und häufig ein Gericht der arbeitenden Klasse ausmacht. Ein so beschaffene Auflösung erhält man nicht von Gluten allein. Sie kann, nach de Saussure's Versuchen, zersetzt und der Gluten mit dem Pflanzeneiweiß ausgefällt werden.

n, wenn sie mit etwas Schwefelsäure vermischt und erzt wird, so daß eine völlig dünne Flüssigkeit entsteht.

2) Pflanzenleim und Pflanzeneiweiß aus Roggen lösen sich, nach Einhof's Versuchen, in dem Wasser auf, womit man einen in Leinen eingebundenen Roggenmehlteig so lange knetet, bis im Tuche zuletzt nur eine weiche, elastische Masse zurückbleibt, die sich auf keine Weise wie jene verhält. Aus dem Wasser löst sich die Stärke ab, und die darüber stehende Flüssigkeit ist klar weingelb. Wird dieselbe, nach dem Filtriren, bis fast zum Kochen erhitzt, so coagulirt sie und löst ab *a*) Pflanzeneiweiß in großen, weißen Flocken, die eine bemerkenswerthe Aehnlichkeit mit dem frischen Käse aus Milch haben, die aber nach dem Trocknen fast schwarz werden. Wird die geronnene Flüssigkeit filtrirt und zur dünnen Extractdicke abgedampft, so erhält man daraus *b*) den Pflanzenleim, mit Hülfe von Alkohol, womit man so lange digerirt, als er noch auflöst. Die Flüssigkeit wird mit etwas Wasser vermischt und abdestillirt, wobei zuletzt eine schwache Auflösung von Zucker zurückbleibt, in welcher der Pflanzenleim in Gestalt großer, brauner Flocken schwimmt. Das Flüssige wird abfiltrirt und der Pflanzenleim einige Mal mit reinem Wasser gewaschen, wobei er zu einer klebrigen, zähen und elastischen Masse zusammenhaftet, ähnlich dem Pflanzenleim aus Weizen, aber weniger elastisch. In kaltem Wasser gelegt, zerfällt er, wird aber das Wasser zum Kochen erhitzt, so geht er wieder in einen Klumpen zusammen, wird zäher und weniger gefärbt, während das Wasser gelb wird. Seine kochendheiß gesättigte Auflösung in Alkohol wird beim Erkalten unklar. Von Wasser wird die Auflösung milchicht, welches wenigstens einen Theil vom aufgelösten niederschlägt. Aether färbt sich von diesem Pflanzenleim gelb, indem er eine Portion von seinem färbenden Stoff auszieht, den Pflanzenleim aber unaufgelöst läßt. In seinem Verhalten zu Säuren und Alkalien gleicht er, so weit Versuche darüber angestellt sind, dem Pflanzenleim aus Weizen.

Die Auflöslichkeit des Pflanzenleims aus Roggen ruht auf der Verbindung mit einer Substanz, welche Alkohol, beim Ausziehen des Pflanzenleims aus dem F stände vom eingekochten Wasser, unaufgelöst läßt, die sich vollkommen wie Gummi verhält. Diese geschäftliche Auflösung von Pflanzenleim und Gummi welcher das Pflanzeneiweiß durch Erhitzen abgesch wurde, ist nicht sauer, bekommt aber nach einige die Eigenschaft, auf freie Säure zu reagiren. Von mischten Säuren trübt sie sich anfangs, klärt sich nachher wieder durch Zusatz von mehr Säure. H macht jedoch die Schwefelsäure eine Ausnahme, nach 12 Stunden hat sie einen Theil des aufgelösten zenleims in Flocken abgeschieden. Die Auflösung nicht von den Hydraten der Alkalien, von Baryt Kalk-Wasser, und nicht von schwefelsaurem Eisen { dagegen aber stark von kohlen saurem Kali, und Niederschlag ist nachher in reinem Wasser auflöslich. von Galläpfelinfusion wird sie gefällt, und dadurch Pflanzenleim vollkommen abgeschieden.

3) Pflanzenleim und Pflanzeneiweiß: Gerste. Nach Einhof's Versuchen ist der Pflanz in reifer Gerste so innig mit der Stärke vereinigt letztere, selbst durch Maceration in einer verdünnte lösung von Kalihydrat, nicht völlig davon befrei den kann.

Einen Theil des Pflanzenleims mit Pflanzeneiweiß hält man auf gleiche Weise, wie aus Roggenmehl, Behandlung mit Wasser, in aufgelöster Gestalt. Das zeneiweiß wird beim Kochen und Abdampfen abge den, und der Pflanzenleim bleibt, mit Gummi v den, in Auflösung, woraus er, wie bei dem aus F mittelst Alkohol abgeschieden wird, indem dies Zucker und Pflanzenleim auflöst und das Gummi : läßt. Der so erhaltene Pflanzenleim gleicht dem au gen, ist aber weniger klebrig, und wird auch in gerer Menge erhalten.

Aus unreifer Gerste dagegen kann der Pflanz

leichter abgeschieden werden, wenn man die Gerste in Wasser zerrührt, und die Flüssigkeit dann klar werden läßt, wobei sich Kleye und Stärke zu Boden setzen, und eine unklare, auch in der Ruhe nichts mehr absetzende Flüssigkeit darüber bleibt. Dieselbe wird vorsichtig von der Stärke abgossen und darnach durch Papier filtrirt, auf welchem sie eine graugrüne Materie zurückläßt, welche Pflanzenleim ist, der sich mit Leichtigkeit in Alkohol auflöst, und daraus sowohl von Wasser als von Gallpfeleinfusion gefällt wird. Er verhält sich im Uebrigen zu Alkalien und Säuren, welche denselben auflösen, wie Pflanzenleim. Aus der filtrirten Flüssigkeit schlägt sich durch Aufkochen Pflanzeneiweiß nieder, worauf sie keine bemerkenswerthen Spuren weder von diesem, noch vom Pflanzenleim enthält. — In der gereiften Gerste hat demnach eine nähere Verbindung zwischen Pflanzenleim, Gummi und Stärke statt gefunden, als in der unreifen, aus welcher sich ersterer leichter abscheiden läßt *).

4) Pflanzenleim und Pflanzeneiweiß aus Hülsenfrüchten. Einhof, welcher dieselben zuerst

*) Ich muß hier eines Bestandtheiles vom Mais (*Zea Mays*) erwähnen, welcher in dieser Getreideart dem Pflanzenleim zu entsprechen scheint, und von Gorham den Namen Zeine erhalten hat. Man erhält ihn durch Behandlung von Maismehl mit Wasser, auf gleiche Weise, wie man aus Waizenmehl Beccaria's Gluten macht; es bleibt hierbei auf dem Tuche eine in Wasser unauflösliche Substanz. Man digerirt dieselbe mit Alkohol, vermischt die Auflösung mit etwas Wasser und destillirt den Alkohol ab. Man erhält dann, mechanisch mit dem übrigbleibenden Wasser gemengt, einen gelben, weichen und biegsamen Körper, welcher große Elasticität und Zähigkeit besitzt, und weder Geruch, noch Geschmack hat. Er wird, außer von Alkohol, auch von Aether aufgelöst; aber Wasser, Säuren und Alkalien wirken wenig darauf. Er unterscheidet sich vom Pflanzenleim hauptsächlich dadurch, daß er keinen Stickstoff zu enthalten scheint, indem er bei der Destillation kein Ammoniak giebt, und in feuchtem Zustande lange, ohne zu faulen oder übel zu riechen, aufbewahrt werden kann. In fetten Oelen ist er unauflöslich, aber auflöslich in Terpenthinöl. Es geht aus dem Angeführten hervor, daß das sogenannte Zein im Mais den Pflanzenleim ersetzt. Der Mais enthält außerdem Pflanzeneiweiß, welches sich beim Erhitzen aus dem Wasser absetzt.

einer Untersuchung unterwarf, nannte diesen Pflanzenleim animalisch-vegetabilische Materie der Hülsenfrüchte, und war der Meinung, daß sie nicht eigentlich mit dem Pflanzenleim aus den Cerealien zusammengestellt werden könne. Man erhält ihn, z. B. aus Erbsen, auf folgende Weise: Die Erbsen werden in Wasser geweicht, bis sie aufgequollen und weich geworden sind, worauf man sie in einem Mörser zu einem gleichförmigen Teig zerstößt, welchen man mit Wasser anrührt und durch ein feines Sieb seiht. Aus der durchgelaufenen, von den Hülsen befreiten Flüssigkeit fällt zuerst reine Stärke nieder, und darauf eine Schicht von pflanzenleimhaltiger Stärke, während die Flüssigkeit, wie eine Milch, unklar bleibt. Dies kommt von dem Pflanzenleim, welcher nicht niederfällt, und welcher, bei dem Versuch ihn abzufiltriren, die Poren des Papiers verstopft. Diese Flüssigkeit muß abgossen, und mit wenigstens dem gleichen Volum Wasser verdünnt und in Ruhe gelassen werden; nach 24 Stunden hat sich ein mehlartiges Pulver abgesetzt, das auf's Filter genommen werden kann. Die Flüssigkeit klärt sich auch beim Erwärmen bis zu $+60^{\circ}$, dann hält der Niederschlag aber auch Pflanzeneiweiß. Der auf dem Filter gesammelte Pflanzenleim ist pulverförmig, weiß, ohne Geschmack und Geruch, und röthet das Lackmuspapier, wie lange man ihn auch waschen mag. Diese saure Reaction rührt von einer Portion mit dem Pflanzenleim chemisch verbundener saurer phosphorsaurer Kalkerde her. Er läßt sich zu einem klebrigen und zusammenhängenden Teig kneten. Der durch Gerinnen in der Wärme zugleich mit Pflanzeneiweiß abgeschiedene Pflanzenleim bildet große, käseähnliche Flocken. Beide bilden nach dem Trocknen eine hellbraune, durchsichtige Masse, welche dem Tischlerleim ähnlich und leicht zu pulvern ist. Der in der Ruhe abgesetzte wird leicht von Alkohol aufgelöst; die Auflösung in kochendheißem wird sowohl beim Erkalten, als bei Vermischen mit Wasser milchicht. Aber in Aether, so wie in fetten und flüchtigen Oelen, ist er unauflöslich.

Concentrirte Schwefelsäure löst ihn zu einer hellbraun-

nen Flüssigkeit auf, woraus er wieder von Wasser in zusammenklebenden Flocken gefällt wird. Mälsig starke Salpetersäure färbt ihn gelb, ohne ihn aufzulösen. Chlorwasser, Chlorwasserstoffsäure und Essigsäure lösen ihn auf. Die Alkalien schlagen ihn daraus wieder nieder. — Kaustische Alkalien lösen ihn sehr leicht, ohne Hülfe von Wärme, auf, aber die Auflösung wird nicht klar, und hinterläßt immer auf dem Filtrirpapier eine schleimige Materie. Er wird leicht sowohl von gewöhnlichem, als zweifach kohlensaurem Kali aufgelöst; selbst kohlensaures Ammoniak löst ihn, wiewohl in geringerer Menge, auf. Aus allen diesen Auflösungen wird er von Säuren niedergeschlagen. Von Kalkwasser wird er leicht aufgelöst; wird er dagegen mit einer Auflösung von kohlensaurer Kalkerde in Kohlensäurewasser übergossen, so erhärtet er und verliert einen großen Theil seiner Auflöslichkeit in kohlensaurem Kali. Aus diesem Umstand erklärt Einhof die allgemeine Erfahrung, daß Hülsenfrüchte niemals in Brunnenwasser weich gekocht werden, weil dasselbe immer jenes Kalksalz aufgelöst enthält.

Mit Stärke giebt dieser Pflanzenleim beim Kochen mit Wasser eine ähnlich beschaffene kleisterartige Auflösung, wie der von den Getreidearten. Beim Erkalten der kochendheissen Auflösung scheidet sich wieder ein Theil vom Aufgelösten in gelatinirter Gestalt ab, wie man dieß bei der Erbsensuppe sieht. Ein anderer Theil bleibt in Auflösung, und kann durch Galläpfelinfusion niedergeschlagen werden.

Aus der Flüssigkeit, woraus sich der Pflanzenleim nach dem Verdünnen und in der Ruhe abgesetzt hat, wird dann durch Aufkochen derselben das Pflanzeneiweiß niedergeschlagen.

5) Pflanzeneiweiß aus emulsionbildenden Saamen. Mehrere Saamen haben die Eigenschaft, nach dem Zerstoßen und Zerrühren mit Wasser, eine Milch zu bilden, bekannt unter dem Namen Emulsion, welche mittelst eines Seihtuches vom Unaufgelösten getrennt werden kann. Hiervon bietet die Mandelmilch ein

wohl bekanntes Beispiel dar. Diese Milch ist keine Auflösung, sondern, wie die Kuhmilch, eine Aufschlammung von sehr feinen Kügelchen im Wasser, von so geringem Durchmesser, daß sie durch Seibtnetz oder Papier gehen. Gleich wie die Kügelchen in der thierischen Milch aus Käse und einem fetten Oele, der Butter, bestehen, sind diese aus Pflanzeneiweiß und einem fetten vegetabilischen Oele zusammengesetzt. Aber die Pflanzenmilch unterscheidet sich in sofern von der thierischen Milch, daß sie beim Kochen gerinnt, wobei das Pflanzeneiweiß aus der Flüssigkeit zwar Oel mitreißt, welches aber beim Pressen des Geronnenen ausgedrückt wird, und wovon das noch Zurückbleibende mit Aether oder Alkohol, je nach der verschiedenen Beschaffenheit des Oeles, ausgezogen werden kann; so läßt sich z. B. aus dem Coagulum von Mandelmilch das Oel nur durch Aether, und aus dem Coagulum der Milch von Ricinuskörnern durch Alkohol ausziehen. Das zurückbleibende, ausgepresste und mit einer von jenen Flüssigkeiten vom Oel befreite Pflanzeneiweiß ist weiß, und wird beim Trocknen durchsichtig und spröde wie Tischlerleim.

Aus der durch Wärme coagulirten Pflanzenmilch erhält man durch Abdampfen und Fällern mit Alkohol noch mehr Pflanzeneiweiß; den Niederschlag wäscht man mit Wasser vom Gummi aus.

Die Pflanzenmilch setzt, wie die Kuhmilch, Rahm ab, welcher nichts anderes als eine Flüssigkeits-Schicht ist, die an diesen Kügelchen reicher ist, als die übrige. Läßt man sie eine Zeit lang stehen, so wird sie sauer und gerinnt dann gänzlich, wobei das leichtere Coagulum oben auf schwimmt. Sie wird von Säuren im Allgemeinen so wie von Galläpfelinfusion coagulirt.

6) Pflanzeneiweiß aus der Milch des Kuhbaums. Der in Amerika in den Gebirgsgegenden von Quito wachsende sogenannte Kuhbaum liefert einen Milchsafte, welcher nach Boussingault und Mariano de Rivero im Aeußeren und Geschmack der Kuhmilch gleicht, und Milchkügelchen enthält, die aus Wachs und

einer Pflanzensubstanz bestehen, welche fast mehr Aehnlichkeit mit dem Faserstoff des Blutes, als mit Eiweiß hat. Diese Substanz gerinnt nicht sogleich beim Kochen, weshalb diese Milch auch gekocht werden kann, und dabei, wie die Kuhmilch, auf der Oberfläche eine Haut bildet. Wird sie abgedampft, so fangen bei einer gewissen Concentration Oeltropfen an sich abzusetzen, was so zunimmt, daß zuletzt das geronnene Pflanzeneiweiß als eine fädige, durchscheinende, braune, harte, nach gebratenem Fleisch riechende Masse in dem geschmolzenen Fett schwimmt. Am besten erhält man jedoch dieses Pflanzeneiweiß, wenn die etwas abgedampfte Milch durch Alkohol gerinnen gemacht, filtrirt und das Unaufgelöste zuerst mit Alkohol gewaschen, und nachher, durch Behandlung mit Aether, vom Wachse befreit wird. Man erhält dasselbe dann in weissen, biegsamen Klümpchen, die weder Geschmack, noch Geruch haben, und beim Trocknen durchscheinend, gelbbraun und hart werden. In feuchtem Zustand wird es von Chlorwasserstoffsäure, aber nicht von Alkohol aufgelöst.

In dem milchähnlichen Saft von *Carica Papaya* fand Vauquelin eine ganz ähnliche Substanz.

7) Pflanzeneiweiß aus frischen Stengeln und Blättern. Wird eine frische und grüne Pflanze zerquetscht und ausgepresst, so fließt eine unklare, grünliche, stark nach Gras riechende Flüssigkeit aus, die nicht leicht von selbst klar wird und unverändert durch's Filtrum geht. Dieselbe enthält wirkliche Milchkügelchen, aber mit grünem Fett, wovon die Milch die Farbe hat, statt daß sie sonst weiß ist. Diese Milchkügelchen können entweder durch Erwärmung bis $+60^{\circ}$ bis 70° , oder durch Zusatz von Alkohol, einer Säure, einem Alkali, einem Salze u. s. w. abgeschieden werden *). Nach der Gerinnung in der

*) Einhof fand, daß der ausgepresste Saft von grünem Erbsenstroh zuerst ein grünliches Satzmehl absetzte, welches Stärke war, und daß nachher aus der abgossenen unklaren Flüssigkeit durch Gerinnen die hier in Rede stehende Substanz erhalten wurde.

Wärme kann die Flüssigkeit filtrirt werden, wobei das grüne Coagulum auf dem Papiere zurückläßt. Es besitzt nun den ganzen Grasgeruch, wovon die Flüssigkeit kaum noch Spuren zeigt. Es mischt sich nun wieder leicht mit Wasser, kann aber immer wieder durch Filtriren abgeschieden werden. Es besteht aus Pflanzeneiweiß verbunden mit einem grünen wachsartigen Fett, welches sich mit Alkohol, oder besser mit Aether ausziehen läßt. Etwas bleibt immer zurück und ertheilt dem erhaltenen Pflanzeneiweiß eine schwach grünliche Farbe. Nach dem Trockner ist letzteres schwarz; es hat im Uebrigen alle schon oben erwähnten Eigenschaften des Pflanzeneiweißes, enthält aber losgeriebene Theile vom Holze der Pflanze, welche bei Behandlung des Eiweißes mit kaustischem Kaliumauflöser unauflöslich bleiben.

Macht man die ausgepresste grüne Milch mit Säuren gerinnen, so wird ihre grüne Farbe zerstört und wird grau.

Die ausgepresste grüne Pflanze, mit Wasser und Spiritus extrahirt, enthält geronnenes Pflanzeneiweiß, welches man durch Behandlung mit einer verdünnten Kaliumauflösung, aus welcher das Eiweiß durch Säuren gefällt werden kann, erhält.

Der Saft von farblosen, zerriebenen und ausgepressten Wurzeln, z. B. Kartoffeln, Runkelrüben, Rüben, gelben Rüben u. s. w., setzt beim Erhitzen ein ziemlich starkes Coagulum eines käseähnlichen Pflanzeneiweißes ab, in seinem Verhalten ähnlich dem aus Weizen und emulsionsbildenden Saamen.

Pflanzenleim und Pflanzeneiweiß haben keine andere Anwendung, als daß sie in Verbindung mit anderen Pflanzenstoffen zur Nahrung dienen. Sie bewirken, daß das Brod und im Allgemeinen alle aus dem Getreide bereiteten Speisen für Menschen und Thiere vollkommen nährend sind, weil sie jenes stickstoffhaltige Material enthalten, während dagegen z. B. Kartoffeln, welche sehr wenig Pflanzeneiweiß und keinen Pflanzenleim enthalten, nicht hinreichend nährend sind, außer in Verbindung mit

ner gewissen Portion animalischer Nahrung. Das Pflanzeneiweiß in den grünen Pflanzen macht dieselben natürlicherweise für pflanzenfressende Thiere mehr nährend; ob diese aus dem Pflanzeneiweiß alles Material für die stickstoffhaltigen Bestandtheile ihres Körpers hernehmen, ist nicht ausgemacht. Die Versuche, pflanzenfressende, junge und im Wachsthum begriffene Thiere nur mit Stärke und Zucker oder mit stickstofffreien Stoffen zu nähren, würden gewiß Resultate von sehr großem Interesse geben.

Pollenin.

Der Saamenstaub der Pflanzenblüthen enthält eine eigenthümliche vegetabilisch-animalische Substanz, welche weder Pflanzeneiweiß noch Pflanzenleim ist, welche aber unter ihren Bestandtheilen Stickstoff hat, und also bei der Destillation Ammoniak giebt. Der Hauptcharakter dieser Substanz ist ihre Unauflöslichkeit in den meisten Auflösungsmitteln, wie Wasser, Alkohol, kaustischem und kohensaurem Alkali, so wie ihre Eigenschaft, mit großer Lebhaftigkeit zu brennen. Es ist nämlich diese Substanz, welche die explosionsähnliche Flamme bewirkt, wenn das sogenannte Lycopodium (der Saamen von *Lycopodium clavatum*) einen brennenden Körper berührt. Fourroy und Vauquelin lenkten zuerst die Aufmerksamkeit auf diesen Stoff bei einer Analyse des Saamenstaubs der Datteln. Buchholz gab, bei einer Untersuchung des erwähnten Saamen von Lycopodium, mehrere seiner Eigenschaften an, und John bestimmte ihn als einen eigenen Pflanzenstoff, und nannte ihn Pollenin, von *Pollen* (Saamenstaub).

Man erhält es am besten aus dem im Handel vorkommenden Lycopodium, indem man es mit Wasser, Alkohol, und zuletzt mit einer Auflösung von Kalihydrat extrahirt; hierbei wird nach einander Zucker, Extract und fettes Oel ausgezogen, und es bleiben zuletzt 89,5 Proc. Pollenin, mit Beibehaltung der gelben Farbe des Saamenstaubes, seiner Pulverform und Brennbarkeit, übrig.

Läfst man es in feuchtem Zustand auf einer Stelle, wo es nicht trocknen kann, so fault es mit übelriechender Ammoniak-Entwicklung, und nimmt zuletzt den Geruch von faulem Käse an. Salpetersäure zersetzt dasselbe, wie den Pflanzenleim, in Aepfelsäure, Oxalsäure, bittere Materie und Talg. Nach Fourcroy ist das Pollenin von Datteln in geringer Menge in Chlorwasserstoffsäure mit grüngelber Farbe auflöslich, und daraus durch Alkali als gelbes Pulver fällbar. Beim Kochen mit concentrirtem kaustischen Kali wird es zerstört und entwickelt Ammoniak.

In Aether und in Terpenthinöl ist es unauflöslich.

Fette Oele.

Die fetten Oele kommen im Pflanzenreich vorzüglich in den Saamen vor, und sind dann in den Saamenlappen enthalten, fehlen aber in der Substanz der Plumula und Radicula. In den Oliven ist das Oel in dem den Kern umgebenden Fleisch enthalten. Eine einzige Wurzel, nämlich von *Cyperus esculentus*, enthält fettes Oel; aber die wachsähnlichen Oele finden sich auch in mehreren anderen Theilen von Pflanzen, z. B. im Saft, in dem sie mit Pflanzeneiweiß grünes Satzmehl bilden, im Saamenstaub, und oft bilden sie einen Ueberzug auf Blättern und Früchten.

Die fetten Oele werden gewöhnlich durch Auspressen der zerquetschten Saamen erhalten, indem man diese in einen Sack von starkem Leinen bringt und zwischen Metallplatten mittelst eines Schraubenapparats preßt. Ein großer Theil der Saamen giebt bei gewöhnlicher Temperatur Oel, und dieses ist das reinste und beste. Um aber die ganze Menge davon zu bekommen, muß das Auspressen bei einer höheren Temperatur geschehen. Zu diesem Endzweck wird die Saamenmasse, so stark sie es vertragen kann, vorsichtig erhitzt und zwischen den vorher erwärmten Platten ausgepreßt. Durch dieses Verfahren erlangt das Oel eine größere Flüssigkeit, es gerinnt da-

dadurch das Eiweiß in emulsionbildenden Saamen, welches sich dadurch besser vom Oele trennt, und es trocknet dadurch in schleimigen Saamen der Schleim aus; es hat aber dagegen das Unvortheilhafte, nicht selten die Beschaffenheit des Oels zu verändern, theils dadurch, daß die Saamen gelinde angebrannt werden, theils dadurch, daß das heiße Oel aus dem Saamen Stoffe aufnimmt, welche nicht in das kalt ausgepresste übergehen, und wodurch das Oel viel eher ranzig wird und verdirbt, Das Gerinnen des Pflanzeneiweißes und das größere Flüssigwerden des Oeles wird schon bei $+100^{\circ}$ erreicht; man schreibt deshalb vor, die zerstoßene Saamenmasse im Dampfbade und die Platten in kochendem Wasser zu erhitzen, und dann, wenn die Masse durch und durch $+100^{\circ}$ erlangt hat, sie schnell unter die Presse zu bringen und das Oel auszudrücken. — Bisweilen scheidet man fettes Oel auch durch Kochen in Wasser aus, wobei sich das Oel auf dem Wasser ansammelt.

Die Menge von Oel ist bei den verschiedenen Saamen, und vielleicht auch bei derselben Art, je nach der Witterung und dem Klima, sehr ungleich. Die Wallnußkerne enthalten ihr halbes Gewicht Oel, die Saamen von *Brassica oleracea* und *campestris* $\frac{1}{3}$, und die Varietät von *Brassica campestris*, welche Reys heißt, $\frac{2}{3}$, Mohnsaamen $\frac{47}{100}$, Hanfsaamen $\frac{1}{4}$ und Leinsaamen $\frac{1}{3}$.

Die fetten Oele haben im ersten Augenblick keinen Geschmack, sondern sind nur, wie auf den Fingern, durch ihre Schlüpfrigkeit auf der Zunge bemerkbar. Die meisten haben den Geruch der Pflanze, wenigstens so lange sie frisch sind. Sie zeigen weder alkalische noch saure Reaction. Ihr specifisches Gewicht ist geringer, als das des Wassers, auf dem sie folglich schwimmen; es wechselt ab zwischen 0,918 und 0,936. Auf Papier getropft, durchdringen sie dasselbe, machen es durchscheinend oder machen darauf, wie man es nennt, Fettflecke. Auch ihre Consistenz ist sehr verschieden, wie man aus der des Wachses sieht, welches erst bei $+68^{\circ}$ schmilzt, und der des Leinöls, welches sich noch bei -20° flüssig erhält.

Die Bestandtheile der fetten Oele sind in ungleichen Oelen nicht von gleicher Beschaffenheit, und der Unterschied zwischen den Oelen besteht keineswegs in einer ungleich proportionirten Vermischung von Stearin und Elain, auch haben diese in ihrem getrennten Zustande nicht dieselben Schmelz- oder Erstarrungs-Punkte, sondern das, was in einem, bei gewöhnlicher Luft-Temperatur festen, fetten Oel Elain ist, könnte Stearin bei einem mehr leichtschmelzbaren Oele sein.

Die Oele können in verschlossenen Gefäßen sehr lange, ohne Veränderungen zu erleiden, aufbewahrt werden; aber beim Zutritt der Luft verändern sie sich nach und nach. Gewisse Oele werden dicker und trocknen zuletzt zu einer durchsichtigen, gelblichen und weichen Substanz ein, die gewöhnlich anfangs eine Haut auf der Oberfläche des Oels bildet, und dadurch um so länger das darunter befindliche Oel schützt. Diese nennt man trocknende Oele, und man benutzt diese Eigenschaft zur Bereitung von Firnissen und zum Oelmalen. Andere dagegen trocknen nicht, werden aber dick, weniger brennbar und nehmen einen rädrigen Geruch an, was man Ranzigwerden nennt, und wobei sie die Eigenschaft bekommen, sauer zu reagiren und beim Schmecken ein kratzendes Gefühl im Halse zu erzeugen. Die Ursache hiervon ist eine im Oele gebildete oder entwickelte Säure, welche größtentheils weggenommen werden kann, wenn das Oel mit etwas Talkerdehydrat und Wasser $\frac{1}{4}$ Stunde, oder so lange gekocht wird, bis es die Eigenschaft, das Lackmuspapier zu röthen, verloren hat. Diese beim Ranzigwerden entwickelte Säure ist bei den vegetabilischen Oelen wenig oder nicht untersucht, ich werde deshalb hier weiter nichts darüber sagen, und beim thierischen Fett darauf zurückkommen. Man schreibt sie gewöhnlich fremden, im Oele aufgelösten Materien zu.

Bei den Veränderungen, welche die Oele so erleiden, nehmen sie nach und nach das mehrfache ihres Volumens Sauerstoff aus der Luft auf. De Saussure führt das eine Schicht von Nufsöl, welche er 8 Monate lang über Quecksilber in Sauerstoffgas liefs, davon ihr

Die fetten Oele sind nicht flüchtig. Werden sie erhitzt, so können sie eine ziemlich hohe Temperatur vertragen, ehe sie sich zu zersetzen anfangen, was mit Kohlen geschieht, wobei es aber nicht das Oel ist, welches

Gas aufsteigt, sondern flüchtige Producte von seiner Zersetzung. Diese beginnt zwischen $+300^{\circ}$ und 320° , und erfordert nachher eine immer höhere Temperatur. Die Producte davon sind anfangs Wasserdämpfe, hierauf ein flüchtiges, sich leicht entzündendes Oel, wodurch ein kochendes Oel leicht in Brand geräth, und dabei kommen auch Kohlenwasserstoffgas und Kohlensäuregas. Wenn unsere Oellampen vermittelst eines Dochtes brennen, so zündet der Docht Oel ein, welches in demselben kocht; aus dabei sich bildende flüchtige, brenzliche Oel brennt und bildet die Flamme, an der auch die brennbaren Gase Theil haben. Das Oel schäumt sehr beim Kochen, wird dick und kocht gern über, wenn es nicht in einem, im Verhältniß zur Oelmenge, sehr großen Gefäß behandelt wird. Die Producte seiner Zerstörung sind indessen nach der ungleichen Temperatur, wobei sie geschieht, sehr verschieden. Vermischt man Oel mit Sand oder läßt man es über glühende, kleine Ziegelsteinstücke Oel einsaugen und ergießt sie nun in einen Destillationsapparat, so entsteht kein Schaum, und man kann die Temperatur, so schnell man will, ungehindert erhöhen; es entsteht dann eine Menge brenzliches Oel (Ziegelsteinöl), wovon ich bei der Zerstörung der Pflanzenstoffe durch trockne Destillation noch weiter sprechen werde. Wird Oel in ein glühendes, Ziegelsteinstücke enthaltendes Gefäß getropft, so wird der größte Theil in ölbildendes Gas und andere gasförmige Verbindungen von Kohlenstoff und Wasserstoff verwandelt, wie ich bei derselben Gelegenheit beschreiben werde.

Die Erscheinungen bei der Destillation fetter Oele sind neuerlich von Dupuy, so wie von Bussy und Lefrançois näher studirt worden. Der erstere setzte Baumöl in einem Destillationsapparat einer Temperatur aus, welcher der, wobei das Oel in's Kochen kommt, nahe war, und unterhielt diese Temperatur so lange, als noch etwas überdestillirte. *Es zeigte sich ein weißer Dampf, welcher*

200

Fette Oele.

dreifaches Volumen aufgenommen hatte: zu
dieser Zeit begann eine schnellere Absorp-
tion innerhalb 10 Tagen ihr 60faches Volumen
wieder ab, und hörte nach 3 Me-
hren Absorption Sauerstoffgas abso-
lut 14% Volumen Sauerstoffgas abso-
birt. Absorption fand zu Anfang August
eine höhere Temperatur der Luft Theil
Wasser gebildet wurde, sich aber 21
ändert entwickelte, das Oel auf
verändert wurde, sich in eine gelat-
dalle und auf Papier keine Fettfle-
Walnussöl gehört zu den trocken-
haben ein entsprechendes Beispiel
peratur, welche entsteht, wenn Y
ebenfalls zu den trocknender
und die Masse in Haufen zusam-
ste sich oft entzündet, und auf die
fabriken erreicht hat. Es ist u
sehr schnelle Sauerstoff-Absor-
Temperatur-Erhöhung sei.

Hier (Oel) wird in Wasser
man sie damit schüttelt, so
aber leichter schwimmt als
dabei darunter.

Menge aufgelöst, woraus der Ueberschufs sich beim Erkalten absetzt und zwar bisweilen krystallisirt. Die Auflösung riecht nach Phosphor und leuchtet im Dunkeln. Ein oder einige Tropfen flüchtigen Oels zugesetzt, machen diese beiden Eigenschaften verschwinden. Auch Selen löst sich im Oel auf, und giebt eine Auflösung, die im Durchsehen klar, aber bei auffallendem Lichte unklar und röthlich ist. Chlor und Jod werden von den Oelen aufgelöst, was aber mit einer Zersetzung verbunden zu sein scheint; es bilden sich Chlorwasserstoff- und Jodwasserstoffsäure, die nachher als Säuren auf das Oel wirken, wodurch es gröfsere Consistenz bekommt und zuletzt hart wie Wachs wird.

Die Säuren, wenigstens die stärkeren, zerstören die Zusammensetzung der Oele und erzeugen damit mehrere andere Körper, in welche die Oele vornehmlich sowohl bei der Destillation, als bei der Behandlung mit Alkali verwandelt werden, nämlich die drei verschiedenen Säuren: Talgsäure, Margarinsäure und Oelsäure. Vermischt man Schwefelsäure mit einem fetten Oel, mit der Vorsicht, daß sich die Masse nicht erwärmt, so löst sich das Oel in der Schwefelsäure zu einer braunen, dickfließenden Flüssigkeit auf, welche von Wasser zersetzt wird, indem es daraus das aufgelöste Oel in verändertem Zustand niederschlägt. Die saure Flüssigkeit enthält aufer Schwefelsäure eine Verbindung von Unterschwefelsäure mit einer organischen Materie, welche Chevreul Acide sulfoadipique nennt, und die durch die reducirende Wirkung des Fettes auf die Schwefelsäure gebildet ist. Das gefällte Fett bildet mit darauf gegossenem frischen Wasser eine Emulsion, die durch Zusatz von einer Basis wieder zersetzt wird, und aus den drei eben erwähnten fetten Säuren und einer Portion Acide sulfoadipique besteht. Chevreul glaubt dabei unter den Producten von der Einwirkung der Säuren auch Scheele's süßes Prinzip, oder, wie wir es nennen, Oelzucker, den ich bei den Producten des Seifenbildungs-Prozesses beschreiben werde, gefunden zu haben. — Wird die Verbindung von Schwe-

mit Oel erhitzt, so entwickelt sich schweflichte die Masse verkohlt, und zuletzt bleibt Kohle, ge- mit künstlichem Gerbstoff, zurück. Salpetersäure t die Oele ungefähr auf gleiche Weise wie die säure, wird aber die concentrirte Säure mit dem nischt, so erhitzt sich das Gemische und bricht in Flammen aus. Wird Oel mit verdünnter äure gekocht, so entsteht zuletzt auch Aepfelsäure, e und die gewöhnlichen Producte von der Ein- der Säure auf Pflanzenstoffe. Mehrere Pflanzen- ösen sich in den Oelen auf, ohne sie aber sicht- erändern. Arsenichte Säure wird von fetten Oelen , die davon schwerer, dickflüssiger und von Farbe erden.

den Salzbasen gehen die Oele Verbindungen bei sie, auf gleiche Weise wie von den Säuren, werden, und Talgsäure, Margarinsäure, Oelsäure zucker hervorbringen. — Das Product ihrer Ver- mit Kali und Natron wird Seife genannt. Ich nach Abhandlung der fetten Oele, den Seifen- gs-Prozess und die dabei entspringenden neuen besonders beschreiben, und will hier mit der Be- ng des Verhaltens der Oele zu anderen Reagen- tverfahren. Kaustisches Ammoniak verwandelt die r schwierig und langsam in Seife, es vereinigt r mit denselben zu einer milchichten Flüssigkeit, liniment genannt und in der Heilkunde angewen- t. Aus dieser Verbindung wird das Oel von Was- erändert abgeschieden. Nach längerer Zeit wird sen wie von den fixen Alkalien verändert.

Oele verbinden sich mit mehreren Salzen. Wird s Oel mit kohlensaurem Kali oder Natron gekocht schüttelt, so entsteht eine milchähnliche Flüssigkeit, sich nicht klärt, und aus welcher Säuren das Oel abscheiden, indem sie sich mit dem Alkali verbinden Kohlensäure austreiben. Die butterartigen Oele chs erzeugen diese Verbindung erst in der Tempe- wobei sie flüssig sind. Kochsalz wird in geringer

Menge von fetten Oelen aufgelöst. Auch basische Kalkoxydsalze, z. B. Grünspan, und selbst Kupferoxyd lösen sich von den Oelen mit grüner Farbe aufgelöst, aber daß davon das Oel in Seife verwandelt wird. Sie binden sich mit Chlorphosphor, Chlorschwefel, Chlorarsenik, Schwefelkohlenstoff u. s. w. lösen ferner mehrere vegetabilische Salzbasen auf Morphium, Cinchonin, Chinin, Strychnin und Phosphin.

Zu Gasen verhalten sie sich wie die Flüssigkeiten im Allgemeinen. Die Gase werden in ihre Poren aufgenommen, und wieder von Wärme und anderen Gasen oder unter der Luftpumpe ausgetrieben; aber wegen ihrer Consistenz nehmen sie dieselben nur schwierig auf, lassen sie nur schwierig wieder fahren. Nach der Erfahrung nimmt Baumöl bei $+18^{\circ}$ Temperatur $1\frac{1}{2}$ Mal sein Volum sowohl von Stickstoffoxydulgas, als von Kohlenoxydgas auf. Von Stickstoffoxydgas absorbiren sie 1,22fache seines Volums auf, verdicken sich dabei und werden dunkler.

Die Oele durchdringen leicht die Körper, wo sie in Berührung kommen, und benetzen sie stark; sie durchdringen sie aber nicht, wie Wasser. Wenn man ein Leder und dergleichen einschmiert, um es mit Oelen weich und geschmeidig zu erhalten, so muß es vorher wenn es hart geworden ist, zuvor in Wasser aufgeweicht und beim Trocknen dann mit dem Oele eingeschmiert werden. Das Oel nimmt dann die vorher vom Wasser geöffneten Poren ein. Das Oel hat ein großes Bestreben, Thon einzuziehen, ohne daß dies auf einer chemischen Verbindung beruht; man pflegt daher Oelflecke auf Papier, auf den Kleidern oder selbst im Fußboden mit Thon zu belegen, den man vorher mit Wasser oder Spiritus zu einem steifen Teig gemacht hat. Beim Trocknen saugt der Thon das Oel ein, so daß alle Spur

von verschwinden; und mit blofs trockenem Thon, den man oft erneuert, nimmt man Oelflecke von solchen Dingen weg, die nicht nafs gemacht werden dürfen, wie z. B. Papier. Es versteht sich, dafs der Oelfleck nicht alt sein darf, weil sich sonst das Oel mit der Zeit verändert hat, und dann nicht mehr vom Thon ausgezogen wird.

Die Zusammensetzung der Oele ist viel weniger variirend, als die vieler anderer, zu einem und demselben Genus gehörender Stoffe. Ihre atomistische Zusammensetzung hat nicht bestimmt werden können, da sie sich nicht ohne Zersetzung mit anderen Körpern vereinigen lassen, und also das Gewicht ihres Atoms nicht bestimmt werden konnte. Ueberdies ist es nicht möglich, sie jemals in absolut reinem Zustand zu bekommen. Gay-Lussac und Thénard, so wie de Saussure, sind es vorzüglich, welche bis jetzt fette Oele analysirt haben, und ich will hier folgende Zusammenstellung ihrer Resultate geben.

	Kohlen- stoff.	Wasser- stoff.	Sauer- stoff.	Stick- stoff.	
Leinöl	76,01	11,35	12,64	—	Saussure.
Nufsöl	79,77	10,57	9,12	0,54	—
Ricinusöl . . .	74,18	11,03	14,79	—	—
Baumöl	77,21	13,36	9,43	—	G. L. u. Th.
Stearin von Baumöl	82,17	11,23	6,30	0,30	Saussure.
Elain von Baumöl	76,03	11,54	12,07	0,35	—
Mandelöl . . .	77,40	11,48	10,83	0,29	—
Piney-Falg . . .	77,00	12,30	10,70	—	Babington.
Weifses Wachs .	81,61	13,86	4,53	—	Saussure.
Desgleichen . .	81,79	12,67	5,54	—	G. L. u. Th.

Man findet aus dieser Uebersicht, dafs die schwer-schmelzbareren Fettarten den meisten Kohlenstoff und den wenigsten Sauerstoff enthalten, und de Saussure nimmt, auf seine Versuche gestützt, an, dafs die Oele in Alkohol in dem Grade auflöslicher seien, als sie mehr Sauerstoff enthalten.

Die Anzahl der fetten Oele im Pflanzenreich ist nicht zu berechnen; aber mehrere dieser Oele werden zu technischem und medicinischem Behuf bereitet und angewendet, weshalb ich die vorzüglichsten davon insbesondere abhandeln werde. Ich werde sie in 3 Abtheilungen bringen, nämlich in trocknende, nicht trocknende und in feste.

a) Trocknende Oele.

Leinöl wird aus dem Leinsaamen (von *Linum usitatissimum*) gewonnen. Das beste ist das durch kaltes Auspressen erhaltene. Es ist hellgelb; das in der Hitze ausgepresste ist braungelb und wird leicht ranzig. Es hat einen eigenen schwachen Geruch und Geschmack. Sein spec. Gewicht variirt zwischen 0,928 und 0,932. De Saussure fand es bei $+12^{\circ} = 0,9395$, bei $+25^{\circ} = 0,93$, bei $+50^{\circ} = 0,9125$ und bei $+94^{\circ} = 0,8815$. Bei -20° nimmt es eine blässere Farbe an, ohne Stearin abzusetzen oder zu erstarren. Es wird von 5 Th. kochenden und 40 Th. kalten Alkohols, so wie von 1,6 Th. Aethers aufgelöst.

Das Leinöl ist eines der am meisten angewendeten Oele, und wird vorzüglich zu Firnissen und zum Oelmalen benutzt. Einen solchen Firniß erhält man, wenn Leinöl in einem glasierten Topf 3 bis 6 Stunden lang über Feuer bei einer Temperatur gehalten wird, wobei es nur ganz gelinde kocht. Auf jedes Quart Oel mischt man 1 bis 2 Loth feingeriebene Bleiglätte und $\frac{1}{4}$ Loth Zinkvitriol zu. Je gelinder und länger anhaltend die Hitze ist, um so besser trocknend und weniger dunkel wird der Firniß. — Durch diese Operation durchläuft das Oel in einer kurzen Zeit die Veränderungen, welche während seines Eintrocknens vor sich gehen, so daß es nun, in dünnen Lagen aufgetragen, in 24 Stunden trocknet. Es wird dabei eine geringe Portion Bleioxyd im Oel aufgelöst, und kann dadurch zur größeren Neigung zu trocknen beitragen; das meiste aber wird partiell reducirt, und findet sich auf dem Boden des Kochgefäßes als ein dunkelgraues Pulver, das abgeseiht werden muß. Man kann so durch längere Zeit fortgesetztes Kochen das Oel so weit

bringen, daß es beim Erkalten fast erstarrt; man macht es dann durch Auflösung in Terpenthinöl flüssig. Die gewöhnliche Buchdruckerschwärze wird aus Leinöl gemacht. Das Oel wird hierzu eine Zeit lang gekocht, so lange nämlich, bis der immer dicker und stinkender werdende Dampf zeigt, daß sich der Firniß gebildet hat. Während des Kochens wird eine Zeit lang gut ausgetrocknetes Brod an hölzernen Spießsen in das Oel gehalten, wodurch das Gelbwerden der Schwärze auf dem Papier verhindert werden soll. Nach gehörigem Einkochen wird der Kessel vom Feuer genommen, der Deckel geöffnet und das Oel durch einen in den Dampf gehaltenen brennenden Spahn angezündet. Es wird so, unter stetem langsamen Umrühren etwa 5 Minuten brennen gelassen, und die Flamme dann, wenn sie nicht von selbst verlischt, durch Auflegung des Deckels ausgelöscht. Der Kessel wird dann durch Eingraben in die Erde schnell abgekühlt. Nach dem Erkalten wird dem Oel gut durchgebrannter Kienruß zugemischt, und so lange damit gerührt, bis keine Klümpchen von Kienruß in der Farbe mehr zu sehen sind.

Leinöl, welches lange in einer halgefüllten Flasche gestanden hat, wird dick und trocknet dann weniger leicht. Es wird dann von Alkohol bedeutend leichter als das frische Oel aufgelöst, und diese Auflösung wird mit Vortheil zu den hellen Lackfirnissen gemischt, um die Sprödigkeit des Harzüberzugs zu vermindern.

Zu Bleiweiß und hellen Farben wird das Leinöl ohne vorhergegangenes Kochen angewendet. Es trocknet dann um so langsamer, verdirbt aber nicht die Klarheit der Farbe.

Wallnufsöl wird aus den Kernen der Wallnüsse (*Juglans regia*) gewonnen. Frisch ist es grünlich, wird aber mit der Zeit blaßgelb. Sein spec. Gewicht ist, nach de Saussure, bei $+12^{\circ}=0,9283$, bei $+25^{\circ}=0,9194$, bei $+94^{\circ}=0,871$. Es ist ohne Geruch, und hat einen angenehmen Geschmack. Es trocknet besser als Leinöl, und wird deshalb in der feineren Oelmalerei statt jenes gebraucht.

Hanföl wird aus dem Hanfsaamen (*Cannabis sativa*) gewonnen. Frisch ist es grüngelb, wird aber mit der Zeit gelb. Es hat einen unangenehmen Geruch, aber einen milden Geschmack. In kochendem Alkohol löst es sich in allen Verhältnissen auf, aber von kaltem bedarf es 30 Theile. Es wird viel zum Brennen auf den Lampen gebraucht, wobei es jedoch die Ungelegenheit hat sich da, wo es aufsen auf die Lampe kommt, als ein zäher, schwer wegzubringender Firniß zu befestigen. Man hat diesem durch Einschmelzen von $\frac{1}{4}$ Butter abzuhelfen gesucht, wodurch es weniger leicht eintrocknet. Auch wird es in Menge zur Bereitung von grüner Seife und zu Firnissen zum Anstreichen gebraucht.

Mohnöl wird aus dem Mohnsaamen (*Papaver somniferum*) ausgepresst. Im Aussehen und Geschmack gleicht es dem Baumöl, und enthält nichts von den narcotischen Eigenschaften des Opiums. Sein spec. Gewicht ist bei $+15^{\circ}=0,9249$. Es geseht bei -18° , wird aber selbst nach mehreren Stunden nicht bei -2° flüssig. Es wird von 25 Th. kalten und 6 Th. kochendheissen Alkohols aufgelöst, und läßt sich leicht mit Aether in allen Verhältnissen vermischen. Es wird im südlichen Deutschland und Frankreich zu Speisen angewendet.

Ricinusöl wird durch Auspressen aus dem Saamen von *Ricinus communis* erhalten. Es ist theils gelb, theils farblos, dickflüssig, und sein spec. Gewicht ist, nach de Saussure, bei $+12^{\circ}=0,9699$, bei $+25^{\circ}=0,9575$ und bei $+94^{\circ}=0,9081$. Es ist ohne Geruch und von mildem Geschmack; bei -18° erstarrt es zu einer durchsichtigen gelben Masse. Der Luft ausgesetzt, wird es ranzig, zäher, dicker und trocknet endlich ein. Bei $+265^{\circ}$ fängt es an sich zu zersetzen. Mit Alkohol und Aether läßt es sich in allen Proportionen vermischen, wobei sich fremde, dem Oel beigemischte Substanzen ausscheiden. Diese Auflöslichkeit in Alkohol zeigt auch eine bedeutende Verschiedenheit des Ricinusöls von den übrigen fetten Oelen. Nach Bussy und Lecanu giebt es sowohl bei der Destillation als bei der Verseifung andere Producte, als die übrigen fetten Oele. Nachdem bei der Destillation ungefähr $\frac{1}{4}$

gegangen ist, bleibt eine eigene Substanz zurück, die gewöhnlicher Temperatur fest ist. Das Destillat ist farbloses, stark riechendes, bei der Abkühlung kry-
sirendes flüchtiges Oel; dasselbe ist von zwei Säuren
eitet, die durch ihre große Schärfe und ihre Eigen-
t, mit Talkerde und Bleioxyd in Alkohol sehr leicht
sliche Salze zu geben, ausgezeichnet sind. — Das
usöl ist ein vortreffliches Abführungsmittel. Man
eb diese Eigenschaft einem scharfen, in diesen Ker-
enthaltene Stoffe zu, aber Guibourt hat gezeigt,
dieser scharfe Stoff so flüchtig sei, daß er durch die

Auspressen oder Auskochen des Oeles angewandte
peratur verfliege, und Nase und Augen reize, wäh-
das Oel mild und mit Beibehaltung seiner medicin-
Eigenschaft zurückbleibe. Französische Pharmaceu-
schreiben vor, daß es ausgekocht und nicht ausge-
t, oder wenigstens nach dem Auspressen mit Wasser
cht sein müsse, damit es nicht ein zu heftiges Abfüh-
mittel sei.

Crotonöl. Unter diesem Namen hat man neuerlich
er Heilkunde das Oel aus dem Saamen von *Croton*
ium anzuwenden angefangen. Es wird theils durch
ressen, theils durch Ausziehen mit Alkohol gewonnen.
Saamen enthalten ihr halbes Gewicht davon. Dieses
ist honiggelb, von der Consistenz von Baumöl, riecht
Malappenharz, schmeckt brennend und erregt im Halse
ündung. Es wird sowohl von Alkohol als Aether auf-
t. Es scheint ein Gemenge von einem fetten Oel mit
n scharfen Stoff zu sein, welcher dasselbe zu einem
heftigen Abführungsmittel macht, wovon weniger als
Tropfen eine hinreichende Dosis ist. Werden die
nen mit Aether ausgezogen, so erhält man, nach
mo, 60 Proc. ihres Gewichtes Oel, von welchem
hol $\frac{2}{3}$ auflöst, welches abführendes Oel ist, und $\frac{1}{3}$
ckläßt, welches mild ist. Der scharfe Stoff scheint
Säure zu sein, welche bei der Verseifung des Oeles
schieden werden kann, und von der ich bei den Pro-
en der Seifenbildung reden werde.

β) Nicht trocknende Oele.

Mandelöl wird sowohl von den süßen als de-
 teren Mandeln (*Amygdalus communis*) gewonnen
 ist hellgelb, dünnflüssig, hat einen angenehmen Gesch
 und keinen Geruch. Sein spec. Gewicht ist bei -
 0,917 bis 0,92. — Beim Erkälten bis zu -10° gie
 0,24 Stearin, welches bei $+6^{\circ}$ schmilzt, und 0,76 l
 welches in der stärksten Kälte nicht erstarrt. Es
 leicht ranzig; wird von 25 Th. kalten und 6 Th. koch
 heißen Alkohols aufgelöst, und läßt sich mit Aeth
 allen Verhältnissen vermischen.

Baumöl wird aus dem fleischigen Theil der C
 (der Frucht von *Olea europaea*) erhalten. Es ist
 grüngelb, theils blaßgelb. Sein spec. Gewicht ist,
 de Saussure, bei $+12^{\circ}=0,9192$, bei $+25^{\circ}=0$.
 bei $+50^{\circ}=0,8932$, bei $+94^{\circ}=0,8625$. Schon bei
 gen Graden über dem Gefrierpunkt fängt es an, Si
 in weissen Körnern abzusetzen, und dies trifft bei
 warm ausgepressten eher und in größerer Menge, a
 dem kalt ausgepressten ein. Bei -6° setzt es 0,28
 rin, welches bei $+20^{\circ}$ schmilzt, ab, und hinterläßt
 Elain.

Das Baumöl kommt im Handel in drei Sorten
 Das beste oder Jungfernöl ist durch ein gelindes, l
 Pressen erhalten. Darauf erhält man durch stärkeres
 sen in der Wärme das gewöhnliche Baumöl, und z
 wird eine neue Portion Oel aus dem Kuchen durch
 kochen desselben mit Wasser erhalten, wobei das
 oben aufschwimmt und abgenommen wird. Das le
 wird nur zu Seife benutzt. Eine noch schlechtere
 wird durch Gährung der vor dem Auspressen in H
 gelegten Cliven erhalten. Das Baumöl ist gewiß
 allen Oelen das am meisten angewendete, und da
 Olivenbaum empfindlich ist, und nur in einem so kl
 Theil von Europa vorkommt, so ist das Baumöl
 theurer als viele andere fette Oele. Das zu Speiser
 nutzte wird oft mit Mohnöl, und das zum Brennen u. (

angewendete oft mit Rüböl verfälscht. Es ist von Wichtigkeit, diese Verfälschungen entdecken zu können. Pouter giebt folgende Methode an, die Verfälschung des Baumöls mit Oel aus Saamen zu entdecken: Man löst 6 Th. Quecksilber in $7\frac{1}{2}$ Th. Salpetersäure von 1,35 spec. Gewicht ohne Hülfe von Wärme auf. Von dieser Auflösung werden 2 Th. mit 96 Th. Oel vermischt; das Gemische wird alle viertel oder halbe Stunde gut umgeschüttelt, und wird, von reinem Baumöl, nach 6 bis 7 Stunden consistent wie ein Brei, und nach 24 Stunden so hart, daß es Widerstand leistet, wenn man einen Glasstab hineinzustecken versucht. Andere fette Pflanzenöle besitzen diese Eigenschaft nicht, sich mit salpetersaurem Quecksilberoxydul zu vereinigen, und wenn Baumöl damit verfälscht war, so gesteht es zwar zu einem Brei, in den man aber ohne Widerstand einen Glasstab einbringen kann. Enthält das Baumöl mehr als $\frac{1}{4}$ vom fremden Oel, so scheidet sich von letzterem eine abgesonderte Schicht ab, deren Größe von der Menge des beigemengten Oeles abhängt, so daß wenn sie zu gleichen Theilen mit einander gemengt sind, das Volum des abgeschiedenen Oels eben so viel wie das des coagulirten beträgt. Der Versuch geschieht am besten bei $+20^{\circ}$, weil sich dann Oel und Coagulum am besten scheiden. Ist das Baumöl mit thierischem Fett verfälscht, so gerinnt das Gemische schneller, gewöhnlich schon in der 5ten Stunde; das coagulirte ist dann das thierische Fett, von dem ein großer Theil des Baumöls abgegossen werden kann. Das abgeschiedene Coagulum des thierischen Fettes riecht dann beim Erhitzen wie geschmolzener Talg oder Schmalz. — Eine andere Methode, die Verfälschung des Baumöls zu entdecken, ist von Rousseau angegeben worden, und beruht auf der Eigenschaft des Baumöls, für die Electricität ein besserer Nichtleiter als die übrigen vegetabilischen Oele zu sein. Rousseau hat hierzu ein eigenes Instrument erfunden, welches aus einer trocknen elektrischen Säule besteht, die aus dünnen Zink- und Kupferplatten erbaut ist, zwischen welche, an die

Stelle des feuchten Leiters, in Oel getauchte Scheiben Papier gelegt werden. Der eine Pol der Säule wird der Erde, und der andere durch einen metallischen Leiter mit einer leicht beweglichen, schwach magnetischen Magnetnadel in Verbindung gesetzt. Steht dieser metallische Leiter mit der Säule in unmittelbarer Verbindung, so weicht die Nadel in einem gewissen Grade vom Meridian ab. Geschieht aber diese Verbindung durch eine Schicht von Oel von bestimmter Tiefe, so ist diese Abweichung langsam und erreicht erst in einer gewissen Zeit ihren höchsten Grad. Je weniger leitend das Oel ist, um so langsamer geht die Ablenkung vor sich, und Rousseau hat bewiesen, daß das Baumöl ein 675 Mal schlechterer Leiter als irgend ein anderes fettes Pflanzenöl ist. 2 Theile Mohnöl, zu $\frac{1}{4}$ Loth Baumöl gemischt, vermehren das Leitungsvermögen des letzteren um das 4fache. Aber es ist zu bemerken, daß sich Stearin von thierischen Oelen bei dieser Probe wie Baumöl verhält.

Das Baumöl erhält sich länger und besser, ohne zu verderben, als alle andere Pflanzenöle. Die Uhrmacher bedienen sich daher desselben, nachdem sie es zuvor einer Reinigung unterworfen haben, die darin besteht, das Oel in eine Flasche gegossen und mitten in dasselbe eine Bleischeibe gestellt wird, worauf die Flasche verkehrt in ein Fenster gesetzt wird, wo sie von der Sonnenstrahlung bestrahlt werden kann. Nach und nach überzieht sich das Oel mit einer käsigen Masse, die zum Theil zu Boden fällt, während das Oel seine Farbe verliert und weißlich klar wird. Sobald das Blei nichts mehr von der Oelsubstanz bildet, wird das nun klar und farblos gewordene Oel abgegossen. Diese Veränderungen verdienen wohl wissenschaftlich untersucht zu werden.

Rüböl, aus den Saamen von *Brassica Rapa Napus*, ist gelb, von eigenem Geruch, erstarrt bei -10° zu einer gelben Masse, und besteht, nach Bracco aus 0,46 Stearin, welches bei $+7^{\circ},5$ schmilzt, und Elain, welches den Geruch des Rüböls behält. Das specifische Gewicht ist bei $+15^{\circ} = 0,9128$. Dieses Oel enthält

genen Stoff aufgelöst, welcher dasselbe zum Brennen, wozu es eigentlich gebraucht wird, weniger tauglich macht. Hénard entdeckte, daß dieser Stoff daraus mit Schwefelsäure niedergeschlagen werden könne, und gründete hierauf einen Reinigungsprozeß, der nachher ganz allgemein geworden ist. Man vermischt das Rüböl mit 2 Proc. seines Gewichts concentrirter Schwefelsäure, wobei sich ein grüner Niederschlag bildet, und das Oel beim Umschütteln dunkelgrün oder schwarz wird; es wird dann stark und lange mit seinem doppelten Volum Wassers umgeschüttelt, welches den Ueberschuß von Säure und die niedergeschlagene Substanz aufnimmt; das Gemenge wird dann 1 bis 2 Wochen lang an einem $+25^{\circ}$ bis 30° warmen Orte gelassen; während dessen setzt sich der Niederschlag und das Wasser aus dem Oele ab, welches sich bei jener Wärme dünnflüssiger erhält. Es wird hierauf in ein Gefäß abgegossen, in dessen Boden sich mehrere 4 bis 5 Zoll langen baumwollenen Dochten versehene Sieber befinden, durch welche das Oel geseiht werden muß, und so völlig klar erhalten wird.

Kolsaöl nennt man eine bessere Art von Rüböl, von *Brassica campestris, var. oleifera*, welches schon ohne weitere Reinigung, in Lampen gut brennt. Sein spec. Gewicht ist bei $15^{\circ} = 0,9136$, und es erstarrt bei $-6^{\circ},25$.

Senföl wird aus dem Senfsaamen (*Sinapis alba* und *græca*) gewonnen. Der zu Teig gestoßene Senfsaamen liefert, nach Julia Fontenelle, $\frac{1}{2}$ seines Gewichts Oel. Dieses Oel ist mild, ohne Geruch, dicker als Baumöl, von bernsteingelber Farbe, bei $+15^{\circ}$ von 0,9170 spec. Gewicht, und gesteht unter 0° . Es wird von 4 Th. Aethers und von 1000 Th. Alkohols von 0,833 aufgelöst. Alkohol zieht, außer der, schon pag. 225 beschriebenen Senfsäure, ein eigenes Fett aus, welches, nach Abdampfung des Alkohols bis zu einem gewissen Grad, beim Erkalten weißlichweißen, perlmutterglänzenden, blättrigen Krystallen abschiefst, die bei $+120^{\circ}$ schmelzen und beim Erkalten krystallisiren. Dieses Fett bildet mit kaustischem Alkali

keine Seife; von Salpetersäure wird es schwer angegriffen und, ohne Bildung von Oxalsäure, in eine gelbe, harzartige Substanz verwandelt. Diese wird durch Behandlung mit Kali zinnberroth. — Das Senföl für sich giebt leicht eine sehr feste Seife. Dieses Oel hat eigentlich keine allgemeine Anwendung, und ich habe es hier nur als das Material, woraus man die Sensäure erhält, aufgeführt.

γ. Feste Oele.

Cacaobutter, wird aus den Cacaobohnen (*Theobroma Cacao*) entweder durch warmes Auspressen oder Auskochen gewonnen. Ersteres verdient vor letzterem immer den Vorzug. Sie ist gelblich, kann aber durch Schmelzen und Schütteln in warmem Wasser fast farblos erhalten werden. Sie riecht wie die Bohnen, hat einen milden und angenehmen Chocoladegeschmack, und die Consistenz von Talg. Ihr spec. Gewicht ist 0,91; sie schmilzt bei $+50^{\circ}$. — Die Cacaobutter zeichnet sich durch ihre Unveränderlichkeit aus; man hat welche schon 17 Jahre lang aufbewahrt, ohne daß sie ranzig geworden war. Die ausgepresste Cacaobutter wird darum in der Heilkunde in Salben angewendet, welche nicht ranzig werden dürfen.

Palmöl, aus der Frucht von *Cocos butyracea*, oder nach anderen von *Avoira Elais*. Es ist butterartig, pomeranzengelb und von schwachem Veilchengeruch. Es schmilzt bei $+29^{\circ}$. Es wird leicht ranzig und wird dann weißlich. Von Aether wird es mit pomeranzengelber Farbe aufgenommen. Es wird zu Seife verbraucht, da es zu ziemlich niedrigem Preis zu bekommen ist, und consistente Seife giebt.

Pineytagl, durch Auskochen der Frucht der im Malabar wachsenden *Vateria indica*. Er ist weiß, fühlt sich fett an, riecht angenehm, und läßt sich mittelst feiner Metalldräthe nur schwer schneiden; schmilzt bei $+35^{\circ}$ bis 36° . Sein spec. Gewicht ist bei $+15^{\circ}=0,926$ und bei $+35^{\circ}=0,8965$. Alkohol von 0,82 zieht daraus 0,025 wohlriechendes Elain nebst einem gelben Farbstoff aus.

Muskatbutter ist das aus den Muskatnüssen (das

Frucht von *Myristica officinalis*) ausgepresste, talgartige Oel, welches gewöhnlich in Holland im Großen bereitet wird, und in platten, vierseitigen Kuchen in den Handel kommt. Sie ist ein Gemenge von einem talgartigen, farblosen Oel, einem butterartigen, gelben, fetten Oel, und einem riechenden flüchtigen Oel. 16 Unzen Muskatbutter bestehen, nach Schrader, aus 7 Unzen talgartigem Oel, $8\frac{1}{2}$ Unzen gelbem, butterartigem und $\frac{2}{3}$ Unzen flüchtigem Oel. Von kaltem Alkohol und kaltem Aether wird sie zerlegt, indem diese die beiden letzteren auflösen und den Talg zurücklassen, welcher aber immer den Muskatgeruch behält. Von dem nach Abdampfung des Alkohols übrig bleibenden gelben Oel kann das flüchtige durch Destillation mit Wasser abgeschieden werden. Wird die Muskatbutter mit dem 4fachen Gewichte Alkohol oder Aether gekocht, so löst sie sich gänzlich auf, und beim Erkalten setzt sich das talgartige Oel dann wieder ab. Die Muskatbutter wird nur in der Heilkunde, und zwar meist als äußeres Mittel angewendet. Sie wird sehr häufig nachgemacht, indem geschmolzenes thierisches Fett mit gepulverter Muskatnuss digerirt, mit etwas Orlean gefärbt und ausgepresst wird. Aber dieser Betrug ist leicht dadurch zu entdecken, daß solche Gemenge, nicht wie die echte Muskatbutter, in dem 4fachen Gewichte kochenden Alkohols auflöslich sind. — Unter der äußeren Schale sind die Muscatnüsse mit einem eigenen Gewebe umgeben, welches Muskatblüthe (*Macis*) genannt wird. Dieses Gewebe enthält neben einem flüchtigen Oel, welches mit Wasser abdestillirt werden kann, und wovon später das Weitere gesagt wird, zwei fette Oele, von welchen das eine mit Alkohol ausziehbar ist, und nach dessen Abdampfung zurückbleibt. Es hat eine rothe Farbe. Das andere, in Alkohol nicht auflösbare, läßt sich auspressen oder mit Aether ausziehen. Es hat eine gelbe Farbe. Diese beiden Oele haben den Muskatgeruch, der durch Destillation nicht ganz weggeht. Das rothe ist in Aether und in Alkohol in allen Verhältnissen auflöslich, das gelbe dagegen nur in Aether, und selbst in kochendem Alkohol

unauflöslich. Sie sind ungefähr in gleicher Menge vorhanden. Werden diese beiden Oele mit kaustischem Kali in Seife verwandelt, so scheidet sich, nach Bollaert, ein nicht verseifbares Oel aus. Es schwimmt auf der Seife und ist nach dem Erkalten farblos, krystallinisch, leicht schmelzbar, ohne Geschmack und Geruch. Bei einer Temperatur von $+316^{\circ}$ destillirt es, wenig verändert, über. Von kochendem Alkohol wird es aufgelöst, aus dem es sich beim Erkalten wieder niederschlägt. Aether löst dasselbe leicht auf. Salpetersäure färbt dasselbe gelb, unter Entwicklung von Stickstoffoxydgas, und hierauf läßt es sich mit Alkali leicht in Seife verwandeln. Dieser Körper scheint ein Product des Verseifungsprozesses zu sein, und die Oele geben ungefähr ihr halbes Gewicht davon. In der äußeren Schale der Muskatnüsse sind also nicht weniger als 4 verschiedene fette Oele enthalten, nämlich ein farbloses, talgartiges; ein gelbes, butterartiges, in kochendem Alkohol auflösliches; ein gelbes, butterartiges, selbst in kochendem Alkohol unauflösliches, und ein rothes, in allen Verhältnissen in Alkohol auflösliches Oel.

Lorbeeröl, durch Auspressen der frischen Lorbeeren (der Frucht von *Laurus nobilis*). Dieses Oel hat eine grüne Farbe, die Consistenz von Butter und ist etwas körnig. Von einem beigemischtem flüchtigen Oel hat es einen eigenen, nicht angenehmen Geruch. Es schmilzt bei der Wärme der Hand. Alkohol nimmt daraus das flüchtige Oel und die grüne Farbe auf, und hinterläßt ein talgartiges, farbloses Oel. Das Lorbeeröl wird nur in der Medicin als äußeres Mittel gebraucht. Es wird bisweilen nachgemacht, indem thierisches Fett, gewöhnlich Butter, mit Lorbeeren geschmolzen und mit einer andern Portion Fett vermischt wird, welches durch Schmelzen mit Sefenbaumnadeln (*Fol. Sabinæ*) grün gefärbt und mit etwas flüchtigem Oel von *Melissa calamintha* vermischt ist. Diese Verfälschung erkennt man daran, daß das nachgemachte Oel nicht körnig ist, und daß es bei Behandlung mit dem 5—6fachen Gewichte kalten Alkohols sehr wenig an Gewicht verliert.

Gewöhnliches Wachs. Das Wachs unterscheidet sich, sowohl durch seine Zusammensetzung, als durch seine Consistenz und sein Verhalten zu den Alkalien, in etwas von den übrigen Arten von vegetabilischem Fett; es hat aber dessen ungeachtet so bestimmt die Charaktere vom Fett, daß ich es völlig als eine Species von vegetabilischem fetten Oel betrachten zu müssen glaubte. Das gewöhnliche, von den Bienen eingesammelte Wachs steht auf der Grenze zwischen Thier- und Pflanzen-Producten. Es schwitzt bei den Bienen (*Apis mellifica*) zwischen den Bauchringen aus, und sie bauen daraus die Zellen für die Entwicklung der Eier und für die Aufbewahrung des Honigs. Man glaubte eine Zeit lang, die Bienen zögen es aus dem Saamenstaub der Pflanzen aus, aber die von Huber, und nachher noch von Anderen angestellten Versuche zeigen, daß dieser Saamenstaub der Bienenlarve zur Nahrung dient, und daß das Wachs aus dem Zucker, welchen sie aus den Pflanzen aufnehmen, hervorgebracht wird. In diesem Falle wäre es mehr als ein Product des Thier- als des Pflanzen-Reichs zu betrachten. Indessen kommt das Wachs so häufig im Pflanzenreich, wiewohl nicht immer in großen Quantitäten, vor, daß sich wohl vermuthen läßt, das Bienenwachs sei eher ein Educt als ein Product von dem, was die Bienen aus dem Pflanzenreich aufsammeln, wiewohl Huber bestimmt erklärt, daß eingesperrte, mit Honig oder Zucker gefütterte Bienen ihre Wachszellen zu bauen fortführen.

Das Bienenwachs, so wie es durch Waschen des im Bienenstock gebildeten erhalten wird, hat eine gelbe Farbe und einen eigenen honigartigen Geruch. Diese Farbe und diesen Geruch hat es vom Honig angenommen, denn diejenigen Zellen im Bienenstock, in welchen die Bienen noch keinen Honig abgesetzt haben, geben weißes Wachs.

1 dieser fremden Einmischung wird es zuerst durch schmelzen in Wasser und nachheriges Bleichen in der sonne befreit. Dieß geschieht so, daß man das geschmolzene und seiner Erstarrungstemperatur nahe Wachs über einen, in kaltem Wasser langsam sich umdrehenden Cy-

linder von Holz ausgießt, wodurch das Wachs gebändert, d. h. in dünne, auf dem nassen Holze nicht festhaftende Blätter geformt wird, welche nun auf in Rahmen gespannten Netzen, und von darüber gelegten Netzen vor dem Winde geschützt, dem Sonnenschein ausgesetzt werden. Die Sonne und die Feuchtigkeit der Luft bleichen nun allmählich das Wachs, welches mit Wasser besprengt werden muß, wenn in der Nacht kein Thau gefallen ist. Selten wird aber das Wachs durch seine ganze Masse hindurch gebleicht, sondern es muß einige Mal umgeschmolzen und wieder gebändert werden, ehe es vollkommen weiß wird. Es wird hierauf in heißem Wasser geschmolzen und in passende Formen gegossen *). — Das Wachs ist in diesem gereinigten Zustand weiß und an dünnen Kanten durchscheinend, es besitzt weder Geruch noch Geschmack, sein spec. Gewicht ist 0,96, bis 0,966. Es schmilzt bei $+68^{\circ}$, wird aber bei $+30^{\circ}$ weich und biegsam, so daß es sich kneten und formen läßt. Bei 0° und darunter ist es hart und spröde. Das Bienenwachs enthält zwei Wachsarten von etwas ungleichem Verhalten. Kocht man Wachs mit Alkohol, so erhält man eine Auflösung, die beim Erkalten ein wachsartiges Fett absetzt; man fährt fort, die filtrirte, erkaltete Auflösung mit dem unaufgelösten Wachs so lange zu kochen, als dieses noch an Menge abzunehmen scheint, und läßt die Flüssigkeit nach jedem Kochen absetzen, was sie beim Erkalten absetzen kann. Der aus dem Alkohol abgesetzte Theil, nebst der geringen im kalten Alkohol aufgelöst erhaltenen Menge davon, beträgt ungefähr $\frac{2}{5}$ vom Wachs oder etwas darüber. Getrocknet und geschmolzen, bildet dieser Niederschlag ein mit dem Wachs in seinem Verhalten ziemlich gleich beschaffenes Fett, dessen spec.

*) Das Wachs kann auch durch Schmelzen in Chlorwasser oder chlo-richtsaurer Kalkerde gebleicht werden; es nimmt aber dabei Chlor auf, nach dem es beim Umschmelzen riecht, und daher, zu Lichtern angewendet, schlecht brennt. Auf den Antillen wird von einer eigenen Bienenart ein schwarzes Wachs producirt, welches nicht gebleicht werden kann.

0,969, dessen Schmelzpunkt aber nach John ist. Zur Auflösung bedarf es 16 Th. kochenden . Es wird von 24 Th. kalten und von einer ge- Menge warmen Aethers aufgelöst, aus dem es kalten niederfällt. In warmem Terpenthinöl löst leicht auf, woraus es sich beim Erkalten in wei- örnern zum Theil wieder niederschlägt. Diese , welche das eigentliche Wachs zu sein scheint, n Cerin genannt (was indessen von Chevreul's unterschieden werden muß, welches ein durch ung von Salpetersäure auf Kork gebildetes, kry- ches Fett ist). — Dasjenige, was der kochende Al- aufgelöst läßt, ist Myricin genannt worden, aus unde, weil es in größerer Menge im Wachs von *a cerifera* enthalten ist. Dieser Theil vom beträgt nicht $\frac{1}{10}$; nach dem Umschmelzen ist er hart, als das Wachs; sein spec. Gewicht kommt n des Wassers gleich, und es schmilzt, nach John, 5° bis +37, 5. Da die beiden Bestandtheile des ein größeres specifisches Gewicht haben und beide bedeutend leichter schmelzen, als das Wachs selbst, man vermuthen, daß entweder die Versuche, aus diese Resultate gezogen wurden, nicht genau ge- en, oder daß das Wachs durch Behandlung mit dem Alkohol auf irgend eine Art verändert werde. yricin bedarf 200 Th. kochenden Alkohols von und 123 Th. vom wasserfreien zur Auflösung, ist keinem bei gewöhnlicher Temperatur auflöslich. Erkalten setzt es sich in Flocken ab. Von kaltem braucht es 99 Th. zur Auflösung, weniger von m. In heißem Terpenthinöl löst es sich leicht auf ne sich beim Erkalten abzusetzen. is Wachs wird von concentrirter Schwefelsäure bei mperatur, wo es schmilzt, aufgelöst. Die Verbin- rstartt beim Erkalten, verhält sich aber zu Wasser, e Verbindungen der fetten Oele mit Schwefelsäure gemeinen. Salpetersäure zersetzt das Wachs sehr rig, erzeugt aber Oxalsäure damit. Von kaustischen

Alkalien wird es in eine Art Seife verwandelt; aber diese Verbindung ist in Wasser schwer auflöslich, und scheidet sich auf der Oberfläche der Flüssigkeit in Gestalt eines Rahmes ab, der sich zu einer sehr harten Seife zusammenschmelzen läßt. Säuren scheiden daraus das Wachs mit fast unveränderten Eigenschaften aus. Das Wachs löst sich nicht in kaltem, aber in 10 Theilen kochendem Aether auf.

Das Wachs wird bisweilen durch Einnengung von Mehl verfälscht, was man durch Schmelzen entdeckt. Bisweilen wird es mit Talg versetzt, was weniger leicht zu entdecken ist, wenn die Menge des letzteren gering ist. Man soll es an dem Talggeruch erkennen können, den der glimmende Docht eines aus solchem Wachse gezogenen Lichts nach dem Ausblasen verbreitet.

In der Heilkunde wird das Wachs zu Pflastern und Salben, zu sogenannten Bougien u. a. m., gebraucht. In den Künsten hat es mannichfache Anwendung, aber seine allgemeinste ist die zu Lichtern.

Myrthenwachs wird durch Auskochen der Beeren verschiedener Myrthenarten mit Wasser, vorzüglich der *Myrica cerifera*, erhalten. Das so erhaltene Wachs ist grünlich, wird aber durch Umkochen mit Wasser weniger gefärbt, und durch Bleichen in der Sonne zuletzt weiß. Es ist bei gewöhnlicher Temperatur härter als Bienenwachs und läßt sich pulvern; in der Wärme läßt es sich weniger gut kneten, und bei $+43^{\circ}$ schmilzt es. Sein spec. Gewicht ist 1,015. Durch Behandlung mit 20 Th. kochenden Alkohols wird es in 87 Proc. sich auflösendes Cerin und 13 Proc. unauflöst bleibendes Myricin zerlegt. Die gesättigte Auflösung von Cerin in Alkohol wird beim Erkalten durch Absetzung des Cerins gallertartig. Es wird wenig von kaltem, aber vollständig von 4 Th. kochendem Aether aufgelöst, woraus beim Erkalten das Meiste niederfällt. War das Wachs ungebleicht, so bleibt die überstehende Auflösung grün. Kaltes Terpenthinöl erweicht dasselbe; kochendheißes löst $\frac{1}{17}$ davon auf. Im Uebrigen verhält es sich zu Säuren und Alkalien

412 Seifenbildungs-Prozess und seine Producte.

bar. Von der Sonne und von Chlor wird es gelblich und auch fester. Säuren zerstören seine Farbe ebenfalls. Kaustisches Alkali verwandelt es in Seife. Es ist, auch in Alkohol und Aether, auch in fetten und flüchtigen Oelen auflöslich. — Wenn die Pflanzen in Saamen übergegangen sind, und zu trocknen und die Farbe zu verändern anfangen, verliert dieses grüne Wachs seine Farbe, wird gelb und dem Bienenwachs ähnlicher als zuvor. Dieser Gegenstand ist inzwischen noch sehr unbedeutend untersucht, obgleich die grünfärbende Substanz im Pflanzenreich wohl eine besondere und ausführliche Untersuchung verdiente. Deshalb weichen auch die Angaben darüber so sehr von einander ab. Nach dem einen Schreiber wird das grüne Wachs von kochendem Wasser aufgelöst und schlägt sich beim Erkalten wieder nieder, nach einem andern ist es unauflöslich; nach dem einen wird seine Auflösung in Alkohol vom Wasser gefällt, nach dem andern nicht; nach dem einen löst es sich in kaustischem Kali mit grüner, nach dem andern mit gelber Farbe auf, u. s. w. Die erste, hierbei sich darbietende Frage ist natürlicherweise: ob die Farbe dem Fette angehöre, oder ob sie, wie Indigo, ein besonderer, mit dem Fette verbundener Farbstoff sei; und die zweite Frage ist: ob nicht dieses mit der Farbe vereinigte Fett von ungleichen Pflanzen auch von bedeutend ungleicher chemischer Beschaffenheit sein könne, und dadurch der Umstand gerechtfertigt werde, daß es bald zu Wachs, bald zu Harz gezählt worden ist.

Seifenbildungs-Prozess und seine Producte.

Werden fette Oele mit kaustischem Alkali digerirt, so entsteht eine in Wasser auflösliche Verbindung, welche man Seife nennt. Dieselbe ist schon von Alters her bekannt; Plinius erwähnt ihrer schon unter dem Namen von *Sapo*, was man von dem alten germanischen Sape ableitet; die Römer lernten ihre Bereitung von den Galliern, aber Galenus führt an, daß die Germanen eine bessere Seife machten, als jene. Als sich die Chemie mit diesen

Seifenbildungs-Prozess und seine Producte. 413

Gegenstand zu beschäftigen anfang, erklärte man, die Seife sei ganz einfach eine Verbindung von Fett und Alkali. Berthollet betrachtete die Oele oder das Fett als saure Körper, die sich mit den Basen verbänden, ihre basischen Eigenschaften neutralisirten und eine Art Salze bildeten. Scheele hatte bei der Bereitung von Bleipflaster, welches durch die Verbindung der fetten Oele mit Bleioxyd entsteht, entdeckt, daß sich dabei eine eigene zuckerartige Substanz bildete, welche er *Principium dulce oleorum* nannte, und mehrere Chemiker hatten bemerkt, daß das Oel, mit einer Salzbasis verbunden und wieder durch eine Säure abgeschieden, dadurch veränderte Eigenschaften bekommen hatte, in Alkohol auflöslicher geworden, und nun mit Salzbasen leichter in Seife zu verwandeln war. Aber was man auf diese Art wußte, war die Folge von zufälligerweise gemachten, mit Vermuthungen untermischten Beobachtungen. So glaubte man z. B., daß bei der Seifenbildung der Zutritt der Luft nothwendig sei, und daß sich dabei das Oel mit Sauerstoff vereinige. Zuletzt ist dieser Gegenstand von Chevreul untersucht und erforscht worden *). Er richtete seine Aufmerksamkeit auf eine fein zertheilte, leichte und stark perlmutterglänzende Materie, welche entsteht, wenn gewöhnliche Seife in einer großen Menge Wassers aufgelöst wird, und die sich besonders deutlich beim Umrühren der Auflösung im Sonnenlichte zeigt. Er schied diese Materie, die er, wegen ihres Perlmutterglanzes, Margarin nannte, ab, und fand sie bei näherer Untersuchung zusammengesetzt aus Kali oder Natron und einem eigenen Fett, welches deutlich saure Eigenschaften besaß und sich leicht in warmem Alkohol auflöste. Er gab ihr daher den Namen Margarinsäure. Diese ersten Beobachtungen wurden im J. 1813 gemacht, und bildeten die Basis von einer Arbeit, die ihn 10 Jahre lang beschäftigte, und bei der er den Seifenbildungs-Prozess und seine Producte zum Gegenstand einer Reihe

*) *Recherches chimiques sur le corps gras d'origine animale. Paris 1823.*

414 Seifenbildungs-Prozess und seine Producte

von Versuchen machte, von denen man sagen kann, daß sie die beste und am vollständigsten ausgeführte chemische Untersuchung ausmachen, welche die Chemie aufzuweisen hat, und bei der wohl kaum mehr eine Frage zu beantworten übrig geblieben ist. Sie ist ein Muster für jüngere Chemiker, welche sich die Erforschung irgend eines weniger bekannten Theiles der Chemie vorgesetzt haben. Chevreul entdeckte dabei nicht weniger als 8 neue Säuren, so wie mehrere vorher unbekannte Producte der Seifenbildung, und bestimmte ihre Eigenschaften und Zusammensetzung. Fast Alles, was ich hier über diesen Prozess und seine Producte anführen werde, ist seine Entdeckung und aus seiner Arbeit geschöpft.

Wenn 2 Th. Baumöl mit 1 Th. in dem doppelten Gewichte Wassers aufgelöstem Hydrat von Kali oder Natron vermischt und 24 bis 48 Stunden lang digeriren gelassen werden, während man von Zeit zu Zeit umrührt, so vereinigt sich das Oel mit dem Alkali, und man erhält eine Seife, welche auf einer Auflösung in Wasser schwimmt. Diese, an sich in Wasser auflösliche Seife scheidet sich aus einer Flüssigkeit aus, welche bis zu einem gewissen Grad der Sättigung kaustisches Alkali enthält. Diese Flüssigkeit ist hier von dem zugegossenen Wasser und dem überschüssigen kaustischen Alkali gebildet.

Wird die Seife abgenommen, von der anhängenden Lauge abgespült, darauf in Wasser aufgelöst und durch Chlorwasserstoffsäure zersetzt, so scheidet diese ein halb erstarrtes Fett ab, welches auf der Flüssigkeit schwimmt. Dieses Fett ist nun nicht mehr Baumöl. Es wird vollständig von kochendem Alkohol aufgelöst, und aus der Auflösung schießen beim Erkalten glänzende Blätter von einem Fett an, welches das Lackmuspapier röthet, und alle Charaktere einer Säure hat. Durch Abdampfen der Alkohol-Auflösung scheidet sich noch mehr von derselben fetten Säure aus, und zuletzt giebt der Rückstand der Auflösung nach dem Abdampfen ein saures, aber flüssiges Fett. Dieses letztere ist Oelsäure (*Acide oleique*). Sammelt man von den Seifen der stearinreichsten Fettarten die ersten

Die letzten Krystallisationen des festen sauren Fettes aus der Alkohol-Auflösung für sich auf, löst sie wieder auf und läßt sie einzeln krystallisiren, so erhält man Krystalle, die wohl im Aeußern einander sehr ähnlich sind, die aber eine sehr ungleiche Schmelzbarkeit haben, und dadurch eine bestimmte Verschiedenheit verrathen. Das Product von der ersten Krystallisation ist am schwersten schmelzbar und wird Talgsäure (*Acide stearique*, Stearinsäure), und das Product der letzteren Margarinsäure (*Acide margarique*) genannt. Durch die Einwirkung von Alkali auf das Fett sind also drei Säuren gebildet worden, welche hinsichtlich ihrer äußeren Verhältnisse zu dem Genus der Oele oder des Fettes gehören, die aber wegen ihrer Reactionen und ihrem Bestreben, sich mit Salzbasen zu verbinden, zugleich zu den Säuren gehören, und daher die Benennung fette Säuren bekommen haben. Durch Chevreul's Versuche ist es außerdem erwiesen, daß sich bei der Seifenbildung weder Essigsäure noch Kohlensäure bilden.

Diese fetten Säuren sind nicht die einzigen Producte von der Seifenbildung. Sättigt man die alkalische Mutterlauge, aus der sich die Seife ausgeschieden hatte, so genau, wie möglich, mit verdünnter Schwefelsäure, dampft ab, bis daß sich Salz abzusetzen anfängt, und vermischt den Rückstand mit Alkohol, so schlägt dieser schwefelsaures Kali oder Natron nieder, und hinterläßt, nach dem Filtriren und Abdampfen, einen süßen Syrup, welchen wir Oelzucker, Scheele's *Principium dulce oleorum*, nennen.

Alle gewöhnlichen fetten Pflanzenöle, und aus dem Thierreich aller Talg und Schmalz, werden durch den Seifenbildungs-Prozess in die 3 fetten Säuren und Oelzucker umgewandelt, und die Verschiedenheit, welche, wie wir oben gesehen haben, hinsichtlich ihrer Zusammensetzung statt findet, veranlaßt hierbei keine andere Verschiedenheit in dem Resultate der Einwirkung des Alkali's auf das Oel, als daß das Verhältniß, sowohl zwischen diesen drei fetten Säuren unter sich, als zwischen diesen

416 Seifenbildungs-Prozess und seine Producte.

und dem Oelzucker, verändert wird. Diese Säuren dieser Oelzucker scheinen dabei vollkommen von gleicher Natur zu sein, aus welchem Oele sie auch erzeugt werden mögen. Chevreul fand bei der Seifenbildung Stearin und aus Elain, einzeln für sich *), folgende Resultate:

	Stearin.	Elain.
Margarinsäure	78,0	20,08
Oelsäure	18,4	75,92
Oelzucker	8,5	9,80
	<hr/>	<hr/>
	104,9	105,80.

Daraus folgt also, daß von den leichtschmelzbaren Fettarten mehr Oelsäure und Oelzucker erzeugt wird, als von den schwerer schmelzbaren; auch bildet z. B. Leinöl, welches nicht bei -20° erstarrt, mit kaustischem Alkali in einem weit größeren Verhältniß Oelsäure, als irgend ein anderes Oel.

Bei dem angeführten Resultate findet man, daß die Producte der Seifenbildung von 4,9 bis 5,8 auf 100 Oel wiegen, als das angewandte Oel. Die Ursache hierin liegt nicht darin, daß etwa Sauerstoff aus der Luft genommen ist, denn die Seifenbildung geht eben so in vollen Gefäßen und im luftleeren Raum wie in offener Luft vor sich, sondern sie beruht nur darauf, sowohl die fetten Säuren, als der Oelzucker, in dem Augenblicke ihrer Bildung, sich mit einer Portion Wasser zu verbinden, welches nicht anderes, als durch die Verbindung derselben mit einem anderen oxydirten Körper von ihnen getrennt werden kann. Als Chevreul auf der einen Seite die Zusammensetzung des in Seife verwandelten Fettes, und auf der anderen die Zusammen-

setz-

*) Diese Versuche wurden mit Stearin und Elain aus Menschenfett angestellt, sind aber nichts desto weniger als Beispiele angethieres Fett, welches ganz analoge Resultate giebt, verwendbar.

setzung der erhaltenen Quantitäten von fetten Säuren und Oelzucker verglich, fand er, daß der Kohlenstoffgehalt in beiden gleich, dagegen aber ein Zuschuß von Sauerstoff und Wasserstoff in dem gegenseitigen Verhältniß entstanden war, worin sie im Wasser enthalten sind, woraus also hervorgeht, daß dieser Gewichtszuschuß in nichts Anderem besteht, als in dem chemisch gebundenen Wasser der Producte von der Seifenbildung, dessen Menge in den fetten Säuren sich genau durch Versuche bestimmen läßt, was aber bei dem Oelzucker nicht möglich ist.

Aber einige Arten fetten Oeles sind so zusammengesetzt, daß sie, außer den nun erwähnten Producten der Seifenbildung, noch andere hervorbringen, welche dann gewöhnlich eine andere Art fetter, aber flüchtiger Säuren sind, die sich zu den zuvor erwähnten fetten Säuren ungefähr wie die flüchtigen Oele zu den fetten verhalten. Diese Arten von Fett finden sich vorzugsweise im Thierreich, wo die Butter ein höchst merkwürdiges Beispiel davon darbietet. Sie kommen aber auch im Pflanzenreich vor, wo die mit Aether aus dem Sabadillsaamen, so wie aus dem Saamen von *Croton Tiglium* ausgezogenen Oele, wie ich weiter unten zeigen werde, Beispiele davon geben, deren Anzahl sich gewiß noch mit der Zeit vermehren wird. — Auch das Ricinusöl bildet bei der Verseifung andere Säuren, als die übrigen Oele. Nach Bussy und Lecanu entstehen dabei 3 Säuren, von denen zwei flüssig sind, und die dritte fest und in Alkohol weniger leicht auflölich ist.

Noch andere Fettarten sind so zusammengesetzt, daß sie nicht in Seife verwandelt werden können, und also nicht von den Alkalien angegriffen werden. Auch hiervon finden sich mehr im Thierreich als im Pflanzenreich, in welchem letzteren das durch Alkohol aus dem Senföl ausgezogene krystallisirende Fett (pag. 403.) ein Beispiel hiervon giebt.

Ob man die Oele aus diesen Körpern, z. B. aus den drei fetten Säuren und Oelzucker, zusammengesetzt betrachten soll, etwa so wie man mehrere Naphthaarten als

418 Seifenbildungs-Prozess und seine Producte.

aus Alkohol und einer Säure zusammengesetzt ansieht, oder ob sie bei der Seifenbildung aus den Bestandtheilen des Oeles erzeugt werden, ohne vorher darin fertig gebildet vorhanden zu sein, ist eine Frage, die, wenigstens gegenwärtig, von geringer Wichtigkeit ist, da sich uns kein Weg zu ihrer Ausmittelung darbietet; und so lange nicht die erstere Ansicht, durch Erzeugung der Oele aus den fetten Säuren und Oelzucker, erwiesen werden kann, möchte die letztere den Vorzug verdienen *).

Hinsichtlich des ungleichen Vermögens der einzelnen Basen, aus Oelen Seife zu bilden, übertreffen Kali und Natron die übrigen sehr bedeutend, und mit diesen Basen geht die Seifenbildung viel rascher, als mit den übrigen vor sich. Die dazu erforderliche Quantität ist gerade dieselbe, welche eben zur richtigen Neutralisation der aus den Bestandtheilen der Oele erzeugten fetten Säuren notwendig ist; sie ist nach der ungleichen Zusammensetzung der Oele etwas veränderlich, jedoch nur in dem Verhältnisse, daß man sie zwischen 15 und 20 Proc. vom Gewicht des Fettes Kali und 10 bis 14 Proc. Natron, beide in wasserfreiem Zustand gerechnet, bestimmen kann. Will man ein Oel in Seife verwandeln, so setzt man gewöhnlich etwas mehr kaustisches Alkali zu, als zur Seifenbildung erforderlich ist, weil, nachdem diese vor sich gegangen ist, die neugebildete Seife bei einem gewissen Concentrationsgrad der Flüssigkeit sich von der Mutterlange abscheidet und davon weggenommen werden kann. Wendet man dagegen die eben erforderliche Menge an, so bildet sich die Verbindung langsamer und bleibt in der Flüssigkeit aufgelöst.

Kocht man ein fettes Oel lange mit nur der halben,

*) Chevreul macht die Bemerkung, daß diese Oelbildung deshalb nicht glücken werde, weil der Oelzucker und die fetten Säuren nicht im wasserfreien Zustand mit einander in Berührung gebracht werden könnten. Aber im Allgemeinen reducirt sich diese Frage darauf, daß man einen jeden organischen Körper zunächst aus dem zusammengesetzt betrachtet, in was er durch Reagentien zerlegt wird.

zur Seifenbildung nöthigen, Quantität Basis, so wird zuletzt, wenn die Masse einen gewissen Grad von Concentration erlangt hat, alles Oel aufgelöst. Diese Masse ist nun eine emulsionsartige Auflösung, welche die eine Hälfte des angewendeten, noch nicht veränderten Oeles in der Seife von der andern Hälfte aufgelöst enthält. Sie wird beim Erkalten unklar, und ist in kochendem Alkohol fast vollkommen auflöslich. Wird sie mit Wasser verdünnt und gekocht, so scheidet sich ein weißes Fett aus, welches das unzersetzte Oel ist, innig mit einer Portion zweifach margarinsäuren und ölsäuren Alkali's vermischt, welche letztere mittelst kochendem Alkohols aus dem Oele ausgezogen werden können.

Das Ammoniak besitzt ein weit schwächeres Vermögen, Seife zu bilden; ich erwähnte, daß es mit dem Oel eine Art von Verbindung eingeht, im Aeufseren ähnlich einer dicken Milch; woraus aber das Oel, sowohl durch Verdunstung des Alkali's in offener Luft, als durch Säuren, unverändert abgeschieden wird. Indessen wenn dieses Gemische lange, das heißt mehrere Monate, in verschlossenen Gefäßen stehen bleibt, so wird endlich durch die Einwirkung des Alkali's das Fett in eine wirkliche Ammoniakseife umgewandelt.

Die Hydrate von Baryterde, Strontianerde und Kalkerde verwandeln das Oel im Kochen sehr leicht in Seife, und die mit den fetten Säuren gebildete Verbindung, welche in Wasser unauflöslich ist, schwimmt auf der Oberfläche der Flüssigkeit, während der Oelzucker mit dem Ueberschuß von Hydrat in der Flüssigkeit aufgelöst bleibt.

Das Hydrat der Talkerde, mit dem gleichen Gewichte fetten Oels in Wasser gekocht, vermischt sich so innig mit dem Oel, daß sie auf keine andere Art, als durch Zusatz einer Säure, welche die Erde auflöst, von einander getrennt werden können. Diese innige Vermischung gleicht in etwas der emulsionsartigen Verbindung des Ammoniaks mit den Oelen. Wird das Gemische einige Zeit lang anhaltend gekocht, so tritt auch hier Seifenbildung ein, und man bekommt eine Talkerdeseife, schwimmend auf einer

420 Seifenbildungs - Prozess und seine Producte.

gelben, bitter schmeckenden Flüssigkeit, welche Oelzucker und eine Portion ölsaurer Talkerde, wovon sie ihren bitteren Geschmack hat, so wie einen gelben Farbstoff enthält. Wasserfreie kaustische Talkerde wirkt nicht auf das Oel.

Die Hydrate der eigentlichen Erden verwandeln das Oel nicht in Seife.

Unter den Metalloxyden haben Zinkoxyd und Bleioxyd die Eigenschaft, unauflöslche Seifenarten mit den Oelen zu bilden, wenn sie mit diesen und Wasser gekocht werden. Das Kupferoxyd besitzt diese Eigenschaft nicht. Mit den übrigen ist es zwar noch nicht untersucht, aber es ist auch wenig wahrscheinlich, daß andere, als Eisenoxydul- und Manganoxydulhydrat, diese Eigenschaft haben sollten. Letztere würden natürlicherweise nur bei völliger Abhaltung der Luft diese Wirkung hervorbringen können.

Kohlensaure feuerbeständige Alkalien, selbst in Form von zweifach kohlensauren, verwandeln die Oele langsam und bei anhaltendem Kochen in Seife. Diese Seifenbildung geht jedoch zu langsam und zu unvollständig vor sich, als daß sie beim Seifensieden im Großen in Betracht käme. Sie gründet sich darauf, daß das zweifach kohlensaure Alkali durch's Kochen zersetzt wird, und das gewöhnliche kohlensaure Alkali anfangs das Oel zu einer emulsionsartigen Auflösung aufnimmt, sich aber nachher durch Seifenbildung nach und nach zur Hälfte in Seife und zur Hälfte in zweifach kohlensaures Salz verwandelt, das wiederum während des Kochens unauflöslich zersetzt wird. Selbst kohlensaures Ammoniak verwandelt mit der Länge der Zeit eine Portion Oel in Seife.

Auch Borax und die entsprechende Verbindung der Borsäure mit Kali verwandeln, durch anhaltendes Kochen, eine Portion fettes Oel in Seife, während das Salz zu zweifach borsauerm wird.

Ich komme nun zur Beschreibung der einzelnen Producte der Seifenbildung.

A. Eigentliche fette Säuren, d. h. solche, welche bei der Destillation mit Wasser nicht mit übergehen.

a. T a l g s ä u r e (Stearinsäure).

Obgleich es von dieser Säure noch nicht erwiesen ist, daß sie ein Product der Seifenbildung von fetten Pflanzenölen sei, da noch keine Versuche hierüber angestellt sind, so hat man doch Ursache sie darunter zu vermuthen. Chevreul stellte sie aus Hammeltalg, Schweineschmalz u. s. w. dar; da aber die Producte der Seifenbildung mit thierischem Fett hinsichtlich ihrer Qualität dieselben wie die von fetten Pflanzenölen sind, so darf man die Talgssäure in der Seife z. B. vom Stearin des Baumöls, der Cacaobutter erwarten. Zur Bereitung der Talgssäure wendet man am besten eine Seife aus Hammeltalg und Kali an. Ein Theil von solcher Seife wird in 6 Th. warmen Wassers aufgelöst, hierzu dann 40 bis 45 Th. kalten Wassers zugemischt, und das Ganze nun an einem zwischen $+12^{\circ}$ und 15° warmen Orte stehen gelassen. Dabei setzt sich eine perlmutterglänzende Materie ab, die aus einem Gemenge von zweifach talgsaurem und margarinsaurem Kali besteht. Sie wird auf's Filtrum genommen und gewaschen. Die durchgelaufene Flüssigkeit wird abgedampft und mit etwas freier Säure vermischt, so daß das in der Flüssigkeit durch die Fällung der zweifach talg- und margarinsauren Salze freigewordene Kali gerade gesättigt wird. Man verdünnt sie hierauf wieder mit Wasser, wobei sie noch mehr zweifach talg- und margarinsaures Salz giebt. Durch vorsichtiges Wiederholen dieser Operation gelangt man endlich dahin, daß die Auflösung nur ölsaures Alkali enthält. — Die niedergeschlagenen, ausgewaschenen Salze werden getrocknet und in Alkohol von 0,82 aufgelöst, wozu ungefähr das 20 bis 24fache Gewicht Alkohols nöthig ist. Beim Erkalten scheiden sie sich wieder aus dem Alkohol ab, ler nur ein wenig zweifach ölsaures und zweifach mar-

garinsaures Kali aufgelöst enthält, welches letztere durch Abdampfung der Auflösung zu einem geringeren Volum gewonnen wird. Die zweifach talg- und margarinsauren Salze werden wieder in kochendheißem Alkohol aufgelöst und anschließen gelassen; es bleibt dabei jedesmal immer mehr margarinsaures Alkali im Alkohol aufgelöst, und das Angeschossene besteht zuletzt nur aus zweifach talgsaurem Kali. Eine Probe, daß man diesen Punkt erreicht hat, ist, daß wenn man eine kleine Menge vom Salz im Kochen durch Chlorwasserstoffsäure zersetzt und nach dem Erkalten bis zu $+50^{\circ}$ in ein Gefäß mit Wasser bringt, welches allmählich erhitzt wird, die fette Säure nicht eher schmilzt, als bis das Wasser $+70^{\circ}$ warm geworden ist. Schmilzt sie eher, so enthält sie noch Margarinsäure, und das Salz muß dann noch weiter in Alkohol aufgelöst und umkrystallisirt werden. — Nachdem man reines talgsaures Kali gewonnen hat, zersetzt man es durch Kochen mit Chlorwasserstoffsäure und Wasser, läßt die Talgssäure dann erstarren, sammelt sie, und wäscht sie durch Umschmelzen in reinem Wasser von anhängender Chlorwasserstoffsäure aus.

Die Talgssäure kann nicht in isolirter Gestalt dargestellt werden. Die auf diese Weise erhaltene Säure ist wasserhaltig. Sie besitzt weder Geschmack noch Geruch. In der Wärme geschmolzen, erstarrt sie bei $+70^{\circ}$ zu Gruppen von glänzenden, weißen, in einander verwebten Nadeln. Sie ist unauflöslich in Wasser, löst sich aber in kochendem wasserfreien Alkohol in allen Proportionen auf; gleiche Theile Säure und kochendheißer Alkohol schießen, beim Erkalten bis zu $+50^{\circ}$, in glänzenden Schuppen an, und bei $+45^{\circ}$ geseht die Auflösung gänzlich. Aus einer verdünnteren Auflösung in Alkohol schießt sie in großen, glänzenden, weißen Schuppen an. Sie wird von gleichen Theilen kochendheißem Aethers von 0,727 aufgelöst, und krystallisirt beim Erkalten in schönen perlmutterglänzenden Blättern. Im luftleeren Raum kann sie unverändert überdestillirt werden, enthält aber in Gefäß atmosphärische Luft, so wird sie einem sehr

ingen Theile nach bei der Destillation zersetzt, das äste geht unverändert, aber bräunlich und mit Spuren a brenzlichem Oel vermischt, über. In offener Luft ert, brennt sie wie Wachs.

Das Verhalten der Talgssäure, und der fetten Säuren Allgemeinen, zu Schwefel und Phosphor ist unbekannt.

t concentrirter Schwefelsäure vereinigt sie sich leicht d die Verbindung kann krystallisirt erhalten werden.

wird von Wasser gefällt. Bei höherer Temperatur setzen sie sich einander. Salpetersäure greift die Talg-

re in der Kälte nicht an, aber in der Wärme löst sie selbe allmählich unter Entwicklung von Stickstoffoxyd-

auf. Unterbricht man die Operation, wenn alle Talg- re aufgelöst ist, und dampft im Wasserbade zur Trockne

so bleibt eine saure, gelbe, dicke, mit Krystallen un- mengte Masse zurück. Sie besteht aus einer eigenen

re, vermischt mit einem ölartigen, der Oelsäure äbn- ten Körper. Wird die Masse mit 25 bis 30 Th. kal-

Wassers behandelt, so löst sich die Säure auf, die n nach dem Abdampfen in kleinen, verworrenen, blät-

gen Krystallen erhält; sie scheint eine eigenthümliche re zu sein. Sie bildet sich auch durch Behandlung

Talg mit Salpetersäure. Sie ist scharf sauer, schmeckt h angebranntem Bernstein, schmilzt in der Wärme,

ht auf Papier Fettflecke, und läßt sich größtentheils erändert sublimiren. Zur Auflösung bedarf sie zwi-

en 20 und 25 Th. kalten Wassers. Mit den Basen bil- sie eigene Salze, wovon die meisten in Wasser auf-

ich sind. Mit Baryterde, Bleioxyd, Silberoxyd, Zink- d und Manganoxydul bildet sie aus concentrirten Auf-

ingen, durch doppelte Zersetzung, Niederschläge, wel- durch Zusatz von mehr Wasser wieder verschwinden.

Die wasserhaltige Talgssäure besteht aus 96,6 Proc. re und 3,4 Proc. Wasser, welches durch Vereinigung

Säure mit Bleioxyd abgeschieden werden kann. Die serfreie Säure besteht aus:

	Nach d. Versuchen.	Atome.	Nach d. Rechnung
Kohlenstoff	80,145	70	79,963
Wasserstoff	12,478	185	12,574
Sauerstoff	7,377	5	7,463.

Ihr Atom wiegt 6699,5, und ihre Sättigungscapacität ist 2,99, d. h. in ihren neutralen Salzen verhält sich der Sauerstoff der Säure zum Sauerstoff der Base wie 5:2, und sie steht daher mit Phosphorsäure und Arseniksäure in gleicher Kategorie.

Die talgsauren Salze können durch Verbindung der Talgsäure mit Salzbasen, und zwar die auflösbaren unmittelbar, und die unauflösbaren durch doppelte Zersetzung hervorgebracht werden. Die Talgsäure treibt im Kochen die Kohlensäure aus, aber bevor dies z. B. mit kohlen-saurem Kali geschieht, löst sich zuerst eine Portion Talgsäure in der Flüssigkeit auf. Dies gründet sich darauf, daß die Talgsäure das Salz zuerst in zweifach kohlen-saures verwandelt und dieses sich nachher beim Kochen zersetzt.

Talgsaures Kali. a) Neutrales, wird erhalten durch Digestion der Säure mit einer Auflösung von gleichviel Kalihydrat in 20 Th. Wassers. Beim Erkalten der Flüssigkeit setzt sich das neutrale Salz in Körnern aus, und in der Flüssigkeit bleibt freies Kali. Man scheidet das Salz ab, preßt davon die Mutterlauge gut aus, und löst es hierauf in dem 15 bis 21fachen Gewichte kochenden Alkohols von 0,821 auf. Beim Erkalten schießt das Salz in kleinen, weißen, glänzenden Krystallschuppen an. Es fühlt sich weich an und schmeckt schwach alkalisch. Es verändert sich nicht in der Luft und schmilzt nicht bei $+100^\circ$. Mit 10 Th. kalten Wassers vermischt, schwillt es allmählich zu einer schleimigen Masse auf, welche bei $+99^\circ$ zu einer klaren, nach dem Erkalten wieder schleimig werdenden Flüssigkeit zergeht. Dies rührt davon her, daß das Wasser das Salz zersetzt und zweifach talgsaures Kali abscheidet; ist aber die Menge des Wassers geringer, d. h. übersteigt sie nicht das 10 bis 50fache Gewicht des

zes, so kann es durch Kochen darin aufgelöst werden, er beim Erkalten zersetzt es sich wieder. Wird 1 Th. antrales, in 20 Th. kochenden Wassers aufgelöstes Salz mit 1000 Th. kalten Wassers oder darüber vermischt, so ist eine in der Flüssigkeit perlmutterglänzende Materie, welche beim Aufsammeln diesen Glanz verliert und fast zweifach talgsaures Kali ist. Eine gleiche Zersetzung erleidet das Salz beim Auflösen in Alkohol und Vermischen mit großen Mengen Wassers, oder beim Übergießen des krystallisirten Salzes mit 3000 — 5000 Th. kalten Wassers; es wird dann nicht schleimig, sondern zerfällt das saure Salz in Gestalt der Krystallschuppen in neutrales. In allen diesen Fällen nimmt das Wasser mit Kali mit unbedeutenden Spuren von Talgssäure auf. Es löst sich in $6\frac{2}{3}$ Th. kochenden wasserfreien Alkohols auf. Bei $+66^\circ$ bedarf es 10 Th. Alkohol von 0,821; bei $+55^\circ$ wird die Auflösung unklar, und bei $+38^\circ$ färbt sie. 100 Th. kalten Alkohols dagegen lösen nicht mehr als 0,432 Th. Salz auf. Von Aether wird es, selbst nach Kochen, sehr unbedeutend aufgelöst; 100 Th. kochenden Aethers nehmen nicht 0,16 Th. Salz auf, und es färbt sich nicht beim Erkalten. Das Aufgenommene ist einfach talgsaures Kali, und das Unaufgelöste enthält einen Ueberschuß vom Alkali. Wasser und Aether zerlegen also das Salz auf entgegengesetzte Weise; ersteres zerlegt daraus eine Portion Base, und letzterer eine Portion Säure auf. Alkohol dagegen verändert seine Neutralität nicht auf bemerkenswerthe Art.

b) Zweifach talgsaures Kali wird, wie schon erwähnt wurde, dadurch erhalten, daß man das neutrale Salz durch Vermischung mit 1000 Th. Wassers oder davor zersetzt. Es wird ausgeprefst, getrocknet und in kochendem Alkohol aufgelöst, woraus es beim Erkalten in kleinen, silberglänzenden, geruchlosen, sich zart anfühlenden Schuppen anschießt. Dieses Salz schmilzt nicht bei $+100^\circ$. Es besteht aus 1 Atom neutralem Salz, verbunden mit 1 Atom wasserhaltiger Säure, und kann von diesem Wasser nicht anders, als durch Zusatz einer an-

deren Basis befreit werden. Man kann es also als Doppelsalz mit Kali und Wasser zu Basen betrachten. Dieses Salz wird nicht von kaltem Wasser verändert, es aber mit 1000 Th. Wassers gekocht, so entsteht eine milchichte, unklare Flüssigkeit, welche aus einer feinsten aufgelösten neutralen, und einer Portion aufgeschwemmten noch saureren Salzes besteht. Diese Auflösung zwischen $+75^{\circ}$ und 72° weniger unklar, fast halbtransparent, fängt aber bei $+67^{\circ}$ wieder an sich zu trüben, was bis zu $+24^{\circ}$, dem Maximum der Trübung, fortwährend Kochendheiß filtrirt, läßt die Auflösung des noch sauren Salzes auf dem Filtrum zurück, welches bei erneuten Versuchsungen mit Wasser zuletzt ein vierfach talgsaures Kali zurückläßt. (Dieses bildet dann einen, im kochenden Wasser schmelzenden, öartigen Körper, der beim Erkalten erstarrt, in kaltem Wasser stark aufschwillt, in kochendem Alkohol aufgelöst, zweifach talgsaures Kali, mit Hinterlassung von freier Talgsäure (Lösung, absetzt.) 100 Th. wasserfreien Alkohols im Kochen 27 Th. zweifach talgsauren Kali's aufzulösen, geben aber bei $+24^{\circ}$ nicht mehr als 0,36 Th. auf, wobei diese Portion, durch die Neigung des Alkohols, das Salz in neutrales zu verwandeln und die Talgsäure aufgelöst zu behalten, etwas mehr Talgsäure enthält, als herauskrystallisirende. Eine Auflösung von zweifach talgsaurem Kali in Alkohol reagirt nicht auf Hematin-Farbstoff aus dem Campeschenholz), wird aber ein mit gefärbte Alkoholauflösung mit Wasser vermischt, entsteht ein Niederschlag, welcher viel vierfach talgsaures Kali eingemengt enthält, und die Flüssigkeit zeigt eine alkalische Reaction. Löst man das Salz in einem schwächeren, kochendheissen Spiritus auf, und verdunstet diese Auflösung tropfenweise mit einer blauen Lösung von Lackmus, so röthet sich die Farbe des letzteren durch den Ueberschuß von Säure im Salze. Wird diese Flüssigkeit mit viel Wasser vermischt, so wird die Flüssigkeit wieder blau, indem sich das saure talgsaure Salz in Wasser schlägt, und gewöhnlich freies Alkali in der Flüssigkeit

Ist dagegen das talgsaure Salz in wasserfreiem Alkohol aufgelöst, so wird er durch die ersten zugesetzten Pfropfen von Lackmusinfusion nicht roth, weil der concentrirte Alkohol die Einwirkung des zweifach talgsauren Salzes auf die mit der Farbe vom Lackmus verbundene Base zu verhindern scheint. Nach einem gewissen Zusatz von Wasser wird die Flüssigkeit, ohne gefällt zu werden, rothblau, und von noch mehr wird sie gefällt wird blau. Aether, mit zweifach talgsaurem Kaliumoxyd, zieht Talgssäure mit höchst unbedeutenden Spuren vom Kalisalz aus, und verwandelt das Salz zuletzt in freies Alkali.

Talgsaures Natron: a) Neutrales, wird eben wie das Kalisalz dargestellt. Nach der Auflösung in 10 Th. kochenden Alkohols, geseht die Flüssigkeit beim Abkühlen zu einer gallertartigen Masse, die sich gleich weiter in kleine, glänzende, halb durchsichtige Blätter zerfallende Krystalle verwandelt, die anfangs geschmacklos zu sein scheinen, nachher aber alkalisch schmecken. Von

Luft wird es nicht verändert, bei höherer Temperatur schmilzt es, und wird von kaltem Wasser nur sehr langsam und unbedeutend angegriffen. In 10 Th. kochendheißem Wasser löst es sich zu einer dicken, halb durchsichtigen Masse auf, die bei $+62^{\circ}$ erstarrt und undurchsichtig wird. Mit 40 Th. kochendheißem Wasser vermischt, löst sie sich auf und kann filtrirt werden. Nach der Auflösung dann mit 2000 Th. Wassers vermischt, schlägt sich zweifach talgsaures Natron nieder, und das Wasser behält nur Natron aufgelöst. 1 Th. talgsaures Natron wird von 20 Th. kochenden Alkohols von 0,821 Th. aufgelöst, die Auflösung fängt bei $+71^{\circ}$ bis 69° an unvollständig zu werden, geseht dann und giebt zuletzt vorzüglich glänzende Krystalle. 100 Th. Alkohol können bei $+10^{\circ}$ nicht mehr als 0,2 Th. talgsaures Natron aufgelöst behal-

ten. Aether mit $\frac{1}{100}$ seines Gewichts Salz gekocht, wird nach dem Erkalten etwas unklar, hat aber, auf 100 Th., nicht mehr als 0,15 Th. Salz aufgenommen, welches Ueberschuss Talgssäure enthält. b) Zweifach talgsaures Natron,

auf die erwähnte Art bereitet, wird durch Auflösung in kochendheißem Alkohol krystallisirt erhalten. Es ist leichter schmelzbar, als das neutrale Salz, ist in Wasser unauflöslich und in Alkohol leicht auflöslich.

Talgsaures Ammoniak entsteht, wenn man Talgssäure einer Atmosphäre von Ammoniakgas so lange ausgesetzt läßt, als noch Gas absorhirt wird. Das Salz ist weiß, fast geruchlos, alkalisch schmeckend, in einer Atmosphäre von Ammoniakgas sublimirbar, wobei während der Sublimation eine Portion Ammoniakgas entwickelt, aber beim Erkalten wieder aufgenommen wird. In Luft enthaltenen Gefäßen destillirt, giebt es zuerst Ammoniak, und hierauf ein brenzliches saures talgsaures Ammoniak. In heißem, freies Ammoniak enthaltendem Wasser löst es sich auf, und setzt beim Erkalten glänzende Schuppen wahrscheinlich von zweifach talgsaurem Ammoniak ab.

Talgsaure Baryterde, Strontianerde und Kalierde erhält man am besten durch doppelte Zersetzung mittelst einer kochendheissen Auflösung vom Kalisalz und den ebenfalls kochendheissen Auflösungen irgend eines neutralen Salzes von diesen Erden. Sie bilden unauflösliche, geschmack- und geruchlose, weiße Pulver, welche bei stärkerem Erhitzen schmelzen. Talgsaures Bleioxyd: a) Neutrales, wird durch doppelte Zersetzung mit salpetersaurem Bleioxyd erhalten. Vollkommen ausgewaschen, ist es ein weißes, ganz geruch- und geschmackloses Pulver, welches beim Erhitzen schmilzt. b) Halb talgsaures Bleioxyd entsteht, wenn Talgssäure mit einer im Ueberschuß zugesetzten Auflösung von basischem essigsaurem Bleioxyd gekocht wird. Es bildet ein farbloses, sehr leicht schmelzbares Pulver, welches nach dem Schmelzen durchsichtig bleibt und sich leicht zu Pulver reiben läßt.

Die übrigen talgsauren Salze sind bis jetzt noch nicht untersucht.

β. Margarinsäure.

Die Margarinsäure wird auf folgende Art erhalten: Th. Baumölseife, am besten mit Kali zur Basis, wird getrocknet und 24 Stunden lang mit 2 Th. kaltem ohol macerirt. Dabei löst sich das ölsaure Kali im ohol auf, und das margarinsaure bleibt unauflöslich, welches mit kaltem Alkohol gut ausgewaschen und dann 200 Th. kochendem aufgelöst wird. Beim Erkalten färbt sich das margarinsaure Alkali, noch mit einer kleinen Menge ölsaurem verunreinigt, an. Man löst es wieder in ohol auf, und läßt es noch einmal krystallisiren. Man setzt dann eine Portion davon mit Chlorwasserstoffsäure, und wenn die dadurch abgeschiedene Säure nicht früher als bei $+60^{\circ}$ schmilzt, so ist das margarinsaure Salz rein. Schmilzt sie eher, so enthält sie noch Oelsäure, und das Salz muß daher wieder aufgelöst und umkrystallisirt werden. Man erhält dasselbe auch durch Behandlung der Seife mit Wasser, so wie bei der Talgsäure erwähnt wurde, wobei sich zweifach margarinsaures Kali niederschlägt, das man hierauf mit Alkohol behandelt und so wieder umkrystallisirt, bis daß eine Portion daraus abgetrennter Säure nicht früher als bei $+60^{\circ}$ schmilzt.

Man zersetzt das reine margarinsaure Salz im Kochen mit Chlorwasserstoffsäure, wodurch sich die Margarinsäure in der Gestalt eines Oeles abscheidet. Man läßt sie erstarren, wäscht die saure Mutterlauge ab, schmilzt die Säure noch einmal in reinem Wasser, löst sie in kochendheißem Alkohol auf, und läßt die Auflösung langsam erkalten, wodurch die Säure in Krystallen anschießt. Diese Säure ist in ihren Verhältnissen der Talgsäure vollkommen ähnlich, in der sie sich nur durch ihre leichtere Schmelzbarkeit und durch ihre kleineren, dichter verwebten und weniger glänzenden Krystalle unterscheidet. Sie ist in Wasser unlöslich, in Alkohol und in Aether sehr leicht auflöslich; sie röthet das Lackmuspapier und zersetzt mit Hülfe der Wärme die kohlen-sauren Alkalien. Sie kann über-

auf die erwähnte Art bereitet, wird durch Auflösung in kochendheißem Alkohol krystallisirt erhalten. Es ist leichter schmelzbar, als das neutrale Salz, ist in Wasser auflöslich und in Alkohol leicht auflöslich.

Talgsaures Ammoniak entsteht, wenn man Talg- säure einer Atmosphäre von Ammoniakgas so lange aus- setzt läßt, als noch Gas absorhirt wird. Das Salz ist weiß, fast geruchlos, alkalisch schmeckend, in einer Atmosphäre von Ammoniakgas sublimirbar, wobei während der Sublimation eine Portion Ammoniakgas entwickelt, aber beim Erkalten wieder aufgenommen wird. In Luft enthalten- den Gefäßen destillirt, giebt es zuerst Ammoniak, und hierauf ein örenliches saures talgsaures Ammoniak. In heißem, freies Ammoniak enthaltendem Wasser löst es sich auf, und setzt beim Erkalten glänzende Schuppen, wahrscheinlich von zweifach talgsaurem Ammoniak ab.

Talgsaure Baryterde, Strontianerde und Kal- erde erhält man am besten durch doppelte Zersetzung mittelst einer kochendheissen Auflösung vom Kalisalz und den ebenfalls kochendheissen Auflösungen irgend eines neutralen Salzes von diesen Erden. Sie bilden unauflö- liche, geschmack- und geruchlose, weiße Pulver, welche bei stärkerem Erhitzen schmelzen. Talgsaures Blei- oxyd: a) Neutrales, wird durch doppelte Zersetzung mit salpetersaurem Bleioxyd erhalten. Vollkommen ge- gewaschen, ist es ein weißes, ganz geruch- und geschmack- loses Pulver, welches beim Erhitzen schmilzt. b) Halb talgsaures Bleioxyd entsteht, wenn Talg- säure mit einer im Ueberschufs zugesetzten Auflösung von basisch- saurem Bleioxyd gekocht wird. Es bildet ein farblos- sehr leicht schmelzbares Pulver, welches nach dem Erhitzen durchsichtig bleibt und sich leicht zu Pulver löst.

Die übrigen talgsauren Salze sind bis jetzt noch nicht

Reinheit, bei ungleichen Temperaturen schmolzen. Bei Untersuchung der Ursache dieser ungleichen Schmelzbarkeit fand er, daß z. B. aus Menschenfett eine fette Säure erhalten würde, welche nie zu größerer Schwerschmelzbarkeit als $+60^{\circ}$ gebracht werden konnte, während er gegen aus Hammeltalg und Schweineschmalz eine abscheiden konnte, die bei $+70^{\circ}$, und eine andere, die bei $+60^{\circ}$ schmolz, worauf er dieselben einzeln untersuchte, und da in der Talgsäure weniger Sauerstoff fand, so nannte er diese anfangs margarinsäure Säure, was er später passend in Talgsäure umänderte.

Die margarinsäuren Salze haben mit den talgigen so viele Aehnlichkeit, daß man das von diesen sagte auch auf die margarinsäuren anwenden kann. Margarinsäures Kali: a) Neutrales, erhält man, wenn die Säure in dem 10fachen ihres Gewichtes kochendem Wassers, welches ein mit der Säure gleiches Gewicht Lithhydrat enthält, aufgelöst wird. Es setzt sich beim Abkühlen in Körnern ab, die weicher sind, als die vom talgigen Salze. In kochendheißem Alkohol aufgelöst, erstarrt man es beim Erkalten in Schuppen von einigem Perlglanz angeschossen, der sich indessen nach einiger Zeit, selbst in der Alkohol-Auflösung, verliert. Wird dieses Salz mit dem 10fachen Gewichte Wassers überschossen, so schwillt es darin auf und bildet eine durchscheinende Gallert, die beim Erhitzen bis zu $+70^{\circ}$ klar wird, bei $+60^{\circ}$ unklare Streifen zu zeigen anfängt, und damit langsam fortfährt, bis sie wieder bei $+15^{\circ}$ Gallert bildet. Von einer größeren Menge Wassers wird es in zwei Theile margarinsäures verwandelt. 100 Th. Alkohol von $+10^{\circ}$ können 1,21 Th. Salz aufgelöst behalten. Werden 100 Th. Alkohol von $0,821$ mit 1 Th. Salz gekocht, so erstarrt es sich auf, die Auflösung gesteht bei $+43^{\circ}$, kann bei $+40^{\circ}$, ohne auszufliessen, umgewendet werden, und erstarrt bei $+38^{\circ}$ vollkommen undurchsichtig. Aether löst dasselbe nicht auf, zieht aber $0,015$ seines Gewichtes Margarinsäure aus. In einer, bei $+12^{\circ}$ im Maximum der Dichtigkeit befindlichen Luft gelassen, ziehen 10 Th.

dieses Salzes 10,5 Th. Feuchtigkeit an, ohne flü werden. *b*) Zweifach margarinsaures Kali man aus Kaliseife durch Zersetzung des neutralen mittelst Wassers, und bildet kleine, perlmutterglä Schuppen, die weniger Glanz haben, als das ta Salz. Kochendes Wasser nimmt daraus etwas Natr 100 Th. Alkohol von 0,834 lösen, bei $+67^{\circ}$, 31, von diesem Salze auf, behalten aber bei $+20^{\circ}$ nur 0 aufgelöst. Wird die Auflösung in warmem Alko einer größeren Menge Wassers gemischt, so schl ein margarinsaures Salz mit größerem Säureüb nieder. Die beim talgsauren Salze erwähnten Fa scheinungen mit Hematin und Lackmus finden at diesem Salze statt.

! Margarinsaures Natron wird gerade so Kalisalz erhalten. Es schießt aus einer warmen sung in Alkohol in kleinen, halbdurchsichtigen B an. Es schmeckt nach einem Augenblick schwac lisch. Beim Erhitzen schmilzt es. Kaltes Wasse wenig auf dieses Salz, selbst wenn 1 Th. Salz 1 Tage lang mit 600 Th. Wasser übergossen stehen wird. In 10 Th. $+80^{\circ}$ warmen Wassers löst vollständig auf. Bei $+57^{\circ}$ wird die Auflösung unk bei $+54^{\circ}$ ist sie zu einer weißen Gallert erstarrt mit dem 100fachen Gewichte Wassers sind die Ersce gen dieselben. Das Wasser kann aus der erstarrten die ein Gemenge von neutralem Salz mit sehr w sauren ist, ausgedrückt werden. Wird aber diese k heisse Auflösung mit vielem kalten Wasser vermis wird das Salz zersetzt und scheidet zweifach margi res Natron ab. 20 Th. kochendheissen Alkohol 1 Th. neutrales Salz auf; bei $+72^{\circ}$ fängt die Au an unklar zu werden, bei $+62^{\circ}$ fängt sie an zu hen, bei $+58^{\circ}$ ist sie ganz erstarrt, und bildet e latinöse Masse und keine Krystalle, wozu eine w dünntere Auflösung nöthig ist. Bei $+100^{\circ}$ behalten Alkohol nur 0,38 Th. trocknes margarinsaures Natr gelöst. 100 Th. Aether ziehen aus dem Salze 0,

rgarinsäure aus. In mit Feuchtigkeit gesättigter Luft
 ssen, nimmt dieses Salz bei $+12^{\circ}$ höchstens 14 Th.
 chtigkeit auf 100 auf.

Margarinsaures Ammoniak erhält man sowohl
 ch Sättigung der Säure mit Ammoniakgas, als auch
 ch Auflösen derselben in schwachem kaustischen Am-
 niak; beim Erkalten schießt ein Salz in kleinen, perl-
 terglänzenden Schuppen an, welches indess ein saures

Wird die Säure in concentrirtem Ammoniak aufge-
 , so bildet sie eine gelatinöse, mehr oder weniger
 chsichtige Masse. Der Luft ausgesetzt, verliert das
 trale Salz etwas Ammoniak und wird sauer.

Margarinsaure Baryterde, Strontianerde und
 lkerde, so wie neutrales margarinsaures und
 b margarinsaures Bleioxyd werden ganz so wie
 entsprechenden talgsauren Salze bereitet, mit denen
 gleiche Verhältnisse haben.

γ. O e l s ä u r e .

Bei der Darstellung dieser Säure fängt man damit an,
 man wohl ausgetrocknete Kaliseife mit kaltem, was-
 reiem Alkohol behandelt, welcher das ölsaure Kali
 löst und das margarinsaure unaufgelöst läßt. Leinöl-
 r Hanföl-Seife enthält fast nur ölsaures Kali, und nur
 nige Procente margarinsaures. Die Auflösung wird
 dem unauflöslichen margarinsauren Salz abfiltrirt,
 h einmal abgedampft, und der Rückstand kalt mit
 geringsten zur Auflösung erforderlichen Menge was-
 reien Alkohols behandelt, von dem noch aufgelö-
 a margarinsauren Salz abgegossen; dann mit Wasser
 mischt, und im Kochen mit Weinsäure oder Chlor-
 sserstoffsäure zersetzt.

Eine andere Methode ist folgende: Man verdünnt
 e Auflösung von Kaliseife mit einer großen Menge
 assers, man sieht das dadurch niedergefallene saure
 rgarinsaure Salz ab, dampft die Flüssigkeit wieder zu
 em geringeren Volum ein, sättigt das freigewordene
 III.

Kali mit Chlorwasserstoffsäure, verdünnt wieder mit viel Wasser, filtrirt, dampft ab, sättigt mit Säure und verdünnt wieder, und wiederholt dies Alles so oft, als sich noch beim Verdünnen perlmutterglänzendes, saures margarinsaures Alkali bildet. So wie dies nicht mehr geschieht, sondern das, was sich noch absetzen sollte, schleimig und nicht perlmutterglänzend ist, wird die Auflösung abgedampft und darauf mit Chlorwasserstoffsäure in geringem Ueberschuß zersetzt.

Die abgeschiedene Säure hat das Ansehen eines Oeles und ist etwas gelblich, was von einer fremden Materie herrührt. Man trennt sie von der sauren Flüssigkeit und schüttelt sie mit warmem Wasser. Sie ist noch nicht vollkommen frei von Margarinsäure, weshalb man sie nach und nach gradweise einer niedrigeren Temperatur aussetzt. Die Margarinsäure krystallisirt dann heraus und die Oelsäure wird durch Papier davon abfiltrirt. Hierauf wird sie noch mehr abgekühlt und zuletzt bis zu 0°. Würde man die Säure auf einmal bis zu 0° abkühlen, so könnte es leicht geschehen, daß das Ganze erstarrte, und daß die Säure von dem HerauskrySTALLISIRTEN nicht getrennt werden könnte. Die bei 0° nicht erstarrte Säure ist ein farbloses Oel, welches einen gelinde ranzigen Geruch und Geschmack besitzt. Ihr spec. Gewicht ist bei +18° = 0,898. Sie geseht bei einigen Graden unter 0° zu einer weissen, aus Krystallnadeln bestehenden Masse. Im luftleeren Raum kann sie unverändert überdestillirt werden. In Berührung mit der Luft geht der grösste Theil unverändert über, aber ein Theil davon wird brenzlich, bildet brenzliches Oel und Essig, so wie Kohlensäure- und Kohlenwasserstoffgas. Von Wasser wird sie nicht aufgelöst, röthet aber die Lackmusinfusion und zersetzt beim Erhitzen die kohlen-sauren Alkalien, obgleich sie aus der Auflösung ihrer neutralen Salze von Kohlensäuregas ausgefällt wird. In Alkohol von 0,822 ist sie in allen Verhältnissen auflöslich. Von Wasser wird sie daraus niedergeschlagen, und dadurch am besten von dem ihr anhängenden gelben Farbstoff gereinigt.

Bei niedriger Temperatur vereinigt sie sich ohne Zer-
 zung mit Schwefelsäure. In der Wärme schwärzt sich
 s Gemische, und über $+100^{\circ}$ zersetzt sich die Säure,
 ter Entwicklung von schweflichtsaurem Gas, sehr schnell
 eine kohlige Masse. Mit Salpetersäure erzeugt sie die
 be krystallinische Säure, welche die Talgsäure mit der
 lpetersäure giebt.

Die Oelsäure verbindet sich mit der Margarinsäure
 d der Talgsäure in allen Verhältnissen. Bei Behand-
 og dieser Verbindung mit kaltem Alkohol, bleibt der
 öfste Theil der festen Säuren unauflöst, während die
 lsäure mit einer geringeren Quantität derselben aufge-
 mmen wird. Bei $+60^{\circ}$ löst Alkohol das ganze Gemi-
 e auf. Die festen Säuren schießen, mit Oelsäure ver-
 reinigt, an, während der grösste Theil der letzteren in
 flösung bleibt, aber verunreinigt mit ersteren. Es ist
 ht möglich, mit völliger Sicherheit zu entscheiden, wann
 n die Oelsäure absolut rein habe, und Chevreul
 lt sich nicht für völlig überzeugt, daß es ihm geglückt
 , die letzten Antheile Oelsäure von den festen Säuren,
 er die letztern Antheile Margarinsäure von der Oel-
 ure zu scheiden. Er hat, durch Ausmittlung ihres
 melzpunktes, in ungleichen Gemengen die Proportio-
 n dieser Gemenge durch folgende, auf directe Versu-
 e gegründete, Tabelle zu bestimmen gesucht:

100	0	0	0
90	10	10	10
80	20	20	20
70	30	30	30
60	40	40	40
50	50	50	50
40	60	60	60
30	70	70	70
20	80	80	80
10	90	90	90
0	100	100	100

	Margarinsäure Oelsäure	Wird unklar bei	Gesteht bei	Margarinsäure Oelsäure	Schmelzpunkt	Margarinsäure Oelsäure	Schmelzpunkt	Margarinsäure Oelsäure	Schmelzpunkt			
99	1	+ 2°	0°	74	26	35,5	49	51	44,3	24	76	49,5
98	2	7	+ 2°	73	27	36	48	52	44,5	23	77	49,8
97	3	7	3	72	28	36,5	47	53	45	22	78	50
96	4	7,5	5	71	29	37	46	54	45	21	79	50
95	5	9,5	7	70	30	37,5	45	55	45,7	20	80	50,2
94	6	11	8	69	31	38	44	56	46	19	81	50,3
93	7	15	9	68	32	38,5	43	57	46,3	18	82	50,7
92	8	15	10	67	33	38,7	42	58	46,5	17	83	51
91	9	16	14	66	34	39	41	59	46,5	16	84	51,5
90	10	21	17	65	35	39,5	40	60	46,7	15	85	51,8
89	11	25	18	64	36	39,7	39	61	47	14	86	52
88	12	26	21	63	37	40	38	62	47,7	13	87	52
87	13	26	24	62	38	40,3	37	63	47,7	12	88	52,5
86	14	27	25,5	61	39	41	36	64	47,8	11	89	52,5
85	15	28	*) 26,5	60	40	41	35	65	48	10	90	53
84	16	30	27,5	59	41	41,7	34	66	48	9	91	53
83	17	30	28,5	58	42	42	33	67	48	8	92	53,2
82	18	32	29,5	57	43	42	32	68	48,2	7	93	54
81	19	32	30,5	56	44	42,2	31	69	48,3	6	94	54
80	20	32,5	31,5	55	45	42,5	30	70	48,5	5	95	54
79	21	35	32	54	46	43	29	71	48,5	4	96	54,2
78	22	35	33	53	47	43,5	28	72	48,5	3	97	54,7
77	23	36	34	52	48	43,7	27	73	48,7	2	98	55
76	24	36	34,5	51	49	44	26	74	49,2	1	99	55
75	25	36,5	35,5	50	50	44	25	75	49,5			

Die Oelsäure läßt sich, gleich den vorübergehenden nicht in isolirtem Zustand erhalten, sondern ist immer wasserhaltig. Sie enthält 96,2 Th. Säure und 3,8 Th Wasser. Die wasserfreie Säure besteht aus:

	Nach d. Versuchen.	Atome.	Nach d. Rechnung
Kohlenstoff	80,972	70	81,32
Wasserstoff	11,359	117	11,09
Sauerstoff	7,699	5	7,59.

*) Von dieser Zahl an sind die Thermometergrade Schmelzpunkte.

Das Atom der Oelsäure wiegt dann 6587. Sie sättigt eine Quantität Basis, deren Sauerstoff 3,036 ist, d. h. er sich zum Sauerstoff der Säure $= 2 : 5$ verhält, und fällt daher mit der Talgsäure in einer Klasse. Nach dieser Berechnung, welche vollkommen mit den Resultaten der Analyse von den ölsauren Salzen übereinstimmt, enthält die Oelsäure mehr Wasser als sie enthalten sollte, was lassen wohl einer Unvollkommenheit im analytischen Versuche mit der wasserhaltigen Säure, die aus 96,7 Säure und 3,3 Wasser bestehen sollte, zuzuschreiben sein möchte.

Ich habe im Vorhergehenden die Zusammensetzung der fetten Säuren nach Chevreul's Analysen und Berechnungen aufgestellt. Bei den Vergleichen, welche ich mit seinen Resultaten anstellte, glaubte ich eine Beziehung in der Zusammensetzung derselben zu finden, die ich hier nicht übergehen darf. Die Talgsäure enthält 3 Atome Kohlenstoff, und die Margarinsäure 35, oder die halbe Anzahl (in Chevreul's *Recherches* steht durch die Beschreibung 34). Den Wasserstoffgehalt der Talgsäure hat er zu 135 berechnet; aber man wird aus dem unten geführten tabellarischen Resultat finden, daß 134 mit der Analyse übereinstimmender ist. Dagegen enthält die Margarinsäure 65; nimmt man eine so geringe Fehlerhaftigkeit im Resultat der Analyse an (was auch die Unmöglichkeit, alle Oelsäure absolut abzuscheiden, rechtfernen kann), so daß diese 65 eigentlich 67 sein sollten, so ist das aus Kohlenstoff und Wasserstoff zusammengesetzte Radikal in diesen beiden Säuren einerlei und aus $\text{C}^{\text{H}67}$ zusammengesetzt, und nennen wir dieses Radikal R, so besteht die Talgsäure aus $2R + 5O$, und die Margarinsäure aus $R + 3O$; ein Verhältniß, welches mit dem der Unterschwefelsäure zur Schwefelsäure, und dem der Chlorsäure zur oxydirten Chlorsäure übereinstimmt, und welches die Ursache der Aehnlichkeit, welche diese Säuren mit einander haben, sein kann.

Die Oelsäure dagegen stimmt mit der Talgsäure darin überein, daß das Verhältniß des Kohlenstoffs zum Sauerstoff gleich ist mit demselben Verhältniß in der

Talgsäure, aber sie enthält ein aus $C^{35}H^{60}$ zusammengesetztes Radikal, welches demnach 7 Atome Wasserstoff weniger enthält, und 2 Atome von diesem Radikal sind mit 5 Atomen Sauerstoff verbunden. Nach Chevreul's eben angeführter Berechnung würde die Oelsäure nur 117 Atome Wasserstoff enthalten, aber die folgende Tabelle zeigt, daß es eigentlich 120 sind.

Bestandtheile.	Talgsäure.			Margarinsäure.			Oelsäure.		
	Atome	Veruch	Rechnung	Atome	Veruch	Rechnung	Atome	Veruch	Rechnung
Kohlenst.	70	80,145	80,01	35	79,053	78,38	70	80,942	81,68
Wasserst.	134	12,478	12,51	67	12,010	12,59	120	11,359	11,34
Sauerstoff	5	7,377	7,48	3	8,937	9,03	5	7,699	7,51
Atomgew.		6687,2			3320,7			6606,0	
Sättigungs- capacität		2,992			3,612			3,028	

Die ölsauren Salze gleichen nicht denen der vorhergehenden Säuren. Es fehlt ihnen im Allgemeinen die Neigung zu krystallisiren, und die von unauflöslichen und pulverförmigen nicht ganz freien, sind vor dem völligen Eintrocknen schleimig.

Oelsaures Kali: α) Neutrales erhält man, wenn eine auf die zuvor erwähnte Weise von margarinsaurem Salz gereinigte Auflösung des Salzes mit kaustischem oder kohlensaurem Kali, oder auch mit Chlorkalium vermischt wird, bis daß sich aus der Flüssigkeit das ölsaure Kali abscheidet, welches man auf Papier nimmt, abtropft, anpreßt, trocknet und in dem 3 bis 4fachen Gewicht wasserfreien Alkohols auflöst, welcher das zur Fällung angewandte Salz zurückläßt. Die Alkohol-Auflösung wird langsam abgedampft, wobei sich bisweilen Krystalle von ölsaurem Kali bilden. Eingtrocknet ist es farblos, leicht zu pulvern, fast ohne Geruch, und schmeckt bitter und zugleich alkalisch. Wird es mit seinem doppelten Gewichte Wassers vermischt, so schwillt es darin zu einer durchsichtigen Gallert auf, und setzt man noch einmal

viel Wasser zu, so verwandelt es sich in eine syrupartige Flüssigkeit (Seifenleim). Mit noch mehr Wasser verdünnt, erhält es sich klar, scheint aber doch nach längerer Zeit in schleimiges, saures ölsaures Kali abzusetzen. In feuchter Luft zerfließt es langsam, und nimmt bis das 1,66fache seines Gewichtes Wasser auf. 1 Th. ölsaures Kali, mit 1 Th. Alkohol von 0,821 vermischt, verbindet sich bei $+13^{\circ}$ nicht damit. Aber bei $+50^{\circ}$ bildet es eine vollständige Auflösung, die sich bei $+40^{\circ},5$ zu trüben anfängt, bei $+30^{\circ}$ eine breiartige Masse, und bei $+12^{\circ}$ fest ist. Wird das Salz mit Hülfe der Wärme in 2 Th. Alkohol aufgelöst, so erhält sich die Auflösung bei $+12^{\circ}$ klar; bei $+10^{\circ}$ setzt sie einige Krystalle vom Salze ab, und auf 100 Th. Alkohol enthält dann die übrigbleibende Auflösung 46,4 Th. Salz. 100 Th. Aether lösen im Kochen 3,43 Th. Salz auf, und nach dem Erkalten erhält sich die Flüssigkeit klar. *b)* Zweifach ölsaures Kali erhält man, wenn 100 Th. Oelsäure mit einer Auflösung von 8,9 Th. wasserfreien Kali's, d. h. mit 10,62 Th. getrockneten Kalihydrats in 400 Th. Wassers, vermischt, und dieses Gemische bei gelinder Wärme digerirt wird. Es bildet dann eine gelatinöse Masse, die sich mit 1000 Th. Wasser so viel Wasser vermischen läßt, ohne davon aufgelöst zu werden. Die schleimige Masse ist sehr schwer vom Filtrum zu bringen. Das Salz ist sowohl in kaltem als in warmem Alkohol auflöslich, und die Auflösung röthet Lackmus; beim Verdünnen mit Wasser wird sie aber wieder blau, obgleich nichts sichtbar daraus gefällt wird.

Oelsaures Natron erhält man sowohl aus Natronasche, auf die Weise, wie das Kalisalz, als auch dadurch, wenn man die Säure in einer Auflösung von kaustischem Natron im Ueberschuß auflöst. Das Salz bildet eine in kaltem alkalischen, selbst warmen Flüssigkeit unauflösliche Gallerte, die beim Erkalten erhärtet. Sie wird aus der Flüssigkeit genommen, zerdrückt und ausgepreßt, und darauf, wie das Kalisalz, mit Alkohol behandelt. Wird diese Auflösung in Alkohol verdunsten gelassen, so bleibt

Talgsäure, aber sie enthält ein aus $C^{35}H^{60}$ zusammengesetztes Radikal, welches demnach 7 Atome Wasserstoff weniger enthält, und 2 Atome von diesem Radikal sind mit 5 Atomen Sauerstoff verbunden. Nach Chevreul's eben angeführter Berechnung würde die Oelsäure nur 117 Atome Wasserstoff enthalten, aber die folgende Tabelle zeigt, daß es eigentlich 120 sind.

Bestandtheile.	Talgsäure.			Margarinsäure.			Oelsäure.		
	Atome	Versuch	Rechnung	Atome	Versuch	Rechnung	Atome	Versuch	Rechnung
Kohlenst.	70	80,145	80,01	35	79,053	78,38	70	80,942	81,0
Wasserst.	134	12,478	12,51	67	12,010	12,59	120	11,359	11,5
Sauerstoff	5	7,377	7,48	3	8,937	9,03	5	7,699	7,5
Atomgew.	6687,2			3320,7			6606,0		
Sättigungs- capacität	2,992			3,612			3,028		

Die ölsauren Salze gleichen nicht denen der vorhergehenden Säuren. Es fehlt ihnen im Allgemeinen die Neigung zu krystallisiren, und die von unauflöslichen und pulverförmigen nicht ganz freien, sind vor dem völligen Eintrocknen schleimig.

Oelsaures Kali: *a*) Neutrales erhält man, wenn eine auf die zuvor erwähnte Weise von margarinsaurem Salz gereinigte Auflösung des Salzes mit kaustischem oder kohlensaurem Kali, oder auch mit Chlorkalium vermischt wird, bis daß sich aus der Flüssigkeit das ölsaure Kali abscheidet, welches man auf Papier nimmt, abtropft, auspresst, trocknet und in dem 3 bis 4fachen Gewicht wasserfreien Alkohols auflöst, welcher das zur Fällung angeordnete Salz zurückerläßt. Die Alkohol-Auflösung wird abgedampft, wobei sich bisweilen Krystalle von bilden. Eintrocknet ist es farblos, leicht ohne Geruch, und schmeckt bitter und. Wird es mit seinem doppelten Gewicht vermischt, so schwillt es darin zu einer Gallert auf, und setzt man noch einmal so

el Wasser zu, so verwandelt es sich in eine syrupartige Flüssigkeit (Seifenleim). Mit noch mehr Wasser verdünnt, fällt es sich klar, scheint aber doch nach längerer Zeit ein schleimiges, saures ölsaures Kali abzusetzen. In feuchter Luft zerfließt es langsam, und nimmt bis das 1,66fache seines Gewichtes Wasser auf. 1 Th. ölsaures Kali, mit 1 Th. Alkohol von 0,821 vermischt, verbindet sich bei $+13^{\circ}$ nicht damit. Aber bei $+50^{\circ}$ bildet es eine vollständige Auflösung, die sich bei $+40^{\circ},5$ zu trüben anfängt, bei $+30^{\circ}$ eine breiartige Masse, und bei $+12^{\circ}$ erstarrt. Wird das Salz mit Hilfe der Wärme in 2 Th. Alkohol aufgelöst, so erhält sich die Auflösung bei $+12^{\circ}$ klar; bei $+10^{\circ}$ setzt sie einige Krystalle vom Salze ab, und auf 100 Th. Alkohol enthält dann die übrigbleibende Auflösung 46,4 Th. Salz. 100 Th. Aether lösen im Kochen 3,43 Th. Salz auf, und nach dem Erkalten erhält man die Flüssigkeit klar. b) Zweifach ölsaures Kali erhält man, wenn 100 Th. Oelsäure mit einer Auflösung von 8,9 Th. wasserfreien Kali's, d. h. mit 10,62 Th. geschmolzenen Kalihydrats in 400 Th. Wassers, vermischt, und dieses Gemische bei gelinder Wärme digerirt wird. Es bildet dann eine gelatinöse Masse, die sich mit 1000 Th. Wasser so viel Wasser vermischen läßt, ohne davon aufgelöst zu werden. Die schleimige Masse ist schwer vom Filtrum zu bringen. Das Salz ist sowohl in kaltem als in warmem Alkohol auflöslich, und die Auflösung röthet Lackmus; beim Verdünnen mit Wasser wird aber wieder blau, obgleich nicht sichtbar daraus getrennt wird.

Oelsaures Natron erhält man sowohl aus Natronasche, auf die Weise, wie das Kalisalz, als auch aus Natroncarbonat, indem man die Säure in einer Auflösung von kohlensaurem Natron im Ueberschuß auflöst. Das Salz bildet eine alkalische, selbst warmen Flüssigkeit unauflösliche Masse, die beim Erkalten erstarrt. Sie wird von der Löslichkeit genommen, zerbröckelt und ausgepreßt. Ihre Darstellung, wie das Kalisalz, mit Alkohol darzustellen. Ihre beste Auflösung in Alkohol verdünnten gelassen. Es zerfällt

das Salz in Gestalt einer festen, halb durchsichtigen Masse zurück, die spröde ist und sich leicht vom Glase ablöst. Es ist farblos, hat wenig Geruch und schmeckt alkalisch. Es löst sich sehr leicht in 10 Th. Wasser von $+12^{\circ}$ auf. Es zieht zwar hygroskopische Feuchtigkeit an, zerfließt aber nicht. Verdünnung mit Wasser bringt, wenigstens nicht in kürzerer Zeit, keinen Niederschlag von saurem ölsauren Natron hervor. Mit 5 Th. Alkohols von $0,821$ geht keine Auflösung in der Kälte vor sich, und nur unvollständig in der Wärme. Von 10 Th. wird es mit Hilfe der Wärme aufgelöst, bei $+32^{\circ}$ fängt die Auflösung an sich zu trüben. 100 Th. Alkohol behalten bei $+13^{\circ}$ nur 4,84 Th. ölsaures Natron aufgelöst. 100 Th. Aether lösen bei seinem Kochpunkt nicht 2 Th. Salz auf; beim Erkalten trübt er sich und behält bei $+10^{\circ}$ nur 1,14 Th. aufgelöst, was einen großen Ueberschuß von Oelsäure enthält und Lackmus röthet. Ein zweifach ölsaures Natron existirt, ist aber nicht untersucht.

Oelsaures Ammoniak entsteht durch Vermischen von Oelsäure mit kaustischem Ammoniak; die Verbindung geht sogleich mit Wärme-Entwicklung vor sich, das Salz scheidet sich in gelatinöser Form ab, löst sich aber durch Verdünnung mit Wasser vollständig auf; die Auflösung trübt sich und verliert beim Kochen Ammoniak.

Oelsaure Baryterde: a) Neutrale entsteht sowohl durch Vereinigung der Oelsäure mit Baryterdehydrat, oder selbst kohlenaurer Baryterde im Kochen, als auch durch Fällung von Chlorbaryum mit ölsaurem Natron. Sie bildet ein in Wasser unauflösliches, farbloses und geschmackloses Pulver, das in geringem Grade in kochendem Alkohol auflöslich ist. In Alkohol aufgelöste Oelsäure löst dieselbe zu einem Salz mit großem Säureüberschuß auf. Sie löst sich auch in einer bestimmten Menge in Oelsäure auf, aber diese sauren Salze sind nicht näher untersucht.

Folgende Salze entstehen alle durch doppelte Zersetzung mittelst der kochenden Auflösungen von ölsaurem Natron und einem auflöslichen Salz der Base: Oelsaure

ontianerde, pulverförmig, wie das Baryterdesalz. Oelsaure Talkerde, farblos, pulverförmig, bei gelinder Wärme schmelzend. Oelsaure Talkerde, weisse durchsichtige, zwischen den Fingern erweichende Körner. Oelsaures Zinkoxyd, weifs, pulverförmig, schmilzt bei $+100^{\circ}$. Oelsaures Kobaltoxyd scheidet sich schwierig ab, ist blaugrün, und wird, wie das Oxydhydrat, an der Luft grün. Oelsaures Nickeloxyd scheidet sich schwierig ab, und bildet ein apfelgrünes Pulver. Oelsaures Kupferoxyd ist grün und so leicht schmelzbar, dafs es schon flüssig zu werden anfängt, wenn es unmittelbar dem Sonnenlicht ausgesetzt wird. Halbsaures Bleioxyd entsteht durch Digestion von basischem essigsaurem Bleioxyd mit Oelsäure. Dieses Salz ist bei $+20^{\circ}$ weich, schmilzt bei $+100^{\circ}$, und ist, nachdem es gänzlich geschmolzen ist, vollkommen durchsichtig. Oelsaures Chromoxydul, durch Fällung dargestellt, ist violett, erhält sich lange weich, erhärtet aber zuletzt an der Luft.

Die nun abgehandelten fetten Säuren haben, als Bestandtheile der Seifen und Bleipflaster, eine grofse Anwendung. Man hat aber auch versucht, denselben, vorzüglich den festen, noch eine andere zu geben, nämlich Brennmaterie, und sie können in der Hinsicht mit der Wachse in sofern verglichen werden, als sie nicht so leicht zu brennen machen, aber mit klarer und reiner Flamme brennen. Sie können zu diesem Endzweck sowohl aus Seife, als auch durch Destillation von vegetabilischem oder animalischem Fett bereitet werden.

Durch Verseifung des Ricinusöls erzeugte fette Säuren.

Man verwandelt 8 Th. Ricinusöl in Seife mittelst der Auflösung von 2 Th. Kalihydrat in 4 Th. Wasser, wobei innerhalb weniger Minuten eine durchsichtige, zähe, im Wasser vollkommen auflösbare Masse entsteht, die sich durch einen Zusatz von überschüssigem Kali aus der Flüssigkeit

sigkeit nicht ausscheidet. Diese Seife zeichnet sich durch einen äußerst bitteren Geschmack aus: Wird ihre Auflösung mit Kochsalz vermischt, so scheidet sich Natronseife aus, und zwar so vollständig, daß die ausgesalzene Flüssigkeit, auf der sie schwimmt, von Säuren nicht unklar wird. Bei dieser Seifenbildung entsteht, wie bei der Saponification anderer Oele, 8 Proc. vom Gewicht des Ricinusöls Oelzucker, und die Quantität der neugebildeten fetten Säure beträgt 94 Proc. Man scheidet die fetten Säuren von der Base mittelst Chlorwasserstoffsäure und wäscht sie mit Wasser aus, wobei ein rothgelbes, geruchloses Oel von sehr scharfem Geschmack übrig bleibt. Es besteht aus drei Säuren, von denen sich die eine nach einigen Stunden, bei einer Temperatur von $+15^{\circ}$ bis $+18^{\circ}$, in fester Form, aber in sehr geringer Menge absetzt.

a) Ricintalgsäure. Diese feste, auf eben erwähnte Art gewonnene Säure, wird zwischen Papier ausgepreßt und in kochendem concentrirten Alkohol aufgelöst, aus dem sie beim Erkalten in perlmutterglänzendem, zart anzufühlenden Schuppen anschießt. Diese Säure ist geruch- und geschmacklos, in Wasser unauflöslich, aber auflöslich in ihrem halben Gewicht kochenden Alkohols. Diese Auflösung röthet die Lackmustinctur sehr stark. Die Ricintalgsäure schmilzt etwas über $+130^{\circ}$, und bei der Destillation geht ein guter Theil davon unverändert über. Mit den Basen bildet sie Salze, welche denen der zuvor beschriebenen Säuren vollkommen ähnlich sind. Ihre Verbindung mit Talkerde ist in Alkohol auflöslich. Diese Säure besteht aus 70,5 Kohlenstoff, 10,91 Wasserstoff und 18,59 Sauerstoff. Die relativen Volume sind so lange noch unbestimmt, als die Sättigungscapacität der Säure unbekannt ist. — Bussy und Lecanu, welche anfangs diese Säure, meiner Meinung nach sehr passend, *Acide stearoricinique* nannten, änderten diesen Namen später in *Acide margaritique* um, den ich für sehr übel gewählt halte.

b) Ricinsäure (*Acide ricinique*). Die ölarartige Verbindung, welcher sich die Ricintalgsäure abgesetzt hat, ohne zuvor Krystalle von letzterge-

Säure abzusetzen. Sie besteht aus Ricinsäure
 Ölsäure, woraus sich eine Portion von ersterer
 absetzt, daß man das Gemenge aus einer klei-
 te destillirt, bis daß $\frac{1}{3}$ übergegangen ist, wel-
 dem größeren Theile nach Ricinsäure ist. Sie
 10° fest, und kann durch Pressen zwischen Lös-
 der flüssigen Ricinölsäure befreit werden. Diese
 let eine perlmutterglänzende Masse von schar-
 t sogleich bemerklichem, aber lange anhalten-
 mack. Sie schmilzt bei +22° zu einem farb-
 und gesteht beim Erkalten zu einem krystalli-
 tt. Sie läßt sich bei einer wenig erhöhten Tem-
 erdestilliren und behält nachher ihren Schmelz-
 erändert. Sie ist in Wasser unauflöslich, aber
 öslich in Alkohol und in Aether, und diese Auf-
 öthen stark das Lackmuspapier. Bei +12° löst
 ohol 3 Th. Säure auf, wovon bei niedrigerer
 r ein Theil wieder anschießt. Gleiche Theile
 id Säure geben bei -8° Krystalle, aber 2 Th.
 af 1 Th. Säure erhalten sich bei -16° klar.
 ung in Alkohol wird von Wasser getrübt, aber
 Zusatz vom $1\frac{1}{2}$ fachen Gewicht vom Alkohol
 ird das Gemenge beim Aufkochen wieder klar.
 her löst 3 Th. Säure bei +18° auf, bei 0°
 allisirt der größte Theil wieder heraus. Ihre
 gen mit den Alkalien bilden, sowohl in Alko-
 Wasser auflösliche, Seifen. Sie geben mit Chlor-
 wie mit Chlormagnesium, einen käseähnlichen
 ag, aber der vom Talkerdesalz ist in Alkohol
 und kann Talkerde im Ueberschuß aufnehmen,
 ese Auflösung in Alkohol alkalisch reagirt. Aus
 lösung kann die ricinsaure Talkerde in perl-
 zenden Nadeln krystallisirt erhalten werden.
 s Bleioxyd ist ebenfalls in Alkohol auflöslich
 et mit Ueberschuß an Basis alkalisch. Diese
 eht aus 73,56 Kohlenstoff, 9,86 Wasserstoff und
 erstoff. Die relative Anzahl von Atomen, so
 tigungscapacität der Säure, sind unbekannt.
 ricinölsäure (*Acide oleoricinique*) ist sehr

schwer von der vorbergehenden zu trennen; man kühlt das Gemenge künstlich bis zu -2° ab, und presst die erstarrte Masse zwischen abgekühltem Löschpapier aus, aus welchem man dann die Ricinölsäure mit Alkohol auszieht. Nach dem Abdampfen des Alkohols bleibt sie als ein gelbes Oel von schwachem Geruch, aber sehr scharfem Geschmack zurück. Sie gesteht bei mehreren Graden unter 0° . In Wasser ist sie unauflöslich, löst sich aber mit Alkohol in allen Verhältnissen vermischen. Ihre Verbindungen mit Salzbasen bilden sich leicht, und sind sowohl in Alkohol als in Wasser auflöslich. Ihre Salze mit Talkerde und Bleioxyd sind, wie die der vorbergehenden Säuren, in Alkohol auflöslich. Sie ist nicht analysirt.

Alle drei nun erwähnten Säuren sind wasserhaltig, und geben bei der Vereinigung mit Bleioxyd Wasser ab. Dieses Wasser ist mit in die Analyse eingerechnet, so daß wenn seine Menge bekannt und abgezogen wird, die relativen Mengen anders ausfallen. Bussy und Lecanu entschuldigen diese Mangelhaftigkeit in der Analyse dadurch, daß sie diese Säuren als Wasserstoffsäuren, und also die Abscheidung von Wasser als eine Bildung desselben betrachten. Ich erwähnte schon pag. 398., daß bei der Destillation von Ricinusöl zwei Säuren gebildet würden; diese sind die Ricinsäure und die Ricinölsäure. Der Name der letzteren ist später unpassender mit *Acide elaiodique* vertauscht worden; ich ziehe den zuerst gegebenen vor.

B. Durch den Seifenbildungs-Prozess erzeugte flüchtige Säuren.

Diese Klasse von Säuren entsteht vorzüglich aus mehreren Arten von thierischem Fett, wie z. B. aus Butter, welche nicht weniger als 3 solcher giebt, die ich an ihrem Orte abhandeln werde. Von vegetabilischen Oelen hat man bis jetzt nur zwei erhalten, nämlich die Sabadill-säure und die Crotonsäure.

a. Sabadillsäure. (*Acide cevadique.*)

Sie ist von Pelletier und Caventou entdeckt worden. Um sie zu erhalten, zieht man Sabadillsaamen (von *Veratrum Sabadilla*) mit Aether aus, welcher ein mit Stearin und Elain vermisches, fettes Oel auflöst; hierauf destillirt man den Aether vom Oel ab, verwandelt dieses mit kaustischem Kali in Seife, zersetzt die Seife durch Weinsäure, seihet die abgeschiedenen fetten Säuren ab und destillirt die Flüssigkeit, wobei eine mit Wasser sehr verdünnte Sabadillsäure in die Vorlage übergeht. Das Destillat wird mit Barytwasser gesättigt, zur Trockne abgedampft, und das Barytsalz in einer Retorte mit syrupdicker Phosphorsäure vermischt und destillirt. Dabei sublimirt sich die Säure in weissen, perlmutterglänzenden Nadeln, welche bei $+20^{\circ}$ schmelzen, wie Buttersäure, d. h. wie alte ranzige Butter riechen, die eben ihren Geruch der Buttersäure verdankt, und bei einigen Graden über ihrem Schmelzpunkt sich sublimiren. Diese Säure ist in Wasser, Alkohol und Aether auflöslich. Ihre Salze behalten in einem gewissen Grade den Geruch der Säure bei. Das Ammoniaksalz fällt die Eisenoxydsalze mit weisser Farbe.

b. Crotonsäure. (*Acide jatrophiq. Pell. et Cav.*)

Diese Säure ist ebenfalls von Pelletier und Caventou entdeckt worden, und zwar in dem Oel aus den Saamen von *Croton Tiglium*, in Frankreich bekannt unter dem Namen von *Graine de pignon d'Inde*, von welchen sie anfangs glaubten, sie stammten von *Jatropha Curcas* her, weshalb sie die Säure Jatrophasäure nannten. Lavoisier hat nachher diese Säure weiter untersucht, und Crotonsäure genannt. Man gewinnt dieselbe aus dem Aether oder Alkohol aus den Saamen ausgezogenen, wenn man dasselbe mit Talkerde und Wasser bis zur Trockne einkocht, darauf das Oel mit Aether auszieht, den Rückstand mit Phosphorsäure destillirt. Aber

auf diese Weise erhält man nur eine sehr geringe Menge Säure, gerade so wie es mit ranziger Butter der Fall ist, und der größte Theil der Säure geht mit dem Oel. Man verwandelt daher das Oel in Seife, zersetzt diese durch Weinsäure, filtrirt und destillirt die Flüssigkeit in einem gut lutirten Apparat, wobei man ein saures, scharf und unangenehm riechendes Destillat erhält. Es wird mit Barytwasser gesättigt und zur Trockne abgedampft, und das Barytsalz dann mit höchst concentrirter Phosphorsäure destillirt. Die überdestillirende Säure wird in einer luftdicht verkitteten, bis -5° und darunter erkälteten, Vorlage aufgefangen, worin die Säure erstarrt. Buchner und v. Valta bereiten die Säure unmittelbar aus dem Samen von *Croton Tiglium*, den man von den Schalen befreit, zerstößt und durch Kochen in einer verdünnten Lauge von Kalihydrat auflöst, bis alles Oel in Seife verwandelt ist. Man bekommt eine braune, unangenehm riechende Flüssigkeit, die durch Leinen geseiht und, mit Schwefelsäure in geringem Ueberschuss vermischt, aus einer Retorte destillirt wird, bis $\frac{1}{3}$ übergegangen ist. Die gut verschlossene Vorlage wird kalt erhalten. Die Säure wird hernach auf die eben erwähnte Art concentrirt. — Die erhaltene feste Säure ist sehr flüchtig und verdunstet wenige Grade über 0° mit einem durchdringenden, ekelhaften, Nase und Augen reizenden Geruch. Sie röthet das Lackmuspapier, schmeckt scharf, bewirkt Entzündung und äußert giftige Wirkungen.

Da diese Säure von Talkerdehydrat aus dem Crotonöl nur in einer sehr geringen, zuvor schon gebildeten Menge ausgezogen wird, so scheint sie sich zum Crotonöl, wie die Buttersäure zur Butter zu verhalten, und einen Bestandtheil des abführenden und in Alkohol auflöselichen Theiles (pag. 399.) von diesem Oel auszumachen, bei dessen Zersetzung, durch den Einfluss des Alkali's, die Säure entweder gebildet oder entbunden wird.

Ihre Salze besitzen keinen Geruch; durch Sättigung der Säure verschwindet ihr Geruch gänzlich. Crotonsaures Kali krystallisirt in rhomboidalen Prismen, ver-

lert sich nicht an der Luft, und ist in Spiritus von 15 schwer auflöslich. Crotonsaure Baryterde ist in Wasser auflöslich, und setzt sich beim Abdampfen entweder in perlmutterglänzenden Krystallen oder in Gestalt eines weissen Pulvers ab; ist in Wasser und in Alkohol leicht auflöslich. Crotonsaure Talkerde ist ein körniger, in Wasser sehr schwer auflöslicher Niederschlag. Von crotonsaurem Ammoniak werden schwefelsaures Eisenoxydul mit isabellgelber, und Blei-, Kupfer- und Silber-Salze mit weisser Farbe gefällt.

C. Oelzucker.

Diese Substanz ist von Scheele entdeckt worden, welcher zeigte, daß sie sich bildet, wenn Oele mit Bleioxyd und wenig Wasser zu Pflaster gekocht werden, worin das Wasser süß wird und Oelzucker aufgelöst enthält, den man gewinnt, wenn man die Auflösung abgießt, durch Schwefelwasserstoffgas von einer Portion aufgelösten Bleioxyds befreit und dann abdampft. Chevreul erwies nachher, daß diese zuckerähnliche Substanz ein Product von der Verseifung sowohl der Pflanzenöle, als des Talges, der Butter und des Schmalzes ist, und daß dabei eine Menge von 8 bis 15 Proc. vom Gewicht des Fettes trägt. Man erhält den Oelzucker bei der Seifenbildung mit Alkali, indem man die alkalische Mutterlauge, sobald sich die Seife von derselben ausgeschieden hat, mit Schwefelsäure sättigt, und den etwa zufälligerweise hinzugesetzten Ueberschuß davon mit etwas kohlenaurer Baryterde wegnimmt, worauf man die Flüssigkeit filtrirt und zum dünnen Syrup abdampft, den man alsdann in Alkohol auflöst, von dem schwefelsauren Salze abfiltrirt und abdampft. Man erhält so den Oelzucker, wenn er vollkommen rein ist, in Gestalt eines farblosen Syrups, der nicht zum Krystallisiren zu bringen ist. Gewöhnlich hat er eine gelbliche Farbe, die durch Blutlaugenkohle weggenommen werden kann. Er hat einen reinen und angenehmen süßen Geschmack. Man erhält ihn leicht so con-

centrirt, daß er ein spec. Gewicht von 1,252 hat, aber enthält dann noch Wasser. Chevreul fand, daß zwei Monate Zeit nöthig waren, um ihn im luftleeren Raum über Schwefelsäure bis zu einem spec. Gewicht von 1,23 zu bringen, und in diesem Zustand enthält er noch chemisch gebundenes Wasser. In der Luft zieht er Feuchtigkeit an, und in Alkohol ist er leicht auflöslich. Wird seine concentrirte wäßrige Auflösung in einem Destillationsgefäße gekocht, so destillirt mit dem Wasser ein Theil Oelzucker über, und Schöeile fand, daß er bei einer sehr hohen Temperatur in concentrirter Form einen großen Theil nach unverändert überdestillirte; als aber die Retorte zu glühen anfang, kam ein riechendes saures Wasser und ein schwarzes brenzliches Oel. In der Retorte blieb eine poröse Kohle. In offener Luft entzündet er sich und brennt mit blauer Flamme. Von Salpetersäure wird er nur äußerst schwer, und erst nachdem man mehrere Male neue Säure aufgegossen hat, in Oxalsäure umgewandelt. Ein Theil Oelzucker, in 4 Theilen Wassers aufgelöst, erhält sich unverändert, ohne weder in Wein- noch saure Gährung überzugehen, und er läßt sich nicht einmal durch Zusatz von Hefe in Gährung versetzen. Er wird nicht von basisch essigsaurem Bleioxyd gefällt, und beim Digeriren mit Bleioxyd löst er dasselbe auf. Er vereinigt sich auch mit Kali zu einer in Alkohol auflöslichen Verbindung.

Bei einem spec. Gewicht von 1,27 besteht der Oelzucker, nach Chevreul's Analyse, aus 40,071 Kohlenstoff, 8,925 Wasserstoff und 51,004 Sauerstoff. Die demselben chemisch verbundene Quantität Wassers ist unbekannt.

D. Seife.

Unter diesem Namen verstehen wir die Verbindungen von Pflanzenölen mit Kali und Natron, die allgemein zum Waschen gebraucht werden. Es giebt zwei Arten davon, nämlich weiche Seife, Schmierseife, die bei

gewöhnlicher Temperatur weich, butterartig ist, und harte Seife. Die weichste von allen Seifen wäre diejenige, welche nur aus ölsaurem Kali, und die härteste von allen, die nur aus talgsaurem Natron bestünde. Kali giebt im Allgemeinen weichere Verbindungen, als Natron, und trocknende Oele liefern weichere Seife, als solche, die leicht erstarren, wie z. B. Baumöl und Myrthenwachs, die, zumal mit Natron, harte Seife geben. Alle diese Seifen sind, nach dem, was wir vorher sahen, nichts anderes, als Gemenge von talgsauren, margarinsauren und ölsauren Salzen in ungleichen relativen Verhältnissen, und da diese Säuren, von welcher Fettart sie auch erzeugt sein mögen, identisch sind, so ist es einleuchtend, daß man durch ihre ungleiche Vermengung und Sättigung mit Alkali genau die Seife von einer gewissen Oelart nachmachen kann, ohne daß ein Tropfen von diesem Oel dazu angewendet wird.

Im Allgemeinen reduciren sich die im Handel vorkommenden Sorten von Seife auf zwei Hauptarten, nämlich grüne oder weiche, und weiße oder harte Seife.

1) Grüne Seife, so bezeichnet, zum Unterschiede von schwarzer Seife, die aus Alkali und fetten thierischen Abfällen gemacht wird. Die grüne Seife wird aus Hanföl und Talg mittelst kaustischen Kali's gemacht. Das Hanföl enthält, als trocknendes Oel, wenig Stearin, und giebt daher meist ölsaures Kali; daher wird Talg zugesetzt, welcher meist margarinsaures und talgsaures Kali bildet. Zur Seifenbildung im Großen wird das Alkali auf die Weise kaustisch gemacht, daß man den Kalk mit Wasser zu Hydrat löscht, darauf mit gewöhnlicher Pottasche ohne Wasser vermengt und das Gemenge drei Wochen lang an einem trocknen Ort läßt. Während dessen wird das Alkali kaustisch. Die Masse wird dann in Bottichen, auf deren mit einem Hahn versehenen Boden Stroh liegt, mit Wasser übergossen, und dieses Wasser hierauf als concentrirte Lauge abgezapft. Es wird dann von neuem Wasser aufgegossen, welches eine schwächere Lauge giebt. Hierbei bleibt ein großer Theil der Salze aus der Pott-

asche bei dem Kalk zurück. Löst man die Pottasche im Wasser auf und macht sie im Kochen kaustisch, was im Großen schwer auszuführen ist, so gehen alle in ihr enthaltenen, auflösbaren Salze mit in die Seife über und setzen sich darin ab. Man muß sie daher vor der Kausticirung herauskrystallisiren lassen. In Deutschland wird die Lauge gewöhnlich aus guter Holzasche gemacht, aus der man einen Haufen mit einer Vertiefung bildet, in den man den Kalk löscht, worauf alles gut durch einander gemengt wird. Dieses Gemenge wird dann in eine Art von Seihapparat, den Auslaugebottich oder Aescher, gebracht, etwas fest gedrückt und Wasser aufgegossen, welches man nach einigen Stunden als Lauge abzapft. Das Oel und der Talg werden zuerst mit der schwachen Lauge gekocht, und hierauf zur vollständigen Sättigung die stärkere Lauge zugesetzt. Der Alkali-Gehalt wird aus dem specifischen Gewicht der Lauge gefunden. Die Seife wird hierauf zur gehörigen Consistenz eingekocht. Man pflegt ihr mitunter etwas mit kaustischem Kali angeriebenen Indigo zuzusetzen, womit ihre natürliche gelbbraune Farbe sich grün färbt. Dieß dient gewiß zu nichts, aber die Käufer verlangen nun einmal aus Gewohnheit diese Farbe. Nach einigen Wochen setzen sich in der Seife eine Menge größerer oder kleinerer weißer Körner ab, die eine Art unvollkommener Auskrystallisirung von talgsaurem und margarinsaurem Kali sind. Man hält dieses Körnige, welches gewöhnlich durch Zusatz von Stärke nachgemacht wird, für ein Zeichen von guter Seife. Es beruht gänzlich auf der Güte und Menge des zugesetzten Talges. Von zu viel Talg wird die Seife im Winter hart, von zu wenig wird sie schleimig, zertheilt sich bei der Anwendung in Waschen in Klümpchen, die sich nur langsam auflösen und dadurch verloren gehen, so daß von solcher Seife mehr verbraucht wird, als von richtig beschaffener. Die grüne Seife enthält überdies, außer ihren eigentlichen Bestandtheilen, den neugebildeten Oelzucker, alle Salze aus der Pottasche, welche beim Auslaugen des kaustischen Kali's aus dem Gemenge mit aufgenommen waren.

n, eine Portion kohlelsauren Kali's, das theils nicht
 usticirt wurde, theils sich nachher gebildet hat, so wie
 ch gewöhnlich einen geringen Ueberschufs von Kali.
 e weiche Seife löst sich leicht im Wasser auf; die Auf-
 ung schäumt stark, so daß sich daraus bei einer ge-
 ssen Concentration derselben die bekannten Seifenbla-
 n bilden lassen; aber in einer, bis zu einem gewissen
 rade concentrirten Lauge von Kali ist die Seife unauflö-
 slich und scheidet sich daraus in Klumpen aus. Man
 nn auf diese Art eine Seife reinigen, die wegen schlech-
 e Vorbereitung zu viel Salze, oder selbst zu viel kaustisches
 er kohlelsaures Alkali enthält. Man nimmt den Sei-
 nklumpen ab, läßt ihn abtropfen und läßt ihn wieder
 it ein wenig Wasser zur gehörigen Consistenz zerge-
 n. — Die weiche Seife löst sich vollkommen in Alko-
 ol auf, und läßt dabei fremde Salze zurück. Thénard
 nd bei einer Analyse von grüner Seife, nach Abschei-
 ung ihrer Salze, 9,5 Proc. Kali, 44,0 Proc. fette Säuren
 nd 46,5 Proc. Wasser.

2) Harte Seife wird in südlichen Ländern gewöhn-
 ch aus Baumöl und Natron, in Deutschland und den
 ördlichen Ländern aber gewöhnlich aus thierischem Fett
 anacht. Entweder nimmt man hierzu unmittelbar kau-
 isches Natron, worin man das Baumöl durch Kochen
 erst mit schwacher, und dann mit stärkerer Lauge in
 eife verwandelt, oder, wie es gewöhnlich geschieht, man
 cht zuerst eine Kaliseife, der man nach beendigter Sei-
 nbildung feingeriebenes Kochsalz zusetzt, das von der
 eife zersetzt wird und Chlorkalium und Natronseife bil-
 et, die sich von der Mutterlauge ausscheidet und darauf
 hwimmt. Die Seife wird dann in eine Form ausgegos-
 n, worin sie erstarrt und trocknet, und darauf mittelst
 es Metalldraths in kleinere Stücke zerschnitten. Eine
 Seife hat eine weiße, etwas in's Gelbe ziehende
 , einen eigenen, nicht unangenehmen Geruch, einen
 ach alkalischen, aber nicht scharfen oder salzigen Ge-
 ck, ist in dünnen Scheiben durchscheinend, wenig
 zwerer als Wasser, fühlt sich trocken und nicht schlüpfrig.

oder fett an, wird nicht in der Luft feucht, sondern trocknet immer mehr aus, ohne sich dabei mit ausgewittertem Salz zu beschlagen, und löst sich in Wasser und in Alkohol ohne Zurücklassung von fremden Substanzen auf. Aus ihrer sehr verdünnten Auflösung schlägt sich saures talg- und margarinsaures Natron nieder. Sowohl weiche als harte Seife ist in gesättigten Salzaufösungen unauflöslich, und durch Zusatz von Kalisalzen zur Auflösung der weichen Seife, oder sowohl von Kali- als Natronsalzen zur Auflösung der harten Seife, wird sie niedergeschlagen, und enthielt die Auflösung nur wenig Seife, so besteht der Niederschlag dem größten Theil nach aus den sauren Salzen der fetten Säuren, die, ohne sich aufzulösen, in kochendem Wasser schmelzen. Aus mehr concentrirten Auflösungen scheiden sich beide Seifenarten unzersetzt ab.

Im Handel haben wir mehrere Arten von harter Seife; nämlich *a*) weiße, spanische oder französische Seife, die aus Baumöl und Natron gewonnen wird. Die französischen Fabrikanten setzen gewöhnlich $\frac{1}{3}$ Mohn- oder Rübol zu, um das zu starke Eintrocknen der Seife zu verhindern, wodurch sie im Detailhandel beim Zerschneiden in kleinere Stücke zersplittert wird und verloren geht. *b*) Marmorirte Seife, auch venedische Seife genannt, die aus denselben Ingredienzien besteht, die aber entweder gleich ursprünglich Eisen (in Gestalt von Schwefeleisen, aufgelöst in dem dadurch grünlich gewordenen kaustischen Natron) enthält, oder der man eine Auflösung von Eisenvitriol innig beimengt. Beim Gestehen der Seife sondert sich die färbende Substanz in den bekannten marmorirten Adern aus. Die Seife muß dazu beim Ausgießen eine gewisse Consistenz haben. Ist sie zu dick, so wird die Masse gleichförmig gefärbt, ist sie zu dünn, so sinkt das Färbende zu Boden. *c*) Sogenannte russische Seife, ebenfalls eine weiße, aus Talg und Kali bereitete Seife. Als ein Product von thierischem Fett, gehört sie, so wie die ~~ähnliche~~ harte aus thierischen Fetten bereitete Seife, ~~ist nicht~~ nicht hierher, aber nach der Verseifung sind

Alle diese Verbindungen von gleicher Art, nämlich Gemenge von den Salzen derselben fetten Säuren mit Natron oder Kali zur Basis. *d*) Durchsichtige Seife, aus Tierentalg und reinem, von fremden Salzen freiem Natron bereitet, die wiederum in Alkohol aufgelöst, filtrirt, abgedampft und bei einer gewissen Concentration in Formen gegossen wird. Sie ist gelb oder gelbbraun, und bleibt nach dem Trocknen durchsichtig. *e*) Palmseife, wie die vorige, zu den Luxusseifen gehört, wird aus Palmöl und Natron gemacht. *f*) Verschiedene andere andere Seifenarten, wie z. B. Mandelseife, die aus gleichen Theilen zerkleinerter Oelseife und Talgseife bereitet wird, die man in 1 Th. aus bittern Mandeln und Rosmarinwasser gemachter Mandelmilch auflöst; Seifenkugeln, indem Seife in ganz wenig Wasser geschmolzen und mit Stärke zu einem Teig geformt wird, etc. Alle diese Seifenarten können dadurch wohlriechend gemacht werden, als man bei ihrer Bereitung vor dem Gestehen flüchtige Oele zusetzt.

Von Oelseife haben wir folgende analytische Angaben:

	Marseiller ¹⁾ .	Gewöhl. französische ²⁾ .	Savon en table ³⁾ .	Marmosette ³⁾ .
Natron	10,24	8,56	4,6	6
Oelsäure	59,20	60,94	50,2	64
Talgsäure	9,20			
Wasser	21,36	30,50	45,2	30.

Die Seife wird zum Waschen, zum Walken des Tuchs, in der Heilkunde und Pharmacie etc. gebraucht. Die weiche Seife wäscht besser als die harte, weil sie gewöhnlich etwas mehr Alkali enthält. Sie wird zu gröberem Leinen und zum Walken angewendet. Die harte Seife dagegen wird beim feineren Leinen, bei Baumwolle und Wolle gebraucht. Die Anwendung der Seife zum Waschen gründet sich auf zwei Umstände: 1) auf ihr Ver-

1) Braconnot. 2) Pelletier. 3) Thénard.

mögen, als emulsionsartige Auflösung fette Stoffe vom Zeug aufzunehmen, die sich dadurch in dem Seifenwasser auflösen, und 2) auf die Leichtigkeit, mit der diese aufgelösten Salze ihr Alkali fahren lassen, welches dadurch in freiem Zustand auf die Unreinigkeiten im Zeug wirkt, die sich mit dem Alkali zu theils auflösliehen, theils solchen Verbindungen vereinigen, die nicht mehr am Zeug haften, während eine entsprechende Menge der Seife in zwei- oder vierfach öl- und margarinsäure Salze übergeht. Die fetten Säuren tragen in letzterem Falle nicht zum Waschen bei, weil sie so gut wie ohne Alkali abgeschieden werden. Man könnte daher sagen, das Alkali sei für sich allein ein wohlfeileres Waschmaterial; aber mit Kohlensäure verbunden, löst es weniger auf, weil die Kohlensäure bei gewöhnlicher Temperatur weniger leicht ausgetrieben, als das neutrale ölsäure Salz zersetzt wird. Kaustisches Kali aber übt seine Verwandtschaft auf das Zeug selbst aus, welches dadurch zerstört oder wenigstens, beim öfteren Waschen mit verdünntem kaustischen Alkali, spröde wird. Bei einer sehr hohen Temperatur, z. B. in einem Dampfbad, thut kohlen-säures Alkali dieselbe Wirkung, wie Seife, weil dann die Kohlensäure ausgetrieben wird; hierauf gründet sich Chaptal's Methode zu waschen, wobei das in eine schwache Lösung von kohlen-säurem Natron getauchte Zeug einige Stunden lang den Dämpfen von kochendem Wasser ausgesetzt wird. Da sich beim Waschen mit Seife das Ausziehen der Unreinigkeiten auf die Ausfällung auch von saurem ölsäurem Alkali gründet, so geht auch daraus die Nothwendigkeit hervor, dieses schleimige, sich auf das Zeug leicht befestigende Salz wegzuschaffen, und das gewaschene Zeug lang und gut in reinem Wasser auszuspülen, wenn es nicht nach dem Trocknen nach Seife riechen soll, welcher Geruch sowohl den sauren Salzen der Oelsäure, als der freien Säure selbst angehört.

Wasser, welches zweifach kohlen-säures Alkali, oder Kalkerde, schwefelsäure, salpetersäure oder andere Erdsalze aufgelöst enthält, wie z. B. Quell- und Meer-Wasser,

nicht zum Waschen mit Seife, weil sich, durch die Säuren mit den Erden gebildete, unauflösliche Salze das Zeug niederschlagen und darauf befestigen, die nicht wegspühlen lassen; aber solches Wasser kann diesem Endzweck gebraucht werden, wenn die Erde z. B. im Meerwasser zuvor durch eine geringe Menge ensauren oder besser kaustischen Alkali's im Kochen stuzt werden, oder im Brunnenwasser die freie Kohlensäure zuvor durch einen sehr geringen Zusatz von kaustischem Alkali oder selbst Kalkmilch gesättigt wird. Was Meerwasser betrifft, so bewirkt sein Kochsalzgehalt, es nach der Zersetzung der Erdsalze nicht so viel aufzulösen kann, als das durch Ausfällen gereinigte Meereswasser. Werden die Erdsalze nicht mit reinem Alkali ausgefällt, so zersetzt dasselbe eine weit größere Menge harter Seife, als diese für sich ausfällen können, das Wasser wird, nach Vauquelin's Versuchen, kohlensäurehaltig. — Wasser, in welchem sich Seife nicht ohne Zersetzung auflösen läßt, pflegt man gewöhnlich hartes Wasser zu nennen.

3) Bleipflaster und unauflösliche Seifen. Bleidseife wird gewöhnlich Bleipflaster (*Emplastrum li plumbici*) genannt, und durch Kochen von 5 Th. geschlämmten Bleioxyds mit 9 Th. Baumöls und Wasser das nach und nach zugesetzt wird, erhalten. Dabei verandelt sich das Oel vollständig in eine Seife, während sich der Oelzucker in dem Wasser auflöst, das man gewöhnlich nur, wegen seiner Verdampfung, zur Mäßigung der Hitze und zur Verhinderung des Anbrennens zusetzt. Man darf das Wasser niemals völlig verdampfen lassen, sondern muß immer neues, aber kochendes Wasser so zugesetzen, als es sich zu sehr zu vermindern anfängt. Wenn es gänzlich verdampft, so muß das Gefäß, vor dem man kocht, von neuem abgekühlt werden, weil die Masse sonst so heiß geworden sein kann, daß sie überkocht und das Wasser sich mit Explosion verflüchtigt und die Seife umherwirft. Sobald die Verseifung vollständig vorübergegangen ist, was man leicht an einer kleinen, in

Wasser getropften Probe an ihrer Gleichförmigkeit und daran erkennt, daß sie sich kneten läßt, ohne an den Fingern zu kleben, so läßt man die Masse erkalten und gießt die Auflösung von Oelzucker ab. Man kann das Bleipflaster auch ohne Wasser durch vorsichtiges Erhitzen des Oels bereiten, indem man, gerade wenn das Oel zu kochen anfangen will, das Oxyd nach und nach in kleinen Antheilen unter beständigem Umrühren zusetzt. Diefes soll ein weißeres Product geben, verlangt aber, wenn es nicht anbrennen soll, viel Vorsicht. Bleipflaster ist hellgelb, in der Kälte spröde, erweicht in der Wärme, und wird bei noch höherer Temperatur klebrig, und schmilzt zuletzt zu einer undurchsichtigen Masse. In Wasser ist es unauflöslich, in Alkohol nur wenig auflöslich. Leinöl giebt ein noch leicht schmelzbareres und weichereres Pflaster als Baumöl. Das Bleipflaster ist als ein Gemenge von den zu einem Drittheil mit den fetten Säuren gesättigten Bleioxydsalzen zu betrachten, worin nämlich die Säuren 3 Mal so viel Basis, wie in den neutralen Salzen aufnehmen. Die neutrale Verbindung entsteht durch Fällung einer Bleizucker-Auflösung mit einer Auflösung von harter Seife; sie ist weiß, zähe, in der Wärme klebrig und wird durch Schmelzen durchsichtig.

Das Bleipflaster macht die Basis eines großen Theiles der zusammengesetzten Pflaster aus, und nimmt auf diese Art die äußerlich auf die Haut anzuwendenden Heilmittel auf.

Baryt-, Strontian- und Kalk-Seife werden niedergeschlagen, wenn eine Auflösung von den Salzen dieser Erden hochendheiß mit einer Auflösung von Seife vermischt wird. Der Niederschlag ist weiß, riecht nach Seife, schmilzt schwer und ist weder in Wasser noch Alkohol auflöslich.

Talkerdeseife entsteht auf gleiche Weise. Sie ist weiß, glatt, schmilzt bei gelinder Wärme, und wird beim Erkalten durchsichtig, blaßgelb und spröde; ist in Alkohol und fetten Oelen auflöslich.

Thonerdeseife bildet einen weißen, nach dem

knen weich und biegsam werdenden Niederschlag. nilt zu einer durchsichtigen gelben Masse, und ist in ser, Alkohol und Oelen unauflöslich.

Manganseife fällt weiß nieder, wird aber an der rothbraun, trocknet zu einer spröden, beim Schmelrothbraun werdenden Masse ein. Nach Scheele be mt man eine Art von Pflaster, wenn man 4 Th. Baumöl 1 Th. Braunstein kocht.

Zinkseife bildet sich durch Kochen von Zinkoxyd Oel und Wasser, und ist bei $+100^{\circ}$ fast flüssig. Als lerschlag ist sie weißgelb, und trocknet zu einer sprö Masse ein.

Eisenoxydseife fällt, bei Anwendung eines Eisen lulsalzes, weiß nieder, wird aber rothbraun, ist zähe, t schmelzbar, in fetten Oelen und in Terpenthinöl t auflöslich.

Kobaltseife ist schmutzig-bleigrau, unauflöslich und beim Trocknen schwarz.

Kupferoxydseife schlägt sich beim Vermischen Kupfervitriol mit Seifenauflösung nieder. Sie ist grün nach dem Trocknen spröde; ist etwas in Alkohol, r aber in Aether und fetten Oelen auflöslich. Thé l und d'Arcet haben eine Anwendungsart der Ku xydseife angegeben. Man macht mit Leinöl und kau em Natron eine Seife, schlägt diese mit einer Auf g von 4 Th. Kupfervitriol und 1 Th. Eisenvitriol r, wäscht die Seife aus, trocknet sie, und löst 16 Th. a in 30 Th. Leinölfirniß (durch Kochen von 4 Th. mit 1 Th. feingeriebener Bleiglätte erhalten) auf, setzt zugleich 10 Th. Wachs zu. Mit diesem geschmol t Gemische tränkt man Gegenstände von Gyps, in man dieselben zuvor bis $+80^{\circ}$ — 90° erwärmt hat, sie dann eine Zeit lang in dieser Temperatur erhält, ich die Masse eingesogen hat. Sie werden dadurch cirt, zumal wenn die hervorstehenden Theile vorher etwas hellem Musivgold oder feingeriebenem Blatt gerieben werden; sie können dann ohne Nachtheil Einfluß der Luft und des Wassers ausgesetzt werden.

Wismuthpflaster wird, wie das Bleipflaster, mit Wismuthoxyd erhalten.

Quecksilberoxydpflaster soll auch beim Kochen von Quecksilberoxyd mit Oel und Wasser gebildet werden können, enthält aber dann wahrscheinlich Oxydul. Aus einer Auflösung von Quecksilberchlorid (Sublimat) niedergeschlagen, bildet es eine weiße, glatte, schwarz trocknende Seife, die in der Wärme schmilzt und im Lichte grau wird.

Silberoxydseife fällt weiß nieder, wird aber in der Luft roth. Beim Schmelzen schwärzt sie sich, wahrscheinlich durch theilweise Reduction des Metalles.

Goldoxydseife fällt weiß nieder, ist glatt und wird bald dunkel purpurfarben.

Flüchtige Oele.

Die flüchtigen Oele kommen in allen riechenden Pflanzen vor, von deren Wohlgeruch sie, durch ihre beständige Verdunstung, die Ursache sind. Sie finden sich in allen Theilen der Pflanzen, aber bei der einen ist das flüchtige Oel in diesem, bei der anderen in jenem Theil enthalten. Gewisse Pflanzen, wie z. B. Thymian, enthalten in allen ihren Theilen flüchtiges Oel; bei einigen ist es in den Blumenkronen, bei anderen in den Saamen, bei noch anderen in den Blättern, in der Wurzel, in der Rinde enthalten. Bisweilen ist es der Fall, daß bei einer und derselben Pflanze verschiedene Theile auch verschiedene Oele enthalten; so hat z. B. der Pomeranzenbaum ein verschiedenes Oel in den Blüten, in den Baumblättern und in den Schalen der Früchte. Die Menge von flüchtigem Oel ist sehr verschieden, nicht allein bei ungleichen Pflanzen, sondern auch bei einer und derselben Species, je nach dem Erdreich und besonders nach dem Klima, indem sich in den warmen Ländern die flüchtigen Oele in den Pflanzen in weit größerer Menge, als in gemäßigten und kalten, entwickeln. Bei verschiedenen Pflanzen ist das flüchtige Oel in eigenen Gefäßen

von denen es so gut umschlossen wird, in vertrocknen können, ohne daß das Oel sich Jahre lang aufbewahren lassen, ohne inwirkung der Luft gänzlich zerstört wird. ten, und vorzüglich in den Blüthen, bildet der Oberfläche selbst, um in demselben verdunsten.

gen Oele gewinnt man gewöhnlich durch dem die Pflanze in einem Destillationsapper übergossen und dieses abdestillirt wird, zu gleicher Zeit das Oel übergeht. Die r Heilkunde angewendeten flüchtigen Oele cken Pflanzen destillirt; einige, wie z. B. blüthöl und Rosenöl, müssen aus frischen nen Blumenblättern destillirt werden.


sind für sich nicht so flüchtig, wie das beim Kochen verdampfen sie in dem sich ergase, und wenn sich dann das aus Wassermengte Gas im Kühlapparat des Destillandensirt, so trennen sie sich, und das Oel em überdestillirten Wasser oder sinkt darin e Oele sind weniger flüchtig und gehen an setzt dann zum Wasser Kochsalz, dessen sung erst bei $+109^{\circ},7$ kocht, wodurch das des Oels durch die höhere Temperatur l. Setzt man bei diesen Destillationen zu den Pflanzen, so bekommt man kein Oel, m gewissen Grade in Wasser auflöslich ist, n Gas vom Oel und vom Wasser in diese übergehen, das Condensirte nur eine ig ohne Ueberschuß von Oel wird. Setzt u wenig Wasser zu, so geschieht es leicht, angelegte Pflanze an dem Boden festsetzt, das Destillat durch eingemengtes brenzli-rt. Da aber die Menge des überdestilli-nicht sowohl auf der des zugesetzten Was-ahr auf der Gröfse der erhitzten Oberfläche it daraus hervor, daß man durch die Ge-

stalt der Destillirblase dieser Ungelegenheit abhelfen kann, weil, je schmaler und höher die Blase, innerhalb eines gewissen Verhältnisse, wird, man um so mehr aus gegebenen relativen Mengen von Pflanzensubstanz und Wasser die Menge des überdestillirenden Wassers vermindert und die des Oels vermehren kann. Daraus folgt, daß die zum Branntweinbrennen am besten sich eignenden Destillirblasen, d. h. die sehr weiten und niedrigen, zur Gewinnung der flüchtigen Oele unvortheilhaft sind, weil in denselben das Wasser in einem zu großen Verhältnisse zum Oel überdestillirt. Auch hat man versucht, in dem nicht angefüllten Theil der Blase und des Helms die Pflanze, woraus das Oel destillirt werden soll, in einem Sack von dünnem Leinen aufzuhängen, um auf diese Weise das Oel in den durchstreichenden Wasserdämpfen verdunsten zu lassen. Dadurch ist man vor aller Gefahr des Anbrennens sicher, wenn man nur nicht bis zur Trockne destillirt.

Die Destillation wird so lange fortgesetzt, als das aus dem Kühlrohr ablaufende Wasser unklar und milchicht ist. Gewisse Pflanzen geben so wenig Oel, daß man bei aller Sorgfalt nichts Anderes, als eine Auflösung von Oel in Wasser erhält; dann giebt man dieses Wasser in die Blase auf eine neue Quantität von Pflanze zurück, destillirt von Neuem, und kann dies mehrere Male fortsetzen. Wenn sich das Oel ausscheidet, nimmt man dasselbe ab, und destillirt das mit übergegangene Wasser mit neuem Zusatz von Pflanzensubstanz, so lange als man noch davon hat.

Zur Abkühlung des Destillats gebraucht man dieselben Geräthschaften, wie beim Branntweinbrennen (s. Kühlapparat im 4. Theil), aber das zur Abkühlung angewendete Wasser darf bei der Destillation gewisser Oele, wie von Anis, Fenchel u. a., nicht kälter als $+6^{\circ}$ sein, weil sonst das Oel im Kühlapparat erstarrt.

Zur Aufnahme des Destillats bedient man sich der sogenannten Florentiner Vorlage, die eine konische, oben schmale und am Boden breite Flasche ist, und gleich über

em Boden einen Tubulus hat. In denselben setzt man mittelst eines durchbohrten Korks eine Glasröhre, die gebogen ist, daß sie neben der Flasche bis zu $\frac{2}{3}$ ihrer Höhe aufsteigt, sich da in einem rechten Winkel von der Flasche abbiegt und an dem Ende eine kleine Biegung nach unten bekommt, so daß sie diese Form hat ; in die Mündung der Flasche wird die Ableitungsröhre vom Kühlfaß eingeführt. Oel und Wasser sammeln sich in der Flasche, indem das Oel oben auf schwimmt und den oberen schmälern Theil einnimmt, während sich das Wasser in dem unteren und breiteren Theil ansammelt. Sobald soviel überdestillirt ist, daß das Oel mit der oberen Biegung der Röhre gleich hoch zu stehen kommt, so fließt das Wasser durch das obere nach unten gebogene Ende der Röhre ab, unter welche man eine Flasche mit einem Trichter zu seiner Aufnahme gesetzt hat. Auf diese Art sammelt sich das Oel beständig in der Florentiner Vorlage, während das Wasser abfließt. Es versteht sich, daß diese Art Vorlage nur für solche Oele paßt, die leichter als Wasser sind. Die schwereren werden in cylindrischen Gefäßen aufgefangen, die man mit anderen vertauscht, wie sie gefüllt sind.

Nach beendigter Destillation wird das Oel aus der Vorlage in eine Flasche gebracht, auf die Weise, daß ein baumwollener Docht in das Oel getaucht und aus der Vorlage in die Flasche hinab geleitet wird, die man mit der Mündung an die der Vorlage hält oder bindet, während man in dem Maße, als das Oel abläuft, von dem abgegangenen Wasser zugießt, so daß auch die letzten Tropfen Oels von dem Docht eingesogen werden können. Das in demselben zurückbleibende Oel kann man nachher auspressen. Man bedient sich zu diesem Endzweck auch der sogenannten Scheidetrichter, die aus einer Glasröhre bestehen, die oben eine Flaschenöffnung und unten einen feinen Trichterhals haben. Wenn das Wasser fast abgeflossen ist, verschließt man die obere Oeffnung mit Finger und läßt die letzten Wassertropfen vorsichtig abfließen, worauf man das Oel in ein anderes Gefäß

ablaufen läßt. Dieser Trichter ist noch bequemer zu handhaben, wenn der Hals lang und so wie an der Florentiner Vorlage gebogen ist. Immer aber muß man sorgfältig vermeiden, das Oel in viele Gefäße kommen zu lassen, weil in jedem etwas hängen bleibt und verloren geht.

Das überdestillirte Wasser liefert öfters noch mehr Oel, wenn es 0° Temperatur ausgesetzt wird.

Einige wenige flüchtige Oele können durch Auspressen erhalten werden, nämlich Bergamott- und Citronenöl, die in der gelben Schaafe der reifen Früchte von *Citrus Aurantium* und *Medica*, nämlich der Pomeranzen und Citronen, enthalten sind. Das Oel fließt dann, mit dem Saft der Schaafe vermischt, aus und schwimmt oben auf.

Um das Oel aus solchen wohlriechenden Blumen zu erhalten, die keine besondere, das Oel führende, Gefäße haben, sondern die dasselbe sogleich ausdunsten, wie Jasmin, Veilchen, Hyacinthen u. a., bedient man sich eines anderen Verfahrens. Man schichtet die frischen Blumen mit lockerer Baumwolle, die vorher in ein reines und geruchloses fettes Oel getaucht, und wieder ausgedrückt worden ist, oder mit in Oel getauchten Tuchlappen auf, und so wie die Blumen ihr flüchtiges Oel, das beständig von dem fetten Oel in der Baumwolle oder dem Tuche absorbiert wird, ausgedunstet haben, werden sie mit anderen vertauscht, bis das fette Oel gänzlich gesättigt ist. Man destillirt dann die mit Oel getränkte Baumwolle oder das Tuch mit Wasser, und bekommt so das flüchtige Oel. Indessen da diese Oele meist nur zum Parfümiren gebraucht werden, so nimmt man hierzu entweder das fette Oel unmittelbar, oder zieht das flüchtige Oel mit Alkohol davon aus.

Mit einigen stark riechenden Blumen, wie z. B. weißen Lilien, braucht man sich nicht so viel Mühe zu geben; man braucht sie bloß mit fettem Oel zu maceriren.

Im Aeußeren sind die flüchtigen Oele sehr verschieden. Die meisten sind gelb, einige farblos, roth oder braun, andere grün, und noch andere, aber nur wenige,

Sie besitzen einen starken, mehr oder weniger angenehmen Geruch, der gleich nach der Destillation etwas unangenehmes hat, das vom Destillationsprozeß herrührt, mit der Zeit verschwindet; im Allgemeinen riechen sie niemals ganz so angenehm, wie die frische Pflanze. Der Geschmack ist scharf, reizend und wärmend, oder, wenn er durch Vermischung mit anderen Stoffen sehr geändert ist, was man aromatisch nennt. Sie fühlen sich schlüpfrig an, wie die fetten Oele, sondern machen sie nicht so rau. Die meisten sind leichter als Wasser, und sinken darin unter, und ihr spec. Gewicht fällt zwischen 0,847 und 1,096, von welchen das erstere das spec. Gewicht des Citronenöls, und das letztere das des Rosöls ist. Ungeachtet sie flüchtige Oele heißen, haben sie doch eine geringere Tension als Wasser. Ihr Kochpunkt ist verschieden, fällt aber gewöhnlich ungefähr bei 100° ; einige brauchen noch höhere Temperatur, und man hat bemerkt, daß Dämpfe von flüchtigen Oelen bis zu einem gerötheten Lackmuspapier bläuen, ohne Ammoniak zu enthalten. Für sich destillirt, werden sie meistens zerfallen, und zwar so, daß ein Theil unverändert mit den übrigen Producten von der Zerstörung des anderen bleibt. Wird ein flüchtiges Oel mit Thon oder Sand geschüttelt, so wird der größte Theil davon bei der Destillation zersetzt, und leitet man die Dämpfe vom Oel durch eine glühende Röhre, so erhält man brennbare Gase, und in der Röhre setzt sich eine poröse und glänzende Kohle ab. Dagegen destilliren sie mit Wasser leicht ab, weil das sich beim Kochen bildende Wassergas unangenehmlich aus dem Destillationsgefäße das Gas vom Oel abführt, indem es durch seine beim Kochpunkt der Oele vermehrte Tension beständig verdunstet. In der Luft brennen sie mit klarer, leuchtender, stark blauer Flamme. Der Erstarrungspunkt der flüchtigen Oele ist sehr ungleich; einige gestehen bei 0° , einige schon bei niedrigeren Graden, andere dagegen bleiben bei gewöhnlicher Lufttemperatur erstarrt. Sie zeigen in dieser Hinsicht ein ähnliches Verhalten, wie die fetten Oele,

und können, wie diese, Gemenge von mehrerer von ungleichen Erstarrungspunkten sein, so daß e Abkühlung glückt, einige derselben in ein erstarren gewöhnlicher Temperatur festes Oel, und in ein driger Temperatur flüssig bleibendes Oel zu trenne können daher diese beiden Oele durch analoge wie bei den fetten Oelen, von einander unters indem wir das feste Stearopten und das flüssige El (von *πτηνον* flüchtig, und *στιας* Talg, und *ελαιον* O nen *). Man trennt dieselben nach dem Erkälte Auspressen in der Kälte zwischen Löschpapier, a das Stearopten zurückbleibt, während man das El durch Destillation des Papiere mit Wasser erhäl einigen Oelen setzt sich das Stearopten bei lange bewahren ab; ob es während dessen auch gebildet ist nicht mit Gewißheit ausgemacht.

Dem Einfluß der Luft ausgesetzt, verändern Farbe, werden dunkler und nehmen nach und nach stoff auf. Dieß fängt mit ihrem ersten Freiwer der Pflanze an, geschieht anfangs stärker und nimm her ab. Das Licht wirkt dabei sehr bedeutend n entwickelt sich dabei aus dem Oele etwas Kohle gas, das aber bei weitem nicht das Volum des al ten Sauerstoffs ersetzt; es bildet sich aber kein Das Oel wird allmählich immer dickflüssiger, verl Geruch und verwandelt sich in ein zuletzt erhä Harz. De Saussure fand, daß frisch destillirtes delöl in 4 Wintermonaten, bei einer Temperatu +12°, 52 Mal sein Volum Sauerstoffgas absorbi sein doppeltes Volum Kohlensäuregas gebildet ha hatte sich aber noch nicht völlig mit Sauerstoffga:

*) Einige Schriftsteller haben alle festen flüchtigen Oele (genannt. Dieß hat indessen den großen Uebelstand, dadurch der wohl bekannten Benennung einer allgemei wendeten Substanz eine andere Bedeutung, als sie von Al hatte, beilegt, und deshalb glaubte ich den Gebrauch de tes Campher in dieser Bedeutung gänzlich verwerfen zu n

gt. Stearopten aus Anisöl absorbirte bei einer Temperatur, wobei es geschmolzen blieb, in zwei Jahren sein 66faches Volum Sauerstoffgas, und bildete 26 Mal sein volum Kohlensäuregas. Ein Oel, welches sich so zu oxydiren angefangen hat, besteht aus Harz, aufgelöst in unverändertem Oel, das sich durch Destillation mit Wasser abheiden läßt. — Wenn man die flüchtigen Oele unverändert erhalten will, so muß man sie in kleinen und vollgefüllten, mit gut eingeschliffenen Stöpseln versehenen Flaschen im Dunkeln aufbewahren. Werden sie in großen, oder zur Hälfte oder darunter angefüllten Flaschen, die oft geöffnet werden, aufbewahrt, so sind sie bald verdorben.

Die flüchtigen Oele sind in geringem Grad in Wasser auflöslich. Mit Wasser geschüttelt, bekommt dieses Geruch und Geschmack des Oels. Das mit den Oelen zugleich überdestillirende Wasser ist eine gesättigte Auflösung von Oel in Wasser, und viele von diesen Auflösungen werden in der Pharmacie bereitet und in der Medicin unter dem Namen destillirter Wasser angewendet. Da sie durch Destillation gewonnen werden, so enthalten sie, aufer dem Oel, noch andere flüchtige Stoffe aus der Pflanze, welche ihnen gleich nach der Destillation einen fremden Geschmack und Geruch ertheilen, den sie beim Aufbewahren an kühlen Orten und in leicht bedeckten, durchsichtigen Gefäßen verlieren, wodurch sie aber, wenn das Gefäß luftdicht verschlossen wird, in Fäulniß übergehen und stinkend werden. Diesem Uebelstand sind sie durch Schütteln mit dem Oel bereiteten Wasser nicht unterworfen, und diese lassen sich verkorken und daher länger aufbewahren.

Die flüchtigen Oele lösen sich in Alkohol auf, und zwar um so besser, je wasserfreier dieser ist. Einige flüchtige Oele, welche keinen Sauerstoff enthalten, wie ^d Terpenthinöl, Citronenöl, sind in einem wasserhaltigen Alkohol, der Lavendelöl, Pfefferöl u. a. in großer Menge auflöst, sehr schwer auflöslich. De Saussure beweist aus seinen Versuchen, daß die flüchtigen Oele, demselben Verhältniß, als sie Sauerstoff enthalten, in

Alkohol leicht auflöslich seien. Diese Auflösung flüchtigen Oele in Alkohol bilden unsere sogenannten chenden Wasser, wie *Eau de Lavande*, *Eau de Cologne*, *Eau de Jasmin* u. dergl. Sie werden von Wasser trübt, welches die flüchtigen Oele ausscheidet. Dieselben setzen sich auch in Aether auf.

Die flüchtigen Oele lösen im Kochen Schwefel, der beim Erkalten der gesättigten Auflösung in prismatischen Krystallen anschießt. Bei fortgesetztem Kochen mit Schwefel zersetzt sich das Oel unter Gasentwicklung, und es entsteht eine stinkende, braune, krümelige, noch nicht gehörig untersuchte Masse. Ebenfalls lösen sie Phosphor im Kochen auf, und setzen bei Erkalten den größten Theil wieder ab. Die Auflösung leuchtet im Dunkeln. Gießt man sie in ein Glas, welches man gut verschließt, und schüttelt sie, so leuchtet das Glas, und die innere Fläche des Gefäßes überall damit bedeckt wird, so wird es in dem Augenblick, als man das Glas im Dunkeln öffnet, leuchtend.

Chlorgas wird von den flüchtigen Oelen aufgenommen, die sich dadurch auf ähnliche Weise, wie bei der Oxydation in der Luft verändern; die Verbindung besteht aus Chlorwasserstoffsäure und einer harzartigen Verbindung zu bestehen. Mischt man Chlorwasser zu einer Auflösung von flüchtigem Oel in Wasser, so scheidet sich ein Harz in kurzem in Gestalt eines Harzes ab. Sie verbinden sich auch mit Jod, welches sie sogar beim Schütteln in Lösung auflösen desselben in einer Salzauflösung aufnehmen, und verbinden sich, oder lassen sich vermischen mit Kohlenstoff, Chlorschwefel, Chlorphosphor, Chloräthyl, Chloräthylenstoff und Chlorarsenik, so wie auch mit der Verbindung von Chlorkohlenoxyd und unterschweflichter

Von den stärkeren Säuren wird die Zusammensetzung der flüchtigen Oele auf verschiedene Weise verändert. Mit Schwefelsäure vereinigen sie sich unter Entwicklung, und bilden damit eine braune Flüssigkeit, aus der Wasser eine braune, saure Masse scheidet, die von Alkohol, von Alkali, und in ein

Grade auch von mehr hinzugegossenem Wasser auf-
 wird. Wird das Gemenge erhitzt, so entwickelt sich,
 Verkohlung des Oels, schweflichte Säure. Schweflicht-
 Gas wird von denselben, ohne sichtbare Verände-
 in Menge absorbirt. Concentrirte Salpetersäure,
 h mit einem flüchtigen Oel in einem erwärmten
 vermischt, zersetzt das Oel mit solcher Heftigkeit,
 e Masse oft in Flammen ausbricht. Ein Zusatz von
 elsäure, welche der Salpetersäure eine Portion Was-
 zieht und sie dadurch concentrirt, trägt viel zur
 dung bei *). Bei minder heftiger Einwirkung wird
 I in Harz verwandelt, und durch fortgesetztes Ko-
 mit verdünnter Säure entsteht zuletzt Oxalsäure.
 oxydgas wird, nach Priestley's Versuchen, in
 von flüchtigen Oelen absorbirt, die sich dadurch
 z verwandeln. Chlorwasserstoffsäuregas wird von
 uerstoffhaltigen flüchtigen Oelen in Menge ver-
 t, ohne dafs sie sich dadurch verdicken, sie wer-
 er dunkler von Farbe und rauchend; mehrere der-
 verbinden sich mit concentrirter liquider Chlorwas-
 säure zu einer dicken, braunen, sauren Masse.
 eselgas wird ebenfalls, unter Wärmeentwicklung,
 ige absorbirt, ohne dafs das Oel dick wird. Auch
 asserstoffsäure verbindet sich begierig mit ihnen,
 sie dieselbe aus ihrer Verbindung mit Wasser auf-
 n; sie werden dadurch schwerer als Wasser, und
 anwasserstoffsäure erhält sich, nach v. Ittner's
 ung, in dieser Verbindung ohne zersetzt zu werden.
 ie flüchtigen Oele verbinden sich mit mehreren Pflan-
 ren, wie mit Essigsäure, Oxalsäure, Bernsteinsäure,
 en fetten Säuren, so wie mit Camphersäure und
 Säure.

Man bewirkt diese Entflammung gewöhnlich so, dafs zu 30 Gramm
 Terpenthinöl, in einer zuvor erwärmten Porzellantasse, ein Ge-
 : von 45 Gramm rauchender Salpetersäure und 15 Gramm
 trirter Schwefelsäure gegossen wird. Das Gefäfs, worin
 ure enthalten ist, mufs man an einem langen Stock befestigt
 wesen, weil die Masse umherspritzt.

Sie verbinden sich dagegen nicht mit Salzbasen (Obne Zweifel hat man versucht, sie mit kausischem Kali zu verbinden, wovon die sogenannte *Sapo Salkyanus* ein Beispiel ist. Man erhält dieselbe, wenn frisch geschmolzenes Natronhydrat in einem Mörser zuerst mit etwas Terpenthin gerieben und hierauf nach und nach in kleinen Antheilen, unter beständigem Reiben, Terpenthinöl zugesetzt wird, bis die Masse endlich die Consistenz von Seife erlangt hat. Man löst sie hierauf in Spiritus, filtrirt und destillirt den Spiritus ab. Die erhaltene Verbindung besteht aus Natron mit einem aus dem Öl während des Reibens erzeugten Harz. Ammoniakgas wird von den flüchtigen Oelen bis zum 6—8 fachen ihres Volums eingesogen; Lavendelöl nimmt sein 47 faches Volumen davon auf. Metalloxyde, welche ihren Sauerstoff nicht fahren lassen, z. B. Kupferoxyd, Mennige u. a., werden durch Kochen mit flüchtigen Oelen zersetzt, indem sich diese mit dem Sauerstoff verbinden und sich in Harz verwandeln. Von den vegetabilischen Salzbasen lösen sie auf: Cinchonin, Chinin, Morphin, Narcotin, Strychnin, Brucin, Veratrin und Delphinin.

Auf Salze haben sie wenig Wirkung. Einige leicht desoxydirbare Metallsalze verwandeln dieselben in Harz, z. B. salpetersaures Quecksilberoxyd, Zinnchlorid und Antimonchlorid. Die Einwirkung zwischen letzteren und den Oelen ist bisweilen sehr heftig, und es wird dabei nicht selten Metall reducirt. Quecksilberchlorid wird von flüchtigen Oelen aufgelöst, die davon so schwer werden, daß sie in einer gesättigten Auflösung dieses Salzes unterriicken, und dabei verdicken sie sich zugleich. Wasser zieht daraus das Quecksilbersalz aus und hinterläßt das Öl so dünn, wie zuvor. Mitunter bildet sich dabei auch eine kleine Menge Quecksilberchlorür.

Mit Zucker gerieben, lassen sich die flüchtigen Oele besser mit Wasser vermischen. Solche Gemenge mit Zucker heißen in der Pharmacie *Elaeosacchara*. Die flüchtigen Oele lösen alle fette Oele, Harze und thierisches Fett auf.

A
M
L
u
u
bi
L
bi
ne
k
n
E
Z
w
b
h
T
D
S
C
L
A
S
B
B
P
O
C
D

Zu Gasen verhalten sie sich wie Flüssigkeiten im reinen, und können von gewissen Gasen bedeutende Mengen einsaugen, die sie beim Kochen oder unter der Pumpe wieder entweichen lassen. Nach de Saussure's mit Terpenthinöl angestellten Versuchen, absorbirt dieses 0,16 bis 0,2 seines Volums Kohlenoxydgas, bis 1,9 Volum Kohlensäuregas, 2,1 bis 2,6 Volum ätherisches Gas, 2,5 bis 2,7 Volum Stickstoffoxydulgas, und nach Gay-Lussac's Versuchen, das 5fache Vol. Cyangas. Die Zusammensetzung der flüchtigen Oele ist vorzüglich von de Saussure untersucht worden. Einige derselben sind auch, obgleich vielleicht nicht ganz so zuverlässig, von Göbel analysirt worden. Hinsichtlich ihrer Zusammensetzung zerfallen sie in zwei Klassen: *a*) solche, welche aus Kohlenstoff und Wasserstoff ohne Sauerstoff bestehen, und *b*) solche, welche zugleich Sauerstoff enthalten.

a) Nicht sauerstoffhaltige flüchtige Oele.

	Kohlenstoff.	Wasserstoff.	Stickstoff.	Analysirt von:
Terpenthinöl	87,6	12,3	—	Houtou- Labillardiere.
Essigöl	87,788	11,646	0,566	De Saussure.
Essigölen v. Rosenöl	86,743	14,889	—	—
Essigölenöl	86,899	12,326	0,775	—

b) Sauerstoffhaltige flüchtige Oele.

	Kohlenstoff.	Wasserstoff.	Sauerstoff.	Stickstoff.	Analysirt von:
Essigdelöl	75,50	11,07	13,07	0,36	De Saussure.
Essigöl	76,49	9,35	13,82	0,84	—
Essigölen desselben	83,47	7,53	8,54	0,46	—
Essigölenöl	82,05	13,12	3,95	0,88	—
Essigölenarinöl	82,21	9,42	7,73	0,64	—
Essigölenermünzöl	75,1	13,4	11,5	—	Göbel.
Essigölen Laur. Cinnam.	78,1	10,9	11,0	—	—
Essigölen Laur. Cassia	76,7	9,7	13,6	—	—
Essigölenpher	74,38	10,67	14,61	0,34	De Saussure.
Essigölenelbe	74,67	11,24	14,09	—	Göbel.

Was den kleinen Stickstoffgehalt betrifft, welchen de Saussure gewöhnlich bei seinen Analysen der meisten organischen Materien fand, so muß man es vor der Hand dahin gestellt sein lassen, ob er als wesentlicher Bestandtheil dieser Körper zu betrachten sei oder nicht. Bemerkenswerth ist die Aehnlichkeit der Zusammensetzung zwischen dem Stearopten des Rosenöls und dem ölbildenden Gas. Indessen scheint in der Analyse ein Fehler enthalten zu sein, weil sie 1,632 Proc. Ueberschuß gab. Aus diesen Analysen ein Resultat zur Bestimmung der relativen Anzahl von einfachen Atomen zu ziehen, ist um so viel weniger möglich, als die meisten dieser Oele Gemenge von mehreren, von ungefähr gleicher Schmelzbarkeit und Flüchtigkeit, sein können, wie wir es beim Citronenöl und Terpenthinöl wahrscheinlich finden werden.

Die flüchtigen Oele werden sehr viel in der Heilkunde als stark reizende Mittel, ferner zur Bereitung der riechenden Wasser, riechenden Pomaden und Seifen etc., zum Ausziehen von Fettflecken und Oelfarbflecken aus Kleidern und Zeugen, und zur Verdünnung der Oelfirnisse beim Malen angewendet, zu welchem letzteren Zwecke die wohlfeilsten, nämlich Spieköl und Terpenthinöl, gebraucht werden. Als Handelsartikel sind sie öfters Verfälschungen ausgesetzt. Die gewöhnlicheren dieser Verfälschungssubstanzen sind folgende:

a) Fette Oele, Harz, Copaivabalsam, aufgelöst in dem flüchtigen Oel. Dieß entdeckt man, wenn ein Tropfen des Oels auf Papier gebracht und bei gelinder Wärme eingetrocknet wird. Das reine flüchtige Oel verdampft ohne Rückstand, aber das auf jene Weise verfälschte hinterläßt einen durchscheinenden Fleck. Ist die Verfälschung mit fettem Oel geschehen, so bleibt dieses unaufgelöst, wenn das Oel mit 3 Volumen Spiritus von 0,84 umgeschüttelt wird. Auch ein Theil vom Copaivabalsam bleibt auf diese Art unaufgelöst und läßt sich so entdecken. Das Harz, es mag nun durch allmähliches Verderben des Oels entstanden oder absichtlich zugesetzt worden sein, scheidet man durch Destillation mit Wasser ab.

) Das Oel wird mit etwas Spiritus vermischt. Dies
 t man durch Schütteln mit Wasser in einem gra-
 n Gefäße. Die Flüssigkeit wird milchicht, und das
 immt, wenn es sich endlich getrennt hat, ein ge-
 es, und das Wasser ein größeres Volum ein, als

) Theure Oele werden mit wohlfeilen vermischt.
 läßt sich nur schwierig anders, als durch den Geruch
 Geschmack entdecken. Man tropft das Oel auf ein
 schwingt es eine Weile in der Luft und riecht in-
 ten daran. Es glückt dabei, aus gemengten Oelen
 Geruch des einen im Anfang, und den des anderen
 de der Verdunstung zu erkennen. Auf diese Art
 ich der Geruch des Terpenthinöls sehr deutlich un-
 eiden. Dieses entdeckt man außerdem beim Schüt-
 nit dem 3 oder 4fachen Volum des Oels Spiritus
 2,84, wovon das meiste Terpenthinöl unaufgelöst

Ist ein flüchtiges Oel, welches schwerer als Was-
 , mit einem leichteren verfälscht, und wird es lange
 Vasser geschüttelt und dann in Ruhe gelassen, so
 nmt das leichtere oben auf und das schwere sinkt

Aber bisweilen ist es der Fall, daß man auf diese
 aus einem unverfälschten Oel kleine Mengen eines
 abscheiden kann, welches schwerer oder leichter
 s Ganze ist.

h will nun einige flüchtige Oele einzeln beschrei-
 ie entweder in wissenschaftlicher Hinsicht oder we-
 rer Anwendung merkwürdig sind.

Nicht sauerstoffhaltige flüchtige Oele.
 erpenthinöl, wird aus mehreren Arten von Ter-
 n, einer Art flüssigen Harzes, gewonnen, das von
 iedenen Species aus dem Geschlechte *Pinus* kommt,
 man diese weichen Harze mit Wasser destillirt. Es
 n allen flüchtigen Oelen das wohlfeilste und das am
 n angewendete. So wie es im Handel vorkommt, ist
 ch Einwirkung der Luft mehr oder weniger harzhal-
 vorden, und muß, wenn man es rein erhalten will,

mit Wasser umdestillirt werden. In diesem Zustand ist es farblos und wasserklar, von einem eigenen charakteristischen, unangenehmen Geruch, dünnflüssig, und hat bei $+22^{\circ}$ ein spec. Gewicht von 0,86, nach de Saussure, und 0,872 bei $+10^{\circ}$, nach Despretz. Seine spec. Wärme ist, nach Despretz, 0,462, die des Wassers zu 1,000 genommen, und sein Kochpunkt $+156^{\circ},8$; das spec. Gewicht seines Gases, verglichen mit dem spec. Gewicht der Luft bei gleicher Temperatur, 5,010, und bei $+100^{\circ}$, wenn die Temperatur der Luft 0° ist, 3,207. Seine Dämpfe geben, bei der Condensation, von ihrem Kochpunkt an, halb so viel Wärme ab, als Wasserdämpfe von 100 condensirt; aber die Menge von gebundener Wärme im Terpenthinölgas verhält sich zur gebundenen Wärme im Wassergas $=0,313:1,0$. Wird das Terpenthinöl bis -27° abgekühlt, so setzt es Stearopten in weissen Krystallen ab, die in Wasser untersinken und bei -7° schmelzen. Das Terpenthinöl röthet stets das Lackmuspapier, was von einem geringen Gehalt von Säure herrührt, von der Lecanu und Serbat gefunden zu haben glauben, daß sie Bernsteinsäure sei.

Das Terpenthinöl ist in Alkohol, welcher nicht wasserfrei ist, schwer auflöslich. 100 Th. Spiritus von 0,84 lösen $13\frac{1}{2}$ Th. Terpenthinöl bei $+22^{\circ}$ auf, wodurch man ein unreines Oel durch Schütteln mit $\frac{1}{3}$ Spiritus von 0,83 reinigen kann, indem dieser den verharzten Theil anzieht und abgossen werden kann. Wird dieses Waschen 3 bis 4 Mal wiederholt, so erhält man, nach Nimmo, das Oel rein, nach Vauquelin, $\frac{1}{3}$ Alkohol enthaltend, der von Wasser ausgezogen wird, ohne daß jedoch das Gemenge beim Schütteln milchicht wird. Diefes ist eine gute Methode, um zu medicinischem Behuf kleinere Quantitäten von Terpenthinöl zu reinigen. Ein wenig Terpenthinöl in Spiritus aufgelöst, ertheilt diesem die Eigenschaft, mit leuchtender Flamme zu brennen. Terpenthinöl, 4 Monate lang in Berührung mit der Luft gelassen, hatte, nach de Saussure, sein 20faches Volum Sauerstoffgas aufgenommen.

Es verbindet sich mit Chlor und wird von einer geringen Menge desselben dunkelgelb und dicker, ohne Durchsichtigkeit zu verlieren. Bringt man eine kleine Menge Oel in das Gas, so geht die Vereinigung mit solch Heftigkeit vor sich, daß sich das Oel unter Absatz von Feuer entzündet. Jod wird in Menge von Terpenthinöl gelöst, und mit der Auflösung von Jod in Jodwasseressigsäure oder in Jodkalium geschüttelt, zieht es fast augenblicklich das Jod daraus aus. Die Auflösung ist, je nach der Menge von Jod, rothgelb oder gelbbraun. Wenn metallisches Silber noch Stärke, die sonst so empfindliche Reagentien auf Jod sind, verrathen seine Gegenwart nicht. Wird eine Auflösung von Jod in Terpenthinöl verdunstet, so geht zuerst das reine Oel über, und dann folgt in braunen Tropfen ein mit Jod gesättigtes Oel. Ein saures alkalisches Alkali giebt die Verbindung eine gelbe, feste Masse. Unter den Verbindungen des Terpenthinöls mit Säuren ist die mit Chlorwasserstoffsäure besonders merkwürdig. Sie wurde von Kind entdeckt, und wegen ihrer großen äußerlichen Aehnlichkeit mit Campher künstlicher Campher genannt. 100 Th. reines, rectificirtes Terpenthinöl nehmen, nach de Saussure, bei $+22^{\circ}$ und 0,724 Meter Barometerhöhe, das gleiche Volum Chlorwasserstoffsäuregas auf. Das Oel während der Absorbtion des Gases durch Umgebung mit Wasser abgekühlt werden, weil es sich sonst erhitzt und das Gas entweicht. Nach beendigter Absorbtion wird die Flüssigkeit 24 Stunden lang abgekühlt. Man erhält dann zwischen 26 und 47 Proc. einer weissen, krystallisirten Substanz, die sich aus einer braunen, rauchenden, durchsichtigen Mutterlauge abgesetzt hat. Nach Thénard wird Terpenthinöl, mit Eis und Kochsalz abgekühlt, mit dem doppelten Gewichte Chlorwasserstoffsäuregas und gegeben zu einer weichen, krystallinischen Masse, aus der durch Abtropfen und Auspressen, von 100 Th. Oel, 10 Th. einer farblosen, rauchenden Flüssigkeit, die noch organische Theile enthält, und 110 Th. krystallisirte Substanz erhält. Die Ursache der Verschiedenheit in die-

sen Angaben liegt wahrscheinlich in dem Terpenthinöl, wenn es aus Terpenthinarten von verschiedenen Pinusarten gewonnen war. Sowohl der krystallisirte als der nicht krystallisirte Theil sind beide Verbindungen von Terpenthinöl mit Chlorwasserstoffsäure, und sie scheinen anzudeuten, daß dieses Oel immer ein Gemenge von zwei verschiedenen flüchtigen Oelen ist, von welchen das eine die flüssige, und das andere die feste Verbindung bildet.

Die flüssige Verbindung ist leichter als Wasser, welches derselben nicht die Säure entzieht. Noch längere Zeit der ferneren Berührung mit Chlorwasserstoffsäuregas ausgesetzt, liefert sie nicht mehr von der krystallinischen Substanz. In der Luft verliert sie bald ihre rauchende Eigenschaft. Entzündet, brennt sie mit grünlicher Flamme und Entwicklung von Chlorwasserstoffsäure, hinterläßt aber keinen Rückstand. Bei der Destillation giebt sie zuerst das bloß absorbirte und nicht chemisch verbundene Chlorwasserstoffsäuregas ab; hierauf kommen einige Tropfen eines dicken Oels, und dann geht die rectificirte Verbindung als ein hellgelbes Oel über. In der Retorte bleibt eine pechartige Substanz, die ein mit Chlorwasserstoffsäure verbundener, verharzter Theil von Oel zu sein scheint. Wird die flüssige Verbindung mit kohlensaurem Natron behandelt, so nimmt dieses den Ueberschuß von Säure weg, und die Verbindung wird farblos und specifisch leichter. Mit Kalkhydrat destillirt, geht ein dünnes, farbloses, aromatisches Oel über. Die flüssige Verbindung ist sowohl in Alkohol als in Aether auflöslich.

Die feste Verbindung, der eigentlich sogenannte künstliche Campher, wird in Wasser, welches etwas kohlen-saures Natron enthält, gewaschen, vom Alkali mit reinem Wasser abgewaschen, dann ausgepresst und in der Luft getrocknet. Er kann dann durch Sublimation mit Kalkhydrat, kohlen-saurer Kalkerde, trockner Asche, Kohlenpulver u. dergl., oder durch Auflösung in Alkohol und Ausfällung mit Wasser noch weiter gereinigt werden. Er hat folgende Eigenschaften: Er ist weiß, durchscheinend, **krystallinisch** oder in Nadeln angeschossen, etwas zähe,

nmt auf Wasser, riecht schwach wie Campher, und
 h, wenn er nicht ganz rein war, etwas nach Ter-
 nöl und schmeckt mehr gewürzhaft, als campherar-
 Er röthet nicht das Lackmuspapier. Wasser löst
 en unbedeutend auf und nimmt davon den Ge-
 k an; Alkohol von 0,806 löst bei $+14^{\circ} \frac{1}{3}$ seines
 hts davon auf, und sättigt man die Auflösung bei
 höheren Wärmegrad, so schießt der Ueberschuß
 Erkalten in Krystallen an. Die Auflösung wird
 von salpetersaurem Silberoxyd gefällt. Wasser, in
 hender Menge zugemischt, fällt ihn fast vollständig
 Er schmilzt bei einer Temperatur über dem Koch-
 des Wassers und krystallisirt nicht beim Gestehen.
 ch der Sublimation unterworfen, verflüchtigt er sich
 Rückstand, wobei sich aber ein Theil zersetzt und
 wasserstoffsäure frei wird. Wird er wiederholt mit
 e oder weißem Bolus umsublimirt, so giebt er ein
 nach Terpenthinöl riechendes Oel und ein braunes
 r, welches bei Anwendung von Bolus sauer ist.
 en seine Dämpfe durch eine glühende Röhre gelei-
 o liefert er brennbare, mit Chlorwasserstoffsäure
 gte Gase. Er läßt sich entzünden, und verbrennt
 Rückstand mit rufsender, an den Rändern grüner
 ae, und mit dem Geruch nach Chlorwasserstoffsäure.
 on concentrirter Salpetersäure wird er mit Entwickelung
 von Stickstoffoxydgas aufgelöst. Aus der Auflösung
 er von Wasser unvollständig gefällt, und bei fort-
 tem Erhitzen derselben entwickelt sich, indem er
 t wird, Chlor. Verdünnte Salpetersäure und Essig-
 lösen ihn nicht auf. Auflösungen von kaustischem
 in Wasser lösen ihn nicht auf, und entziehen ihm,
 mit Hülfe von Wärme, nur wenig von seiner Säure.
 Diese Verbindung besteht, nach Houtou-Labillardier's
 Analyse, in 108 Theilen aus 82,5 Kohlenstoff,
 Wasserstoff und 15,2 Chlorwasserstoffsäure, welches,
 em specifischen Gewicht des Oels und der Säure in
 m verglichen, 3 Atome Oel auf 2 Atome Chlor-
 stoffsäure ausmacht. Man könnte hieraus die An-

zahl von einfachen Atomen von Kohlenstoff und Wasserstoff im Oel berechnen, wenn das mit Chlorwasserstoffsäure verbundene Oel eben so zusammengesetzt wäre, wie das analysirte Terpenthinöl. Die Analyse der chlorwasserstoffsäuren Verbindung gab Kohlenstoff und Wasserstoff in dem Verhältniß, daß 2 Atome Chlorwasserstoffsäure mit 15 At. Kohlenstoff und 24 At. Wasserstoff verbunden waren; da sich diese beiden Zahlen gerade mit 3 dividiren lassen (was nothwendig der Fall sein mußte, wenn die Analyse richtig war), so kann man das mit der Säure verbundene Oel zusammengesetzt betrachten aus 5 At. Kohlenstoff und 8 At. Wasserstoff, oder in 100 Th. aus 88,44 Kohlenstoff und 11,56 Wasserstoff.

Das Terpenthinöl enthält, außer dem schon erwähnten, noch eine geringe Menge eines anderen Stearoptens, das man besonders aus dem schon lange aufbewahrten Oel erhält, aus dem es sich bisweilen in Krystallen absetzt. Man erhält es theils durch Abkühlung, theils dadurch, daß man das Oel längere Zeit in einem Destillationsgefäße einer Temperatur von $+50^{\circ}$ aussetzt, wobei sich das Stearopten sublimirt, theils durch Destillation des Oels ohne Wasser, wobei gegen das Ende ein saures Wasser übergeht, welches dasselbe aufgelöst enthält, und woraus es sich durch Abkühlung bis zu mehreren Graden unter 0° nach mehrtägigem Stehen absetzt. Es schießt in durchsichtigen, farblosen, rechtwinkligen, prismatischen Krystallen an, die oft 5 bis 6strahlige Sterne bilden. Es besitzt weder Geschmack noch Geruch, ist schwerer als Wasser, schmilzt bei $+150^{\circ}$, und sublimirt sich unverändert zwischen $+150^{\circ}$ und 155° . Auf glühende Kohlen geworfen, verflüchtigt es sich mit harzartigem Geruch, ohne sich zu entzünden. Es löst sich in 200 Th. kaltem und in 22 Th. kochenden Wassers auf, und krystallisirt daraus beim Erkalten. Es ist auf blaues und geröthetes Lackmuspapier ohne Wirkung. Von Alkohol wird es leicht aufgelöst und daraus durch Wasser niedergeschlagen; auch von Aether wird es aufgelöst; warmes Terpenthinöl löst dasselbe auf, ohne es wieder in der Kälte ab-

etzen. In warmem Mohnöl aufgelöst, setzt es sich dar-
 beim Erkalten wieder ab. Von concentrirter Schwe-
 säure wird es mit rother Farbe und unter Entwicke-
 lung balsamischer, nach Moschus riechender Dämpfe auf-
 gelöst, welche das Lackmuspapier vorübergehend röthen.
 Bei der sauren Auflösung wird es von Wasser, aber mit
 veränderten Eigenschaften, niedergeschlagen. Concentrirte
 Petersäure löst dasselbe in der Kälte unverändert auf,
 und zersetzt es in der Wärme. Essigsäure löst dasselbe,
 auch in der Kälte, leicht auf. In dieser Art von Auflö-
 sung befindet es sich in dem übergehenden sauren Was-
 ser bei der Destillation des Terpenthinöls. Chlorwasser-
 säure löst dasselbe erst in der Wärme auf. Alkalien
 wirken nicht darauf und entwickeln daraus keinen Am-
 niakgeruch. — Ist dieses Stearopten ein Product von
 der Zersetzung des Oels durch Einwirkung der Luft, oder
 verliert letzteres dadurch nur das Vermögen, dasselbe auf-
 zu lösen zu erhalten?

Das Terpenthinöl ist eine überall vorkommende Han-
 delswaare. In großen Quantitäten ist es schwer aufzube-
 halten. Die Zerbrechlichkeit der Glasgefäße und die
 Entzündlichkeit des Oels sind Ursache, daß man es nicht
 in großen Glasflaschen aufbewahrt. Im Großen ver-
 packt man es in hölzernen Gefäßen, die indessen leicht
 austrocknen und es ausfließen lassen; man muß sie
 halb noch in andere hölzerne Gefäße legen, und den
 Raum zwischen diesen und den anderen mit Wasser aus-
 füllen. Das Terpenthinöl wird in der Malerei und beim
 Schmelzen zur Verdünnung der Oelfirnisse, Auflösung des
 Balsams zu hellem Copalfirniss, und überhaupt zur Berei-
 tung der Terpenthinirnisse u. a. m. gebraucht. In der
 Medicin wird es unter andern innerlich als ein sehr
 wirksames Mittel gegen den Bandwurm gebraucht.

In Schweden ist eine Art Terpenthinöl aus dem Harze
 der Fichten und Tannen bereitet worden, und kam vor
 einiger Zeit im Handel unter dem Namen schwedischer
 Terpenthinspiritus (*Oleum Pini*) vor. Es gleicht in allen
 seinen Verhältnissen dem Terpenthinöl, ausgenommen im

Geruch, der höchst widrig ist, und da es eben aus dieser Ursache nicht allgemein zu Oelfarben gebraucht werden konnte, so wurde sein Verbrauch zu geringe und seine Gewinnung wurde eingestellt.

Citronenöl wird durch Auspressen der äußeren Schalen der Citronen gewonnen. Es ist in diesem Zustand gelblich, dünnflüssig, von 0,8517 spec. Gewicht; aber mit Wasser umdestillirt, bis $\frac{2}{3}$ übergegangen sind, erhält man, nach de Saussure, ein farbloses Oel, dessen spec. Gewicht bei $+22^{\circ} = 0,847$ ist, und welches selbst bei -20° nicht erstarrt. Das Citronenöl hat einen angenehmen Citronengeruch, der beim ausgepressten angenehmer ist, als beim destillirten. Es hat ungefähr dieselbe Tension, wie das Terpenthinöl; bei $+15^{\circ}$ trägt sein Gas eine Quecksilbersäule von 9 Millimeter Höhe. Es löst sich in allen Proportionen in wasserfreiem Alkohol auf; aber 100 Th. Spiritus von 0,837 lösen bei $+16^{\circ}$ nicht mehr als 14 Th. Citronenöl auf.

Mit Chlorwasserstoffsäuregas geht es Verbindungen ein, die denen vom Terpenthinöl ähnlich sind, und zuerst von Thénard beobachtet, und von de Saussure näher untersucht worden sind. Dieser fand, daß das destillirte Citronenöl bei $+20^{\circ}$ und 0,724 Meter Barometerhöhe sein 286faches Volum Chlorwasserstoffsäuregas unter Wärme-Entwickelung aufnimmt, dabei gelb wird und ungefähr $\frac{2}{3}$ an Umfang und 0,49 an Gewicht zunimmt. Es erstarrt nachher bei $+12^{\circ}$ zu einer krystallinischen Masse, welche durch Pressen zwischen Löschpapier in einen festen und einen flüssigen Theil, welche von zwei verschiedenen, im Citronenöl mit einander vermischten Oelen herzurühren scheinen, getrennt werden kann.

Die flüssige Verbindung ist gelb, an der Luft rauchend, und riecht, nachdem der Ueberschuß von Säure verdunstet ist, stark nach Thymian. Sie enthält gewöhnlich einen Antheil von der krystallisirten Verbindung aufgelöst, deren ganze Menge sich bei $+25^{\circ}$ bis 30° darin auflöst. Sie ist nicht weiter untersucht. Die feste Verbindung beträgt ungefähr $44\frac{1}{2}$ Proc. vom Gewicht des

s. Sie hat folgende Eigenschaften: Sie krystallisirt, weder durch Sublimation oder aus einer Auflösung in Alcohol, in rechtwinkligen, vierseitigen Prismen, die oft r. platt oder blattförmig sind. Sie hat einen schwachen Geruch nach Thymian, ist sehr zähe, schwerer als Wasser, läßt sich nur sehr schwer entzünden und brennt un-

ter. Entwicklung von Chlorwasserstoffsäure. In der Luft verändert sie sich nicht, sublimirt sich aber in den Gefäßen, worin man sie aufbewahrt, und setzt sich krystallin an die Wände an. Bei $+41^{\circ}$ schmilzt sie und nimmt beim Erkalten eine glänzende, krystallinische Textur an. In einem Destillationsgefäße schnell bis zu einer, den Kochpunkt des Wassers weit übersteigenden Temperatur erhitzt, läßt sie sich ohne bemerkbare Veränderung destilliren. Die überdestillirte und krystallisirte Masse nimmt nur einen geringen ölartigen Ueberzug an. Wird sie aber langsam destillirt oder lange bei $+60^{\circ}$ erhalten, so zerfällt sie theilweise; ein Theil sublimirt sich in, mit gelbbogenfarben spielenden Blättern, und ein anderer theilt sich stillirt als ein saures Oel über, das noch einen Antheil der unzersetzten Verbindung aufgelöst enthält. Diese Zersetzung erleidet sie in noch höherem Grade, zwar ebenfalls nicht vollständig, wenn sie mit dem 5 bis 6fachen Gewichte ungelöschten Kalks in einem Destillationsgefäße bei $+60^{\circ}$ erhitzt wird. Das überdestillirende Oel ist nun frei von Säure. Dasselbe ist flüchtig, dünnflüssig, farblos und durchsichtig, ist aber kein Citronenöl mehr, sondern ein anderes Oel, welches Chlorwasserstoffsäure in geringer Menge absorbirt und sich dadurch schwärzt, die wieder die krystallisirte Verbindung hervorzubringen.

Die feste Verbindung ist in Wasser unauflöslich, aber bei $+14^{\circ}$ in 6 Th. Alkohols von 0,806 auflöslich. Sie wird von concentrirter Schwefelsäure, unter Entwicklung von Chlorwasserstoffsäuregas, aufgelöst. Die Auflösung ist gelb, bildet mit Wasser eine Emulsion, worauf sich ein sehr verändertes, grüngelbes, dickes und stinkendes Oel schwimmt. Rauchende Salpetersäure greift dieselbe bei der Kälte wenig an. Sie löst sich darin zum Theil

auf, zum Theil wird sie dadurch zerstört. Der zersetzte Theil fällt die Silberauflösung, aber der aufgelöste bewirkt die Fällung nur in dem Grade, als er zersetzt wird. Von Chlorwasserstoffsäure wird dieselbe nicht aufgelöst oder verändert.

Vom undestillirten Citronenöl erhält man mit Chlorwasserstoffsäuregas weit weniger von der krystallisirten Verbindung; es wird dadurch dunkler, setzt Krystalle erst bei $+10^{\circ}$ ab, enthält eine schwarze, zähe Substanz nebst einem gelben Farbstoff aufgelöst, und setzt einige Tropfen einer braunen und schweren Flüssigkeit ab, die sich nicht mit dem sauren Oel vermischen läßt.

Die krystallisirte Verbindung gab, nach de Saussure, durch Zersetzung mit Salpetersäure, 108,7 Proc. Chlorsilber, welche 27,6 Proc. Chlorwasserstoffsäure entsprechen, oder wonach 100 Th. Oel mit 38,12 Th. Chlorwasserstoffsäuregas verbunden sind, was also einen geringeren Säuregehalt in der krystallisirten, als in der flüssigen Verbindung ausweist.

Das Citronenöl wird hauptsächlich zum Parfümiren und nur wenig in der Medicin angewendet.

Bergamottöl wird ebenfalls durch Auspressen aus der Schale der reifen Früchte von *Citrus Aurantium* und *Bergamium* gewonnen. Es riecht nach Pomeranzen, ist klar, gelblich, dünnflüssig und von 0,888 spec. Gewicht. Es geseht etwas unter 0° . Dieses Oel ist wenig untersucht. Ich habe es unter den nicht sauerstoffhaltigen Oelen bloß wegen seiner Analogie mit dem Citronenöl aufgeführt.

Das Stearopten des Rosenöls werde ich beim Rosenöl anführen.

B. Sauerstoffhaltige flüchtige Oele.

Die Anzahl dieser Oele ist sehr groß; nur wenige davon sind untersucht. Die hier abzuhandelnden werde ich eintheilen in *a*) aromatische, *b*) scharfe und blasenziehende, *c*) giftige oder blausäurehaltige, und *d*) Campher.

Die

Die aromatischen Oele will ich in alphabetischer Ordnung führen.

a) Aromatische Oele.

Anisöl, aus Anis, dem Saamen von *Pimpinella* *zsum.* Es ist farblos oder gelblich, hat den Geruch und Geschmack vom Anis, geseht nach und nach bei 10° , wird aber nicht eher als bei $+17^{\circ}$ wieder flüssig.

Sein spec. Gewicht ist bei $+25^{\circ} = 0,9857$, und seine Dension bei $+15^{\circ},5$ trägt eine Quecksilbersäule von 1 Millimeter Höhe. Es läßt sich mit Alkohol von 0,806 in allen Verhältnissen vermischen, aber Alkohol von 0,844 nur bei $+25^{\circ}$ nur 0,42 seines Gewichts davon auf. Durch Erhitzung in der Luft verliert er seine Neigung zu gellen. Es besteht aus zwei Oelen, einem bei gewöhnlicher Temperatur festen und einem flüssigen.

a) Stearopten vom Anisöl, wird durch Auspressen bei 0° zwischen Löschpapier erhalten, und beträgt ungefähr $\frac{1}{4}$ vom Gewicht des Oels. Es bildet eine weiße, krystallinische Masse, die sich zu einem trocknen Pulver zerreiben läßt, hat die Härte von Zucker, schmilzt bei 20° , ist in krystallisirtem Zustand schwerer als Wasser, hat bei $+12^{\circ} = 1,014$, aber bei $+25^{\circ} = 0,9849$, bei $50^{\circ} = 0,9669$, und bei $+94^{\circ} = 0,9256$ spec. Gewicht, gleiches mit dem des Wassers bei $+12^{\circ}$. Es ist weniger flüchtig als das Elaeopten, und seine Tension entspricht einer Quecksilbersäule von 1 Millimeter. Es ist schwerer in Alkohol auflöslich, und braucht bei 10° 4 Th. Alkohols von 0,806, wiewohl es bei $+15^{\circ}$ $\frac{6}{10}$ seines Gewichtes von demselben Alkohol aufgelöst wird. So lange es seine Krystallform behält, verändert es sich nicht in der Luft. Ich habe schon vorher seines Verhaltens zur Luft im geschmolzenen Zustand erwähnt. Das harzte Oel krystallisirt nicht mehr. b) Das Elaeopten vom Anisöl ist nicht weiter untersucht.

Das im Handel vorkommende Anisöl soll bisweilen mit Baumöl, worin man etwas Wallrath geschmolzen hat, gefälscht werden.

482 Cajeputöl. Dillöl. Wachholderöl.

Aus den Saamenkapseln und dem Saamen von *Sten- anis*, *Illicium anisatum*, erhält man durch Destillation ein im Geruch und Geschmack dem Anisöl ähnliches Öl, welches aber dünnflüssig ist, und sich noch bei $+2^{\circ}$ flü- sig erhält. Es ist sowohl in Alkohol als in Aether leicht auflöslich.

Cajeputöl wird auf den Molucken durch Destilla- tion der trocknen Blätter von *Melaleuca Leucadendron* bereitet. Der Name Cajeput bedeutet in der Landesprache der weisse Baum. Dieses Öl ist grün, schmeckt bren- nend und riecht stark nach Campher, Terpenthin und Sevenbaum, ist dünnflüssig und hat bei $+9^{\circ} = 0,978$ spec. Gewicht. — Man hat darüber gestritten, ob die grüne Farbe dem Öl eigenthümlich sei oder von Kupferoxyd herrühre, weil das Öl im Handel in Kupferflaschen vor- kommt. Mit Wasser umdestillirt, soll es farblos oder gelblich erhalten werden und in der Retorte ein Haas zurücklassen, welches Ammoniak blau färbt. Es wird bisweilen mit Terpenthin-, Rosmarin- oder Sevenbaumöl nachgemacht, indem man darin Campher auflöst und es mit Harz von *Achillea Millefolium* grün färbt. Das Cajeputöl wird in der Medicin gebraucht.

Dillöl, aus Dill, *Apium graveolens*. Es ist blaß- gelb, riecht durchdringend nach Dill, schmeckt süßlich und brennend. Sein spec. Gewicht ist 0,881. Es ist in 1500 Th. Wassers auflöslich, und wird von Alkohol und Aether sehr leicht aufgenommen. Seine gesättigte Anflö- sung in Wasser wird in der Medicin unter dem Namen von *Aqua anethi* gebraucht.

Wachholderöl, durch Destillation der gut zerquetch- ten Wachholderbeeren mit Wasser. Das Öl liegt in den Beeren in kleinen Behältern, die geöffnet werden müssen, wenn das Öl soll verdampfen können. Es ist wasserklar oder bisweilen grüngelb. Sein spec. Gewicht ist 0,911. Es schmeckt und riecht nach Wachholder. Von Wasser in geringer Menge, und auch von Alkohol nur aufgelöst. Dem Branntwein in geringer Menge zuge- setzt, bildet den sogenannten Genievre oder Gin

Engländer. Es wird in der Medicin gebraucht und ein sehr gutes urintreibendes Mittel gehalten; auch eilt es, wie das Terpenthinöl, dem Urin einen Veilgeruch. Das im Handel vorkommende Oel ist sehr mit Terpenthinöl verfälscht, welches man bei der Destillation mit den Wachholderbeeren in die Blase gethan hat. Diese Verfälschung wird durch das spec. Gewicht entdeckt, indem dasselbe dann bedeutend geringer ausfällt.

Fenchelöl, aus dem Saamen von *Anethum Foeniculum*. Es ist farblos oder gelblich, schmeckt und riecht nach Fenchel, und hat 0,997 spec. Gewicht. Es gesteht bei $+10^{\circ}$ zu einer krystallinischen Masse, die sich durch Auspressen zwischen Löschpapier zerlegen läßt in ein Stearopten, welches schwerer als Wasser ist, breite Krysalblätter bildet, und bedeutend weniger flüchtig und weniger in Wasser auflöslich ist, als das Elaeopten, welches auf Wasser schwimmt, sich darin in bedeutender Menge auflöst, und welches, zu Anfang der Destillation das ganze Oel mit Wasser, in einem größeren Verhältniß als das Stearopten übergeht. Das Fenchelöl, so wie seine Auflösung in Wasser, sind Arzneimittel. Aus dem Fenchelwasser schießt das Stearopten bisweilen in Krystallen an.

Fuselöle. Die zur Weingährung dienenden Pflanzsubstanzen enthalten gewöhnlich, in sehr geringer Menge, flüchtige Oele, welche sich beim Branntweimbrennen mit Wasser- und Alkohol-Dämpfen verflüchtigen, so daß sie in zunehmendem Verhältniß in den zuletzt übergehenden weniger Spiritus haltenden Wasserdämpfen enthalten sind, welche sich zu einer milchichten Flüssigkeit condensiren, die das Oel in der Ruhe absetzt. Diese Oele hängen dem Alkohol hartnäckig an, der dadurch, wie man bemerkt, einen Fuselgeschmack bekommt. Die Fuselöle sind aus verschiedenen Materialien verschieden, und unterscheiden sich von den gewöhnlichen flüchtigen Oelen dadurch, daß sie sich so leicht mit kaustischem Alkali auflösen.

1) Fuselöl aus Getreide ist bei gewöhnlicher

Temperatur halb fest, weiß, sieht in der Kälte talgartig aus, und besteht einem großen Theile nach aus Stearopten. Es schmeckt und riecht sehr unangenehm; schwimmt auf Wasser und eingradigem Branntwein. Durch einen Kafferoxydgehalt ist es oft grün gefärbt. Erwärmt, schmilzt es und wird gelb. Auf Papier hinterläßt es bisweilen nach dem Verdampfen einen Fettfleck, wenn es sich schon an der Luft verändert hat. Es löst sich in 6 Th. wasserfreien Alkohols und in 2 Th. Aethers auf. Von Wasser wird es nur unbedeutend aufgenommen und aus gewöhnlichem Branntwein durch Verdünnung und starke Abkühlung ausgeschieden. Von kaustischem Alkali wird es aufgelöst. Von gut ausgeglühter Kohle wird es aufgenommen, und vermittelt Blutlaugenkohle kann es aus einem damit verunreinigten Branntwein gänzlich weggenommen werden.

2) Fuselöl aus Kartoffeln hat ganz andere Eigenschaften. Man erhält es in ziemlicher Menge, wenn die Destillation noch fortgesetzt wird, nachdem der Branntwein schon übergegangen ist. Man erhält dann ein gelbliches Oel, welches sowohl Wasser als Spiritus enthält. Zuerst mit Wasser, und hierauf mit Pulver von Chlorcalcium geschüttelt und umdestillirt, hat es, nach Pelletan folgende Eigenschaften: Es ist farblos, klar, von eigenem Geruch und wärmendem, bitterem und anhaltendem Geschmack; es hinterläßt auf Papier keinen Fettfleck, bleibt noch bei -18° flüssig, und krystallisirt dann wie Anisöl. Es kocht, wenn es rein ist, bei $+125^{\circ}$; enthält es aber Wasser oder Alkohol, so kocht es leichter. Sein spec. Gewicht ist 0,821, aber bei Wassergehalt, 0,8233. Es brennt mit leuchtender, nicht rauchender Flamme, verlischt aber, wenn es nicht zuvor erhitzt oder mit einem Docht versehen ist. Es löst sich etwas in Wasser auf, das davon den Geschmack und die Eigenschaft, beim Schütteln zu schäumen und zu perlen, bekommt. Selbst das Oel nimmt Wasser auf. Mit Alkohol vermischt es sich in allen Verhältnissen, und Wasser scheidet daraus nicht das Oel ab, wenn nicht die Menge des Alkohols sehr geringe ist. In

schon löst es Schwefel auf und vereinigt sich leicht mit d. Von Chlor wird es grün. Von concentrirter Schwesäure wird es mit carmoisinrother Farbe aufgelöst und raus von Wasser mit gelber Farbe niedergeschlagen. Saltersäure greift es in der Kälte nicht an, in der Wärme twickelt sich Salpeternaphtha. Chlorwasserstoffsäuregas wandelt dasselbe in Chlorwasserstoffnaphtha, die sich ch nach einigen Tagen aus seiner Verbindung mit Chlor twickelt. Es läßt sich in allen Verhältnissen mit Essig- re vermischen. Es wird von concentrirten kaustischen kalien aufgelöst und daraus von Wasser niedergeschla- n. Es löst essigsäures Kali auf, und nimmt das Gold- orid aus seiner wässrigen Auflösung auf, ohne dasselbe verändern. Kalium oxydirt sich darin mit Gasentwik- lung. Es ist nicht giftig, wenigstens verursachte es bei nden, eslöffelweise gegeben, nur Erbrechen.

3) Fuselöl aus Trauben erhält man beim Brannt- inbrennen aus dem in Gährung versetzten Rückstand r ausgepressten Weintrauben, nachdem zuvor der Spi- as übergegangen ist. Es ist, nach Aubergier, dünn- ssig, von durchdringendem Geruch und scharfem un- genehmen Geschmack, wasserklar, und wird in der ft schnell gelb. Für sich destillirt, geht es anfangs un- ändert über, fängt aber dann sich zu zersetzen an und rd brenzlich. Es ist in 1000 Th. Wassers auflöslich, lches davon Geschmack und Geruch annimmt. Ein opfen davon ertheilt 60 Quart Branntwein Fuselge- mack. Im Kochen löst es Schwefel auf, der sich beim kalten wieder abscheidet. Es ist mit kaustischen Alka- a verbindbar.

Hollunderöl, aus den Hollunderblüthen, *Sambucus ra*. Es hat die Consistenz von Butter. Seine Auflö- g in Wasser, *Aqua sambuci*, wird in der Medicin gewandt.

Hyssopöl, von *Hyssopus officinalis*, ist gelb und d mit der Zeit roth, schmeckt scharf und campherar-

Seine Auflösung in Wasser ist das in der Medicin gewandte *Aqua hyssopi*.

Calmusöl aus der Calmuswurzel, *Acorus Calamus*. Es ist gelb, und hat völlig den Geruch und Geschmack der Wurzel. Wird mit der Zeit roth.

Chamillenöl wird aus den Chamillenblumen, *Matricaria Chamomilla*, erhalten. Es ist dunkelblau, fast undurchsichtig und dickflüssig, riecht wie Chamillen und schmeckt gewürzhaft. Durch Einfluß der Luft wird es braun und schmierig. Salpetersäure löst dasselbe mit brauner Farbe auf, und Wasser schlägt daraus ein nach Moschus riechendes Harz nieder. Zuerst mit Schwefelsäure und dann mit Wasser vermischt, soll es sich, nach Hasse, mit Explosion entzünden. Es wird oft auf die Art verfälscht, daß man bei seiner Bereitung zu den Blumen Terpenthinöl zusetzt. Von der preussischen Pharmacopöe wird ein Zusatz von einer Unze Citronenöl auf 3 Pfund Blumen vorgeschrieben, aus dem Grunde, weil sich das Chamillenöl für sich wegen seiner dicken Beschaffenheit so schwer vom Wasser trennt. Es wurde ehemals als Arzneimittel gebraucht.

Blaue, dem Geruch nach ebenfalls dem Chamillenöl sehr ähnliche Oele erhält man von den römischen Chamillen, *Anthemis nobilis*, von den Blüten der *Arnica montana*, so wie von den Schafgarbenblüten, *Achillea Millefolium*; letztere muß aber auf fettem Boden gewachsen sein, weil sonst das Oel grün ist.

Zimmetöl, aus dem Zimmet, der Rinde vom *Laurus Cinamomum*. Es wird auf Ceylon aus den klein zerriebenen, zum Verpacken untauglich gewordenen Zimmetstücken gewonnen. Es geht schwer über, und man wendet dabei einen niedrigen Destillationsapparat und Salz im Wasser an. Es hat eine hellgelbe Farbe, wird aber mit der Zeit bräunlich; es besitzt den süßlich brennenden Geschmack und den angenehmen Geruch des Zimmets in hohem Grade; es ist schwerer als Wasser, sein spec. Gewicht ist 1,035. Es gesteht unter 0° und schmilzt dann erst bei +5°. In Wasser ist es sehr schwer auflöslich, woraus es sich nach dem Umschütteln gänzlich ausscheidet. In Alkohol dagegen ist es sehr leicht auflöslich.

Wird Zimmetöl lange aufbewahrt, so setzt es ein ophten in großen, regelmässigen, farblosen oder gelblichen Krystallen ab, das sich leicht pulvern läßt, bei geringer Wärme zu einer farblosen Flüssigkeit schmilzt und beim Erkalten wieder in Krystallen anschießt. Es riecht nach Zimmetöl und Vanille, und schmeckt talgartig, hintennach zimmetartig brennend und aromatisch. Es zerfällt zwischen den Zähnen; es braucht zum Ueberdestilliren eine sehr hohe Temperatur, und wird dabei braun und brenzlich. Nach dem Erkalten bleibt das Destillat noch lange flüssig, geseht aber zuletzt zu braunen Krystallgruppen. In Alkohol löst es sich leicht und in großer Menge auf. Nach dem freiwilligen Verdampfen hinterläßt der Alkohol ein ölartiges Liquidum, das sich nach und nach in Gruppen von farblosen Krystallen verwandelt. Von Schwefelsäure wird es mit tief rothgelber Farbe aufgelöst, und aus dieser Auflösung durch Wasser mit unveränderten Eigenschaften niedergeschlagen. Erwärmt schwärzt und zersetzt sie sich. In concentrirter Salpetersäure löst es sich augenblicklich auf, wenn es als Pulver in kleinen Portionen eingetragen wird, worauf bald Gas mit Heftigkeit sich zu entwickeln anfängt. Wasser schlägt dann ein braunes zähes Liquidum nieder, welches nach dem Auswaschen äußerst bitter schmeckt und im Halse unerträgliches Brennen verursacht. Von Ammoniak wird es zersetzt, unter Abscheidung einer pulverförmigen Substanz und Bildung einer braunen Auflösung. Das Stearopten löst sich in geringer Menge in Essigsäure auf. Die scharfheißse Auflösung setzt dasselbe beim Erkalten in farblosen, durchsichtigen Krystallen ab. Sie wird von Wasser milchicht, und nach dem Abdampfen läßt sie das Stearopten krystallisirt zurück. Die Alkalien lösen eine kleine Menge von diesem Stearopten auf, und bilden milchähnliche, unklare Auflösungen, aus welchen es wieder von Säuren niedergeschlagen wird. Man hat angegeben, daß es durch Alkali ausziehbare Benzoësäure enthalte. Es röthet allerdings das Lackmuspapier, und das Alkali benützt sich dieser Säure, sie beträgt aber nur eine Spur.

488 Krausemünzöl. Kümmelöl. Lavendelöl.

Wird es mit Alkali gekocht, so wird es, selbst nach der Digestion mit verdünnter Säure, nicht mehr fest, sondern bildet ein dickes, rothgelbes Liquidum. Geschieht das Kochen in einem Destillationsgefäße, so geht mit dem milchichten Wasser eine geringe Menge Stearopten über.

Das Zimmetöl wird sowohl für sich, als in Spiritus aufgelöst, oder in Vermischung mit Spiritus, Wasser und Zucker (Zimmetwasser) sehr viel in der Heilkunde angewendet. Es ist sehr theuer und wird daher oft mit Oel verfälscht, welches durch Destillation aus den Zimmetknospen, den noch unaufgebrochenen Blütenknospen des Zimmetbaumes, erhalten wird. Dieses hat mit dem Oele aus der Rinde in Farbe, Geruch, Geschmack und spec. Gewicht sehr viele Aehnlichkeit, schmeckt indessen weniger angenehm und hat einen Nebengeruch von Styrax.

Krausemünzöl, aus dem Kraut von *Mentha crispa*. Frisch ist es blafs gelb, wird aber mit der Zeit dunkler und rothgelb. Es besitzt den Geruch und Geschmack der Pflanze. Sein spec. Gewicht ist 0,975. Einem höheren Kältegrad ausgesetzt, geseht es beim Schütteln. Es wird in der Medicin angewendet.

Kümmelöl, aus gewöhnlichem Kümmel, dem Saamen von *Carum Carvi*. Es ist blafs gelb, und hat Geruch und Geschmack des Kümmels. Sein spec. Gewicht ist 0,94. Ein im Geruche ähnliches, aber weniger angenehmes Oel wird aus dem römischen Kümmel, dem Saamen von *Cuminum Cyminum* gewonnen. Es ist blafs gelb, dünnflüssig und von brennenderem Geschmack, als das vorige. Sein spec. Gewicht ist 0,975. Das Kümmelöl wird in der Medicin gebraucht, und ist im Kümmelbranntwein enthalten.

Lavendelöl, aus dem Kraut von *Lavandula Spica*, unserem gewöhnlichen Gartenlavendel. Es ist gelb, dünnflüssig, riecht wie Lavendel und schmeckt brennend. Das spec. Gewicht des im Handel vorkommenden ist bei $+20^{\circ}$ = 0,898, und wird nach dem Destilliren mit Wasser 0,877. Seine Tension entspricht bei $+13^{\circ},75$ einer Quecksilbersäule von 73 Millimeter Höhe. Es löst sich in allen Pro-

Portionen in Spiritus von 0,83 auf, aber Spiritus von 0,887 ist nicht mehr als 0,42 seines Gewichts Lavendelöl auf. Wird Lavendelöl mit concentrirter Essigsäure geschüttelt, trennt sich das Gemische in eine ölähnliche Verbindung von Essigsäure mit Oel und in eine wasserähnliche Auflösung von Oel in Säure. Letztere enthält mehr Wasser, weil das Oel nur die reine Säure aufnimmt. Wasser zieht die Säure vollständig aus. Dieses Oel wird hauptsächlich zum Parfümiren gebraucht, und seine Auflösung in Alkohol, *Eau de Lavande*, ist eines der allgemeinen riechenden Wasser.

Im Handel kommt, unter dem Namen von Spieköl, eine andere Art von Lavendelöl vor, die im südlichen Europa aus einer uncultivirten Varietät von *Lavandula spica*, die breitere Blätter hat, und daher *latifolia* genannt wird, destillirt. Dieses Oel hat einen weniger lavendelartigen Geruch und zugleich etwas von Terpeninöl, mit dem es außerdem oft verfälscht wird. Es ist wohlfeil, daß es oft zu demselben Endzweck, wie Terpeninöl, gebraucht wird.

Nach Proust's Angabe setzt sich aus dem Lavendelöl ein Stearopten in Krystallen ab, zumal wenn das Oel in vollkommen verschlossenen Gefäßen steht, das oft $\frac{1}{4}$ vom Gewicht des Oels betragen kann, und durch Ausschessen in der Kälte und Sublimation gereinigt werden kann. Proust hielt es mit Campher für identisch, und die Bereitung des Camphers auf diese Weise für sehr vortheilhaft.

Wermuthöl, aus dem ganzen Kraut von Wermuth, *Artemisia Absinthium*. Es ist gelb oder bisweilen grün, hat den charakteristischen Geruch des Wermuths und einen ihm ähnlichen Geschmack. Wird in der Medicin gebraucht.

Muskatnufsöl, aus den Muskatnüssen und vorzüglich aus den Muskatblüthen, dem gelblichen, häutigen Überzug der Muskatnüsse. Dieses Oel ist farblos oder gelblich, etwas dickflüssig, und besitzt einen aromatischen, starken Muskatgeruch, einen brennenden Geschmack und

ist von 0,948 spec. Gewicht. Es besteht aus zwei Oelen, die durch Schütteln mit Wasser von einander getrennt werden können, indem das eine, welches das flüchtigste und aromatischte ist, obenauf schwimmt, und das andere schwerere, butterähnliche zu Boden sinkt. Bei der Wärme der Hand wird es flüssig.

Wenn Muskatnufsöl einige Zeit gestanden hat, setzt es ein Stearopten in Gestalt einer krystallinischen Kruste ab, welches John Myristicin genannt hat. Dieses Stearopten hat einen aromatischen Geruch und Muskatgeschmack. Zum Schmelzen bedarf es mehr, als $+100^{\circ}$, fließt dann wie ein Oel und verdampft bei stärkerer Hitze mit Hinterlassung eines Kohlenflecks. Bei der Destillation zersetzt es sich etwas, liefert zuerst ein wasserklares, und hernach ein gelbes Oel, so wie etwas Wasser, das aromatisch riecht und brennend schmeckt, und alkalisch reagirt, ohne Ammoniak zu enthalten. Es löst sich in 19 Th. kochenden Wassers auf, und beim Erkalten geseht das Ganze zu einer schneeweißen krystallinischen Masse, aus der sich das Wasser auspressen läßt. Beim langsamen Abdampfen dieses Wassers schießt es daraus in farblosen, wasserklaren, langen und dünnen prismatischen Tafeln, mit zweiflächiger Zuspitzung, an. In Alkohol und in Aether ist es leicht auflöslich. Mit concentrirten Säuren ist es verbindbar und läßt sich daraus wieder durch Wasser ausziehen. Seine wäßrige Auflösung fällt nicht die Salze von Baryterde, Blei, Eisen, Quecksilber oder Gold.

Das Muskatnufsöl wird in der Heilkunde angewendet.

Gewürznelkenöl, aus den Gewürznelken, den noch unentwickelten Blütenknospen von *Caryophyllus aromaticus*. Es ist farblos oder gelblich, hat einen starken Geruch nach Gewürznelken und einen brennenden Geschmack. Sein spec. Gewicht ist 1,034. Es ist eines der am wenigsten flüchtigen Oele und schwer überzudestilliren. Mit der Zeit setzt es ein krystallinisches Stearopten ab. Man erhält wahrscheinlich dasselbe Stearopten, wenn man gröblich zerstoßene Gewürznelken eine Zeit lang mit

Alkohol kocht und diesen abfiltrirt. Es schießt dann in kleinen, kugelförmig gruppirten, weißen, glänzenden Krystallen an, die weder Geruch noch Geschmack haben. In Aether ist es auflöslich, unauflöslich in Alkali. Bei gelinder Hitze sublimirt es sich, wenigstens größtentheils, unverändert. Einige deutsche und französische Chemiker nennen es Caryophyllin. Das im Handel vorkommende Nelkenöl ist braun und von unerträglich brennendem Geschmack. Es ist ein verfälschtes Oel, indem das ächte mit einer Tinktur von Nelken versetzt ist, deren scharfes Harz auf diese Weise mit in's Oel kommt. Bisweilen wird es auch mit anderen Oelen verfälscht. Es wird in der Heilkunde und sehr häufig als Hausmittel beim Zahnweh angewendet.

Neroliöl, aus den frischen Pomeranzenblüthen, *Citrus Aurantium*, ist röthlichgelb, dünnflüssig, leichter als Wasser und von höchst angenehmem Geruch. Seine Auflösung in Wasser (*Aqua Aurantiorum*) wird in der Heilkunde gebraucht, und gewöhnlich durch Destillation der frischen oder eingesalzenen Blüthen mit Wasser gewonnen. Dieses Oel macht einen Hauptbestandtheil mehrerer Parfüms aus.

Pfefferöl, wird aus dem gewöhnlichen Pfeffer, *Piper nigrum*, und aus dem Jamaika-Pfeffer, den Beeren von *Myrtus pimenta*, erhalten. Frisch ist es wasserklar, wird aber nach und nach gelb, schwimmt auf Wasser, hat den Geruch, aber nicht den brennenden Geschmack des Pfeffers. Wird in der Medicin gebraucht.

Pfeffermünzöl, aus dem Kraut von *Mentha piperita*. Es ist gelblich und hat einen brennenden, campherartigen und weit schärferen Geschmack, als das Krausemünzöl. Sein spec. Gewicht ist 0,92. Bei -22° setzt es kleine haarförmige Krystalle ab, und nach längerem Aufbewahren ein Stearopten, welches Proust für identisch mit Campher hält. Nach Giese setzt sich dasselbe nur aus dem Oel ab, welches von der in der Blüthe gesammelten und getrockneten Pfeffermünze gewonnen ist, und nicht aus dem von der frischen, nicht getrockneten Pflanze

492 Petersilienöl. Reinfarrenöl. Rosenöl.

destillirten. Das Pfeffermünzöl und besonders seine gesättigte Auflösung in Wasser (*Aqua menth. piperit.*) werden viel in der Heilkunde gebraucht. Das Pfeffermünzwasser zeichnet sich durch das angenehme Gefühl von Kälte aus, welches dasselbe im Munde erregt.

Petersilienöl, aus der Petersilie, *Apium Petroselinum*. Es ist ein hellgelbes, im höchsten Grad nach Petersilie riechendes Oel. Es besteht aus zwei, durch Schütteln mit Wasser trennbaren Oelen. Sein Elaeopten schwimmt obenauf und ist dünnflüssig, sein Stearopten sinkt zu Boden, ist butterartig und in der Kälte krystallisirbar. Die gesättigte Auflösung des Petersilienöls (*Aqua petroselini*) wird in der Medicin gebraucht. Nach längerem Aufbewahren schießt nicht selten das Stearopten des Oels in Krystallen an, die man Petersiliencampher genannt hat. In diesem Zustand schmilzt er erst bei $+30^{\circ}$.

Reinfarrenöl, aus Kraut und Blumen von *Tanacetum vulgare*. Je nach dem Boden, ist es gelb oder grün; letzteres kommt von trockenem, fettem Boden. Es hat den unangenehmen, durchdringenden Geruch des Reinfarrens, und einen scharfen und bitteren Geschmack. Sein spec. Gewicht ist 0,946. Wird in der Medicin gebraucht.

Rosenöl, durch Destillation der Blumenblätter von *Rosa centifolia* und *sempervirens*. Aus inländischen Rosen wird es in so geringer Menge gewonnen, daß es nicht der Mühe lohnt. Wenn man mehrere Male dasselbe Wasser über neue Mengen von Rosen destillirt, die man gewöhnlich einsalzt, um sie in großer Menge auf einmal zu haben, so bekommt man zuletzt etwas Oel, und beim Abkühlen des Wassers bis 0° setzt sich daraus noch mehr von butterähnlicher Beschaffenheit ab. Aber das so gewonnene Oel hat wegen der wiederholten Destillationen, wobei es jedes Mal durch Einfluß der Luft etwas verändert wird, einen weniger angenehmen Geruch, als die Rosen. In Ostindien soll das Rosenöl auf die Art bereitet werden, daß die Saamen von einer Digitalisart, Gengeli genannt, welche viel fettes Oel enthalten, in stei-

ernen Krügen mit Rosenblättern aufgeschichtet und so einige Tage lang an einem kühlen Ort stehen gelassen werden, wobei das Oel im Saamen das Rosenöl absorbiert. Wird dasselbe Verfahren mit demselben Saamen mit neuen Quantitäten von Rosenblättern wiederholt, so schwellen die Saamen, sowohl durch den wässrigen Saft, als auch durch das flüchtige Oel der Rosen, zuletzt bedeutend auf, und dann werden sie ausgepresst. Die ausgepresste trübe Flüssigkeit muß zum Klarwerden lange Zeit in gut verschlossenen Gefäßen stehen gelassen werden. Die obere Oelschicht wird dann mittelst eines baumwollenen Dochts abgelassen, und ist nun ein mit Rosenöl gesättigtes fettes Oel, woraus sich das Rosenöl durch Destillation mit Wasser abscheiden läßt.

Das Rosenöl ist farblos, hat einen starken Rosengeruch, der indessen nur angenehm ist, so lange er schwach ist, sonst unangenehm ist, Kopfweh und Hitze verursacht; sein Geschmack ist mild und süßlich; es ist leichter als Wasser, und sein spec. Gewicht ist bei $+32^{\circ},5 = 0,832$, verglichen mit dem des Wassers bei $+15^{\circ}$. Bei niedrigeren Wärmegraden geseht es und wird butterartig, und schmilzt erst bei $+29^{\circ}$ bis 30° . Seine Tension bei $+14^{\circ},5$ entspricht einer 2 Millimeter hohen Quecksilbersäule. Es ist in Alkohol schwer auflöslich; 1000 Th. Alkohol von 0,806 spec. Gewicht nehmen bei $+14^{\circ}$ nur $7\frac{1}{2}$ Th., und bei $+22^{\circ}$ nicht mehr als 33 Th. Rosenöl auf. Dieses Oel besteht, wie schon erwähnt wurde, aus zweien. Es ist nur das Elaeopten, welches der flüchtigere und riechende Theil ist; man hat es aber noch nicht näher untersucht.

Das Stearopten des Rosenöls scheidet man eben so wie das des Anisöls ab. Es bildet krystallinische Blätter, schmilzt bei $+33^{\circ}$ bis 34° , und schießt beim Erkalten in breiten, durchsichtigen, farblosen, blättrigen Krystallen an. Bei gewöhnlicher Lufttemperatur hat es die Consistenz von Wachs; seine Tension beträgt kaum 1 Millimeter Quecksilberhöhe bei $+14^{\circ},5$. In Alkohol ist es höchst schwer auflöslich, indem 1000 Theile von

494 Rosenholzöl. Rosmarinöl. Safranöl.

0,806, und bei $+14^{\circ}$ nicht mehr als 2 Theile davon aufnehmen.

Das Rosenöl wird zum Parfümiren gebraucht. In den Apotheken wird eine Auflösung desselben in Wasser, unter dem Namen Rosenwasser, durch Destillation von 1 Th. frischen oder eingesalzenen Blättern von *Rosa centifolia* mit 4 Th. Wassers, wovon 2 Th. abdestillirt werden, bereitet. Das gesättigte Rosenwasser setzt bei langem Aufbewahren Stearopten in sechsseitigen, blättrigen Krystallen ab.

Rosenholzöl, aus dem Holze von *Convolvulus scoparius*. Es ist dünnflüssig, gelb, mit der Zeit roth werdend, riecht nach Rosen, und schmeckt bitter und gewürzhaft. Es wird zur Verfälschung des Rosenöls gebraucht, welches aber dadurch seine butterartige Consistenz verliert, woran sich die Verfälschung leicht zu erkennen giebt.

Rosmarinöl wird aus Rosmarin, *Rosmarinus officinalis*, gewonnen, und in der Pharmacie *Oleum Anthos* genannt. Es ist wasserklar, hat viel Aehnlichkeit mit Terpenthinöl und riecht wie Rosmarin. Das im Handel vorkommende hat 0,911 spec. Gewicht, aber mit Wasser umdestillirt, wird es 0,8886, und hat bei $+16^{\circ}$ eine Tension von $9\frac{1}{2}$ Millimeter Barometerhöhe. Es kocht bei $+165^{\circ}$. Es läßt sich mit Alkohol von 0,83 in allen Verhältnissen vermischen, bedarf aber bei $+18^{\circ}$ 40 Th. Spiritus von 0,887 spec. Gewicht zur Auflösung. In unvollkommen verschlossenen Gefäßen setzt es Stearopten ab, das man mit Campher für identisch hält, und das, nach Proust, bis $\frac{1}{10}$ vom Gewicht des Oels betragen kann. Nach Bucholz giebt es, mit $\frac{1}{2}$ bis 1 Th. Kalihydrat digerirt und destillirt, Campher. — Es wird in der Medicin gebraucht und bisweilen mit Terpenthinöl verfälscht, was sich durch Beimischung von einem gleichen Volum wasserfreien Alkohols, der das Rosmarinöl auflöst und das Terpenthinöl ausscheidet, entdecken läßt.

Safranöl wird aus dem Stigma von *Crocus sativus*, dem gewöhnlichen Safran, erhalten. Es ist gelb,

chtflüssig, sinkt in Wasser unter, riecht durchdringend nach Safran, schmeckt scharf und bitter. Mit der Zeit verwandelt es sich in eine weiße, krystallinische, auf Wasser schwimmende Masse. Eine gewisse Menge davon erlitt man schon bei der anfänglichen Bereitung des Oels. äußert narcotische Wirkungen.

Sassafrasöl, aus dem Wurzelholz von *Laurus Sassafras*. Es ist farblos, wird aber mit der Zeit gelb oder bräunlich. Es hat einen eigenen, süßlichen, nicht unangenehmen Geruch und einen brennenden Geschmack. Sein spec. Gewicht ist 1,094. Mit rauchender Salpetersäure entzündet es sich leichter, als die meisten anderen flüchtigen Oele.

Dieses Oel setzt beim Aufbewahren ein Stearopten in sechsseitigen, farblosen, geschoben vierseitigen oder unregelmäßig sechsseitigen Prismen mit zweiflächiger Zuspitzung ab. Es riecht und schmeckt wie das flüssige Oel. sein spec. Gewicht ist bei $+6^{\circ} = 1,245$, aber in geschmolzenem Zustand bei $+12^{\circ},5 = 1,110$. Es schmilzt bei der Wärme der Hand und erstarrt bei $+7^{\circ},5$ zu einer krystallinischen Masse. Bei stärkerer Wärme verflüchtigt es sich ohne Rückstand. In Wasser ist es unbedeutend auflöslich, aber leicht auflöslich in wasserfreiem Alkohol, aus dem es nicht durch Wasser niedergeschlagen wird. Von Schwefelsäure wird es zersetzt. In concentrirter Salpetersäure löst es sich zu einer rothen, ölartigen Flüssigkeit auf, aus der bald ein zähes, braunes Harz niederfällt. Von Chlorwasserstoffsäure, Essigsäure oder Kalilauge wird es selbst in der Wärme nicht aufgelöst. — Das Sassafrasöl wird in der Medicin gebraucht.

Sevenbaumöl, aus den Beeren des Sevenbaums, *Juniperus Sabina*. Es ist wasserklar, und hat den Geruch und Geschmack des Sevenbaums. Diese Pflanze giebt mehr Oel, als irgend eine andere. Man hält dieses Oel für eines der diuretischen, und wendet es in dieser Hinsicht in der Medicin an.

Thymianöl, aus dem Thymian, *Thymus Serpyllum*. Es ist röthlichgelb, von angenehmem Geruch, und setzt

nach langem Aufbewahren ein krystallisirtes Stearopten ab. Es wird nur zum Parfümiren gebraucht.

Tonka-Stearopten, aus den sogenannten Tonkabohnen, *Dipterix odorata*, Wild. Dieses wohlriechende, feste, flüchtige Oel ist von Boullay und Boutres-Charlard untersucht und Coumarin *) genannt worden. Sie zogen es auf folgende Weise aus: Gröblich gepulverte Tonkabohnen wurden mit Aether macerirt, welcher ein fettes Oel und das Stearopten auszog, die nach dem Verdampfen des Aethers zurückblieben. Mit Alkohol von 0,84 behandelt, wurde das Stearopten mit Zurücklassung des fetten Oels aufgelöst. Nach dem freiwilligen Verdampfen des Alkohols blieben, durch fettes Oel noch etwas verunreinigte, Krystalle zurück, die durch Auflösen in einer geringen Menge Alkohols und Abdampfen desselben farblos erhalten wurden.

Das Tonka-Stearopten ist weiß, krystallisirt in glänzenden vierseitigen Nadeln oder kurzen vierseitigen Prismen mit zweiflächiger Zuspitzung; es riecht aromatisch und angenehm, und hat einen reizenden und wärmenden Geschmack. Es ist ziemlich hart, im Bruche glatt und schwerer als Wasser. In der Wärme schmilzt es zu einer klaren, farblosen Flüssigkeit und gesteht beim Erkalten krystallinisch. In Destillationsgefäßen sublimirt es sich unverändert in Krystallen. In Wasser ist es wenig auflöslich, aber leicht auflöslich in Alkohol und Aether. Diese Auflösungen zeigen keine saure oder alkalische Reactionen. Es ist in fetten und flüchtigen Oelen auflöslich.

Durch dieses flüchtige Oel wird oft der Schnupftaback wohlriechend gemacht, indem man die zerbrochenen Bohnen in den Taback legt, welcher das Stearopten ansieht und dessen Geruch bekommt.

*) Vom barbarisch-lateinischen Namen Coumaroua, in welchem Aublet Willdenow's *Dipterix* umgeändert hat.

ge
di
zu
fol
zu
mei
Meer
tig,
mit
entzi
ringe.
lende
den a
mer
ulpet
dersel
Von
Aufbe
in na
Meern
erwär
rettig.
Sie ve
schwe
stand
Meer
Thrä
schafi
quets
tent
und
spec
sein

b) Scharfe und blasenziehende Oele.

Die bis jetzt bekannte Anzahl dieser Oele ist sehr geringe. Sie zeichnen sich durch ihre Eigenschaft aus, die Haut zu entzünden und darauf Blasen zu ziehen, und unter ihren Bestandtheilen enthalten sie Schwefel. Nur folgende sind von einiger Merkwürdigkeit.

Meerrettigöl, aus dem Meerrettig, *Cochlearia Arzoracia*. Es ist hellgelb, von der Consistenz des Zimmetöls, sinkt in Wasser unter, riecht unerträglich nach Meerrettig und macht die Augen thränen, ist sehr flüchtig, so daß ein einziger Tropfen ein ganzes Zimmer mit Meerrettiggeruch erfüllt, schmeckt anfangs süßlich, entzündet aber dann Lippen und Zunge. Es ist in geringem Grade in Wasser auflöslich, welches seinen beißenden Geruch und die Eigenschaft, die Haut zu entzünden annimmt. Die Auflösung reagirt weder alkalisch noch sauer, fällt aber essigsaurer Bleioxyd mit brauner, und salpetersaurer Silberoxyd mit schwarzer Farbe; der Niederschlag enthält das Metall mit Schwefel verbunden. Von Alkohol wird das Oel leicht aufgelöst. Bei langem Aufbewahren verwandelt es sich nach und nach gänzlich in nadelförmige, silberglänzende Krystalle, welche nach Meerrettig riechen und den Schlund entzünden. Gelinde erwärmt, schmelzen sie und riechen anfangs nach Meerrettig, dann nach Pfeffermünze und zuletzt nach Campher. Sie verflüchtigen sich ohne Rückstand, und sind in Alkohol schwer auflöslich. Das Meerrettigöl ist der wirksame Bestandtheil im Meerrettig, und beim Genusse von frischem Meerrettig die Ursache des Reizes in der Nase und des Thränens der Augen, so wie der blasenziehenden Eigenschaft des auf die Haut applicirten geriebenen Meerrettigs.

Flüchtiges Senföl, durch Destillation von zerquetschtem Senf mit Wasser. Es ist, nach Julia Fontenelle, citronengelb und von eben so durchdringendem und reizendem Geruch, wie kaustisches Ammoniak. Sein spec. Gewicht ist 1,0387. Wasser löst davon 2 Procent eines Gewichts auf, und diese Auflösung hat den Geruch

des Oels, den scharfen Geschmack des Senfs und einen ausgezeichneten Grad von Kausticität. In offener Luft verliert die Auflösung bald ihre Schärfe und setzt ein graues Schwefel und Oel enthaltendes Pulver ab. Dieses Oel ist in Alkohol leicht auflöslich. Es löst Schwefel und Phosphor auf, und verhält sich zu Säuren und Alkalien wie die flüchtigen Oele im Allgemeinen. Auf die Haut gebracht, zieht es mit erstaunlicher Schnelligkeit Blasen, und seine, vermitteltst Compressen, auf die Haut applicirte Auflösung macht oft innerhalb 2 Minuten Blasen. Eine geringe Menge, z. B. $\frac{1}{2}$ Loth Senföl, zu 2 Quent frisch ausgepresstem Traubensaft gemischt, verzögert seinen Uebergang in die Gährung, so daß es sich mehrere Monate lang aufbewahren läßt. Anderen flüchtigen Oelen kommt diese Eigenschaft nicht zu.

Knoblauchöl, aus dem Kraut und der Zwiebel des Knoblauchs, *Allium sativum*. Es ist sehr flüchtig und geht mit den ersten Antheilen Wassers über, worin es untersinkt. Seine Farbe ist gelb, es hat einen durchdringenden Geruch, einen scharfen Geschmack, und erregt, auf die Haut gebracht, heftigen Schmerz. Es verbrannt mit vielem Ruß und dem Geruch nach schweflichter Säure. Es soll frisch gefälltes Eisenoxydulhydrat schwarz färben, nicht aber Wismuth- oder Bleioxyd. Es ist in Alkohol leicht auflöslich. Ein ähnliches schwefelhaltiges Oel erhält man auch durch Destillation des ausgepressten Saftes der Zwiebeln. Es ist farblos.

Löffelkrautöl, aus dem Löffelkraut, *Cochlearia officinalis*. Es ist gelb, hat einen flüchtigen, durchdringenden Geruch, der schon von weitem zu Thränen reizt, schmeckt scharf, ist schwerer als Wasser und leicht zu verflüchtigen. Es löst sich in Spiritus auf, womit es überdestillirt werden kann. Eine solche Auflösung wird in der Medicin unter dem Namen *Spiritus cochlearias* angewendet.

Meh
eigenen s
aus, welc
Hierdurch
darin mit
die sich ni
lösung die
herblau g
starbern A
die Blausä
eine Gift
gang der I
in diesen
ihre Bleng
dem Zutri
bemerkens
lang aufbe
Bitter
von Mande
ter als W
nehmen Ge
werden Ge
und es sc
welche, n
Robique
Gemeinge
tiger ist
niger
verwe
100
mit
wore
eine
bildet
Berli
tend
schin

c) Blausäurehaltige, giftige Oele.

Mehrere flüchtige Oele zeichnen sich durch einen eigenen sogenannten Bittermandel-Geschmack und -Geruch aus, welcher, wie man weiß, von Blausäure herrührt. Ueberdies sind diese Oele sehr giftig. Die Blausäure ist darin mit sehr großer Verwandtschaft gebunden, so daß sie sich nicht durch Wasser ausziehen läßt, und die Auflösung dieser Oele in Alkohol mit Eisensalzen kein Berlinerblau giebt. Behandelt man aber diese Oele mit kauschem Alkali oder Barytwasser, so zieht die Salzbase die Blausäure aus und das Oel wird frei, und hat nun seine Giftigkeit verloren. Ungeachtet der großen Neigung der Blausäure, sich zu zersetzen, erhält sie sich doch in diesen Oelen sehr gut; man hat zwar gefunden, daß ihre Menge mit der Zeit abnimmt, ist aber das Oel vor dem Zutritt der Luft wohl verwahrt, so kann es, ohne bemerkenswerthen Verlust an Blausäure, mehrere Jahre lang aufbewahrt werden.

Bittermandelöl wird durch Destillation von bitteren Mandeln mit Wasser erhalten. Es ist goldgelb, schwerer als Wasser, hat einen durchdringenden, aber angenehmen Geruch nach Blausäure, und einen bitteren, brennenden Geschmack. In der Luft absorbirt es Sauerstoff, und es schießen darin eine Menge von Krystallen an, welche, nach Stange's Versuchen, Benzoësäure sind. Robiquet fand, daß dieses Oel eigentlich aus einem Gemenge von zweien besteht, von denen das eine flüchtiger ist, Blausäure hält und giftig ist. Das andere weniger flüchtige ist nicht giftig, absorbirt Sauerstoff und verwandelt sich in Benzoësäure. Schrader erhielt aus 100 Th. frischem Bittermandelöl, in Spiritus aufgelöst und mit einer spirituösen Auflösung von Kalihydrat vermischt, woraus hernach das Oel durch Wasser ausgefällt wurde, eine Quantität Cyankaliums, die $22\frac{1}{2}$ Th. Berlinerblau bildete. Aus einem 3 Jahr alten Oel erhielt er 17,6 Th. Berlinerblau. Das ausgeschiedene Oel hat noch in bedeutendem Grade seinen eigenthümlichen Geruch und Geschmack, giebt aber keine Blausäure mehr, und ist, nach

Vogel's Versuchen, noch giftig. Stange dagegen giebt an, daß er, nach dem Schütteln des Oeles mit Barytwasser und Destilliren, ein flüchtiges Oel mit dem Geruch und Geschmack der bitteren Mandeln erhalten habe, welches, selbst in größeren Dosen Hunden und Katzen gegeben, keine Wirkung gezeigt, aber auch keine Spur von Blausäure mehr enthalten habe. Nach wenigen Minuten hatte es sich in einem flachen Gefäße in Benzoësäure umgewandelt. — In sauerstoffgasfreiem Wasser ist das Bittermandelöl in sehr geringem Grade auflöslich, dem es seinen Geruch und Geschmack ertheilt. Das Wasser, welches bei der Destillation des Oels übergeht, schlägt beim Vermischen mit salpetersaurem Silberoxyd Cyansilber nieder, und bildet mit Quecksilberoxyd Cyanquecksilber. Wird das Oel, von wenigem Wasser bedeckt, aufbewahrt, so wird es dick und undurchsichtig; wird es aber unter einer größeren Menge Wassers aufbewahrt, so löst es sich auf und zersetzt sich allmählich unter Zurücklassung von bräunlichen Flocken, wahrscheinlich einer stickstoffhaltigen Koble. Dieses Oel ist ein höchst gefährliches Gift.

Ganz ähnliche Oele, wie das Bittermandelöl, erhält man durch Destillation mit Wasser aus den Pfirsichblättern, *Amygdalus persica*, aus den Kirschlorbeerblättern, *Prunus Laurocerasus*, aus der Vogelkirschenrinde, *Prunus Padus*, aus den zerstoßenen Kernen der Kirschen und Vogelkirschen. Sie enthalten Blausäure, sind äußerst giftig, absorbiren Sauerstoff und erzeugen Benzoësäure. Aus dem flüchtigen Oel der Vogelkirschenrinde erhielt Schrader, auf die angeführte Art, 19,2 Proc. Berlinerblau, und aus dem Kirschlorbeeröl 16 Proc. In der Medicin werden schwache Auflösungen dieser Oele in Wasser angewendet, die durch Destillation von bitteren Mandeln oder von Kirschlorbeerblättern mit Wasser gewonnen und *Aqua amygdalarum amar.* und *Aq. laurocerasi* genannt werden. Auch pflegt man mit sehr kleinen Quantitäten dieser Oele Liqueure und manche Speisen zu würzen, indem man ihnen dadurch einen gelinden Geschmack nach bitteren Mandeln ertheilt.

d) Campher.

Wenn ich den Campher als eine besondere Abtheilung der flüchtigen Oele betrachte, so rührt dieß hauptsächlich davon her, daß viele Chemiker ihn nicht zu diesen Oelen rechnen, und daß er gewisse Eigenschaften besitzt, welche ihn von den flüchtigen Oelen im Allgemeinen unterscheiden, wie z. B. sein Verhalten zu den Säuren, vorzüglich zur Salpetersäure, seine medicinischen Wirkungen u. a.

Der Campher ist eigentlich ein Stearopten, welches ohne alle Einmischung von Elaeopten in verschiedenen species von *Laurus*, vorzüglich *sumatrensis* und *Camphora*, so wie in dem Wurzelholz von *Laurus Cinnamomum* vorkommt. Diese Bäume wachsen auf Japan, Borneo und Sumatra, und in Japan wird der meiste Campher bereitet. Aus *Laurus sumatrensis* werden beim Spalten des Baumes aus dem Marke reine Krystallmassen von Campher erhalten. Dieser wird *Camphora di baros* genannt, und in Japan so hoch geschätzt, daß er nicht in den allgemeinen Handel kommt. Der gewöhnliche kommt von *Laurus Camphora*, dessen Holz in Stücke ersägt, zerspalten und mit Wasser in einen kupfernen Kessel gebracht wird, über den man einen mit Reifstroh bewendig ausgefütterten konischen Helm von Holz stellt, welchem sich der mit den Wasserdämpfen beim Kochen verflüchtigende Campher sublimirt und zwischen dem Strohhalm festsetzt. Herausgenommen, stellt er kleine, graue, krystallinische Körner dar, und kommt, in Tonnen verpackt, unter dem Namen roher Campher in den Handel. Durch Sublimation in Glasgefäßen wird er hierauf gereinigt. Dieß ist eine ganz schwierige Operation, denn wird das Gefäß zu kalt gehalten, so bildet der Campher eine vollige, bald das ganze Gefäß erfüllende Vegetation, und wird es zu heiß gehalten, so schmilzt er und fließt zurück. Man nimmt dazu sehr niedrige, große Glaskolben, in welche man den Campher, mit $\frac{1}{2}$ ungelöschtem Kalk wohl vermischt, einlegt. Zu Anfang der Sublimation hat

man den Kolben bis nahe zu der, mit einer Papierdüte versehenen, Mündung mit Sand bedeckt, und in dem Grade, als die Operation weiter geht, entblößt man das Glas, so daß der condensirte Theil seinem Schmelzpunkt beständig nahe ist, und dadurch in einen festen Kuchen zusammengeht, der, wie der Salmiak, die Form des Gefäßes bekommt. Der Kolben wird nachher zersprengt und das Sublimat herausgenommen, das nun die Gestalt einer flachen Schaaale hat. In dieser Gestalt kommt er, unter dem Namen gereinigter Campher, in den Handel.

Um diese Operation zu erleichtern, hat man den Vorschlag gemacht, den Campher aus einer Retorte zu destilliren, die so heiß gehalten wird, daß das Destillat in flüssigem Zustand in eine, aus zwei lose auf einander gesetzten Halbkugeln bestehende Vorlage von Kupfer rinnt; der in der unteren angesammelte Campher wird nach beendigter Operation durch gelindes Erhitzen davon abgelöst.

Ob das Stearopten, welches sich aus den Oelen der zu den natürlichen Familien der Labiatae gehörenden Pflanzen, wie Lavendel, Thymian, Salvey, Majoran und Rosmarin, absetzt, wirklich mit dem Campher identisch sei, wie mehrere Chemiker, und vorzüglich Proust vermuthet haben, muß einer künftigen Bestätigung oder Widerlegung überlassen bleiben.

Der gereinigte Campher bildet eine feste, weiße, durchscheinende Masse, von eigenthümlichem Geruch und Geschmack. Sowohl bei der Condensation aus dem gasförmigen Zustand, als auch aus seiner langsam erkaltenden, gesättigten Auflösung in warmem Alkohol schießt er in farblosen, durchsichtigen Octaëdern oder sechsseitigen Octaëdersegmenten an. Er nimmt vom Nagel Eindruck an, ist zähe und läßt sich ohne Zusatz von etwas Alkohol nicht zu Pulver reiben. Sein spec. Gewicht ist 0,9857 bis 0,996. Durch den Einfluß der Luft und des Lichts wird er nicht verändert. Er schmilzt erst bei $+175^{\circ}$ zu einem wasserklaren Oel, und kommt bei $+204^{\circ}$ in's Kochen. Er sublimirt sich vollständig ohne die geringste

ersetzung. Seine Tension bei $+15^{\circ},5$ entspricht 4 Millimeter Barometerhöhe. Wird er, mit dem 6fachen Gewicht Thon vermischt, destillirt, so wird er zersetzt und giebt ein goldgelbes aromatisches, einem Gemenge von Thymian und Rosmarin ähnlich riechendes Oel, und etwas äuerliches Wasser, das ein wenig von diesem Oel aufgelöst enthält. In der Retorte bleibt Kohle zurück. Werden Dämpfe von Campher durch eine glühende Porzellanröhre geleitet, so wird er ebenfalls zersetzt und giebt ein flüchtiges Oel, welches unzersetzten Campher aufgelöst enthält, und ein brennbares Gas, wovon 100 Raumtheile 145,5 Th. Sauerstoffgas zum Verbrennen bedürfen, und 95,5 Th. Kohlensäuregas liefern; Kohle setzt sich aber dabei nicht ab. In offener Luft läßt er sich entzünden und brennt mit klarer, leuchtender und rauchender Flamme; selbst auf Wasser gelegt, fährt er zu brennen fort. Nähert man einem Stück Campher einen spiralförmig gewundenen, feinen Platindrath, so fährt dieser durch das Verrennen der durch die Hitze verflüchtigten Campherdämpfe zu glühen fort, gerade so wie bei dem Alkohol in Davy's Nachtlampe. Legt man Platinschwamm auf ein Stück Campher, den man anzündet und wieder ausbläst, wenn das Platin glüht, so fährt das Glühen fort, das Platin schmilzt sich allmählich in den Campher ein, und die unzerbrannten Dämpfe setzen sich rings herum in krystallinischen Gruppen an.

Der Campher ist in Wasser wenig auflöslich. Ein Th. Campher bedarf 1000 Th. Wassers zur Auflösung; aber die Auflösung hat den Geschmack und Geruch des Camphers. Durch einen Zusatz von Kali wird er aus dem Wasser niedergeschlagen, nicht aber von Natron oder Ammoniak. In Papin's Digestor mit Wasser gekocht, soll er eine gelbe Auflösung bilden, die beim Erkalten einen Campher absetzt. Wahrscheinlich hat er dabei eine Veränderung erlitten. Werden kleine Campherstücke auf Wasser geworfen, so kommen sie in eine rotirende Bewegung, die eine Folge von der gemeinschaftlichen Verdunstung des Wassers und des Camphers ist, und

gänzlich verhindert wird, so wie die kleinste Spur von Wasser Oel auf die Wasseroberfläche kommt. Legt man kleine Campherstücke auf eine mit Wasser benetzte Tasse, so zieht sich das Wasser weit vom Campher zurück, und stellt man in eine Tasse, deren Boden einige Linien hoch mit Wasser bedeckt ist, einen Cylinder von Campher, so verdunstet der Campher in Berührung mit der Wasseroberfläche stärker, als an anderen Punkten, so daß der Cylinder endlich etwas über der Wasseroberfläche durchschnitten wird. Der Campher löst sich leicht in Alkohol auf. 100 Th. Alkohol von 0,806 lösen 120 Th. Campher bei $+12^{\circ}$ auf. Er wird daraus durch Wasser gefällt. Auch kann der Alkohol durch Destillation abgeschieden werden, wobei aber das Destillat nicht campherfrei wird. In Aether, in flüchtigen und in fetten Oelen ist er leicht auflöslich.

Er läßt sich mit Schwefel und mit Phosphor zusammenschmelzen und ist in Schwefelkohlenstoff auflöslich. Es verbindet sich mit Jod zu einer braunen, weichen, zerfließlichen, sowohl in Wasser, als in Alkohol auflöslichen Masse. Wird sie in Terpenthinöl aufgelöst und Alkohol zugesetzt, so zieht dieser reinen Campher aus, und läßt die Verbindung von Terpenthinöl und Jod unaufgelöst zurück.

Mit den Säuren geht er eigene Verbindungen ein. Mit 1 Th. concentrirter Schwefelsäure verbinden sich 11 Th. Campher zu einer bräunlichen zähen Masse, welche sich in Alkohol auflöst, woraus aber Wasser den Campher dem größten Theil nach unverändert ausscheidet. Wird die Verbindung erhitzt, so entwickelt sich schwefellichtsaures Gas, es destillirt ein nach Pfeffermünze und Campher riechendes Oel über, zuletzt kommt etwas Schwefelwasserstoff, und in der Retorte bleibt ein Gemenge von Kohle mit überschüssiger Säure und künstlichem Gerbstoff zurück. Ein Th. rauchende Salpetersäure löst 6 Th. Campher zu einer ölähnlichen Flüssigkeit auf, die sich durch Schütteln mit Wasser zersetzt und unveränderten Campher giebt. Ist die Säure nicht concentrirt genug, so bildet sich unter der ölähnlichen Verbindung eine Schicht

a wasserhaltigerer Säure. Der salpetersaure Campher
 leicht in Alkohol auflöslich. Metalle lösen sich schwie-
 darin auf, weil sie sich in dem Grade, als sich die
 ure sättigt, mit Campher bekleiden. Wird Campher
 t 8 Th. Scheidewasser destillirt, so wird die Säure zer-
 zt und der Campher in eine eigene Säure, die Cam-
 ersäure, umgewandelt, die ich später bei den Producten
 n der Zerstörung der Pflanzenstoffe durch Salpetersäure
 führen werde. Der Campher absorhirt bei $+10^{\circ}$ und
 726 Meter Barometerhöhe sein 144faches Volum Chlor-
 wasserstoffsäuregas, und verwandelt sich damit in ein klares,
 bloses Liquidum, welches, so wie es in die Luft kommt,
 ar schnell erstarrt, weil die Säure Feuchtigkeit anzieht,
 e den Campher niederschlägt. Ein Theil Campher wird
 n 2,6 Th. concentrirter Chlorwasserstoffsäure aufgelöst
 d daraus durch Wasser niedergeschlagen. Der durch
 asser aus einer der genannten Mineralsäuren niederge-
 lagene Campher löst sich bei Zusatz von vielem Was-
 wieder auf, was anzuzeigen scheint, daß der Cam-
 er in verdünnten Säuren auflöslicher ist, als in reinem
 asser. Ein Th. concentrirte Essigsäure löst 2 Th. Cam-
 er auf, und bildet ein dickflüssiges Liquidum von schar-
 n Geschmack, welches brennbar ist, und nach dem
 tzünden ohne Rückstand verbrennt.

Zu den Salzbasen hat der Campher eine sehr geringe
 rwandtschaft. Er wird weder von kaustischen noch
 hlensäuren alkalischen Auflösungen aufgenommen, und
 absorhirt kaum sein gleiches Volum Ammoniakgas.

Der Campher hat, als eines der vorzüglichsten äußere-
 und inneren Heilmittel, eine große Anwendung. Er
 rd theils in Substanz, und theils als Auflösung in Spi-
 us oder in einem fetten Oel angewendet.

Anhang zu den flüchtigen Oelen.

Als einen Anhang zu den flüchtigen Oelen will ich
 r einige flüchtige Pflanzenstoffe beschreiben, welche
 sofern mit Stearopten Aehnlichkeit haben, als sie flüch-

tige, meist krystallinische, und mit Wasser überdestillirbare Körper sind.

Asar erhält man, wenn die trockene Wurzel von *Asarum Europaeum* mit 8 Th. Wasser destillirt wird, bis daß 3 Theile übergegangen sind. Es krystallisirt dabei theils im Retortenhalse, theils in der Vorlage, und theils beim Abkühlen des übergegangenen Destillats. Es ist zuerst von Görtz und später von Lassaigue und Feuille beschrieben worden. Das Asar schießt in durchsichtigen, perlmutterglänzenden, vierseitigen Tafeln an. Es riecht und schmeckt aromatisch, campherartig, schmilzt in kochendem Wasser und läßt sich in der warmen Hand wie Wachs kneten. Erhitzt, verflüchtigt es sich ohne Rückstand, unter Verbreitung stark zum Husten reizender Dämpfe. Es ist schwer auflöslich in Wasser, welches davon einen ekligen, scharfen und campherartigen Geschmack annimmt. Von Alkohol wird es leicht aufgelöst, und von Wasser daraus niedergeschlagen. Salpetersäure verwandelt dasselbe in ein zähes Harz, wovon sich ein Theil in der Säure mit gelber Farbe auflöst. Innerlich genommen, erregt es Erbrechen.

Helen wird aus der Alantwurzel, *Inula Helenium*, erhalten. Es ist seit Lefebure und Geoffroy d. j. bekannt. Wird die Alantwurzel destillirt, so geht es mit dem Wasser als ein gelbliches, im Wasser untersinkendes Oel über, welches nachher erstarrt. Man erhält es auch krystallisirt aus einer in der Wärme concentrirten Auflösung der Alantwurzel in Spiritus. Durch Umdestilliren mit wenig Wasser wird es gereinigt. Es bildet prismatische, farblose Krystalle und bisweilen Würfel, wenn es auf dem nassen Wege, und talkartige Blättchen, wenn es bei der Sublimation anschießt. Es ist weich und läßt sich mit dem Messer schneiden, schwerer als Wasser, und hat den Geruch und Geschmack der Alantwurzel. Bei $+42^{\circ}$ schmilzt es zu einem Oel; es ist ohne Rückstand sublimirbar. Sowohl in kaltem als in kochendheißem Wasser ist es schwer auflöslich. Auch wird es von kaltem Alkohol nur schwer aufgelöst, leicht aber von hei-

n, aus dem es beim Erkalten anschießt. Die Auflösung wird von Wasser gefällt. In Aether und in Terthinöl ist es leicht auflöslich. Von Salpetersäure wird in Harz verwandelt, das unreine wird dabei grünlich.

Betul findet sich in der Oberhaut der Birkenrinde (*Betula alba*). Es wurde von Lowitz entdeckt. Es kommt in wolligen Vegetationen hervor, wenn Birkenrinde langsam bis zum Braunwerden erhitzt wird, und so voluminös, daß 8 bis 10 Gran den Raum von einem and Wasser einnehmen. Auf glühenden Kohlen verpft es mit angenehmem Geruch, aber bei der Destillation zersetzt es sich größtentheils. In der Lichtflamme brennt es mit weißer Flamme. In Wasser ist es unauflöslich, auflöslich aber in 120 Th. kalten und 80 Th. siedendheissen Alkohols. Beim Erkalten setzt es sich in feinen Haaren ab. Von Aether und von fetten und flüchtigen Oelen wird es aufgelöst. Concentrirte Schwefelsäure löst dasselbe auf, und die Auflösung gesteht im Wasser wieder ab und wird weiß. Weder kaustische noch kohlen-saure Alkalien lösen dasselbe auf.

Nicotian erhält man durch Destillation der frischen Tabacksblätter, *Nicotiana Tabacum*. Es ist von Hermbstadt beschrieben worden. Das mit Tabacksblättern destillirte Wasser ist, wenn es viel Nicotian enthält, unklar und milchicht. Da das Nicotian flüchtig ist, so concentrirt man die Auflösung auf die Weise, daß man das destillirte Wasser mit basisch essigsaurem Bleioxyd versetzt, wodurch das Nicotian ausgefällt wird; man scheidet den Niederschlag ab und zersetzt ihn mit verdünnter Schwefelsäure. Beim freiwilligen Abdampfen setzt die Auflösung kleine, blättrige Krystalle ab. Das Nicotian riecht nach Tabacksrauch; beim Verdunsten seiner Auflösung riecht das ganze Zimmer nach Taback. Es schmeckt auch wie Tabacksrauch und erregt Niesen, wenn man nahe daran steht. Es reagirt weder sauer noch alkalisch. In der Wärme schmilzt es und verflüchtigt sich allmählich. Beim Erkalten erstarrt es. In Wasser ist es schwer auflöslich, und seine Auflösung wird sowohl von neutralem essig-

sauren Bleioxyd, als von salpetersaurem Quecksilberoxydul niedergeschlagen. Auch von Galläpfelinfusion wird sie gefällt. Von Alkohol wird das Nicotian aufgelöst, aber von Wasser daraus nicht niedergeschlagen.

Vauquelin's Versuche darüber stimmen nicht völlig mit denen von Hermbstädt überein. Er destillirte eine Infusion von Tabacksblättern, und fand, daß das Destillat erst nach dem Vermischen mit Kalkhydrat einen durchdringenden Tabacksgeruch bekam, welchen er durch erneuerte Destillation des mit Kalk vermischten Destillates concentrirte. Als der ausgepresste Saft von frischen Tabacksblättern zum Extract abgedampft, und dieses hierauf mit Alkohol von 0,82 behandelt wurde, so zog dieser den wirksamen Theil des Tabacks, mit Essigsäure und Aepfelsäure verbunden, aus; nach dessen genauer Neutralisation mit Kali und Destilliren der Flüssigkeit, wurde eine farblose, sehr scharfe Flüssigkeit erhalten. Aber in dem Rückstand war noch von dem scharfen Stoff enthalten.

Vauquelin kochte den frischen Saft von Tabacksblättern auf, seigte ihn von dem dabei geronnenen Eiweiß ab, fällte mit Bleiessig (wodurch Hermbstädt's Nicotian hätte abgeschieden werden müssen) und befreite die filtrirte Flüssigkeit vom überschüssigen Blei durch Schwefelwasserstoffgas. Aus der zum Extract abgedampften Flüssigkeit erhielt er mit Alkohol eine Auflösung, die beim Abdampfen ein braunes, dickes, beim Erhitzen unerträglich nach Taback riechendes Oel absetzte.

Da der Taback so allgemein gebraucht wird, so lohnte es wohl der Mühe, mit größerer Sicherheit seine Bestandtheile, so wie die seines Rauches zu kennen. Es ist wahrscheinlich, daß dieser Rauch seine Eigenschaften dem mit den Verbrennungs-Producten verdampfenden Nicotian verdankt.

Anemon wird erhalten, wenn ein Theil frisches Kraut von *Anemone Pulsatilla*, *pratensis* oder *nemorosa* mit $2\frac{1}{2}$ Th. Wassers destillirt wird, bis das 1 Theil übergegangen ist. Von diesem Destillate wird wiederum $\frac{1}{4}$

destillirt, und dieses setzt dann, nachdem es einige Wochen in einem Keller gestanden hat, Anemon in Krystallen ab. Es ist von Vauquelin und von Heyer beschrieben worden.

Es schießt in langen Blättern oder in sechsseitigen Nadeln an, ist schwerer als Wasser, leicht pulverisirbar, bei gewöhnlicher Lufttemperatur wenig flüchtig, verdampft aber auf einem heißen Blech in scharfen Dämpfen und ohne Rückstand. In Destillationsgefäßen destillirt es als ein Oel flüssig über, das nachher geseiht. Ein wenig wird ersetzt. Der Dampf riecht schmerzhaft stechend und macht Thränen. Bei gewöhnlicher Temperatur ist es geruchlos. In festem Zustand hat es kaum Geschmack, in geschmolzenem ist es kaustisch und bewirkt auf der Zunge mehrere Tage anhaltende Gefühllosigkeit. In kaltem Wasser ist es schwer auflöslich, leichter in kochendem, woraus es beim Erkalten krystallisirt. Auf gleiche Weise verhält es sich zu Alkohol. In erhitzten fetten und flüchtigen Oelen ist es auflöslich. Es wird sowohl von starken Säuren, als auch von kaustischen und kohlen-sauren Alkalien zersetzt.

Das Anemon äußert giftige Wirkungen, und reizt und entzündet die Haut. In aufgelöster Gestalt wird es in der Medicin unter dem Namen von *Aqua Ranunculi albi* gebraucht; man erhält es, indem man 4 Th. *Anemone nemorosa* mit Wasser destillirt, bis daß 6 Th. übergegangen sind. Es entzündet die Haut gelinde und kann so zur Vertreibung der Sommerflecken wirksam sein.

Ein ähnliches scharfes und reizendes Destillat liefern noch mehrere andere Pflanzen bei der Destillation mit Wasser, z. B. mehrere Arten von *Ranunculus*, wie *acris*, *Flammula*, *Lingua* und *sceleratus*, mehrere Species von *Clematis*, zumal *Flammula*, Species von *Rhus*, *Scilla maritima*, *Arum maculatum*, *Polygonum Hydropiper*. — Sie kommen darin mit einander überein, daß der scharfe Stoff äußerst flüchtig ist und gänzlich verschwindet, wenn die Pflanze getrocknet wird oder das Destillat der frischen Pflanze in offener Luft steht, oder wenn die Destillation nicht in lutirten Gefäßen vorgenommen wird. Fette Oele

ziehen den scharfen Stoff aus dem Wasser aus. Den entzündet die Haut, reizt zum Niesen, macht Th und wirkt, innerlich genommen, giftig. Ob er Anemon, oder eher mit den blasenziehenden flücht Oelen verwandt sei, muß künftigen Erfahrungen üben bleiben.

Harze.

Die Harze kommen in allen Pflanzen und allen Theilen vor, und gehören zu den allgemeinsten Bestandtheilen des Pflanzenreichs. Ihre Anzahl daher fast in's Unendliche. Diejenigen Harze, welche eigentlich eine besondere Beschreibung verdienen, daher nur solche, welche in der Natur in so bedeutender Menge vorkommen, daß sie zum Gebrauche gesammelt werden, oder solche, deren Anwendbarkeit Veranlassung ist, daß man sie aus den Pflanzen, wo sie enthalten sind, auszieht.

Es giebt hauptsächlich zwei Arten, wie die Harze gewonnen werden, nämlich durch freiwilliges Ausfließen oder durch Ausziehen mit Alkohol. Im ersteren kommen sie von Bäumen, seltner von Sträuchern, das Harz fließt entweder durch zufällig vorhandene Wunden oder durch Einschnitte aus, die man zu dem Endzweck durch die Rinde bis in das Holz macht. Pflanzen, wenigstens die größeren, bilden nicht bloß Harz sondern gewöhnlich ein Gemenge von Harz und flüchtigem Oel, welches während des Sommers durch die Sonnenwärme hinreichend flüssig wird, um aus diesen Wunden hervorsiekern zu können, wo es dann allmählich erhärtet, indem das flüchtige Oel theils abdunstet, theils sich in Harz verwandelt. Die so erhaltenen Harze werden endlich noch, wenn es irgend ein Endzweck erfordert, durch Kochen mit Wasser von flüchtigem Oel befreit.

Fließen dagegen die Harze nicht von selbst aus, digerirt man den harzigen Pflanzenstoff mit Alkohol,

Das Harz nebst anderen Stoffen aufnimmt. Die Auflösung wird mit etwas Wasser versetzt, wodurch sich das Harz niederschlägt, und der Alkohol abdestillirt, wobei das Harz in geschmolzenem oder zusammengebackenem Zustand, und vermischt mit der Auflösung der übrigen Stoffe, in dem zugesetzten Wasser zurückbleibt.

Auf diese Art erhält man gewöhnlich Gemenge von mehreren Harzen, gleich wie es bei den Oelen der Fall ist, und man hat keine bestimmte Probe, welche zu erkennen giebt, daß ein Harz rein oder frei von allen anderen Stoffen sei. Gewöhnlich ist es der Fall, daß bei der Prüfung der Harze mit verschiedenen Auflösungsmit- teln eines derselben eine Portion unaufgelöst läßt; so löst sich z. B. Colophon vollkommen in Alkohol auf, während ein andres eine Portion davon unaufgelöst läßt, woraus man vermuthen kann, daß dieses Harz ein Gemenge von zweien ist, von denen das eine in Steinöl auflöslich, das andere in Wasser auflöslich wäre. Außerdem können diese Harze mit anderen Stoffen vermischt sein, die keine Harze, aber wenig mit jenen verbunden sind, oder mit denselben gleiche Auflöslichkeit in Alkohol und Unauflöslichkeit in Wasser haben. Neuerlich hat z. B. Bonastre gezeigt, daß einige Harze, vorzüglich Anime und Elemi, vermittelst kalten Alkohols in zwei zerlegt werden können, von denen das eine in kaltem Alkohol auflöst, und das andere, welches dann von kochendem Alkohol aufgelöst wird, krystallisirt erhalten werden kann, weshalb er ihm den übel gewählten Namen *Sousresine* (Halbharz) gab. Baup hat dieselbe Beobachtung bei Harz von verschiedenen Pinusarten gemacht. Es ist daher wahrscheinlich, daß viele dieser von uns gegenwärtig für homogen gehaltenen Harze in Zukunft in mehrere zerlegt werden können.

Die generischen Kennzeichen von Harz sind seine Auflöslichkeit in Alkohol, seine Unauflöslichkeit in Wasser, und seine Schmelzbarkeit in der Wärme, wobei es sich anders, als unter gleichzeitiger Zersetzung, zu verhalten ist.

Die Harze krystallisiren nicht. Sie sind, wie Gummi,

ohne bestimmte Gestalt, meistens durchsichtig, selten oder nie farblos und von verschiedener Farbe. Die meisten sind gelb oder braun, andere roth, und noch andere grün. Sie sind ohne Geschmack und Geruch, und wenn sie riechen oder schmecken, so ist es gewöhnlich eine Folge von fremden Einmengungen. Ihr spec. Gewicht variirt zwischen 0,92 und 1,2. Ihre Consistenz ist verschieden, die meisten sind hart, mit glasigen Bruch und in der Kälte leicht pulverisirbar. Andere sind weich, was wohl meistens von fremder Einmischung herrührt. Die harten Harze sind Nichtleiter der Electricität und nehmen durch Reiben negative Electricität an. In der Wärme schmelzen sie mehr oder weniger leicht zu einem dickflüssigen Liquidum; von brennenden Körpern lassen sie sich entzünden, und brennen mit klarer, leuchtender Flamme und rußendem Rauch. Bei der trockenen Destillation geben sie Kohlensäuregas und brennbare Gase, brenzliches Oel, gewöhnlich von weniger unangenehmem Geruch, als das von anderen Stoffen, etwas saures Wasser und eine geringe Quantität glänzender Kohle.

Sie sind unauflöslich in Wasser. Dagegen lösen sie sich sowohl in kaltem als warmem Alkohol auf, wiewohl ihre Auflöslichkeit darin sehr verschieden ist. Diese Auflösung röthet Lackmus, aber nicht den Veilchensyrup; von Wasser wird sie zu einem milchichten Gemische gefällt, in dem sich das Harz allmählich sammelt. Es ist dann wasserhaltig, weich und gewöhnlich knetbar, was durch Wegrocknen des Wassers vergeht. Sie lösen sich auch in Aether und flüchtigen Oelen auf, und lassen sich mit den fetten zusammenschmelzen. Auch mit Schwefel, und in einem gewissen Grade mit Phosphor, lassen sie sich zusammenschmelzen. Pulver von gefärbtem Harz wird nicht selten von Chlorwasser gebleicht. Ob dabei Chlor aufgenommen werde, ist nicht ausgemittelt. Von Schwefelkohlenstoff werden sie leicht aufgelöst.

Zu Säuren haben sie geringe Verwandtschaft. Die concentrirten Mineralsäuren verändern in der Wärme ihre

mmensetzung. Concentrirte Schwefelsäure löst sie Zersetzung auf; die Auflösung wird von Wasser gegeben, aber beim Erhitzen entwickelt sich schweflichtsaures Gas und es bleibt eine kohlige, mit etwas künstlichem Stoff gemengte Masse zurück. Salpetersäure löst die Harze mit Hülfe der Wärme unter Entwicklung von stoffoxydgas und Zersetzung derselben auf, und erhält damit, je nach ungleich lange fortgesetzter Einwirkung, verschiedene Producte. Anfangs wird die Auflösung sowohl von Wasser als von Alkali gefällt, nachher erhält man, nach dem Verdampfen der Säure, eine dunkelgelbe, zähe, sowohl in Alkohol als in Wasser auflösliche Substanz, dann bildet sich ein pulverförmiger, bituminöser, harzähnlicher Stoff, und zuletzt künstlicher Gerbstoff; bisweilen erzeugt sich auch Oxalsäure. Concentrirte Schwefelsäure löst ungefähr ein Procent Harz auf; auch lösen sich einige Harze in geringer Menge in Essigsäure. Diese Auflösungen werden durch Verdünnen mit Wasser gefällt.

Mit den Salzbasen dagegen vereinigen sich die Harze in Folge einer bestimmten Affinität zu salzähnlichen Verbindungen, von welchen die mit alkalischer Base in Wasser auflöslich sind. Man hat diese Verbindungen schon lange gekannt, und ihre Entstehung als eine Art von Seifenbildung betrachtet; aber Unverdorfen hat neuerlich wieder die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, und gezeigt, daß dabei das Harz nicht zersetzt wird, sondern als Ganzes die Rolle einer schwachen Base spielt. Wird Harz im Ueberschuß mit einer sehr concentrirten Auflösung von Natron- oder Kalihydrat digerirt, so löst es sich auf, und wird die Auflösung dann verdünnt und filtrirt, so erhält man eine völlig gesättigte Verbindung, nachdem ein von dem concentrirten Hydrat gelöster Ueberschuß ausgefällt worden ist. Dagegen erhält es selten, vermittelst einer verdünnten Kalilauge eine Auflösung neutral zu bekommen. Gepulvertes Harz, in Quecksilber in Ammoniakgas gelassen, absorbirt das Gas bis daß sich eine neutrale Verbindung gebildet hat,

die dann theils in Wasser auflöslich, theils darin unauflöslich ist. Die Hydrate der alkalischen Erden verbinden sich ebenfalls mit den Harzen zu salzartigen, in Wasser mehrentheils schwerlöslichen, Verbindungen, und die eigentlichen Erden und Metalloxyde geben, vermittelt sogenannter doppelter Zersetzung, in Wasser unauflösliche, aber meist in Alkohol, Aether und flüchtigen Oelen auflösliche Salze. Einige Metallsalze, wie z. B. essigsäures Bleioxyd und Zinnchlorid, in Alkohol aufgelöst und mit einer Harzauflösung in Alkohol vermischt, schlagen Verbindungen des Harzes mit dem Metalloxyde nieder. Alle diese Salze werden auf nassem Wege von stärkeren Säuren zersetzt, indem diese die Base aufnehmen und das Harz abscheiden. Wird es aus der Auflösung des Kalisalzes gefällt, so erhält man eine weiße, bisweilen pulverförmige Masse, die nach dem Auswaschen und Trocknen bei $+100^{\circ}$ eine chemische Verbindung von Harz mit Wasser ist, welches darin die Stelle der ausgeschiedenen Base einnimmt und so eine wasserhaltige Säure vorstellt. Durch Schmelzen in der Wärme wird das Wasser ausgetrieben und das Harz mit seinen ursprünglichen Eigenschaften wieder erhalten.

Mit Salzen kennt man noch keine bestimmten Verbindungen. Gepulverte Harze werden von neutralen kohlensäuren und borsäuren Alkalien aufgelöst, aber dieß gründet sich bei ersteren auf die Bildung eines Harzsalzes mit alkalischer Basis, indem sich das Alkali in zweifach kohlensäures Salz umwandelt; welches letztere dann durch Kochen zersetzt wird, weshalb sich in einer concentrirten Flüssigkeit mehr Harz auflöst, als die Hälfte der Base sättigt. Gewöhnlich ist die Verbindung des Harzes mit Alkali in Wasser, welches kohlensäures Alkali enthält, unauflöslich; daher kommt es, daß sich oft beim Kochen das Harz nicht auflöst, aber es entsteht eine unauflösliche Verbindung mit Alkali, die sich dann in reinem Wasser auflöst. Die borsäuren Salze lösen so lange Harz auf, bis daß sich zweifach borsäures Salz gebildet hat. Ob dieß durch die Entstehung eines wirklichen Doppelsalzes mit Säuren bedingt wird, ist nicht entschieden.

Die elementare Zusammensetzung der Harze ist wenig untersucht. Versuche darüber sind von Gay-Lussac und Thénard, de Saussure, Göbel, Ure, Thomson und Trommsdorff angestellt; nur die von den drei zuerst genannten halte ich aber für so genau, daß sie hier aufgenommen zu werden verdienen. Gay-Lussac und Thénard haben Colophon und Copal analysirt, und de Saussure hat ersteres, aber nur den Theil davon analysirt, welcher sich in rectificirtem Steinöl auflöst und bei dessen Verdunstung in offener Luft zurückbleibt.

	Kohlen-	Wasser-	Sauer-	
	stoff.	stoff.	stoff.	
Colophon	75,944	10,719	13,337	G. L. u. Th.
Dass. d. Steinöl gereinigt	77,402	9,551	13,047	de Sauss.
Copal	76,811	12,583	10,506	G. L. u. Th.

Die Harze werden mannichfaltig angewendet. Mehrere derselben werden in der Heilkunde gebraucht. Die Auflösung von einigen in Alkohol wird zu Firnissen angewendet, oder sie werden den Firnissen aus trocknenden Oelen zugemischt u. s. w.

Es wäre zwecklos, hier alle Harze beschreiben zu wollen, die bei Analysen von Pflanzenstoffen gefunden und mehr oder weniger ausführlich beschrieben worden sind; ich werde daher nur solche anführen, die wegen ihrer Anwendung bemerkenswerth sind. Diese zerfallen in zwei natürliche Abtheilungen: 1) solche, welche noch einen Antheil flüchtiges Oel zurückhalten, deshalb weich oder flüssig sind, und die wir aus diesem Grunde natürliche Balsame *) nennen, und 2) harte Harze.

I. Flüssige Harze oder natürliche Balsame.

Copaivabalsam wird durch Einschnitte von einem in Brasilien und auf den Antillen wachsenden Baum, Co-

*) Sie müssen nicht verwechselt werden mit dem, was die französischen Pharmaceuten so nennen, welche hierunter Harze verstehen, die Benzoësäure enthalten, sie mögen hart oder flüssig sein. Sie rechnen daher Benzoë zu den Balsamen, nicht aber Terpenthin.

paifera officinalis, gewonnen. Der brasilianische ist besser, wohlriechender und von hellerer Farbe. Der Copaivabalsam hat eine bläsiggelbe Farbe, ist durchsichtig, ungefähr von der Flüssigkeit eines fetten Oeles, die sich aber durch längeres Aufbewahren vermindert, so daß er zuletzt honigdick wird. Er hat einen eigenen, nicht unangenehmen, aromatischen Geruch und einen scharfen, bitteren, anhaltenden Geschmack. Sein spec. Gewicht ist 0,95. Alter Copaivabalsam gesteht zuletzt ohne zu er härten, und verliert dabei seinen Geruch. Der frische Balsam ist in wasserhaltigem Spiritus schwer auflöslich, leicht auflöslich in wasserfreiem Alkohol. Er besteht aus einem flüchtigen Oel und einem Harz. a) Das Oel ist darin in veränderlichen Mengen enthalten; zu Anfang beträgt es ungefähr die Hälfte, aber in dem im europäischen Handel vorkommenden Balsam nur 0,4 und darunter vom Gewicht des Balsams. Dieses Oel erhält man durch Destillation des Balsams mit Wasser. Es ist wasserklar, dünnflüssig, hat Geruch und Geschmack des Balsams, von 0,9 spec. Gewicht, und bedarf 8 Th. Alkohol (mit kohlen-saurem Kali concentrirten Spiritus) zur Auflösung. Es hängt dem Harze mit so großer Verwandtschaft an, daß es ohne Wasser vom Balsam nicht abdestillirt werden kann. Bei $+126^{\circ}$ giebt dieser Spuren von Wasser und flüchtigem Oel, und erst bei $+212^{\circ}$ fängt er an zu kochen, wird aber dann zersetzt und giebt brenzliches Oel und brennbare Gase. b) Das Harz, welches bei der Destillation mit Wasser zurückbleibt, ist graugelb und spröde, erweicht aber zwischen den Zähnen, und schmilzt in der Wärme zu einer braungelben, durchsichtigen, noch schwach nach Copaivabalsam riechenden Masse.

Der Copaivabalsam hat in der Medicin eine ganz bedeutende Anwendung und wird nicht selten verfälscht. Man versetzte ihn ehemals mit irgend einem fetten Oel, was man durch Behandlung mit Alkohol, welcher das fette Oel ungelöst läßt, leicht entdecken kann. Nachher verfälschte man ihn mit Ricinusöl, welches sich eben so gut wie der Balsam in Alkohol auflöst. Um dies zu ent-

decken, hat man folgende Methoden: *a)* Man schüttelt den Balsam mit einer Auflösung von kaustischem Natron, wobei die Flüssigkeit milchicht wird; war aber der Balsam rein, so scheidet er sich nach einigen Stunden unverändert ab, und es bleibt eine unklare Flüssigkeit darunter. War er mit Ricinusöl verfälscht, so bildet sich hierbei eine homogene, mehr oder weniger zusammenhängende oder erstarrte seifenartige Masse. *b)* Der Balsam wird in einem offenen Gefäß 5 bis 6 Stunden lang in Wasser gekocht. Ist dann der zurückbleibende Theil dem Colophon ähnlich und läßt sich in der Kälte mit glasigem Bruch zerbrechen, so ist der Balsam rein, bleibt er weich, so war er mit fettem Oel versetzt. *c)* Man tropft auf ein Uhrglas 3 Tropfen Copaivabalsam und daneben einen Tropfen concentrirter Schwefelsäure. Im Berührungspunkte wird die Masse gelb, und nach dem Umrühren mit einer Glasröhre safrangelb. Ist der Balsam mit Ricinusöl vermischt, so wird er erst gelb, verliert aber dann die Farbe und sieht wie klarer, weißer Honig aus. Bei längerem Stehen schwärzt sich die Masse in beiden Fällen. *d)* Man vermischt 3 Volumtheile Copaivabalsam mit 1 Th. concentrirtem kaustischen Ammoniak in einer unten zugeschmolzenen Glasröhre und schüttelt um. Der reine Balsam löst sich klar auf, der ölhaltige bildet ein milchweißes Liniment. *e)* Man reibt Copaivabalsam mit ein wenig Magnesia alba zusammen, die sich darin allmählich zu einer klaren Flüssigkeit auflöst, aus der Säuren die Magnesia mit Aufbrausen ausziehen. Der mit Oel verfälschte Balsam bleibt beständig unklar. — Bisweilen wird der Copaivabalsam mit Terpenthin vermischt. Diefs ist schwerer zu entdecken; er ist aber dann consistenter und riecht beim Erhitzen, z. B. auf einem heißen Eisen, nach Terpenthinöl.

Meccabalsam (*Balsamum gileadense*, *Opobalsamum*), aus *Amyris Gileadensis* in Arabien, theils durch Einschnitte, theils durch Auskochen. Der auf erstere Art gewonnene steht bei den Türken in so hohem Werth, daß er fast nur als Geschenk des türkischen Kaisers an Höfe

nach Europa kommt. Er ist hellgelb, dünnflüssig und hat einen angenehmen, zwischen dem von Salvey und Citronen stehenden Geruch. Der durch Auskochen erhaltene ist dickflüssiger als Copaivabalsam, aber dünnflüssiger als Terpenthin. In der Hand gerieben, wird er weiß und seifenartig, und in Wasser getropft, breitet er sich auf die Oberfläche des Wassers aus, und kann mittelst einer Feder leicht davon abgeschäumt werden. Diese beiden Umstände hält man für Proben des echten Meccabalsams. — In Spiritus ist er, selbst bei Anwendung von Wärme, nicht vollständig auflöslich, sondern es bleibt eine durchsichtige, harzartige, wohlriechende Substanz zurück. Von dieser löst erwärmter Alkohol von 0,815 auf, mit Hinterlassung einer flockigen Materie, die sich in der Wärme in Fäden ziehen läßt. Die warme Auflösung trübt sich beim Erkalten und setzt beim freiwilligen Abdampfen eine durchsichtige, terpenthinartige Masse mit einigen weißen Flocken ab. Der Meccabalsam wurde ehemals in der Heilkunde benützt. Bei den Türken steht er als innerliches stärkendes Heilmittel in großem Ansehen.

Perubalsam, aus *Myroxylon peruiferum* auf Terra firma in Südamerika. Ein Theil wird durch freiwilliges Ausfließen nach gemachten Einschnitten gewonnen. Er ist farblos, in's Gelbe ziehend, riecht angenehm wie Storax und Benzoë, und hat einen scharfen Geschmack. Er enthält, außer Harz und flüchtigem Oel, auch Benzoësäure. Von Alkohol wird er vollkommen aufgelöst, aber Aether läßt eine weiße Substanz ungelöst. In der Luft färbt er sich allmählich, wird rothbraun und erhärtet, so daß er sich pulvern läßt, behält aber noch viel von seinem Geruch. In diesem Zustand kommt er, wiewohl selten, in Kürbisschaalen im Handel vor, und enthält dann 88 Proc. Harz, 12 Proc. Benzoësäure und eine Spur von flüchtigem Oel.

Ein anderer Theil wird durch Auskochen der Zweige und der Rinde des Baumes gewonnen. Dieser kommt allgemein im Handel unter dem Namen *Balsamum peru-*

ianum nigrum vor. Er ist dunkelbraun, durchscheinend, von der Consistenz des Honigs, riecht vanilleartig und hat 1,15 spec. Gewicht. Er erhärtet nicht in der Luft, wie der vorhergehende. In einem Destillationsgefäße erhitzt, kommt er bei $+287^{\circ}$ in's Kochen, wobei sich zuerst ein Theil seines Oels entwickelt, dann aber fängt er bald sich zu zersetzen an, die Temperatur steigt allmählich über $+325^{\circ}$, und der Balsam zersetzt sich gänzlich. An das damit digerirte Wasser giebt er Benzoësäure ab. In wasserfreiem Alkohol löst er sich in allen Verhältnissen auf, aber von Alkohol von 0,833 bedarf er 5 Th., und die Auflösung wird nicht klar. Aether läßt eine bräunliche, schmierige Masse unaufgelöst zurück, während er das flüchtige Oel, die Benzoësäure und einen Theil des Harzes aufnimmt. Von Terpenthinöl werden mit Hülfe der Wärme 0,51 vom Balsam aufgelöst; die Auflösung ist braun. Das Unaufgelöste theilt sich in zwei Schichten, von welchen die eine als ein syrupdickes Liquidum oben auf schwimmt, und die andere als eine Art körniger und schwarzbrauner Masse zu Boden liegen bleibt. Mandelöl löst die Hälfte vom Gewicht des Balsams auf, ohne seine Farbe zu verändern oder Geruch anzunehmen. Der unaufgelöste Theil ist eine dunkelbraune, schmierige Substanz.

Schwefelsäure vermischt sich in der Kälte damit zu einem rothbraunen, dicken Magma. Salpetersäure zersetzt ihn mit Entwicklung von Gas und dem Geruch von Blausäure. Durch fortgesetzte Einwirkung bildet er mit beiden Säuren künstlichen Gerbstoff. Mit einer Auflösung von Kalihydrat digerirt, verbindet sich das Harz mit dem Kali, und man erhält ein Gemenge von zwei Flüssigkeiten, von denen die obere das flüchtige Oel des Balsams enthält und hell bräungelb ist, und die untere eine in Wasser aufgelöste Verbindung des Alkali's mit Harz und Benzoësäure ist. Dieses Oel hat den Geruch des Balsams, vermischt etwas mit dem von Pomeranzen, und wird durch Rectification mit Wasser farblos. In Spiritus von 0,833 ist es schwer auflöslich. Das Harz, durch Behandlung mit zweifach kohlen-saurem Kali von Benzoësäure, und durch

Destillation mit Wasser vom Oel befreit, ist, in geschmolzenem und erstarrtem Zustand, gelbbraun, durchscheinend, spröde und bei $+100^{\circ}$ schmelzbar. Von Alkohol und Aether wird es vollständig aufgelöst; aber von Terpenthinöl wird es in zwei Harze zerlegt, von welchen das eine vom Oel nicht aufgelöst wird.

Der Perubalsam wird in der Medicin gebraucht und bisweilen mit Terpenthin, bisweilen mit Capaivabalsam verfälscht. Den Terpenthin entdeckt man am Geruch beim starken Erhitzen.

Flüssiger Storax (*Styrax liquida*). Es giebt zwei Arten davon. Der eine fließt nach Einschnitten aus dem in den südlichen Theilen von Nordamerika wachsenden *Liquidambar Styraciflua*, und der andere aus *Altingia excelsa*, in Cochinchina, auf Java und anderen Gegenden in Ostindien, aus. — Der westindische ist frisch rothgelb und wird mit der Zeit rothbraun, fast schwarz; er hat einen vorzüglich angenehmen vanille- und ambraähnlichen Geruch, und einen wärmenden gewürzhaften Geschmack. Er hat die Consistenz von venetianischem Terpenthin, und ist gewöhnlich mit dem Pulver von der Rinde des Baumes vermischt. Er enthält Benzoësäure. Mit der Zeit wird er hart, so daß er sich pulvern läßt. Er kommt selten in den europäischen Handel. Der ostindische riecht nicht so gut, ist graugrün oder aschgrau, riecht stark, aber unangenehm nach Vanille und hat einen bitteren, scharfen Geschmack. Er wird in der Medicin gebraucht, ist aber recht oft ein verfälschtes Gemenge.

Tolubalsam, durch Einschnitte aus der in Honduras in Nordamerika wachsenden *Toluifera Balsamum*. Anfangs ist er dünn, hellgelb, riecht angenehm und durchdringend nach Citronen und Jasmin, schmeckt süßlich, gewürzhaft und wärmend. Er färbt sich nach und nach rothgelb, bekommt größere Consistenz und erhärtet endlich so, daß er sich pulvern läßt. Er kommt in Kürbisschaalen zu uns, hat dann eine gelbrothe Farbe, läßt sich in Fäden ziehen und hat noch größtentheils seinen Geruch. Er enthält, außer Harz und flüchtigem Oel, Ben-

ensäure, und ist ohne Rückstand in Alkohol, Aether und ichtigen Oelen auflöslich. Von fetten Oelen wird er ivollständig aufgelöst. Zu Schwefelsäure und Salpeterure verhält er sich wie Perubalsam. Von kaustischen lkalien wird er aufgelöst, wobei sich sein Geruch veridert, so daß die mit Balsam gesättigte Auflösung nach ewürznelken riecht.

Terpenthin wird das aus mehreren Pinusarten ausessende flüssige Harz genannt. Er ist, von den verschieenen Species, auch von ungleichen äußeren Verhältnissn, aber immer besteht er aus Colophon und Terpeninöl.

a) Gemeiner Terpenthin (*Tereb. communis*) ird nach gemachten Einschnitten von der Tanne, *Pinus lvestris*, gewonnen. Er ist dickflüssig, zähe, unklar, raugelb, schmeckt bitter, brennend, und hat nur unbeeutenden Geruch.

Ein Gemenge von Tannen- und Fichtenharz, welies im Handel in größeren oder kleineren, weichen, raugelben, auf der Oberfläche erhärteten Klumpen vorommt, wird Galipot genannt, und ist eigentlich als n an Oel weniger reicher, gemeiner Terpenthin zu beachten.

b) Venetianischer Terpenthin (*T. veneta*) as *Pinus Larix*, und französischer Terpenthin as *Pinus maritima*, der erstere aus Steyermark, Unarn, Tyrol und der Schweiz, und der letztere aus dem idlichen Frankreich. Er ist klar, durchsichtig, farblos der schwach gelblich, von dünner Honigconsistenz, fließt schwer und läßt sich in lange Fäden ziehen. Er riecht ungenehm und hat einen bitteren, brennenden Geschmack. Er bleibt, auch in unvollkommen verschlossenen Gefäßen, iele Jahre lang zähe und erhärtet erst sehr spät. Der on *Pinus Larix* enthält zwischen 18 bis 25 Proc. Oel, ber der von *Pinus maritima* giebt nur 12 Proc. Das el wird daraus durch Destillation mit Wasser abgeschieen (S. Terpenthinöl), und das zurückbleibende Harz ist as weiter unten anzuführende Colophon. Von Alkohol

wird der Terpenthin langsam, aber vollständig, in allen Proportionen aufgelöst. Von kaustischen Alkalien wird er sehr leicht aufgenommen, und verbindet sich überhaupt mit Salzbasen. Wird Terpenthin mit einer Lauge von kaustischem Kali zerrührt, so löst er sich auf und die Flüssigkeit setzt einen weißen, flockigen Bodensatz ab, der sich allmählich vermehrt und zuletzt, wenn sich das Alkali dem Sättigungspunkt nähert, wieder verschwindet. Die Auflösung wird dann klar, gelbbraun und hat einen balsamischen, bitteren, nicht im Geringsten alkalischen Geschmack. Es setzt sich kein flüchtiges Oel ab, und bei gelinder Wärme läßt sich die Auflösung eintrocknen, ohne daß das Oel entweicht. Die abgedampfte Masse ist anfangs klar, gelbbraun und klebrig, und wird später beim völligen Eintrocknen unklar und runzelig. In Wasser löst sie sich wieder leicht auf; aber aus dieser Auflösung wird sie wieder von in einiger Menge zugesetztem kaustischen und kohlensaurem Kali abgeschieden. Das Terpentinkali schwimmt oben auf, und bildet über der Lauge eine klare, gelbbraune, scharf alkalisch schmeckende Flüssigkeit, die sich nach dem Abgießen in Wasser auflöst, und dann noch viel mehr Terpenthin auflösen kann. Dieser Umstand verursacht die Trübung beim Auflösen von Terpenthin in Kalilauge. Die alkalische Lauge, woraus sich das Terpentinkali abgeschieden hat, enthält sehr wenig Harz aufgelöst. Mit Natron verhält sich der Terpenthin auf gleiche Weise. Mit Ammoniak zeigt er ganz interessante Verhältnisse. In sehr concentrirtem Zustand wirkt dieses Alkali wenig darauf, aber etwas verdünnt und mit Hülfe der Wärme löst es den Terpenthin dem größten Theile nach mit gelbbrauner Farbe auf; der unaufgelöste Theil bildet eine gelatinöse, brauner Kaliseife ähnliche Masse. Beim Erkalten gesteht das Ganze zu einer solchen Substanz, während sich ein braunes, abgießbares Fluidum ausscheidet. Wird die Masse mit Wasser zerrührt, so wird sie weiß und coagulirt. Die gelatinirte Masse, mit dem 40 bis 50fachen Gewichte Wassers vermischt und gut umgerührt, bildet

ne milchähnliche Flüssigkeit, die nach zwölf Stunden in einer weichen, weissen Gallert geseht. Wird diese auf Löschpapier gelegt, so giebt sie, indem sie sich langsam zusammenzieht, eine klare, gelbe Flüssigkeit ab. Versucht man, die Gallert zu waschen, so wird das Durchgehende milchicht. Bei dieser Behandlung wird der Terpenthin in zwei, in ihren Eigenschaften verschiedene Körper zerlegt. *a)* Die klare, gelbe Flüssigkeit, die sich von dem gelatinirten Theil sowohl vor als nach der Verdünnung ausscheidet und durch's Filtrum geht, ist eine Verbindung von Ammoniak mit einem Harz, worin kein flüchtiges Oel mehr enthalten ist; wird die Flüssigkeit mit einer Säure gesättigt, so fällt das Harz pulverförmig nieder, kann auf das Filtrum genommen und gewaschen werden, und bildet, nach dem Trocknen in gelinder Wärme, eine weisse, poröse, leichte, krümlige und im Bruche erdige Masse. Wird dieser Niederschlag mit der Flüssigkeit, woraus er gefällt ist, in einem Destillationsgefäss gekocht, so bemerkt man durch den Geruch nur Spuren von flüchtigem Oel, aber es setzt sich nichts davon in einer Periode der Destillation im Wasser ab. Das Harz schmilzt beim Kochen und sieht nach dem Erkalten wie gewöhnliches Colophon aus. Mit destillirtem Steinöl gekocht, löst sich dieses Harz in einem gewissen Grade im Oel mit braungelber Farbe auf, scheidet sich aber beim Erkalten als eine gelatinöse gelbbraune Masse wieder ab, während das Oel seine Farbe verliert. Das pulverförmige weisse Harz enthält Wasser, welches es beim Schmelzen verliert. *b)* Der gelatinirte Theil von der Verbindung des Ammoniaks mit Terpenthin zieht sich in dem Waasse zusammen, als sich die eben erwähnte Verbindung ausscheidet. Mit dem Filtrum auf vielfach zusammengelegtes Löschpapier gelegt, giebt er die letzten Antheile von der übrigen gelben Auflösung ab, und in Behandlung mit der Luft wird er allmählich hellgelb, durchscheinend und klebrig wie Terpenthin. Er besteht aus einer Verbindung von Ammoniak mit einem anderen Harz und mit Terpenthinöl. In dem Grade, als das Am-

moniak verdunstet, bildet sich ein regenerirter Terpenthin, der aber nun, wegen des geringeren Harzgehaltes, weicher und klebriger ist, und auch eine, nicht verdunstende, Portion Ammoniak zurückbehält. Wird diese Masse in einer Retorte mit Wasser destillirt, welches freie Säure enthält, so geht schon mit den ersten Tropfen des Destillats Terpenthinöl über. Das durch Destillation vom Oel befreite Harz erstarrt beim Erkalten, und wird dann hart, braungelb und dem oben erwähnten sehr ähnlich, von dem es sich gleichwohl durch seine leichte Auflöslichkeit in rectificirtem Steinöl unterscheidet, wobei nur ein sehr geringer, von dem nicht vollkommen abgeschiedenen vorigen Harze herrührender, Rückstand bleibt, und die Auflösung sich nach dem Erkalten klar erhält. — Wird eine Auflösung von Salmiak so lange in eine Auflösung von Terpenthinkali getropft, als sich noch ein Niederschlag bildet, so erhält man ebenfalls dieselben nun erwähnten Verbindungen, von denen die eine aufgelöst bleibt, und die andere sich niederschlägt. Der Terpenthin besteht folglich aus zwei Harzen, von denen das eine in kaltem Petroleum unauflöslich, das andere darin auflöslich ist, und dessen Verbindung mit Ammoniak und Terpenthinöl in einer Flüssigkeit unauflöslich ist, welche die Verbindung des ersteren Harzes mit Ammoniak aufgelöst enthält. Uebrigens habe ich schon beim Terpenthinöl angeführt, daß dieses wahrscheinlich zwei Oele enthalte, so daß der Terpenthin also aus wenigstens zwei Harzen und zwei Oelen besteht.

Das in Wasser aufgelöste Terpenthinkali fällt die Salze der alkalischen und eigentlichen Erden, so wie die der Metalle. Diese Niederschläge sind in Wasser unauflöslich, und wenn sie nach dem Trocknen mit Wasser destillirt werden, so geben sie Terpenthinöl. Sie sind völlig geruchlos und sind anfangs ohne Geschmack, aber nach einigen Augenblicken kommt der stechende Geschmack des flüchtigen Oels im Balsam hervor. — Diese Verbindung des flüchtigen Oeles mit dem Harze und der Salzbase ist sehr bemerkenswerth. Im Uebrigen verhalten sich diese

Verbindungen wie die von Colophon mit denselben Baunen, wovon ich weiter unten reden werde, nur mit dem Unterschiede, daß sie leichter schmelzbar sind.

c) Strasburger Terpenthin (*T. argentoratensis*) von *Pinus Picea*. Er ist blaßgelb, durchsichtig, riecht angenehm und ist dünnflüssiger als der vorige.

d) Karpathischer u. Ungarscher Terpenthin, der erstere von *Pinus Cembra*, und der letztere von *Pinus Mugos*. Sie gleichen dem Strasburger Terpenthin.

e) Canadischer Terpenthin (*Bals. canadense*) von *Pinus balsamea* und *canadensis*. Riecht viel angenehmer als die vorigen, ist blaßgelb, durchsichtig und dünnflüssig, aber zugleich zähe.

f) Cyprischer Terpenthin (*T. cypraea* oder *Chia*) von *Pistacea Terebinthus*. Ist gelb, grünlich oder blaugrün, durchscheinend, zähe und consistent wie Honig, riecht gut, zumal auf glühenden Kohlen, und schmeckt weniger scharf als alle vorhergehenden. Wird oft mit anderen Terpenthinarten verfälscht.

Der Terpenthin wird in der Medicin und in den Künsten, zu Firnissen, Kitten u. dergl., sehr viel gebraucht. In Schweden kommt nur der gewöhnliche und der venezianische Terpenthin im Handel vor.

2. Trockene Harze.

Anime wird von *Hymenaea Courbaril*, einem in Brasilien wachsenden Baume, erhalten. Es kommt in blaßgelben Stücken mit glasigem Bruch und staubiger Oberfläche zu uns. Es enthält eine geringe Menge, kaum Proc. flüchtigen Oels, von dem es einen angenehmen Geruch hat; von kaltem Alkohol wird es langsam und unvollständig aufgelöst. Der übrigbleibende Rückstand löst sich in kochendem Alkohol auf, und krystallisirt aus einer im Kochen gesättigten Auflösung, oder durch freiwillige Verdunstung einer nicht gesättigten. Die Krystalle sind farblos und sublimirbar (Bonastre's Halbharz). Sind sie vielleicht als ein das Harz begleitendes Stearopten zu

betrachten? Das Anime wird in der Pharmacie und in Firnissen gebraucht.

Benzoë wird durch Einschnitte in den Stamm und die Aeste von dem auf Sumatra wachsenden *Styrax Benzoin* gewonnen. Es erhärtet bald und gelangt in großen, spröden Klumpen zu uns, deren Bruch ein Gemenge von rothen, braunen und weissen, größeren und kleineren Körnern zeigt, welche, wenn sie weissen und Mandeln ähnlich sind, zur Benennung *Benzoë amygdaloides* Veranlassung gegeben haben. Im Bruche ist es muschlich und fettglänzend; sein spec. Gewicht ist von 1,063 bis 1,092. Es riecht, besonders beim Zerstoßen, sehr angenehm vanilleartig. Bei gelinder Wärme schmilzt es, und dann sublimirt sich Benzoësäure daraus. Es enthält bis zu 18 Proc. von dieser Säure, deren ganze Menge, nach Stolze, am besten so ausgezogen wird, daß man das Harz in 3 Th. Alkohol auflöst, die Auflösung in einer Retorte mit einer Auflösung von krystallisirtem kohlen sauren Natron in 8 Th. Wasser und 3 Th. Alkohol nach und nach in kleinen Antheilen vermischt, bis daß die freie Säure der Alkoholauflösung gesättigt ist, worauf man das 2fache Gewicht vom Harze Wasser zumischt und den Alkohol abdestillirt. Die Flüssigkeit enthält dann die Säure, und das darin angesammelt liegende Harz kann weggenommen und abgewaschen werden. Es beträgt 80 bis 82 Proc. Außerdem enthält das Benzoë Spuren von flüchtigem Oel, nebst einer in Wasser und vorzüglich in kohlen sauren Alkali auflöselichen Substanz. Das Benzoë ist in Alkohol und Aether leicht auflöselich, in letzterem aber mit Rückstand. Flüchtige und fette Oele lösen nur sehr wenig davon auf.

Das Benzoëharz ist rothbraun und giebt ein röthliches Pulver. Es ist durchscheinend, spröde und hat mit der Säure auch fast gänzlich seinen Geruch verloren. Von concentrirter, kalter Schwefelsäure wird es mit dunkelrother Farbe aufgelöst, und daraus durch Wasser in rothen Schuppen gefällt. Von Salpetersäure wird es mit Heftigkeit aufgelöst und zersetzt; beide Säuren hinterlassen nach

stärkter Einwirkung künstlichen Gerbstoff. Auch in Essigsäure ist es auflöslich. Von kaustischem Kali und Natrium wird es leicht aufgelöst; die gesättigte Auflösung ist rothbraun, durchsichtig und trocknet zu einer anfangs weichen, hernach aber spröden, braunen Masse ein, die sowohl in Wasser als in Alkohol auflöslich ist. Die Auflösung in Wasser wird von überschüssigem Alkali gefällt. In Ammoniak löst dasselbe, wiewohl schwächer, auf. In Terpenthinöl, welches $\frac{1}{2}$ Harz auflöst, wird es in zwei Theile zerlegt, von denen das eine im Oel unauflöslich ist.

Benzoë wird in der Pharmacie, vorzüglich zur Darstellung der Säure, benutzt.

Colophon ist das von dem flüchtigen Oel befreite Rückbleibsel der Terpenthinarten. So wie es in der Destillirblase zurückbleibt, hat es schon eine dunkle, im Durchsehen rothbraun erscheinende Farbe, und war die Destillation nicht lange genug fortgesetzt, so ist es noch weich und nimmt den Namen gekochter Terpenthin. Es wird gewöhnlich in offener Luft geschmolzen, um es von Wasser und noch rückständigem Oel zu befreien. Nach dem Erkalten bleibt eine etwas dunklere, harte und spröde Masse zurück, die Colophon (*Colophonium*) ist. Man pflegt es gewöhnlich mit $\frac{1}{3}$ Galipot zusammenzuschmelzen, woraus das sogenannte Harz, *Resina communis* oder *Pix Burgundica* entsteht.

Das Colophon ist dunkel bräunlich, halb durchsichtig, spröde, leicht zu pulvern, und von 1,07 bis 1,08 spec. Gewicht. Bei $+69^{\circ}$ wird es weich und sein Pulver backt zusammen, aber erst bei $+135^{\circ}$ schmilzt es vollkommen. Bei der trockenen Destillation hinterläßt es nicht mehr als $\frac{1}{2}$ Proc. Kohle, das Uebrige ist brennbares Oel, saures Wasser und brennbare Gase. In Alkohol, Aether, flüchtigen und fetten Oelen ist es leicht auflöslich. In Steinöl wird es in zwei Harze zerlegt, von denen das eine im Oel unauflöslich ist. Das andere bleibt nach der Verdunstung des Oels zurück; es breitet sich weit aus, wird gelb und leicht zu pulvern. Mit fetten Oelen, so wie mit Talg, giebt es eine weiche Masse, die mit viel Fett

wie Terpenthin klebrig wird. Zu den Säuren verhält es sich wie die Harze im Allgemeinen.

Mit Salzbasen verbindet es sich mit einer ausgezeichneten Verwandtschaft, und es wird von kaustischen Alkalien, selbst von Ammoniak, zu einer klaren, gelben oder braunen Flüssigkeit aufgelöst. Seine Verbindungen mit Salzbasen, welche von Unverdorben untersucht wurden, sind die bis jetzt am besten bekannten. Ich will hier das Resultat seiner Arbeit mittheilen.

Das Colophon wird von kaustischem Kali ohne Zersetzung aufgelöst; wird es durch eine verdünnte Säure niedergeschlagen, gewaschen, getrocknet und geschmolzen, so findet man Eigenschaften und Gewicht desselben unverändert. In diesen Verbindungen spielt es die Rolle einer Säure; in seinen neutralen Salzen sättigt es eine Quantität Basis, deren Sauerstoff 1,45 ist, was wiederum fast $\frac{1}{9}$ vom Sauerstoffgehalt des Harzes ist, denn $1,45 \times 9 = 13,05$, und Gay-Lussac und Thénard fanden 13,337 Procent Sauerstoff *); ein Atom Colophon wiegt dann 6280. Fällt man Colophon durch eine Säure aus seiner Auflösung in Alkali, so erhält man eine Verbindung vom Harze mit Wasser, die aus 100 Th. Colophon und 13,1 Th. Wasser besteht, das sich austreiben läßt. Der Sauerstoff des Wassers verhält sich zu dem des Colophons $= 8 : 9$; man kann hieraus schliessen, daß das Colophon Wasser enthält, welches dasselbe nicht beim bloßen Schmelzen entweichen läßt, und daß in dem wasserhaltigen gefällten Harze der Sauerstoff in letzterem und im Wasser gleich viel beträgt.

Colophonkali erhält man nicht neutral durch Auflösung in einer verdünnten Kalilauge, deren Lösungsvermögen im Verhältniß zu ihrer Concentration steht. Werden aber 100 Th. Colophon mit $8\frac{1}{2}$ Th. Kalihydrat in der geringsten Quantität Wassers aufgelöst, so nimmt das Al-

*) Unverdorben hat hiernach die Zusammensetzung des Harzes zu $69C + 119H + 9O$ berechnet.

Alkali einen Ueberschuß von Harz auf, der sich beim Auflösen in mehr Wasser abscheidet, während ein neutrales Salz in Auflösung bleibt. Nach dem Abdampfen erhält man das neutrale Salz in Gestalt einer braunen, trockenen, spröden und durchscheinenden Masse, welche sich in allen Verhältnissen in Wasser, Alkohol und Aether auflöst, aber in Terpenthinöl und Baumöl unauflöslich ist. Ihre Auflösung in Wasser wird von überschüssigem Alkali, wenn man es in einer gewissen Menge zusetzt, gefällt, gerade so, wie es mit den Salzen der fetten Säuren der Fall ist. Wird die Auflösung dieses Salzes durch die elektrische Säule zersetzt, so setzt sich das Colophon an den positiven Drath, während das Kali zum negativen geht, und ist der positive Drath von Kupfer, so bildet sich Colophonkupferoxyd. Kohlensäure zersetzt das Colophonkali, nicht aber Cyanwasserstoffsäure. Colophonnatron verhält sich wie das Colophonkali. Colophonammoniak entsteht, sowohl wenn trockenes Colophonpulver Ammoniak bis zur Sättigung absorhirt, wobei 100 Th. Colophon 3,1 Th. an Gewicht zunehmen, als auch wenn wasserhaltiges Colophon bis zur Sättigung in kaustischem Ammoniak aufgelöst wird. In beiden Fällen erhält man eine in Wasser schwer auflösliche, hellgraue, dem Vogelleim ähnliche Masse; und die nicht im 300fachen ihres Gewichtes Wassers auflöslich ist. Sie schlägt sich auch beim Vermischen von Colophonkali mit Salmiak nieder. In der Wärme wird das Ammoniak ausgetrieben, und beim Schmelzen entweicht es vollständig. Colophon-Baryterde, -Strontianerde und -Kalkerde erhält man durch doppelte Zersetzung. Sie werden als weißse, käsige Massen niedergeschlagen, die nach dem Trocknen in's Gelbe ziehen, nicht harzähnlich werden, und selbst bei $+100^{\circ}$ nicht zusammensintern. Bei höherer Temperatur schmelzen sie und zersetzen sich. In Alkohol sind sie wenig löslich, leicht auflöslich aber in Aether, Terpenthinöl und Baumöl. Die übrigen Erdd- und Metallsalze geben mit Colophonkali durch doppelte Zersetzung Colophonsalze, die in Wasser unauflöslich sind.

die aber alle, mit Ausnahme des Bleioxydsalzes, von Aether aufgelöst werden, aus welchem sie Alkohol niederschlägt. Einige sind auch in Terpenthinöl auflöslich. Die meisten derselben schmelzen bei einer Temperatur über $+100^{\circ}$. Colophonkupferoxyd fällt als ein blasgrünes, leicht zusammenbackendes Pulver nieder. Es wird kaum merklich von Alkohol aufgelöst, der sich gleichwohl damit grün färbt; aber von Aether und von Terpenthinöl wird es leicht aufgelöst. Die Auflösung in letzterem ist ein schön grüner Firnis, der nach der Verdunstung des Oels einen durchscheinenden grünen Ueberzug zurückläßt. Bei gelinder Wärme schmilzt es zu einer grünen Masse, die bei höherer Temperatur in gelinder Kochen kommt, die grüne Farbe verliert, durchsichtig bräunlich wird, und nun eine Verbindung von Harz mit Kupferoxydul zu enthalten scheint. Setzt man in die Auflösung von Colophonkupferoxyd in Aether Zink oder Eisen, so schlägt sich das Kupfer metallisch darauf nieder und der Aether enthält nun ein Zink- oder Eisensalz mit Colophon. Die Auflösung der letzteren ist dunkelroth. — Auch mit vegetabilischen Salzbasen kann sich das Colophon verbinden. Eine Auflösung von Colophonkali zum Beispiel mit chlorwasserstoffsauerm Cinchonin vermischt, giebt einen Niederschlag, der sich zu einer zähen, ölähnlichen, in Alkohol leicht auflöslichen Masse ansammelt. Wird diese Auflösung zuerst mit einer Säure, und dann mit Wasser vermischt, so wird das Harz gefällt und in der Auflösung bleibt Cinchoninsalz; aber Harzcinchonin wird von Alkali, worin es unauflöslich ist, nicht zersetzt.

Das Colophon wird in der Pharmacie und in den Künsten in großer Menge verbraucht. Seine Anwendung zum Bestreichen der Violinbogen, um ihr Weggleiten über die Saiten zu verhindern, ist allgemein bekannt, und die Veranlassung zur deutschen Benennung Geigenharz gewesen.

Copal wird aus *Rhus copallinum* und *Elaeocarpus* gewonnen, aus denen er von selbst ausfließt.

Ersterer wächst in Westindien, letzterer in Ostindien. Noch eine dritte Art wird auf der Küste von Guinea, besonders in der Nähe der Flüsse, im Sande ausgegraben. Dieses Harz kommt zum Theil in großen, auswendig unklaren, inwendig aber klaren, fast farblosen oder schwach gelblichen Stücken vor; zum Theil ist es auch gelb oder gelbbraun und schließt Insecten ein. Er hat, je nach seinem Ursprung, 1,045 bis 1,139 spec. Gewicht, ist hart, von muschlichem Bruch, und geruch- und geschmacklos. In der Wärme schmilzt er, verändert sich aber dabei und giebt, unter Kochen, aromatisch riechende Dämpfe von sich. In seinem natürlichen Zustand wird er selbst von wasserfreiem Alkohol höchst unbedeutend aufgelöst, beim Kochen schwillt er aber zu einer zähen, elastischen Substanz auf. Um seine Anflösung zu bewirken, giebt man die Vorschrift, denselben in den Dämpfen von kochendem Alkohol aufzuhängen, worin er nach und nach zergeht, und dann in die Flüssigkeit in der Retorte tropft, worin er aufgelöst bleibt, und dies soll vorzüglich gut glücken, wenn man Campher im Alkohol aufgelöst hat; wenn es aber auch manchmal mit einer gewissen Copalart glückt, so geht es doch nicht mit allen Arten. In Aether dagegen schwillt er auf und wird vollständig aufgelöst. Wird Copal, nachdem er in Aether zu einer syrupdicken Masse aufgequollen ist, bis zum anfangenden Kochen erhitzt, und dann mit kleinen Mengen warmen Alkohols (von 0,82 und noch stärkerem) vermischt und umgeschüttelt, so löst sich der Copal darin zu einer wasserklaren Flüssigkeit auf, die auf diese Weise nach Belieben verdünnt werden kann. Setzt man den Alkohol kalt oder auf einmal zu, so gerinnt die Masse und löst sich nicht weiter auf. Steinöl löst 1 Procent seines Gewichts, und Terpenthinöl etwas mehr Copal auf. Man hat einen Zusatz von concentrirtem Ammoniak zum Terpenthinöl vorgeschrieben, wodurch Copalammoniak gebildet und im Oel auflöst werden würde; in diesem Falle aber trocknet die linstete Masse nur ganz langsam ein. — Copal wird, andere Harze, von concentrirter Schwefelsäure und

von Salpetersäure aufgelöst. Kaustische Alkalien lösen dasselbe, zumal mit Hülfe der Wärme, leicht auf, wobei es einen aromatischen, dem Copaivabalsam nicht unähnlichen Geruch verbreitet. Mit kaustischem Kali digerirt, erweicht das Harz zuerst, so daß es sich in Fäden ziehen läßt, und löst sich dann zu einer klaren, gelblichen Flüssigkeit auf, die beim Erkalten weiß und unklar wird und gerinnt, wobei die Masse eine geringe Menge einer gelblichen Flüssigkeit auspresst. Hierbei wird der Copal in zwei Harze zerlegt, von denen das eine sich in der gelatinirten Verbindung, und das andere in der aufgelösten befindet. Sie sind sehr schwer bestimmt von einander zu trennen, und durch Verdünnung mit mehr Wasser zertheilt sich die gelatinirte Verbindung zu einer Milch, die sich nicht filtriren läßt. Das in der gelatinirten Verbindung befindliche Harz, so viel wie möglich von dem anderen getrennt und durch eine Säure niedergeschlagen, bildet eine schneeweiße, flockige Substanz, die selbst bei $+40^{\circ}$ nicht in der Flüssigkeit zusammenbackt, und die den häufigeren Bestandtheil des Copals auszumachen scheint. Das aber, was sich in Auflösung von der Gallert abgeschieden hat, sammelt sich, backt bei gewöhnlicher Temperatur zusammen und wird dann gelb.

Wird eine mit den beiden Harzen gesättigte milchichte Auflösung in Kali abgedampft, so hinterläßt sie eine wenig gelbgefärbte, klare, durchsichtige, in Wasser und Alkohol leicht auflösbare Masse, die bitter und etwas aromatisch, aber nicht alkalisch schmeckt.

Wird gröblich zerstoßener Copal mit kaustischem Ammoniak befeuchtet und in einer verkorkten Flasche an einen warmen Ort gestellt, so schwillt der Copal zu einer klaren Gelée auf, die mit wenig Wasser einen unklaren, zähen Schleim, und mit viel Wasser eine milchichte, nicht klar werdende Flüssigkeit giebt. Abgedampft, hinterläßt sie, bevor noch alle Flüssigkeit weg ist, eine weiße, zähe und elastische Masse, die sich in lange Fäden ziehen läßt. Wird diese bei $+40^{\circ}$ bis 60° getrocknet, so fließt sie zu einer durchsichtigen, gelblichen Masse, die bei dieser

peratur mehrere Wochen lang weich bleibt, aber bei ähnlicher Lufttemperatur hart und spröde wird, und nur sehr unbedeutend in kochendem Alkohol auflöst. Wird dagegen die mit kaustischem Ammoniak und Cörrhaltene Gelatine mit Alkohol vermischt, so löst sie augenblicklich zu einer wasserklaren Flüssigkeit auf. Theil vom Copal, der nicht aufgequollen war, bleibt ungelöst, selbst wenn die Flüssigkeit Ammoniak im Ueberschuß enthält, und Alkohol, der mit derjenigen Menge kaustischen Ammoniaks versetzt ist, die auf die erwähnte Art vollständige Auflösung bewirkt, löst vom Copal, auch nach dem Kochen, kaum etwas mehr als Alkohol ohne Ammoniak auf. Die Auflösung der, so viel wie möglich, mit gesättigten Ammoniakgelée in Alkohol hinterläßt, auf dem Körper gestrichen, einen kreideähnlichen Ueberzug, der bei $+40^{\circ}$ ein farbloses, durchsichtiges und glänzendes Häutchen bildet, das in der Wärme weich bleibt, in der Kälte ziemlich fest und zähe ist, und man kann diese Auflösung als einen farblosen Lackfirniß in denselben Fällen anwenden, wo das Trocknen in der Wärme stehen kann und die Gegenwart des Ammoniaks nichts schadet.

Copalkali schlägt mit Salmiak Copalammoniak als eine flockige Substanz nieder, die in kochendem Alkohol nicht auflöslich ist, sondern sich damit ganz so wie Copal ohne Ammoniak verhält. Mit Ammoniak versetzter Alkohol löst dasselbe ebenfalls nicht auf. Wird Copal mit Salzen von alkalischen und eigentlichen Erden vermischt, so entstehen Niederschläge, die nach dem Trocknen entweder weiß oder schwach gelblich, hart und von erdigem Bruch sind. Mit gefärbten Metallsalzen giebt man gefärbte Verbindungen; Kupferoxyd z. B. giebt schön grasgrüne, in geringem Grad in Aether auflösliche; Kobaltoxyd eine rosenrothe, nach dem Trocknen violette, aus der Aether etwas Copal auszieht, ohne die Base aufzulösen; Eisenoxyd eine rostgelbe, nach dem Trocknen pomeranzengelbe u. s. w. Beim Kochen mit kohlensaurem Kali erweicht der

Copal, ohne sich darin aufzulösen, und bleibt nach noch lange so weich.

Geschmolzener Copal zeigt ein ganz anderes Verhalten als der ungeschmolzene; er giebt beim Schmelzen unter Kochen flüchtiges Oel und Wasser ab, und ist sowohl in Alkohol als in Terpenthinöl auflöslich. Letztere Auflösung wird öfters mit fettem, trocknendem Oel zur Bildung eines harten, farblosen und durchsichtigen Firnisses vermischt. Man erhält diese Auflösungen so, daß man den in erbsengroße Stücke zergewogenen Copal in eine Glasflasche mit dünnem Boden diese, an einen Stock befestigt, über Kohlenfeuer und behutsam umschüttelt, bis daß aller Copal bei so gelinder Wärme geschmolzen ist, daß er noch braun zu werden anfängt. Dann wird Terpenthinöl so erhitzt, daß es sich kaum anfassen läßt, aber nicht zu heiß, nach und nach in kleinen Antheilen zugegossen durch Umschütteln mit dem Copal vermischt. Gießt man alles auf einmal zu, so coagulirt der Copal und löst sich dann nicht mehr auf. Coagulirt der geschmolzene Copal auch wenn kleine Antheile Oel zugesetzt werden, so kann man eine andere Portion schmelzen.

Der Copal wird nur zu Firnissen gebraucht.

Drachenblut wird durch Einschnitte in *Pteropus Draco*, *P. santalinus*, *Dracaena Draco* und von der reifen Frucht von *Calamus Rotang*, die davon urbar ist, gewonnen. Es ist von verschiedener Güte. Das beste bildet runde, muskatnußgroße Stücke, die mit Schilf umgeben sind. Seine Farbe ist dunkelbraun; es giebt ein blutrothes Pulver, ist undurchsichtig, spröde, im Bruche matt, geschmack- und geruchlos, und von 1,196 spec. Gewicht. Es löst sich leicht mit rother Farbe in Alkohol, Aether, flüchtigen und fetten Oelen auf. Es enthält eine kleine Menge Benzoësäure, wonach es beim Verbrennen riecht. Salpetersäure zerstört seine Farbe, macht es dunkelgelb, und wenn sie zusammen destillirt werden, erhält man 0,06 Benzoësäure sublimirt, und als Rückstand künstlichen Gerbstoff. Schwefelsäure verkohlt

in Alkohol schlägt Schwefelsäure nieder. Salpetersäure von dem Guajakpulver grün und löst auf. Die Auflösung wird von Wasser nicht aber von Schwefelsäure gelöst. Ein braunes, in der Wärme sich absetzendes Niederschlag. Zuletzt bildet sich Oxaloxal. Salpetersäure wird vom Harze zerlegt, es gänzlich aufgelöst wird; es bleibt eine braune Substanz zurück, die von Wasser aufgelöst wird, im Feuer animalisch fortgesetzter Behandlung mit Salpetersäure in stickstoffähnlichen Körper verwandelt wird. Bei der Auflösung von Guajak in Alkohol, die salpetrische Säure enthält, so wird das Harz grün. Wasser schlägt daraus ein grünes Pulver nieder, während die Auflösung blau wird. Mehr Wasser setzt ein blaues Harz nieder, die Auflösung wird durch fernere Verdünnung ein braunes Pulver, welches unrectificirte und saure Salpeternaphta enthält, blau, und fällt ein blaues, bald braunes Pulver ab. Läßt man in eine mit Guajaktinctur befüllte Retorte Stickstoffoxydgas strömen, so wird die sich bildende salpetrische Säure, augenblicklich blau. Chlorwasserstoffsäure fällt die Tinctur mit grauer Farbe, aber von Essigsäure wird es gefällt.

Bei Salzbasen verhält sich das Guajakharz wie ein Salz. Es löst sich mit der größten Leichtigkeit in Wasser, Kali und selbst in verdünntem kaustischen Ammoniak auf, und sein Pulver absorbirt Ammoniakgas. Das Guajakharz werden, nach Unverdorben, von einer Quantität Basis gesättigt, deren Sauerstoff 3,53 ist. Die Auflösungen mit alkalischer Basis sind, nach ungleicher Concentration, braun oder rothbraun. Die neutrale Auflösung des Harzes mit Ammoniak ist in Wasser fast unauflöslich. Mit den Erden und Metalloxyden bildet es, durch doppelte Zersetzung, schwerlösliche

ver. Es enthält, nach Buchner, gewöhnlich 80 Pro. Harz, $16\frac{1}{2}$ Proc. eingemengte Rinde, 5,1 Proc. in Wasser auflösliches Gummi und 2 Proc. eines scharfen, in Wasser löslichen Extractivstoffs. Es brennt wie die Harze, und riecht dabei angenehm.

Dieses Harz zeichnet sich vor andern dadurch aus, daß es aus der Luft leicht Sauerstoff aufnimmt, seine Farbe verändert und diese Farbe wieder leicht verliert. Dieser Umstand ist die Ursache, daß man die Verhältnisse des Guajakharzes weit mehr als die anderer Harze untersucht hat. Wird sein Pulver der Luft ausgesetzt, so absorbiert es Sauerstoff und wird grün. Ich habe schon im I. Th. p. 140 der Farbenveränderungen erwähnt, welche ein mit Guajaktinctur bestrichenes Papier im Farbbild des Prisma's erleidet, wobei es in dem violetten Licht grün, und in dem rothen, so wie durch Erwärmung bis zu einem gewissen Grad, wieder gelb wird. Aehnliche Farbenveränderungen zeigt es auch durch Einwirkung chemischer Reagentien, wobei es zugleich blau und braun wird. Alkohol löst 0,9 vom natürlichen Guajakharz auf. Die Auflösung ist braun und wird durch Wasser gefällt, wobei sich aber das Harz lange aufgeschlämmt erhält und als eine Milch durch das Filtrum geht. Aether läßt einen größeren Rückstand als Alkohol unaufgelöst zurück. Warmes Terpenthinöl löst davon mehr auf, als kaltes, und beim Erkalten setzt sich der Ueberschuß ab. Die Auflösung wird beim Abdampfen blau, amethystroth, rosenroth, rothbraun und zuletzt braungelb. Von fetten Oelen wird es nicht aufgelöst.

Chlorgas und Chlorwasser färben das Guajakpulver sogleich grün, dann blau und zuletzt braun; wird dann Ammoniak zugesetzt, so wird es wieder grün und löst sich mit grüner Farbe darin auf. In einer Auflösung des Harzes in Alkohol bewirkt Chlor einen blauen Niederschlag. Schwefelsäure löst das Guajakpulver in der Kälte mit rothbrauner Farbe auf; Wasser schlägt daraus ein lilafarbn'es Harz nieder. In der Wärme entwickelt sich schweflichtsaures Gas, unter Bildung von künstlichem Gerb-

Aus der Auflösung in Alkohol schlägt Schwefelsäure Harz mit grüner Farbe nieder. Salpetersäure von spec. Gewicht färbt das Guajakpulver grün und löst mit Gasentwicklung auf. Die Auflösung wird von Wasserstoffsäure, nicht aber von Schwefelsäure gelöst.

Alkalien geben einen braunen, in der Wärme sich auflösenden Niederschlag. Zuletzt bildet sich Oxal-

Verdünnere Salpetersäure wird vom Harze zerlegt, ohne daß dieses gänzlich aufgelöst wird; es bleibt noch eine harzige, braune Substanz zurück, die von Alkohol und Aether aufgelöst wird, im Feuer animalisch verbrennt, und nach fortgesetzter Behandlung mit Salpetersäure in einen gerbstoffähnlichen Körper verwandelt wird. Man kann zu einer Auflösung von Guajak in Alkohol

Salpetersäure, die salpetrichen Säure enthält, so die Tinctur grün. Wasser schlägt daraus ein grünes Harz nieder, während die Auflösung blau wird. Mehr Wasser schlägt ein blaues Harz nieder, die Auflösung wird wieder grün und setzt durch fernere Verdünnung ein braunes Harz ab. Auch unrectificirte und saure Salpeterminerale lösen die Tinctur blau, und fällen ein blaues, bald braunes Harz. Läßt man in eine mit Guajaktinctur befüllte Porzellanschale Stickstoffoxydgas strömen, so wird durch die sich bildende salpetrichen Säure, augenblicklich prächtig blau. Chlorwasserstoffsäure fällen die Tinctur mit grauer Farbe, aber von Essigsäure wird nicht gefällt.

Zu den Salzbasen verhält sich das Guajakharz wie Guajak. Es löst sich mit der größten Leichtigkeit in verdünntem kohlensaurem Kali und selbst in verdünntem kaustischem Ammoniak auf, und sein Pulver absorbirt Ammoniakgas.

Die Guajakharze werden, nach Unverdorben, von einer bestimmten Quantität Basis gesättigt, deren Sauerstoff 3,53 ist.

Die Auflösungen mit alkalischer Basis sind, nach ungleicher Concentration, braun oder rothbraun. Die neutrale Verbindung des Harzes mit Ammoniak ist in Wasser fast unauflöslich. Mit den Erden und Metalloxyden bilden sich, durch doppelte Zersetzung, schwerlösliche Verbindungen.

dungen, deren Farbe dunkeler, mehr in's Grüngrau ziehend ist, als die der Colophon-Verbindungen. Guajakali und Guajaknatron werden nicht, wie die Colophon-salze, aus ihren Auflösungen von überschüssigem Alkali gefällt.

Mit einigen Salzen zeigt es bemerkenswerthe Verhältnisse. Von kohlen-sauren Alkalien wird es aufgelöst. Vermischt man Guajak-tinctur mit essigsau-rem Kupferoxyd oder mit Kupferchlorid und setzt Cyanwasserstoffsäure zu, so fällt Kupfercyanür nieder und die Auflösung geht durch Grün und Blau in Braun über. Vermischt man die Flüssigkeit in dem Augenblick, wo sie schön blau ist, mit Wasser, so fällt ein schön blaues Harz nieder, welches kein Kupfer enthält, welches sich mit blauer Farbe in Alkohol und mit grüner in Ammoniak auflöst, aber in Säuren und in Aether unauflöslich ist. Die Farbe beider Auflösungen ändert sich allmählich in eine gelbe um.

Mit verschiedenen Pflanzen- und Thierstoffen nimmt das Guajakharz eine blaue Farbe an; so z. B. fand Tadei, daß Guajakpulver durch Zusammenreiben mit Pflanzenleim und mit, Pflanzenleim enthaltendem, Mehl blau wird. Planche fand, daß wenn man von den frischen Wurzeln mehrerer Pflanzen transverselle Scheiben schneidet und darauf Guajak-tinctur tropft, die auch bei Ausschluß der Luft blau werden. Diefes zeigte sich mit *Cochlearia Armoracia*, *Symphytum officinale*, *Leontodon Taraxacum*, *Cichorium Intybus*, deren ausgepresster Saft gleichfalls davon blau wurde, *Eryngium campestre*, *Iris germanica*, *Nymphaea alba*, *Solanum tuberosum*, *Inula Helenium*, *Daucus Carota*, *Glycyrrhiza glabra*, *Brassica Napus*, *Arcticum Lappa*, *Colchicum autumnale*, *Saponaria officinalis*, *Fumaria off.*, *Rumex Acetosa*, *Scorzonera hispanica*, *Borago off.*, *Angelica Archangelica* und *Allium Cepa*. Diese Wurzeln verlieren ihre irbende Eigenschaft sowohl beim Erhitzen bis +100°, als beim Trocknen. Die Wurzeln von *Polypodium* *Rumex acutus*, *Fragaria Vesca* u. a. zeigten nicht. Ap. summi, in kaltem Wasser

gelöst, erzeugt die blaue Farbe nur bei Zutritt der Luft, nicht aber, wenn es in kochendheißem aufgelöst. Tragantgummi macht, weder kalt noch warm, blaue Guajakinctur, welche lange in schlecht verschlossnen Gefäßen gestanden, hat ihre blaumachende Eigenschaft verloren. Auch Milch färbt die Tinctur blau, verliert aber diese Eigenschaft durch Aufkochung, ohne sie beim Erkalten wieder zu bekommen, selbst nachdem sie durch Einpressen mit atmosphärischer Luft gesättigt worden ist. Das beim Aufkochen der Milch Abdestillirende färbt die Tinctur nicht. Wird Milch mit Alkohol gefällt, so bläuet nicht die Molke, sondern bloß der Niederschlag; aber diese Eigenschaft geht durch Auspressen des Alkohols verloren. Auch durch Zusammenkneten mit Seife wird Guajakpulver blau, aber durch Zusatz von gepulverten trocknen Wurzeln wird diese Wirkung verhindert.

Das Guajakharz gehört zu den wirksameren Heilmitteln, und wird daher viel in der Heilkunde angewendet. Es wird nicht selten durch Zusammenschmelzen mit Colophon verfälscht, was sich leicht bei der Auflösung in kaustischem Kali entdecken läßt, worin sich das reine Guajakharz klar, das colophonhaltige aber trübe auflöst, so lange nämlich die Flüssigkeit freies Kali enthält, worin das Colophonkali schwer löslich ist.

Gummilack wird von *Ficus indica* und *religiosa*, so wie von *Rhamnus Jujuba* erzeugt, indem ein Insect, *Coccus Ficus*, Stiche in die kleineren Zweige oder Aeste des Baumes macht, wonach das Harz als eine milchichte Flüssigkeit ausfließt. In dieser gehen die Geschlechtsverrichtungen des Insectes vor, und die rothgefärbten Weibchen bleiben darin eingeschlossen zurück, worauf die Masse allmählich erhärtet. Die mit Harz und der Coccusbrut verklebten, und alsdann abgeschnittenen Zweige bekommen den Namen Stocklack (vom englischen Stick-lac), *acca in ramulis* oder *baculis*. Diese Masse wird gröblich zerstoßen und die Holzstücke weggenommen, worauf die von dem Insecte herrührende rothe Farbe durch Kochen mit einer schwachen Auflösung von kohlenwasser-

Natron abgezogen wird, wodurch rothe Farben entstehen, die ich weiter unten beim Farbstoff der *Coccus*arten anführen werde. Die so ausgekochten Körner werden nun Körnerlack (englisch Seed-lac), *Lacca in granis*, genannt. Dieser wird dann geschmolzen, durch einen langen und schmalen leinenen Beutel geseiht, und das geschmolzene, durchfließende, zähe Harz auf Pisangblättern (*Musa paradisiaca*) aufgefangen; während es noch weich ist, wird es zwischen zwei Blättern in dünne Scheiben gepresst und bekommt nun den Namen Schelllack (engl. Shell-lac), *Lacca in tabulis*. In allen diesen Formen, am gewöhnlichsten aber in der letzteren, kommt es in Handel. Es besteht hauptsächlich aus einem Harz, gemengt aber mit fremden Substanzen; im Schelllack ist es am reinsten, enthält aber noch Farbstoff, eine gewisse Menge einer wachsartigen Substanz, und auch, wie man gefunden zu haben glaubt, Pflanzenleim. Hatchett hat die Menge der verschiedenen Bestandtheile in den verschiedenen Zuständen des Gummilacks zu bestimmen gesucht:

	Harz.	Farbstoff.	Wachs.	Pflanzenleim.	Schmutz.	Verlust.
Stocklack	68,0	10,0	6,0	5,5	6,5	4,0
Körnerlack	88,5	2,5	4,5	2,0	—	2,5
Schelllack	90,5	0,5	4,0	2,8	—	1,8.

John hat, wie es scheint noch näher, das Bestandtheils-Verhältniß des Körnerlacks untersucht. Er fand in 100 Theilen: Harz, wovon ein Theil in Aether unauflöslich, 66,65, eine von ihm Lackstoff genannte Substanz 16,7, Coccusfarbstoff 3,75, Extract 3,92, Stocklacksäure 0,62, durch Farbstoff geröthete Insectenhäute (Chitin) 2,08, wachsartiges Fett 1,67, Salze (stocklacksaures und schwefelsaures Kali, Kochsalz und Knochenerde) 1,04, eingemengter Sand und Erde 0,62, Verlust 3,96.

Von diesen Bestandtheilen ist das Harz der hauptsächlichst anwendbare. Man erhält es durch Auflösung des Gummilacks in kaltem Spiritus und Abfiltriren des zu-

bliebenen, graugelben, pulverigen Rückstandes. Aus Lösung ausgeschieden und geschmolzen, ist es braun, scheinend, hart, spröde und von 1,139 spec. Gewicht. Erhitzen schmilzt es und ist dickflüssig; riecht dabei schwach nach Harz. Von Alkohol wird es in allen Proportionen gelöst; aber in Alkohol von einem gewissen Wassertheile erweicht es und geht, ohne sich aufzulösen, zusammen. Nach John's Versuchen besteht es aus zwei Harzen, von denen das eine in Alkohol, Aether und flüchtigen fetten Oelen leicht auflöslich ist, während das andere sich in kaltem Alkohol schwer, und in Aether und flüchtigen Oelen gar nicht auflöst. Zu concentrirten Lösungen verhält es sich wie die Harze im Allgemeinen. In verdünnter Chlorwasseressigsäure und Essigsäure auf. Das Gummilackharz verbindet sich begierig mit Salzbasen. Wird Gummilack nach seiner Auflösung von kaustischem Kali digerirt, so löst es sich auf, und es verschwindet zuletzt der alkalische Rückstand nach der Auflösung gänzlich. Dieselbe ist nach dem Erkalten dunkelroth und trocknet zu einer durchsichtigen, gelben, rothbraunen und glänzenden Masse ein, die mit Wasser und Alkohol nicht auflöslich wird. Sie hat einen bitteren und balsamischen Geschmack, und ihre Auflösung wird nicht von überschüssigem Alkali gefällt. Wird Gummilack mit einer Auflösung von Pottasche gekocht, so schmilzt es darin, und das Harz zieht einen Theil seines Farbstoffs aus. Wird das Harz lange genug fortgesetzt, so verwandelt sich das harzige Harz in Gummilack-Kali, das sich aber im Geringsten in der concentrirten Lauge auflöst, welche nach dem Erkalten durch Uebersättigung mit Wasser größtentheils die Farbe verliert, ohne daß sich etwas absetzt. Das Harz dagegen, mit kaltem Wasser von gelber Mutterlauge befreit, löst sich leicht in kochendem Wasser auf, und bleibt, wenn es nicht allzusehr mit Kohlensäurem Kali verunreinigt ist, aufgelöst; im andern Fall geseht es beim Erkalten. Zu Natron verhält sich das Gummilack wie zum Kali. Wird Gummi-

lack in einem verschlossenen Gefäße mit wenigem concentrirten Ammoniak übergossen und 12 Stunden lang an einem warmen Ort gelassen, so quillt das Harz zu einem gelatinösen Klumpen auf, der sich nachher vollkommen in warmem Wasser auflöst, mit Hinterlassung von Wachs und Insectendecken, die man abfiltriren kann. Wird diese Auflösung abgedampft, so concentrirt sie sich immer mehr, ohne gefällt zu werden, und hinterläßt nach völligem Eintrocknen eine durchsichtige, harte Substanz, welche dem Gummilack ähnlich und in Wasser unauflöslich ist. Sie besteht aus Harz, verbunden mit einer geringeren, aber bestimmten Quantität Kali, und unterscheidet sich von dem ammoniakfreien Harz dadurch, daß sie durch längeres Benetzen mit Wasser wie Leim aufquillt, ohne sich aber aufzulösen. — Mischt man zu einer Auflösung von Salmiak Gummilack-Kali, so entsteht ein Niederschlag, der auf das Filtrum genommen und von den Salzen mit kaltem Wasser, worin er fast unauflöslich ist, ausgewaschen werden kann. Wird aber dieser Niederschlag nach gehörigem Auswaschen bei $+50^{\circ}$ bis 60° mit Wasser digerirt, so löst er sich vollständig auf und ist neutrales Gummilack-Ammoniak. Nach längerer Zeit gelatinirt die Auflösung. Die Auflösung des Gummilacks in Ammoniak kann als eine Art Lackfirniß für solche Gegenstände angewendet werden, die nur kurze Zeit, z. B. nicht länger als eine bis zwei Stunden, dem Wasser ausgesetzt werden. Sie läßt einen sehr glänzenden Ueberzug zurück, der sich schleifen und poliren läßt, und der durch Zusatz von Terpenthin-Ammoniak weniger Neigung hat, mit der Zeit Sprünge zu bekommen.

Die alkalischen Auflösungen des Gummilacks haben alle eine viel dunklere Farbe, als die Auflösung in Alkohol. Die Ursache hiervon ist die Reaction des Alkali's auf den Farbstoff. Diese Farbe kann aber zerstört werden, wenn man in eine alkalische, mit Gummilack gesättigte Auflösung Chlorgas leitet, wodurch die Farbe des Harzes, in dem Augenblick, wo es sich von der Base trennt, zerstört wird. Der Niederschlag, wenn er so

in der Flüssigkeit gelassen wird, bis diese einen Überschuss von Chlor enthält, ist ganz weiß, und bleibt auch nach dem Auswaschen und Trocknen (*). Von Alkohol wird es mit schwach hellgelber Farbe aufgelöst, Zurücklassung einer unten zu erwähnenden Substanz. Die Auflösung in Alkohol giebt einen vortrefflichen Firnis, wenn sie, wie ich bei den Firnissen anzuwenden werde, mit Terpentin und Mastix versetzt wird. Gummilack aus seinen alkalischen Auflösungen durch Säure gefällt, so entsteht ein flockiger, graubrauner Niederschlag, der beim Trocknen, selbst bei gewöhnlicher Temperatur, zu einer zusammenhängenden Masse glasigem Bruch zusammenbackt, die aber lange weich biegsam bleibt, und eine Verbindung von Gummiharz mit Wasser ist. Beim Schmelzen geht Wasser durch Aufblähen weg. Dieser Niederschlag löst sich ohne Rückstand in Alkohol auf.

Das Gummilack löst sich, mit Hilfe von Wärme, leicht in einer Auflösung von Borax auf.

Den von John so genannten Lackstoff erhält man, wenn Gummilack in kaltem Spiritus aufgelöst, und der Rückstand zuerst mit Wasser und nachher mit warmem Alkohol, welcher das Wachs auflöst, behandelt wird, auf man das Unaufgelöste von den Inzertien abtämmt. Er bildet eine gelbliche, durchscheinende Masse, in der Wärme, ohne zu schmelzen, erhärtet und in stehendem Wasser erweicht. Getrocknet, wird er hart, und scharf. Er löst sich nicht in Aether auf, weicht, so wie Alkohol, denselben nur zu einer fettartigen, artartigen Substanz aufweicht. Versucht man, ihn zu schmelzen, so zersetzt er sich, raucht und vertheilt den unangenehmen, nicht unangenehmen Geruch des Gummilackes. Er ist schwerer als Wasser, und giebt bei der Section, nach John, kein Ammoniak. Mit Salpeter

Ein durch Säure gefälltes Gummilack wird nicht angetrieben von Chlor gebleicht. Das Bleichen muß, wenn es gelingt, gerade in dem Augenblicke, als sich die Farbe anfangt zu sehen.

säure giebt er Oxalsäure und keine bittere Substanz. Im Kochen wird er von kaustischem Alkali mit hellgelber Farbe aufgelöst und daraus durch Säuren niedergeschlagen. Der Niederschlag hat alle Charaktere des Gummilackharzes und ist in Spiritus auflöslich. Aus diesem Grunde erhält man diese Substanz nicht beim Auflösen von Gummilack in Alkali; denn das aus dieser Auflösung durch Säuren gefällte Harz löst sich vollständig und ohne Rückstand in Alkohol auf. Wird dagegen die Auflösung in Alkali durch in die Flüssigkeit geleitetes Chlorgas gefällt und das gebleichte Harz dann mit Alkohol behandelt, so läßt der Alkohol eine große Menge dieser Substanz in ganz reinem und farblosem Zustand in Gestalt von gelatinösen Klumpen zurück, die jedoch beim Trocknen braun werden, und durch Behandlung mit Alkali wieder die Eigenschaften des Gummilackharzes annehmen.

Das sogenannte Wachs erhält man am besten beim Auflösen von Gummilack in Alkali, wobei es in Gestalt einer weissen, pulverigen, nach dem Trocknen erdig erscheinenden Substanz zurückbleibt. Es wird von kochendem Alkohol aufgelöst, und diese Auflösung gesteht beim Erkalten zu einer halbdurchsichtigen Gallert. Es verbindet sich nicht mit Alkali, wovon selbst die concentrirte und kochende Auflösung nur sehr wenig aufnimmt, das Säuren wieder unverändert niederschlagen. Es schmilzt zu einem klaren gelben Liquidum, welches beim Erstarren undurchsichtig wird. Im luftleeren Raum destillirt es unverändert über; bei Zutritt der Luft zersetzt es sich etwas, indem sich zugleich ein in Alkohol unauflösliches brenzliches Oel bildet. Auf Papier geschmolzen, macht es einen Fettleck. Seine Eigenschaft, sich nicht mit Alkali zu verbinden, unterscheidet es vom Wachs.

Die Anwendung des Gummilacks, auch abgesehen von der des darin enthaltenen Farbstoffs, ist sehr groß. Es macht die Basis des Siegellacks aus, wozu es sich deshalb vorzugsweise vor anderen Harzen eignet, weil es hart ist ohne zugleich spröde zu sein. Das beste rothe Siegellack wird bereitet, indem man 48 Th. Schellack

Bei einer sehr gelinden Hitze mit 19 Th. venetianischem Terpenthin und 1 Th. Perubalsam zusammenschmilzt, und hierzu 32 Th. geschlammten Zinnober einrührt, wozu man gewöhnlich eine hochrothe, besondere schöne, und deshalb Lackzinnober genannte Sorte anwendet. Die bis zu einem gewissen Grad erkaltete Masse wird entweder zu runden Tangen gerollt oder in Formen von Messing gepreßt. Zu den schlechteren Siegellacksorten wird ein großer Theil des Schelllacks durch Colophon und der Zinnober durch in Gemenge von Mennige und Kreide ersetzt. Das beste schwarze Siegellack wird aus 60 Th. Schelllack, 10 Th. Terpenthin und 30 Th. geschlammten Beinschwarz gemacht, wozu man, des Geruches wegen, etwas Storax und Ambra setzt. Gelbes Siegellack erhält man aus 60 Th. Schelllack, 2 Th. venetianischem Terpenthin, 24 Th. Chromgelb, oder, in Ermangelung desselben, Casseler Gelb und 1 Th. Zinnober. Blaues wird durch Einmischung von Bergblau oder Kobaltblau, und grünes durch Einschmelzen von Berggrün oder durch die Verbindung des Lackharzes mit Kupferoxyd gemacht. Das älteste bekannte, aus wirklichem Siegellack bestehende Siegel stammt, nach Scholtz, von 1553 her, und die erste gedruckte Nachricht darüber: von Garcia ab Orto, vom Jahre 1563 *).

Das Gummilack ist sowohl für sich, als nach dem Erweichen und Vermischen mit etwas gebeuteltem Ziegelmehl, und zu Stangen geformt, ein gutes Mittel um Stein, Porzellan, Fayence u. dergl. zusammenzukitten. Die zu kittenden Stücke werden gelinde erwärmt, so daß das Lack, wenn es darauf gestrichen wird, schmilzt, worauf sie zusammengefügt und so bis nach dem Erkalten zusammengehalten werden. Es hält vortrefflich, so lange das Gekittete nicht erwärmt wird. Das Gummilack ist ein Hauptbestandtheil der meisten Lackfirnisse, weshalb man auch

*) Das Siegelwachs in den Blechdosen der Pergamentbriefe besteht aus 15 Th. venetianischem Terpenthin und 5 Th. Baumöl, zusammengeschmolzen mit 80 Th. Wachs, und mit geschlammter Mennige gefärbt.

einen Ueberzug mit einem solchen Firniß Lackirung nennt. Ich werde weiter unten einige Vorschriften zu solchen Firnissen mittheilen. Auch in der Medicin ist das Gummilack angewendet worden.

Jalappenharz wird durch Ausziehen der Jalappenwurzel (*Convolvulus Jalappa*) mit Alkohol, Vermischen der Tinctur mit Wasser und Abdestilliren des Alkohols erhalten. Es ist auswendig grüngelb und matt, im Bruche gelbbraun und wenig glänzend, undurchsichtig, spröde, schmeckt scharf und bitter, zumal hinten im Schlund, und riecht beim Reiben oder Erwärmen wie Jalappenwurzel. In Alkohol ist es leicht auflöslich. Wird diese Auflösung mit Blutlaugenkoble digerirt und filtrirt, so verliert sie, nach Martius, den größten Theil ihrer Farbe, bleibt nur gelblich und giebt, wenn das Aufgelöste abgeschieden wird, ein Harz, welches nach dem Schmelzen gelb ist. Aether löst 0,3 davon auf, und dieses bleibt nach dem Abdampfen des Aethers als ein dunkelbraunes, schwierig ganz zu trocknendes Harz zurück, welches von kaustischem Natron aufgelöst und daraus nicht durch Schwefelsäure gefällt wird. Der in Aether unauflösliche Theil wird, nach dem Auflösen in Natron, von Schwefelsäure mit gelber Farbe gefällt. Es besteht also aus zwei mit einander vermischten Harzen. Es ist gänzlich, sowohl in Essignaphtha als auch in Essigsäure, auflöslich. In fetten und flüchtigen Oelen ist es unauflöslich. In seinen Verbindungen mit Basen hat es eine sehr geringe Sättigungscapacität, 1,01, nach Unverdorben's Versuchen.

Das Jalappenharz wird wegen seiner purgirenden Kraft in der Medicin angewendet. Es wird bisweilen mit Colophon verfälscht.

Ladanum überzieht als ein schmieriges, wohlriechendes Harz eine auf Candia und in Syrien wachsende Pflanze, *Cistus creticus*. Es ist dunkelbraun, weich, erhärtet aber allmählich, hat 1,186 spec. Gewicht, einen angenehmen Geruch und bitteren Geschmack. Eine schlechtere Sorte kommt in gedrehten Kuchen zu uns, ist mit eisenhaltigem Sand gemengt, ohne Geruch, und taugt nichts.

adanum wird zu Pflastern, Salben und zu Räucher-
gebraucht.

Mastix wird durch Einschnitte in den Stamm und
ste von *Pistacia Lentiscus*, auf den Inseln im Archi-
s, besonders auf Chios, gewonnen. Es kommt in
n, gelblichen, halb durchscheinenden Körnern zu
erweicht zwischen den Zähnen, schmeckt schwach
tisch und etwas bitter, und hat einen schwachen,
angenehmen Geruch; auf glühenden Kohlen riecht
ker. Sein spec. Gewicht ist 1,074. Das Mastix be-
aus zwei Harzen, von denen das eine in wasserhal-
Alkohol auflöslich, das andere darin unauflöslich
Letzteres beträgt zwischen $\frac{1}{2}$ und $\frac{1}{12}$. Das in Alko-
aufgelöste Harz wird von Chlor in Gestalt einer zä-
elastischen Masse gefällt, das sich wie der unauflös-
Theil verhält. Letzterer, der bei der Auflösung in
is zurückbleibt, ist dann weiß, weich und zähe, so
r sich in lange Fäden ziehen läßt, wird aber durch
nen und Schmelzen durchsichtig und gelblich, wie
t, und läßt sich dann pulvern. Es verhält sich im
neinen wie das Copalharz. Es wird von wasserfreiem
ol, Aether und Terpenthinöl aufgelöst, in welchen
das gemengte Harz auflöslich ist. Wird der in was-
tigem Alkohol unauflösliche Theil gepulvert und lange
ner warmen Stelle gelassen, so wird er zuletzt im
is auflöslich. Einige Chemiker glaubten diesem Theil
Mastix einen besonderen Namen geben zu müssen,
aben ihn Masticin genannt, was indessen auch
is auflöslichere Harz nothwendig einen besonderen
n voraussetzt. Das gemengte Harz verhält sich zu
felsäure, Salpetersäure und Alkali, wie Colophon, und
Sättigungscapacität ist, nach Unverdorben, 2,8.
as Mastix macht einen Bestandtheil von Pflastern,
, Räucherpulver und Firnissen aus. Von Vielen,
von den Frauen in der Türkei, wird es gekaut,
s Zahnfleisch zu stärken und dem Athem einen an-
neren Geruch zu ertheilen.

andarach oder Wachholderharz, schwitzt von selbst,

besonders in den warmen Ländern, aus dem Wachholderstrauch, *Juniperus communis*, und findet sich nicht selten in den Ameisenhaufen. Nach Broussonet soll indessen das meiste Sandarach von *Thuja articulata* kommen. Es kommt in kleinen, blafsgelben, durchscheinenden, glänzenden, harten und spröden Körnern vor, die nicht, wie Mastix, zwischen den Zähnen erweichen, bitter balsamisch schmecken und einen schwachen Terpentin-geruch haben. Auf glühenden Kohlen verbreitet es einen angenehmen Geruch. Sein spec. Gewicht ist 1,05 bis 1,09. Es schmilzt leicht und ist in Alkohol vollständig auflöslich. Zu Schwefelsäure, Salpetersäure und Alkali verhält es sich wie Harz im Allgemeinen. Seine Sättigungscapazität fand Unverdorben zu 0,92, und ist also eine der geringsten.

Bei manchem Sandarach fand Giese, daß kalter Alkohol ein anderes Harz unauflöst lasse, welches in Aether auflöslich und daraus durch Alkohol fällbar ist, und nach dem Abdampfen des Aethers in Gestalt eines kreideähnlichen Flecks zurückbleibt. So wie es nach der Auflösung des Sandarachs und Schmelzen des Rückstandes zurückbleibt, ist es weißgrau, spröde, leicht zu pulvern, und verhält sich zu Säuren und Alkalien wie Harz im Allgemeinen; er nannte es Sandaracin. Gewöhnlich ist es nicht vorhanden.

Das Sandarach wird zu Pflastern, Salben, Räucherpulver und Firnissen gebraucht.

Storax, durch Einschnitte von *Styrax officinalis* in Syrien und Arabien. Der im Handel vorkommende ist in Ochsenblasen enthalten und bildet ungleich große Stücke, mit braunen und weißen Flecken im Bruch, von angenehmem Vanillegeruch und aromatischem Geschmack. In der Wärme erweicht er leicht. Er enthält ein flüchtiges Oel, das sich nicht mit Wasser abdestilliren läßt. Er wird als Riechmittel zu verschiedenen theils pharmatischen, theils anderen Präparaten gebraucht; man be-
 thn rein. Statt desselben kommt ein Ge-
 benzoë, Perubalsam und Sägespähen,

unter dem Namen *Styrax Calamita* vor, welches nur zu Läuherkerzen und Rauchpulver tauglich ist.

Takamahak, wovon es zwei Arten giebt. Die eine kommt von Bourbon und Madagascar, und wird von *Calophyllum Inophyllum* gewonnen. Es ist in Kürbisdern Muschelschaalen verwahrt und mit Binsen bedeckt. Es ist gelb, durchscheinend, klebrig, zwischen Grün und Roth spielend, von angenehmem, lavendelartigem Geruch und bitterem gewürzhaften Geschmack. Es kommt selten im Handel vor. Das andere kommt aus Westindien, und wird, nach Einigen von *Fagara octandra*, nach Anderen von *Populus balsamifera* gewonnen. Es ist hellbraun, undurchsichtig, spröde und leicht schmelzbar. Sein spec. Gewicht ist 1,046. Es riecht angenehm und schmeckt gewürzhaft. Von Alkohol wird es unvollständig aufgelöst, vollkommen aber von Äther und fetten Oelen. Das ostindische wird von Alkohol ohne Rückstand aufgelöst. Zu den Säuren verhält es sich wie die Harze im Allgemeinen, giebt aber nicht mit Salpetersäure die Art von Gerbstoff, welche die Leimauflösung fällt, sondern nur die, welche Metallaufösungen niederschlägt. Wird von Alkalien leicht aufgelöst. In der Medicin ist es zu Pflastern angewendet worden.

Harzfirnisse.

Ein großer Theil dieser Harze wird zu Firnissen angewendet, und man löst sie zu diesem Endzweck entweder in Alkohol, oder in Terpenthinöl, oder in Terpenthinöl und zugleich einem trocknenden fetten Oel auf. Die Anwendung dieser Firnisse beruht auf dem Umstande, daß nach Verdunstung des Auflösungsmittels ein Häutchen von Harz zurückbleibt, welches die damit überzogene Fläche glänzend macht, und sie vor Feuchtigkeit und Nasenverden schützt.

Weingeistfirnisse gerathen immer am besten, wenn sie mit wasserfreiem Alkohol gemacht werden; sie trocknen schneller und widerstehen vollkommen selbst der

Einwirkung von schwachem Spiritus. Man bereitet sie sonst gewöhnlich mit Spiritus von 0,833 spec. Gewicht. Wenn Alkohol Harze auflöst, so werden sie gewöhnlich zuerst weich und kleben zusammen, wodurch die Einwirkung des Auflösungsmittels viel langsamer von statten geht. Man verhindert dies auf die Weise, daß das gröblich zerstoßene Harz mit ungefähr $\frac{1}{4}$ seines Gewichts grobem Glaspulver genau gemengt wird, welches sowohl das Zusammenbacken des Harzes als auch sein Ankleben an den Boden des Gefäßes verhindert. — Ferner kann es der Fall sein, daß das zurückbleibende Harzhäutchen nach dem Trocknen Risse bekommt oder gepulvert wird, da wo es ein Stofs trifft. Diesem beugt man durch einen Zusatz von venetianischem Terpenthin vor, welcher dem Harzüberzug eine gewisse Weichheit ertheilt, die sich freilich mit der Zeit verliert, so daß der Terpenthin im Allgemeinen nichts weiter thut, als daß er die Zeit des Eintrocknens, von wo an der Firniß Sprünge bekommen würde, verzögert. Man thut deshalb besser, statt seiner verdicktes Leinöl in Alkohol aufzulösen, und diese Auflösung in einer richtigen Quantität statt des Terpenthins oder zugleich mit diesem anzuwenden. Aber es ist nothwendig, davon nicht so viel zuzusetzen, daß der Harzüberzug nach der Verdunstung des Alkohols klebrig bleibe.

Zu farblosem Firniß nimmt man 6 Th. Sandarach, 3 Th. Mastix, 1 Th. Elemi, $\frac{1}{2}$ venetianischen Terpenthin, 4 Th. Glaspulver und 32 Th. Alkohol. Nach geschehener Auflösung wird der Firniß durch Papier geseiht. Eine andere Vorschrift ist: 12 Th. Sandarach, 4 Th. Elemi, 2 Th. Anime, 1 Th. Campher und 64 Th. Alkohol. Dieser ist hart, nicht biegsam und nur auf harten Gegenständen, wie Dosen, Futteralen u. dergl., anwendbar.

Die farblosesten Firnisse erhält man von Copal, der in Aether aufgequollen und in heißem Alkohol aufgelöst ~~z.~~ ~~welchen~~ letzteren man auf die beim Copal erwähnte ~~kleinen~~ ~~Antheilen~~ zusetzt. Der zurückbleibende ~~keine~~ bemerkbare Farbe. Einen ande-
blichen Firniß erhält man durch Auf-

Lösen von geschmolzenem Copal und etwas Terpenthin in wasserfreiem Alkohol.

Einen Stich in's Braune abgerechnet, ist der beste Firniß der gewöhnliche Gummilack-Firniß, aus 6—8 Th. Schellack, 3—4 Th. Sandarach, 1 Th. venetianischem Terpenthin, 4 Th. Glaspulver und 60 Th. Alkohol. Andere nehmen 8 Th. Schellack, 8 Th. Sandarach und 4 Th. Mastix auf 80 Th. Alkohol. Der letztere eignet sich gut zu Messingarbeiten. Wird das Gummilack vorher durch Chlor gebleicht, so wie ich es bei diesem Harze anführte, so wird auch dieser Firniß fast farblos.

Terpenthinfirnißs, farblosen, erhält man aus 24 Th. Mastix, 3 Th. venetianischem Terpenthin, 1 Th. Campher, 10 Th. zerstoßenem Glas und 72 Th. rectificirtem Terpenthinöl. Wird auf Oelmalereien, Karten, Zeichnungen und Kupferstichen angewendet, nachdem das Papier vorher mit einer Auflösung von Hausenblase überzogen worden ist, um das Durchschlagen des Firnisses zu verhindern.

Ich habe schon beim Copal die Bereitung von Terpenthinfirnißs mit geschmolzenem Copal anggeführt.

Dunklere Terpenthinfirnisse erhält man durch gemeinschaftliches Auflösen von Gummilack und Colophon in dem 3 bis 4fachen Gewichte Terpenthinöl.

Diese Weingeist- und Terpenthin-Firnisse kann man dann färben: gelb, mit Curcuma, Orlean, Saffran, Gummigutt; roth, mit Drachenblut, Cochenille, Sandelholz, Safflor, Alkannawurzel; grün, mit essigsauerm Kupferoxyd, und Terpenthinfirnisse mit dem Niederschlag, der durch Zersetzung der Verbindung des Harzes mit Kali durch ein Kupferoxydsalz entsteht, welchen man abscheidet, trocknet und im Firniß auflöst. Im Uebrigen kann man alle undurchsichtige Farben durch Einmischung einer geriebenen Farbe, wie Zinnober, Indigo, Berlinerblau, Chromgelb, bereiten, die aber hierzu geschlämmt sein müssen. Der sogenannte Goldfirniß wird aus 8 Th. Körnerlack, 8 Th. Sandarach, 4 Th. venetianischem Terpenthin, 1 Th. Drachenblut, $\frac{1}{4}$ Curcuma, $\frac{1}{4}$ Gummigutt

64 Th. Terpenthinöl bereitet. Mit Alkohol wird er aus 4 Th. Körnerlack, 4 Th. Sandarach, 4 Th. Mastix, 4 Th. Elemi, 1 Th. Drachenblut und 192 Th. Spiritus von 0,85 gemacht. Dieser letztere Firnis ist roth und muß daher mit Gelb versetzt werden, was man so bewirkt, daß man einen gleichen Firnis, aber statt mit Drachenblut, mit eben so viel Gummigutt bereitet, und will man einem Gegenstand einen goldähnlichen Ueberzug geben, so versucht man, welches Verhältniß beim Vermischen der beiden Firnisse sich am besten hierzu eignet. — Man kann Messing vortrefflich dem matten Golde ähnlich machen, wenn man seine Oberfläche einige Secunden lang durch ein Gemische von 6 Th. salzsäurefreier Salpetersäure und 1 Th. Schwefelsäure corrodiren läßt, unmittelbar darauf in einer warmen gesättigten Auflösung von Weinstein wäscht, und darauf bis zur völligen Trockenheit mit trockenen Sägespännen abreibt; dann streicht man den Firnis mit einem Pinsel auf und trocknet das Messing in der Wärme. Alle messingene Instrumente zu physikalischem oder mathematischem Behuf müssen gefirnist werden, wenn das Metall vor Einwirkung der Luft geschützt bleiben soll.

Das Lackiren hat, außer seiner schützenden Eigenschaft gegen die Einwirkung des Wassers, auch zum Zweck, eine glatte und glänzende Oberfläche zu machen. Bei Metall hat man dies schon durch die durchscheinende Politur des Metalles; aber auf Holz oder bei einer undurchsichtigen Lackirung muß die vom Firnis gebildete Oberfläche polirt werden. Man streicht dann den Firnis so viel Mal über, daß der Ueberzug eine bemerkliche Dicke bekommt, streicht aber nicht eher von Neuem auf, als bis jedesmal der vorige Ueberzug gut getrocknet ist. Dann schleift man ihn, nach mehrtägigem Trocknen, mit Oel und Trippel ab, so, daß die Oberfläche vollkommen eben wird, worauf man durch Reiben mit Puder polirt, bis daß er vollen Glanz erlangt hat. Mahagoni-Tische und ähnliche Gegenstände von Holz werden lackirt, nachdem die Oberfläche des Holzes mit Bimstein abgeschliffen und dann mit Trippel und Leinöl polirt worden ist, auf die

Art, daß man ein Stück nach dem andern vom Holze mit einem Gemenge von ganz wenig Leinöl mit Gummi-lack-Firnifs reibt, bis es vollkommen glänzend geworden ist. Bei diesem Reiben trocknet der Firnifs ein und wird polirt. Der Ueberzug wird dünn, kostet aber nicht viel Firnifs und läßt sich leicht wieder ausbessern, wenn er abgenutzt ist.

Extracte und extractförmige Stoffe.

Wird eine getrocknete Pflanze mit warmem Wasser übergossen und damit digerirt, so lösen sich ihre auflöslischen Stoffe auf, und wird diese Auflösung nachher abgedampft, so bleibt eine braune, gewöhnlich dicke und weiche Masse zurück, die man Extract nennt. Dieses Extract enthält in den meisten Fällen Zucker, Gummi, verschiedene Salze, wie von Kali, Kalkerde mit Essigsäure, Aepfelsäure und bisweilen auch anderen Pflanzensäuren, gemengt außerdem mit irgend einer der Pflanze eigenthümlichen Substanz, welche dem Extract gewisse Eigenschaften ertheilt, derentwegen es gerade bereitet wird. Man ist lange ungewiß gewesen, ob nicht in den Pflanzen ein für alle gemeinschaftlicher Stoff enthalten sei, der sowohl in Wasser als in Spiritus auflöslich wäre, und die Eigenschaft hätte, beim Abdampfen des Auflösungsmittels sich zu verdicken und zuletzt die zähe Masse zu bilden, welche wir Extract nennen. Scheele nannte ihn *Materia saponacea*, welchem auch Hermbstädt folgte, bis Vauquelin ihn Extractivstoff nannte, und, als dessen charakterisirende Eigenschaften, einige Verhältnisse bestimmte, die sich bei Pflanzenextracten zeigen, wenn sie hinsichtlich ihrer chemischen Natur auch noch so ungleichartig sind. Sie werden nämlich in Berührung mit der Luft allmählich verändert. Wenn auch die aufgelösten extractiven Stoffe von Anfang an farblos sind, wie z. B. in den ausgepressten Pflanzensäften, so werden sie beim Abdampfen zuerst gelb, dann gelbbraun und zuletzt ganz dunkelbraun. Während dessen wird Sauerstoff aus der

Luft absorbirt und gleichviel Kohlensäuregas aus der Auflösung entwickelt, nach de Saussure's Versuchen. Bei fortgesetztem Abdampfen bekommt die Flüssigkeit eine braune Haut, sie wird durch ein braunes Pulver trübe, und zuletzt, wenn sie die Consistenz von Extract erlangt hat, wird dieses klar, durchscheinend, braun, trübt sich aber beim Wiederauflösen in Wasser und setzt eine große Menge der braunen pulverförmigen Substanz ab. Wird das Extract verdünnt, so lange als noch ein Niederschlag entsteht, filtrirt und wiederum abgedampft, so zeigen sich dieselben Erscheinungen von Neuem, und dies dauert so lange, als noch etwas von den extractiven Stoffen übrig ist, worauf zuletzt Zucker und Gummi, wenn sie vorhanden sind, nebst Salzen in der Auflösung zurückbleiben. Chlor erzeugt augenblicklich eine Menge von jenem Niederschlag. Die gefällte und abfiltrirte Substanz hat man oxydirten Extractivstoff genannt; aber dieser Name bezeichnet eine unrichtige Vorstellung; denn bei der Bildung dieser Substanz verbindet sich kein Sauerstoff damit, ein Antheil ihres Kohlenstoffs verbindet sich mit dem Sauerstoff der Luft, und es bildet sich, nach de Saussure, aus dem Wassertoff und Sauerstoff des Extracts eine Portion Wasser, so daß die bei diesem Prozeß entstehende braune Substanz an Kohlenstoff reicher wird, als sie zuvor war. Wir wollen sie daher den Absatz der Extracte (*Apothema*) nennen. Er ist in Wasser nicht unauflöslich, welches sich damit gelb, rothgelb oder roth färbt und ihn beim Abdampfen unverändert absetzt; er ist indessen in Wasser sehr schwer auflöslich und schon eine sehr geringe Menge davon färbt dasselbe. Von kochendheißem Wasser wird er in etwas größerer Menge aufgelöst, und diese Auflösung trübt sich beim Erkalten. In Alkohol löst er sich weit mehr als in Wasser auf, und leichter in kochendheißem, als in kaltem. Sein bestes Auflösungsmittel ist kaustisches Alkali, welches denselben in großer Menge aufnimmt, und damit gesättigt und concentrirt, eine dunkelbraune Auflösung bildet. Auch von Alkalien wird er aufgelöst, und aus diesen

auflösungen wird er durch Säuren gefällt. Er verbindet sich dabei mit der zum Fällen angewandten Säure, durch deren Gegenwart der Niederschlag die Eigenschaft bekommt, feuchtes Lackmuspapier zu röthen. Diese Eigenschaft desselben, sich begierig mit elektronegativen Körpern zu verbinden und damit niederzuschlagen, erklärt theilweise die specifischen Ungleichheiten, welche diese Substanz, wenn sie aus verschiedenen Extracten niedergeblagen ist, zeigt, indem sie sich beim Niederfallen mit einem Antheil der noch unzersetzten, oder einer dem Extracte eigenen freien Säure verbindet. So z. B. werden Eisensalze vom Absatz des Galläpfelextracts geschwärzt, werden aber grün von dem des Chinaextractes, des Tannrinden-Extracts und des Extracts von ungebranntem Kaffee, was die Gegenwart eines Antheiles unzersetzter Substanz in chemischer Verbindung mit der durch Einwirkung der Luft gebildeten anzuzeigen scheint. Aus einigen Extracten wird der Absatz wenig gefärbt, aus anderen dunkelgelb, gelbbraun, roth oder dunkelbraun.

Die Absatz-Substanz gleicht in ihrem chemischen Verhalten sehr derjenigen, welche in der Dammerde, als letztes Glied der organischen Materien, zurückbleibt, welche wir Dammerdeextract nennen, und die von Einigen, durch eine unrichtige Vergleichung, Ulmin genannt worden ist.

Man bereitet die Extracte entweder aus trockenen oder aus frischen Pflanzen. Aus den trockenen erhält man sie entweder durch Infusion oder durch Auskochen. a) Infusion nennt man, wenn ein Pflanzentheil oder eine ganze zerschnittene Pflanze mit kochendheißem Wasser übergossen und an einer warmen Stelle, unter öfterem Umschütteln, stehen gelassen wird, wobei das warme Wasser das trockene Pflanzenskelett aufweicht und Alles auflöst, was es von auflöselichen Substanzen enthält. Die Flüssigkeit wird abgeseiht und das Unaufgelöste ausgepresst, worauf es von Neuem mit warmem Wasser übergossen wird, um alles noch übrige im ausgepressten Skelett Zurückgebliebene auszuziehen. Trockene pulverförmige Substanzen, die sich nicht unter der Presse

deln lassen, muß man auf die Art ausziehen, daß man sie in ein den Zuckerhutformen ähnliches Gefäß, oder in einen Trichter mit unvollkommen verschlossener Oeffnung legt, und, nachdem die erste Infusion abgelaufen ist, die untere Oeffnung verschließt und frisches Wasser aufgießt, welches man nach 6 bis 8 Stunden wieder ablaufen läßt, womit man so lange fortfährt, als noch etwas aufgelöst wird. Diese verschiedenen Infusionen werden natürlich immer schwächer und schwächer. Man dampft sie, am besten jede einzeln, in flachen Schaaalen bei einer Wärme ab, wodurch sie nicht in's Kochen kommen, bis sie dieselbe Concentration, wie die erste, erlangt haben, worauf man sie zur gemeinschaftlichen Abdampfung mit einander vermischt. *b*) Die durch Auskochen der Pflanzen mit Wasser erhaltene Auflösung pflegt man *Dococt* zu nennen. Sie ist gewöhnlich gesättigter, als eine Infusion mit der gleichen Menge Wassers wird, und enthält sehr oft Substanzen, die beim Erkalten ihre Auflöslichkeit verlieren, und daher das *Dococt* trüben. Viele Pflanzen erfordern ein lange anhaltendes Auskochen, wenn sie alles in Wasser Auflösliche abgeben sollen. Sie müssen gewöhnlich mehrere Male mit erneuertem Wasser ausgekocht werden, ehe alles ausgezogen wird. Im Uebrigen behandelt man beim Abdampfen die *Decocte* eben so wie die Infusionen. Das zur Bereitung von Infusionen und *Decocten* dienende Wasser muß Regenwasser oder destillirtes Wasser und darf nicht Brunnenwasser sein, dessen Gehalt an kohlen-sauren Erdsalzen oft wirksame Stoffe ausfällt und im *Extract* immer nicht unbedeutende Quantitäten der im Wasser vorhandenen anderen Salze zurückläßt. — Von frischen Pflanzen erhält man das *Extract* durch Auspressung des Saftes und Abdampfung. Die Pflanze wird in einem Mörser zu einer breiartigen Masse zerstoßen, und, wenn es nöthig ist, dabei mit etwas Wasser vermischt, worauf man das Ganze in einen leinenen *ck* bringt und auspresst. Der durchlaufende Saft ist
 l nicht selten grünlich, theils von grünem Farbs
 s von, während des Zerstoßens, fein zer-

heiltem Skelett. Gewöhnlich wird er von dieser Trübung nicht abgeseiht, sondern durch Erhitzen bis zu $+70^{\circ}$ geklärt, indem das darin enthaltene Pflanzeneiweiß genant, das Farbwachs und Theile vom Skelett umschliesst, und sich abseihen lässt, worauf die Flüssigkeit klar und farblos wird. Die abgesetzte grüne Masse pflegt man grünes Satzmehl oder *Faecula* zu nennen. Bisweilen fallen damit wirksame Theile aus dem Saft nieder, weshalb man sie, nach Abdampfung des Saftes bis zu dünnem Extract, demselben wieder beizumischen pflegt.

Bei Abdampfung dieser Infusionen, Decocte oder ausgepressten Säfte, erleiden die darin aufgelösten extractiven Stoffe bedeutende Veränderungen. Die sich über ihrer Oberfläche beständig umwechselnde Luft bewirkt darin einen bedeutenden Absatz, und die Größe dieser Veränderung vermehrt sich mit der Temperatur, so daß, wenn man durch stärkere Hitze die Zeit des Aussetzens der Luft zu vermindern sucht, die Veränderung größer wird, als wenn man zum Abdampfen längere Zeit, aber eine geringere Hitze nimmt. Oft ist es der Fall, daß durch Unachtsamkeit bei der Bereitung ein solches Extract keine mehr von den Eigenschaften der Pflanze zurückbehalten hat, die man in dem Extract zu concentriren suchte. Gewöhnlich pflegt man bei der pharmaceutischen Bereitung dieser Extracte alle mit einander vermischten Auflösungen, zuerst die schwachen und nachher die zugemischtesten oder stärksten, kochend abzdampfen, und das Kochen fortzusetzen, bis daß der Rückstand Consistenz zu bekommen anfängt, worauf man das letzte auf die Art abdampft, daß man die Masse in ein kleineres Gefäß ausgießt, und dieses in eine Pfanne mit kochendem Wasser stellt. Oft wird dies versäumt und das Abdampfen über freiem Feuer oder auf dem Sandbad fortgesetzt, wann das Extract gewöhnlich auch angebrannt wird.

Wenn die Extracte die Wirksamkeit der Pflanze behalten sollen, so wird erfordert: 1) daß man die Infusion oder das Decoct so concentrirt als möglich macht, und lieber einen Theil von wirksamer Substanz der Pflanze

verloren gehen läßt, als daß man durch Verdünnung mit dem Waschwasser und dadurch verlängertes Abdampfen das zerstört, was im Extract enthalten sein soll. 2) Daß das Abdampfen in sehr flachen Porzellanschaalen bei einer, nicht $+40^{\circ}$ übersteigenden, oder besser noch bei einer niedrigern Temperatur geschehe. Man erhält dann das Extract gewöhnlich in Gestalt einer gelben, durchsichtigen Masse, welche man, während sie noch warm und weich ist, herausnimmt, worauf man eine neue Menge der Auflösung abdampft. So wie die Extracte durch die weniger achtsame Bereitung, womit man sie in den Apotheken macht, gewöhnlich erhalten werden, bekommen sie nicht selten eine fast schwarze Farbe, sind selbst in dünnen Fäden undurchsichtig, und riechen und schmecken oft angebrannt.

In neuerer Zeit hat man die Bereitung der Extracte viel sicherer und zuverlässiger durch Abdampfung im luftleeren Raum, wobei die Einwirkung der Luft vermieden und eine höhere Temperatur nicht gebraucht wird, zu bewerkstelligen angefangen, und zwar auf folgende Weise: Man hat eine große kupferne Kugel, z. B. von 16 bis 20 Quart Inhalt, die luftleer gemacht werden kann, entweder mittelst einer Luftpumpe, was das beste und einfachste ist, oder dadurch, daß man Wasser darin kocht, und, nachdem die Wasserdämpfe $\frac{1}{4}$ Stunde lang mit Heftigkeit durch eine oben angebrachte Schraubenöffnung ausgeströmt sind, diese verschließt und die Kugel abkühlt. Mit dieser Kugel communiciren eine oder mehrere Abdampfschaalen dadurch, daß andere sphäroïdische Gefäße durch geneigte, mit Ventilen verschließbare Röhren sich in der kupfernen Kugel öffnen. Diese sphäroïdischen Gefäße bestehen aus zwei Hälften, die luftdicht zusammengeschraubt werden können. In die unterste wird nun eine hineinpassende Schale von Zinn oder Porzellan mit der abzdampfenden Flüssigkeit gesetzt, worauf man die obere Hälfte anschraubt. Es gewährt Vorthail, in die obere Hälfte auf zwei entgegengesetzten Seiten starke Ur-

gläser einzukitten, wodurch man, wenn ein Licht vor das eine gehalten wird, den Fortgang der Abdampfung beobachten kann. Unter diese kleineren Gefäße setzt man eine Oellampe mit einfacher Flamme, wodurch die Temperatur bis zu $+40^{\circ}$ höchstens $+50^{\circ}$ erhöht wird, und wobei das Wasser mit der größten Leichtigkeit verdunstet, und sich in der luftleeren, nicht erwärmten, größeren Kupferkugel condensirt. Je kälter man diese hält, um so weniger brauchen die Abdampfungsgefäße erwärmt zu werden. Es wäre von großer Wichtigkeit für die Heilkunde, wenn keine anderen als die auf diese Weise bereiteten Extracte als Heilmittel angewendet würden.

Die Wirkung, welche die Luft während des Abdampfens auf die Flüssigkeit ausübt, hört nicht nach der Abdampfung bis zum Extract auf, welches gewöhnlich von noch zurückgebliebenem Wasser noch weich ist, sondern sie fährt beständig fort; die Aerzte halten gewöhnlich die Jahre alten Extracte für wenig wirksam, und die narcotischen nach dieser Zeit für untauglich. Diejenigen Extracte, welche bis zum Hart- und Festwerden eingetrocknet werden können, erleiden nachher keine weitere Veränderung.

Die Consistenz der Extracte ist verschieden; im Allgemeinen haben sie Honigdicke; mehrere enthalten so viel von zerfließlichen Salzen, daß sie nach und nach zu einer wie Syrup fließenden Masse zergehen. Andere wagt man nicht so weit einzutrocknen, aus Furcht, ihre Wirksamkeit zu zerstören, und man sucht ihnen dann die gehörige Consistenz durch Einmischung von getrockneten Faecula und Pulver der getrockneten Pflanze zu geben, wie es mit den narcotischen der Fall ist.

Mehrere Extracte bereitet man mit Spiritus; man nennt sie *Extracta spirituosa*, und sie enthalten dann nicht die in Alkohol unauflöselichen Salze, so wie kein Gummi aus der Pflanze, statt dessen aber Harz und bisweilen fettes Oel. Andere bereitet man so, daß die Pflanzensubstanz zuerst mit Spiritus, und alsdann mit Wasser

ausgezogen wird, welche man, jedes für sich, zur dünnen Syrupconsistenz abdampft, sie dann sehr genau mit einander vermischt und zur Consistenz von dickem Honig abdampft. Dabei verbinden sich die Pflanzenstoffe mit einander, so daß die Masse homogen und durchscheinend wird, und das Harz aus dem Alkohol-Extract löst sich wirklich in der Masse des wässrigen Extracts auf. Diese Extracte werden *spirituoso-aquosa* genannt.

In Destillationsgefäßen einer höheren Temperatur ausgesetzt, trocknen die Extracte zuerst aus, schmelzen dann und blähen sich auf, wobei sie sich unter Entwicklung von brennbaren Gasen, brenzlichem Oel und einer braunen sauren Flüssigkeit, die freie Essigsäure und bisweilen etwas essigsaures Ammoniak enthält, zersetzen. Sie lassen eine poröse, aufgeblähte Kohle zurück, nach deren Verbrennung kohlensaures Kali und kohlensaure Kalkerde, die gewöhnlich als pflanzensaure Salze in den Extracten vorhanden sind, zurückbleiben. Bisweilen findet man in der Asche Spuren von Kupfer, Blei oder Zinn, welche dann von den, zur Einkochung der Extracte gebrauchten Gefäßen herrühren; und es ist daher das Verbrennen die sicherste Art, ausfindig zu machen, ob ein Extract durch unachtsame Bereitung metallhaltig geworden sei.

Wird ein Extract in Wasser aufgelöst, und hierzu dann Kochsalz oder ein anderes leicht auflösliches, nicht so leicht zersetzbares Salz bis zur völligen Sättigung der Flüssigkeit zugesetzt, so schlägt sich der größte Theil des aufgelösten Extractes in Gestalt einer braunen, zähen Masse nieder. Dieser Niederschlag wird nur dadurch bewirkt, daß das Salzwasser das Extract nicht aufgelöst halten kann, welches sich aber in reinem Wasser wieder auflöst.

Die Extracte sollten in luftdicht verschließbaren Gefäßen aufbewahrt werden; aber gewöhnlich hat man sie in steinernen oder porzellanen, nur leicht mit aufgelegtem Deckel oder mit übergebundener Ochsenblase bedeckten Gefäßen, wodurch die Luft nicht verhindert wird, sich in gleichem Maasse, als ihr Sauerstoff vom Extract schluckt wird, umzuwechseln. Um sie vor Schimmel

u bewahren, befeuchtet man ihre Oberfläche in dem Verwahrungsgefäß mit etwas Alkohol.

Wir können die Extracte in drei Hauptklassen eintheilen: bittere, adstringirende, und narcotische und giftige.

A. Bittere Extracte.

Diese kann man wiederum eintheilen in rein bittere, *Extracta amara*, und in bittere.

a) Rein bittere werden zu pharmaceutischem Beruf bereitet aus Wermuth (*Artemisia Absinthium*), aus dem zarten, frisch ausgeschlagenen Laub der Birken (*Betula alba*), aus der Cascarillenrinde (*Croton Eluteria*), aus den Spitzen des Tausendgüldenkrauts (*Erythraea Cicutarium*), aus den Chamillenblumen (*Matricaria Chamomilla*), aus der Alantwurzel (*Inula Helenium*), aus der Wurzel von *Gentiana lutea* und *purpurea*, aus der unreifen Schaaale der Wallnüsse (*Juglans regia*), aus dem Hopfen (*Humulus Lupulus*), aus der Schaafgarbe (*Achillea Millefolium*), aus dem Löwenzahn (*Leontodon Taraxacum*), aus den Schößlingen der Tannenzweige (*Pinus sylvestris*), aus dem Baldrian (*Valeriana officinalis* und *Phu*) und anderen mehr.

Die Natur des bitteren Bestandtheiles in diesen Extracten ist sehr ungleich, aber seine chemischen Charactere sind bis jetzt noch so wenig der Gegenstand von Untersuchungen gewesen, daß wir darüber nur sehr wenig sagen können. Man nahm in denselben einen gemeinschaftlichen Bestandtheil an, den man *Principium amarum* nannte, und dessen Hauptcharacter in dem bitteren Geschmack und in einer heilsamen Wirkung auf den Magen, oder, wie man es nannte, in seiner magenstärkenden Kraft lag. Im Allgemeinen wird der bittere Stoff aus der filtrirten Auflösung des Extracts von Bleiessig gefällt, wodurch die Flüssigkeit farblos wird. In der Gentianawurzel ist eine Substanz enthalten, die krystallisirbar ist, und die ich weiter unten beschreiben werde. Sie hat einen bitteren Geschmack, ob sie aber den einzigen bitteren

ren Bestandtheil des Gentianaextracts ausmache, ist schwer zu sagen.

β) Bittere Extracte von Merkwürdigkeit sind folgende:

Aloë, welche von den verschiedenen Species von Aloë, nämlich *soccotrina*, *perfoliata* und *spicata* erhalten wird. Die besseren Arten werden durch Auspressen der Blätter, oder selbst durch freiwilliges Ausfließen aus dem an der Spitze abgeschnittenen und umgekehrt aufgehängten Blatte gewonnen, indem dieser Saft nachher geseiht und bei einer sehr gelinden Wärme zu einem Extract abgedampft wird, das allmählich so erhärtet, daß es sich pulvern läßt. Im Handel kommen mehrere Arten davon vor, nämlich *lucida*, *soccotrina* und *hepatica*, die an verschiedenen Orten bereitet und nur wegen der Färbennüance unterschieden werden. Die sogenannte *Aloë caballina* wird durch Auskochen der Blätter gewonnen.

Die Aloë ist braun oder gelbroth, und hat einen sehr bitteren Geschmack. Sie löst sich dem größten Theile nach in Wasser und in Alkohol auf. Wasser läßt eine pulverförmige braune Substanz unauflöst zurück, die sich in einem gewissen Grade in kochendem Wasser auflöst, sich aber beim Erkalten wieder größtentheils niederschlägt. Diese Substanz backt zu einer weichen, in der Wärme schmelzenden, in Alkohol, Aether und Alkali leicht auflöselichen Masse zusammen. Aus diesem Grunde hat man sie für ein Harz angesehen; aber Braconnot's Versuche zeigen, daß sie Absatz ist, verbunden mit einem Antheil unzersetzten Extracts, die sich durch Digestion in Wasser mit Bleioxyd von einander trennen lassen. Der Absatz veröndet sich mit dem Bleioxyd, und das unveränderte Extract löst sich im Wasser auf. Aus dem Bleioxyd kann man vermittelst sehr verdünnter Salpetersäure, welche das Oxyd auflöst, den Absatz in Gestalt eines braunen Pulvers erhalten, welches in kaltem Wasser unauflöselich ist, kochendes Wasser gelbbraun färbt, schwierig von Alkohol aufgelöst, und daraus durch Wasser niedergeschlagen, und nach Verdampfung des Alkohols un-

verändert wieder erhalten wird. In Alkali ist es auflöslich und wird daraus durch Säuren gefällt. Der Absatz verbindet sich dabei mit der Säure, so daß man ihn wohl schwerlich anders, als durch Fällung mittelst eines Bleisalzes und Zersetzung des Niederschlags durch Schwefelwasserstoffgas, rein erhalten kann, indem man ihn dann mit Alkohol auszieht. Er brennt wie Zunder ohne Flamme und ohne zu schmelzen. Das unveränderte, in Wasser auflösliche Extract hat den Namen Aloëbitter bekommen. Es enthält noch eine kleine Menge Absatz aufgelöst, den man durch Digestion mit Bleioxyd abscheidet, worauf man die braune, an der Luft dunkler werdende Auflösung zur Trockne abdampft, die dabei ein gelbes, durchscheinendes, gummiähnliches Extract zurückläßt, welches bei gelinder Wärme schmilzt und einen safranartigen, sehr bitteren Geschmack hat. Bei der Destillation gibt es eine saure Flüssigkeit, Spuren von Ammoniak enthaltend, ein dickes brenzliches Oel, und eine poröse Kohle, die nach völliger Verbrennung Spuren von Kali hinterläßt.

Die Auflösung der Aloë in Wasser wird, mehrere Monate für sich stehen gelassen, ohne zu schimmeln oder zu faulen, dick und dann stark von Galläpfelinfusion gefällt. Das Aloëbitter löst sich in wasserhaltigem Alkohol, aber weder in wasserfreiem Alkohol, noch in Aether auf. Mit Chlor giebt seine Auflösung in Wasser ein Coagulum, welches dem im Wasser unauflöslichen Theil der Aloë gleicht. Von kalter Schwefelsäure wird es ohne Veränderung aufgelöst. In kalter Salpetersäure löst es sich mit grünlicher Farbe auf, und in der Wärme bildet sich Aepfelsäure, Oxalsäure und eine röthliche, harzähnliche, nach Vanille riechende Substanz, die bei gelinder Hitze detonirt. Erhitzt man 1 Th. Aloëbitter mit 8 Th. Salpetersäure, dampft die Auflösung zur Trockne ab, und behandelt den Rückstand mit Wasser, so bleibt, nach Braconnot, ein dunkelgelbes Pulver von sehr bitterem Geschmack unauflöst, das sich in sehr geringer Menge in Wasser auflöst, demselben aber eine Purpurfarbe ertheilt, und beim Erhitzen verpufft, als wäre es mit Salpeter vermischt,

indem es dabei an einen darüber gehaltenen kalten Körper ein purpurfarbendes Pulver absetzt. Diese Substanz verbindet sich mit Kali zu einer detonirenden purpurfarbenen Verbindung. In Wasser aufgelöstes Aloëbitter wird durch Vermischung mit freien Säuren heller, indem dabei ein geringer Niederschlag entsteht. Von Alkali wird seine Auflösung dunkelroth gefärbt. Auch von Eisenoxydsalzen wird sie dunkelroth. Von Zinnchlorür wird sie unbedeutend, und von essigsauerm Bleioxyd, weinsauerm Antimonoxyd-Kali, Zinnchlorid, so wie Mangan-, Zink- und Kupfersalzen, gar nicht gefällt. Salpetersaures Quecksilberoxydul und Silberoxyd bewirken darin erst nach einiger Zeit einen Niederschlag.

Die Aloë wird sehr viel in der Heilkunde angewendet, und ist eines der gewöhnlichsten und kräftigsten Abführungsmittel.

Coloquinthenbitter, aus dem Mark von *Cucumis Colocynthis*, und ausgezeichnet durch seine große Bitterkeit. Man nimmt das Mark heraus, befreit es von den Kernen, zerschneidet es und zieht es mit kaltem Wasser aus. Nach Vauquelin muß dieß mit kaltem geschehen, und diese Auflösung dann bei gelinder Wärme abgedampft werden, wobei sie sich trübt und ölähnliche, nach dem Erkalten, erstarrende Tropfen absetzt, die sich so lange absetzen, als man noch abzudampfen hat. Diese sind nun das Coloquinthenbitter (Colocynthin). Sie lösen sich leicht in Alkohol auf. Nach Braconnot wird das Mark mit Wasser ausgekocht, das Decoct zur Trockne verdampft und der Rückstand mit Alkohol behandelt, welcher das Gummi unaufgelöst läßt und den bitteren Stoff, nebst essigsauerm Kali, aufnimmt. Die Alkoholauflösung wird abgedampft und der Rückstand mit einer sehr geringen Menge Wassers behandelt, welches das Kalisalz auflöst und den größten Theil des bitteren Stoffs unaufgelöst läßt. Es bildet nach dem Trocknen eine röthliche oder gelbbraune, durchscheinende, spröde und gesprun-

Massen, die sich leicht zu einem gelblichen Pulver

Nach Braconnot stellt es schwach die

Farbe des gerötheten Lackmuspapiers wieder her. Erhitzt, rennt es mit Flamme, wie ein Harz, und bei der Destillation giebt es etwas Ammoniak. Zur Auflösung bedarf es etwas weniger als das 5fache seines Gewichts kaltem Wassers; von kochendem wird es in noch größerer Menge aufgelöst, und beim Erkalten setzt sich nichts ab. Auch in Alkohol und in Aether ist es auflöslich. Chlor erwirkt in seiner Auflösung in Wasser einen in Alkohol unlöslichen Niederschlag. Sowohl Säuren als stark zerießliche Salze, wie Chlorcalcium und essigsaures Kali, schlagen es in einer zusammenhängenden, klebrigen Masse nieder, die sich nicht mehr in Wasser auflöst, und sich wie das nach Vauquelin's Vorschrift bereitete zu verhalten scheint. Dagegen wird es nicht von kaustischem Alkali, Baryt- oder Kalk-Wasser gefällt. Es wird niedergeschlagen von schwefelsaurem Eisenoxydul, schwefelurem Kupferoxyd und salpetersaurem Quecksilberoxyd, nicht bedeutend aber von Quecksilberchlorid, salpetersaurem Silberoxyd oder essigsaurem Bleioxyd. — Von Gallapfelinfusion wird es mit hellgelber Farbe zu einer so dicken Masse gefällt, daß das Glas umgekehrt werden kann, ohne daß sie ausfließt. Der Niederschlag ist sowohl in Alkohol als in kochendheißem Wasser, woraus er sich beim Erkalten absetzt, auflöslich.

Das Coloquinthenextract wird in der Medicin als ein käftiges Abführungsmittel gebraucht.

Eigener bitterer Stoff der Rhabarberwurzel (Rhabarberbitter) wird, nach Pfaff, erhalten, wenn es mit Wasser bereitete und so gut wie möglich ausgeocknete Extract mit wasserfreiem Alkohol digerirt wird, wovon man nachher den größten Theil abdestillirt und den Rückstand behutsam eintrocknet. Er bildet eine dunkelbraune, glänzende, undurchsichtige Masse, von einem unangenehen, höchst unangenehen Rhabarber-Geruch und Geschmack, welcher letztere zugleich etwas zusammenziehend ist. Bei der Destillation giebt er kein Ammoniak, und beim Erhitzen in offener Luft wird er unter Verbreitung des Geruches nach gebranntem Zucker zerstört. In

der Luft wird er feucht, und in Wasser ist er in allen Verhältnissen auflöslich; die Auflösung ist rothbraun und verdünnt gelb. Er ist in Alkohol und in weniger als dem 5fachen seines Gewichtes Aether auflöslich. Von Salpetersäure wird er in Aepfelsäure und Oxalsäure verwandelt. Die Alkalien färben seine Auflösung braun, ohne sie zu fällen; Baryt- und Kalkwasser scheiden rothbraune Flocken ab (Vergl. pag. 293.). Seine Auflösung wird von Eisensalzen grün gefärbt, und nach einiger Zeit schlägt sich eine dunkelgrüne Substanz nieder. Schwefelsaures Kupferoxyd färbt ihn grünbraun und bildet nach einigen Stunden einen braunen Niederschlag. Salpetersaures Bleioxyd wird davon schwach, aber essigsäures Bleioxyd und salpetersaures Quecksilberoxydul stark mit gelber Farbe gefällt. Er wird nicht gefällt von Alaun, von weinsäurem Antimonoxydkali, von Zinksalzen, von Zinnchlorür und von Quecksilberchlorid; ferner nicht von Galläpfelinfusion; dagegen aber fällt er, wie Gerbstoff, die Leimauflösung in weichen, röthgelben Flocken.

Diese Substanz wird in der Medicin als ein magenstärkendes und in größerer Dosis als Abführungsmittel gebraucht.

B. Adstringirende Extracte. Gerbstoffarten.

Holzrinde und viele perennirende Wurzeln von jährigen Pflanzen enthalten eine größere oder kleinere Menge einer Substanz, welche man Gerbstoff genannt hat, wegen ihrer Eigenschaft sich mit dem thierischen Gewebe der Haut zu verbinden, welche dadurch, wie man es nennt, gegerbt wird. Diese Operation ist zwar von Alters her bekannt gewesen, allein die Substanz, welche sich dabei mit der Haut verbindet, ist zuerst von Dejeux, und mit noch größerer Genauigkeit von Seguin unterschieden worden, und Proust bemühte sich, Methoden aufzufinden, um sie von anderen Stoffen, welche zugleich in gerbstoffhaltigen Pflanzen vorkommen, zu trennen.

Nach Wahlenberg kommt der Gerbstoff vor: 1) in einigen perennirenden Wurzeln von jährigen Kräutern, *Tormentilla erecta*, *Polygonum bistorta*, *Ly-*

thrum Salicaria; 2) in der Rinde der meisten Baumstämme, und in den jungen Zweigen von Sträuchern und holzigen Pflanzen. Der Gerbstoff ist am reinsten in dem Holze, und bekommt gegen die Oberfläche der Rinde zu eine dem Extract-Absatz immer gleichartiger werdende Natur; 3) in den Blättern der Kräuter findet er sich selten (*Saxifraga crassifolia* enthält jedoch denselben in Menge); dagegen aber findet er sich in den Blättern der Bäume und Sträucher, z. B. der Eichen und Birken, bei welchen er sich jedoch gegen den Herbst zu vermindert, in *Arbutus Uva ursi* und *A. Unedo*, *Rhus Coriaria* u. a.; 4) in den Schalen von Früchten und Saamen, so wie in deren Scheidewänden, wie z. B. in den Erlen- und Fichtenzapfen, in den Hülsen verschiedener Leguminosen, in der Schaafe fleischiger Früchte, wie in den Vogelkirschbeeren, Hambutten, rothen Trauben u. a.; 5) in unreifen Früchten. Er findet sich selten oder nie in Blumenblättern (die Blüthe von *Punica Granatum* macht hiervon eine Ausnahme), im Fleische reifer Früchte oder Saamen und nicht in jährigen Pflanzen. Nach H. Davy's Versuchen erhält man folgende Mengen Extract und Gerbstoff aus 100 Th. der folgenden Pflanzen in trockenem Zustand:

	Extract,	Gerbstoff
	darin,	
Galläpfel	37,5	26,4
Die weiße innere Rinde von alten Eichen	22,5	15
— von jungen Eichen	23,1	16
— vom Rostkastanienbaum	18,5	15,2
Gefärbte innere Rinde von Eichen	10,0	4
— — vom Kastanienbaum	8,5	3
Ganze Eichenrinde	12,7	6,3
Ganze Rostkastanienrinde	11,0	4,3
Ganze Ulmenrinde		2,7
Gewöhnliche Weide		2,2
Sumach von Sicilien	34,3	16,2
— Malaga	32,5	16,4
Souchong-Thee	32,5	10
Grüner Thee		8,5
Catechu von Bombay		54,3
— aus Bengalen		48,1.

In diesen adstringirenden Extracten macht der Gerbstoff bisweilen die Hauptmasse aus, bisweilen ist er mit anderen, in Wasser auflösblichen Stoffen vermischt.

Die den Gerbstoff charakterisirenden Eigenschaften sind folgende: er schmeckt zusammenziehend, oft ohne alle gleichzeitige Bitterkeit, er ist gewöhnlich geruchlos, seine Auflösung in Wasser röthet das Lackmuspapier. Mit einer gewissen Menge concentrirter Schwefelsäure vermischt, wird er niedergeschlagen; desgleichen von den meisten Metallsalzen, zumal den Blei-, Zinn- und Kupfersalzen, so wie endlich von einer Auflösung von Tischlerleim. Mit aufgelösten Eisenoxydsalzen bildet er ebenfalls Niederschläge, und zwar entweder schwarze oder graugrüne, indem die darüber stehende Flüssigkeit entweder dunkelblau, in's Grüne ziehend, oder rein grün bleibt. Nach diesem ungleichen Verhaltem hat man den Gerbstoff in zwei Arten eingetheilt, nämlich in solchen, welcher von Eisensalzen schwarz oder blau, und in solchen, welcher davon grün wird.

Ob diese beiden Arten aus bestimmt verschiedenen Stoffen bestehen, oder ob sie nur durch zufällige Einmischungen von einander unterschieden sind, läßt sich gegenwärtig nicht entscheiden; man hat nämlich Anlaß zu vermuthen, daß die bläuende Farbe, welche ebenfalls durch Galläpfelsäure entsteht, möglicherweise von einer Einmischung dieser Säure herrühren könne. So viel scheint jedoch aus den bis jetzt gemachten Erfahrungen hervorzugehen, daß ungleiche Pflanzen Gerbstoff mit derselben Art von Verschiedenheiten hervorbringen, welche zwischen ungleichen fetten oder flüchtigen Oelen, ungleichen Harzen u. s. w. bestehen, wie man leicht aus den nun zu beschreibenden Arten sehen wird.

Einige Chemiker vermuthen, der Gerbstoff sei kein besonderer, näherer Bestandtheil des Pflanzenreichs, sondern bestehe aus einer extractartigen Substanz, verbunden mit einer Säure, welche, wenn sie Galläpfelsäure ist, dem Gerbstoff die Eigenschaft, Eisenoxydsalze zu schwärzen, ertheilt. Zu dieser Vermuthung wurde man dadurch ver-

anlaßt, daß mehrere Pflanzeninfusionen, welche für sich die Leimauflösung nicht fällen, diese Eigenschaft erlangen, wenn sie mit einer freien Säure vermischt werden; so fand z. B. Pelletier, daß eine Safraninfusion die Leimauflösung nicht fälle, diese Eigenschaft aber beim Vermischen mit Galläpfelsäure bekomme. Chevreul fand, daß eine kalte Infusion von Fernambuk die Leimauflösung nicht fälle, daß sie aber den Leim niederschlage, wenn sie zum Extract abgedampft und hernach bis zu demselben Grad, wie sie zuvor war, verdünnt werde.

Aus allen diesen Umständen kann man wohl schließen, daß der Gerbstoff noch weiterer Untersuchungen bedürfe, wenn wir einige Gewisheit über seine Natur erlangen wollen, aber sie berechtigen uns deshalb noch nicht, eine solche Zusammensetzung aus Säure und Extractivstoff für bewiesen zu halten; man sollte erwarten, daß stärkere Säuren die schwächeren austreiben und ersetzen würden, um auf diese Art nach ungleichen Säuren ungleiche Gerbstoffe mit einer und derselben Pflanzensubstanz hervorzubringen, was aber auf keine Weise der Fall ist.

*) Gerbstoff, welcher die Eisenoxydsalze blau färbt.

Gerbstoff von Eichen. Das ganze Geschlecht *Quercus* enthält einen Gerbstoff, welcher sich ziemlich gleich zu sein scheint; er findet sich da im Holze des Stammes und der Wurzel, in der Rinde, in dem Laub und in der größten Menge in jenen Auswüchsen, die sich auf den Blättern von *Quercus infectoria* durch den Stich von *Cynips quercusfolii* bilden und unter dem Namen der Galläpfel in den Handel kommen. (Die entsprechenden Auswüchse bei unseren Eichen enthalten nicht viel mehr Gerbstoff, als das Blatt selbst, worauf sie sitzen). Man erhält den Eichengerbstoff am besten entweder aus den Galläpfeln, oder von der inneren Seite der frischen Rinde unserer gewöhnlichen Eiche (*Q. Robur*). Man hat eine große Menge von Methoden zur Darstellung dieses Gerbstoffs angegeben, von denen jedoch selten eine ihn

richtig rein geliefert hat. In den Galläpfeln ist er durch sehr wenige fremde Substanzen verunreinigt, und man kann das Galläpfelextract selbst als einen ziemlich reinen Gerbstoff betrachten, der verunreinigt ist durch Galläpfelsäure, die sich mit wasserfreiem Alkohol ausziehen läßt, durch einige Salze, mit Kalkerde oder Kali zur Basis, gebunden entweder an Galläpfelsäure, oder an Gerbstoff selbst, und endlich durch Extract-Absatz, gebildet durch Einwirkung der Luft und auf Kosten des Gerbstoffs, sowohl während des Eintrocknens der Galläpfel, als auch nachher bei der Abdampfung des Extractes.

Unter der Voraussetzung, daß die Galläpfel- oder Eichenrinden-Infusion noch andere extractive Stoffe als Gerbstoff enthalte, sucht man diesen durch Reagentien abzuscheiden, die denselben ausfällen, ohne auf die übrigen zu wirken. Ich habe indessen sehr Ursache zu vermuthen, daß diese Infusion nicht wesentlich etwas Anderes enthalte, als Galläpfelsäure und Gerbstoff. Wird dieselbe zur Trockne abgedampft und zuerst mit Aether behandelt, so zieht dieser Galläpfelsäure und Gerbstoff aus. Darauf zieht Alkohol gerbstoffsaures Kali und gerbstoffsaure Kalkerde mit Gerbstoff im Ueberschuß, die in Wasser vollkommen auflöslich sind, aus, und zuletzt löst Wasser gerbstoffsaure Kalkerde auf, mit Hinterlassung einer geringen Menge unauflöslichen Absatzes. Folgende Reinigungsmethoden haben mir besser, als die gewöhnlich angegebenen, dem Endzweck zu entsprechen geschienen.

a) Man bereitet eine kalte Infusion von zerstoßenen Galläpfeln, seih dieselbe und sättigt sie sehr nahe, aber nicht völlig, mit kaustischem Ammoniak; wird das Sättigen überschritten, so setzt man noch so viel Infusion zu, bis die Flüssigkeit auf freie Säure reagirt. Sie wird dann so lange mit einer Auflösung von Chlorbaryum vermischt, als sich noch ein Niederschlag bildet, und dann in einer vollen und verkorkten Flasche klären gelassen. In offenen Gefäßen wird die in der Flüssigkeit zurückgebliebene galläpfelsaure Baryterde grün und setzt einen grünen Niederschlag ab. Das Klare wird abgegossen, und die Ver-

bindung von Gerbstoff mit Baryterde auf ein Filtrum genommen und mit kaltem Wasser gewaschen, wobei sie gewöhnlich etwas grün wird und sich ein Theil auflöst, weil dieses Salz in Wasser ein wenig auflöslich ist. Der Niederschlag wird hierauf in Essigsäure aufgelöst, die eine, durch Einfluß der Luft auf das Barytsalz neugebildete graugrüne Materie zurückläßt. Die Auflösung wird filtrirt und mit Bleiessig vermischt, der einen gelblichen, beim Waschen graugrün werdenden Niederschlag bildet. Dieser Niederschlag wird, noch feucht und in Wasser zerührt, durch Schwefelwasserstoffgas zersetzt.

b) Eine warme und concentrirte Galläpfelinfusion wird durch grobes Leinen geseiht und die Masse nachher noch ausgepreßt. Die trübe, durch Filtriren nicht klar werdende Flüssigkeit wird mit ganz weniger verdünnter Schwefelsäure versetzt und sogleich umgerührt, wobei sich ein geringer Niederschlag bildet, der die Substanzen umschließt, wodurch die Flüssigkeit unklar war; und nun läßt sie sich leicht filtriren. Sie wird darauf mit einer Auflösung von kohlensaurem Kali vermischt, so lange als noch etwas niederfällt. Ein Ueberschuß von Alkali löst das Gefällte wieder auf. Der weiße Niederschlag, welcher eine Verbindung vom Gerbstoff mit Kali ist, wird auf's Filtrum genommen und mit kaltem Wasser gewaschen; je kälter, um so besser, weil er in Wasser um so auflöslicher ist, je wärmer es ist. Dabei bleiben Galläpfelsäure, möglicherweise auch Gummi und anderer Extractivstoff aufgelöst. Der ausgewaschene Niederschlag wird in kochendheißer verdünnter Essigsäure aufgelöst und die Flüssigkeit erkalten gelassen, wobei sich eine mit Essigsäure verbundene Absatz-Materie niederschlägt. Die Auflösung wird hierauf mit basisch essigsaurem Bleioxyd behandelt, und der dadurch entstandene Niederschlag, wie oben, mit Schwefelwasserstoffgas zersetzt.

Man erhält hierbei eine wasserklare Auflösung von einem rein zusammenziehenden Geschmack, die man von dem Schwefelblei abfiltrirt und im luftleeren Raum über kohlensaurem Kali verdunstet, welches mit dem Wasser

zugleich den Ueberschuß von Schwefelwasserstoffgas aufnimmt. Der Gerbstoff bleibt dann auf dem Glase in Gestalt einer durchsichtigen, zersprungenen, blaßgelben und schuppigen Substanz zurück, die sich mit Leichtigkeit und vollständig in Wasser zu einer farblosen Flüssigkeit auflöst, welche alle charakteristischen Eigenschaften der Galläpfelinfusion besitzt.

c) Eine warme und concentrirte Galläpfelinfusion wird mit ein wenig Schwefelsäure, auf die angeführte Weise, geklärt, filtrirt und mit concentrirter Schwefelsäure nach und nach in kleinen Antheilen versetzt. So lange die gefällte, anfangs weiße und flockige Masse nach einer Stunde zu einer gelben oder bräunlichen, harzähnlichen Substanz zusammenbackt, fährt man mit dem allmählichen Zumischen von Schwefelsäure fort. Das Gefällte ist eine Verbindung von Gerbstoff und Schwefelsäure mit einer anderen Substanz, deren Gegenwart der Verbindung Zusammenhang und das harzähnliche Ansehen giebt. Sobald der Niederschlag nach einstündigem Stehen nicht mehr zusammenhaftet, gießt man die Flüssigkeit davon ab und vermischt sie darauf mit concentrirter Schwefelsäure, so lange als sie noch getrübt wird. Man erhält dann einen weißen oder wenig gelblichen Niederschlag, den man auf's Filtrum nimmt und mit Schwefelsäure von ungefähr gleicher Verdünnung, als die Flüssigkeit hatte, auswäscht, woraus sich der Niederschlag absetzte; hierauf bringt man ihn auf Löschpapier und preßt ihn zuletzt auch zwischen solchem so lange aus, als dieses noch feucht wird. Man hat nun eine Menge einer schwach gelblichen, von verdünnter Schwefelsäure feuchten Masse; man löst sie in kaltem Wasser auf, wovon sie mit Leichtigkeit und ohne Trübung zu einer gelben Flüssigkeit aufgenommen wird. Zu dieser setzt man nun, in kleinen Antheilen, fein geriebenes, reines kohlensaures Bleioxyd, so lange als noch Aufbrausen entsteht; sobald dieses aufgehört hat, läßt man sie mit etwas kohlensaurem Bleioxyd im Ueberschuß maceriren, bis daß die Auflösung eine saure Auflösung von Chlor-

baryum nicht mehr trübt, worauf man filtrirt und im luftleeren Raum verdunstet. Sobald alle Schwefelsäure aus der Auflösung entfernt ist, wird die Farbe sogleich dunkler gelb. — Der anfangs erhaltene harzartige Niederschlag mit Schwefelsäure giebt ebenfalls Gerbstoff, wenn er in einer geringen Menge kochendheissen Wassers aufgelöst und dieses erkalten gelassen wird, wobei sich eine Materie absetzt, welche Schwefelsäure enthält und von gleicher Beschaffenheit zu sein scheint, wie die in *b*) mit Essigsäure gefällte. Aus der filtrirten Auflösung, welche gleichwohl noch etwas davon aufgelöst enthält, bekommt man durch Behandlung mit kohlensaurem Bleioxyd einen nicht völlig reinen Gerbstoff. Die Einnengung besteht aus Absatz-Materie; ob aber zugleich noch etwas Anderes darin enthalten sei, ist noch nicht durch Versuche ausgemittelt.

Noch andere Methoden zur Abscheidung des Gerbstoffs können darin bestehen, daß man die Galläpfelinfusion mit essigsaurem Kupferoxyd oder mit weinsaurem Antimonoxydkali niederschlägt und den ausgewaschenen Niederschlag mit Schwefelwasserstoffgas zersetzt, oder daß man das Galläpfelextract auf die unten anzuführende Weise mit Aether behandelt. Die unmittelbaren Fällungen mit Blei- oder Zinn-Salzen sind in sofern unzuverlässig, als dadurch sehr viele andere Stoffe, die man als gegenwärtig vermuthen kann, mit niedergeschlagen werden.

Der Gerbstoff ist in seinem reinen Zustand farblos. So findet er sich in der Pflanze, und es ist wahrscheinlich, daß die gelbe Farbe, die er nach dem Trocknen annimmt, eine Folge vom Einfluß der Luft ist, da der im luftleeren Raum eingetrocknete Gerbstoff in der Luft, und selbst in einer verkorkten Flasche, besonders unter dem Einflusse des Lichts, dunkler gelb wird. Er hat keinen Geruch, schmeckt rein zusammenziehend, ohne alle Bitterkeit und röthet das Lackmuspapier stark. In der Luft erhält er sich, ohne feucht zu werden, und er läßt sich mit der größten Leichtigkeit zu Pulver reiben. Zwischen den Fingern gerieben, erweicht er nicht, wie das

Galläpfelextract, und beim Erhitzen auf einem Platinlöfel knistert er, schmilzt halb, bläht sich auf, verkohlt sich und entzündet sich mit einer glänzenden Flamme, worauf eine leicht verbrennbare Kohle zurückbleibt. Bei der Destillation giebt er anfangs einen dicken Rauch und brennbare Gase, denen ein gelbliches Oel und ein Liquidum folgt, welches beim Erkalten in fast farblosen Krystallen anschießt. Diese Krystalle, die man für Galläpfelsäure halten könnte, schmecken scharf brenzlich, schwärzen nicht eine schwache Auflösung eines neutralen Eisenoxydsalzes, sondern färben dasselbe dunkel grüngelb, und bewirken einen flockigen Niederschlag von graugrüner Farbe. Ammoniak findet sich nicht in bemerkbarer Menge unter den Destillationsproducten. Einige Chemiker geben an, daß es sich bilde, haben aber dann gewiß einen unreinen Gerbstoff angewendet. Der Gerbstoff löst sich leicht und ohne Rückstand in Wasser und in Alkohol auf; allein nicht ohne Hülfe von Wärme in wasserfreiem Alkohol. Auch von Aether von 0,72 wird er aufgelöst. Letztere Auflösung ist farblos und hinterläßt nach dem freiwilligen Verdunsten den Gerbstoff gesprungen, und fast farblos und durchsichtig zurück. Bisweilen zeigen sich darin Spuren einer weißen Substanz, deren Menge äußerst geringe ist, und die sich beim Uebergießen des Gerbstoffs mit wenig Wasser nicht auflöst. In diesem Zustand ist der Gerbstoff wahrscheinlich in dem höchsten Grad von Reinheit, in dem man ihn darstellen kann. Wird der Gerbstoff mit Aether übergossen, so backt er etwas zusammen, und hinterläßt gewöhnlich einen flüssigen, gelbbraunen, in Aether unauflöselichen Rückstand von gefärbtem Gerbstoff, der sich nun nicht vollständig in Wasser auflöst. Dies findet auch mit dem im luftleeren Raum verdunsteten statt. Wird trockenes Galläpfelextract mit Aether übergossen, so löst dieser Galläpfelsäure und farblosen Gerbstoff auf, und läßt man ihn freiwillig verdunsten, so sieht man die Krystalle der Säure in der durchsichtigen eingetrockneten Masse von farblosem Gerbstoff. Wird das Extract mehrere Male nach einander mit klei-

Mengen Aethers ausgezogen, so erhält man einen farblosen Gerbstoff, der keine Galläpfelsäure enthält. In fetten und in flüchtigen Oelen löst er sich nicht auf.

Wird die Auflösung des Gerbstoffs in Wasser dem Luft überlassen, so wird sie gelb, gekochter zuletzt dunkelbraun, und wird sie zum Extract abgerocht, so erhärtet sie zu einer gesprungenen Masse, vollkommen durchscheinend ist, und beim Anfeuchten wieder eine braune Substanz aufgelöst läßt. Diese Veränderung beruht auf einer Veränderung in der Zusammensetzung des Gerbstoffs, indem ein Theil der ursprünglichen Materie übergeht, die anfangs von noch unverändertem Gerbstoff aufgelöst gehalten wird, und sich dann in Verbindung mit einer gewissen Menge desselben niederschlägt. In diesem gefärbten Zustand befindet sich der Gerbstoff in der Galläpfel- oder Eichenrinde-Infusion, wird er von Baryterde und von Kali niedergeschlagen, und so ist ferner der Gerbstoff, welcher von Schwefelwasserstoff in Freiheit gesetzt, so löst sich der reine Gerbstoff in der Flüssigkeit auf, und der Schwefelblei bleibt mit dem Schwefelblei gemengt zurück, oder er sich theilweise mittelst kochenden Wassers, noch besser mit Ammoniak, ausziehen läßt, weissen sich zu einer dunkelbraunen Flüssigkeit auflöst, nach dem Abdampfen eine schwarzbraune, in Wasser unlösliche, fast geschmacklose Substanz hinterläßt, die beim Leimauflösung nicht eher fällt, als bis eine Säure zugesetzt wird, wobei sich ein braunes, Leimartiges Coagulum bildet. Der Gerbstoff hatte demnach in der gefärbten schwer auflöselichen Substanz eine Verbindung gebildet, deren Bestandtheile vom Alkali getrennt aufgelöst werden, und deren Gerbstoff, bei der Sättigung des Alkali's durch eine Säure, seine Eigenschaft, als Leim zu wirken, wieder erlangt. — Wird eine

verdünnte Galläpfelinfusion in einem leicht bedeckten Gefäße für sich stehen gelassen, so wird der Gerbstoff nach und nach zerstört, während die Flüssigkeit schimmelt und sich braune Krystalle von Galläpfelsäure bilden, an Menge bei weitem die Galläpfelsäure übertreffend, welche sich auf andere Arten aus den Galläpfeln gewinnen läßt. Hierbei entsteht die Frage: ist diese Galläpfelsäure durch Zerstörung des Gerbstoffs gebildet, oder ist sie nur durch die Zerstörung eines Stoffes in Freiheit gesetzt, womit sie verbunden war? Da es Gerbstoffarten giebt, welche keine Galläpfelsäure enthalten, und da der Gerbstoff der Galläpfel, gleich wie anderer Gerbstoff, durch wiederholte Auflösungen und Abdampfungen gänzlich in Extract-Absatz zersetzt wird, ohne Galläpfelsäure zu geben, so ist es wohl möglich, daß die Galläpfelsäure bei der langsamen Zerstörung der Galläpfelinfusion ein Educt und nicht ein Product wird.

Wird eine Auflösung von Gerbstoff mit Chlorwasser vermischt, oder in dieselbe Chlorgas geleitet, so wird sie dadurch braun, trübt sich und erleidet eine, der durch Abdampfen in der Luft bewirkte, ähnliche Veränderung. Von einer geringeren Menge Chlor wird bloß Extract-Absatz, mit Chlorwasserstoffsäure verbunden, abgeschieden, während die Auflösung die Eigenschaften des Gerbstoffs behält; mehr Chlor zerstört den Gerbstoff gänzlich.

Mit Säuren verbindet sich der Gerbstoff begierig und vor allen mit Schwefelsäure. Ich erwähnte, daß die Schwefelsäure zwei verschiedene Verbindungen in der Galläpfelinfusion hervorbringe. Die zuerst entstehende backt zusammen und wird beim Umrühren klebrig, zusammenhängend, und, nach einiger Ruhe, durchsichtig und gelbbraun. In kaltem Wasser geknetet, wird sie anfangs oberflächlich unklar und löst sich sehr unbedeutend in Wasser auf, das dadurch einen rein zusammenziehenden Geschmack und eine gelbe Farbe bekommt. Nach öfter wiederholter Behandlung mit kaltem Wasser, bleibt zuletzt eine hellgraue, pulverige Materie zurück. In kochendem Wasser löst sie sich mit dunkelbrauner Farbe auf,

auf, und beim Erkalten trübt sich die Flüssigkeit, indem sich eine braune, pulverige Substanz absetzt, während eine weniger dunkel gefärbte Auflösung von schwefelsaurem Gerbstoff zurückbleibt. Von Alkohol wird sie leicht mit dunkelgelber Farbe aufgelöst, wobei ein geringer pulverförmiger Rückstand bleibt. Ich habe schon erwähnt, daß diese Verbindung den Absatz des Gerbstoffs enthält. Ein Beweis hiervon ist, daß wenn man reinen Gerbstoff in Wasser auflöst, die Auflösung langsam verdunsten läßt, und das, sich nicht mehr vollständig in kaltem Wasser auflösende, gefärbte Extract in kochendem Wasser auflöst, und nach dem Erkalten mit verdünnter Schwefelsäure vermischt, ein Niederschlag entsteht, welcher in wenigen Minuten eine bräunliche, zusammenhängende, der aus der Galläpfelinfusion erhaltenen ganz ähnliche Masse bildet. Der reine Gerbstoff verbindet sich mit Schwefelsäure zu einer in Wasser leichtlöslichen, aber in Schwefelsäure von einer gewissen Concentration unauflöselichen, flockigen, weißen oder etwas in's Gelbe ziehenden Masse, die, durch Pressen getrocknet, sich durch die stärkere Concentration der noch daran sitzenden Schwefelsäure in der Luft nicht schwärzt. Mit kohlenensaurem Bleioxyd von der freien, nicht aber von der damit chemisch verbundenen Säure befreit, bildet diese Verbindung eine hellgelbe Auflösung, von stark und rein zusammenziehendem, nicht im Mindesten saurem Geschmack, die aber aus einer sauren Auflösung von Chlorbaryum schwefelsaure Baryterde fällt, zum Beweis, daß sie Schwefelsäure enthält. In offener Luft abgedampft, wird sie nicht dunkler und läßt eine gesprungene, halb durchscheinende, weißgelbe Masse zurück, die sich nur durch den Mangel an völliger Durchsichtigkeit dem Ansehen nach von dem reinen Gerbstoff unterscheidet. Sie fällt die Leimauflösung und ertheilt Auflösungen von Eisenoxydsalzen eine dunkelblaue Farbe. Wäre der Gerbstoff nichts anderes, als eine chemische Verbindung eines eigenen Extractivstoffes mit einer Säure, die im Galläpfel-Gerbstoff Galläpfelsäure wäre, so müßte die Schwefelsäure in dieser Verbindung die Galläpfelsäure

ausgetrieben haben, und die Verbindung die Eisenoxydsalze nicht mehr blau färben können. Salpetersäure fällt die Auflösung des Gerbstoffs, aber der Ueberschuß, welcher erforderlich ist, um die Verbindung unauflöslich zu machen, fängt bald an dieselbe mit Entwicklung von Stickstoffoxydgas zu zersetzen, wobei die Auflösung rothgelb wird. Nun mit kaustischem Ammoniak vermischt, schlägt sich eine zuerst röthliche, hernach graugrüne Materie nieder, die zuletzt braun wird. Bei fortgesetzter Einwirkung der Salpetersäure wird der Gerbstoff in Aepfelsäure und Oxalsäure verwandelt. Aus einer Galläpfelinfusion fällt die Salpetersäure eine ähnlich beschaffene, harzartige Verbindung, wie die Schwefelsäure. Der Gerbstoff wird ferner gefällt von Chlorwasserstoffsäure, Phosphorsäure, Arseniksäure, Oxalsäure, Weinsäure und Aepfelsäure. Löst man etwas Borsäure mit Hülfe von Wärme in einer Auflösung von reinem Gerbstoff auf, so geseht die ganze Masse beim Erkalten zu einer weißen Gallert, die nach völligem Eintrocknen eine voluminöse, schneeweiße Masse bildet, die sich so zart wie der feinste Talk anfühlt. Von Essigsäure wird er nicht gefällt. Alle diese Niederschläge sind Verbindungen des Gerbstoffs mit der Säure, unauflöslich in einem Ueberschuß der fallenden Säure, allein auflöslich in reinem Wasser. In der Galläpfelinfusion erzeugen sie, wie die Schwefelsäure, zwei Niederschläge, von denen der erste, welcher den gefärbten Gerbstoff enthält; in Wasser schwerlöslich ist und zusammenhängend wird. Die Verbindung der Phosphorsäure mit dem Gerbstoff erfordert, um gefällt zu werden, einen größeren Ueberschuß von Säure in der Flüssigkeit, als die der übrigen Mineralsäuren.

Mit den Salzbasen verbindet sich der Gerbstoff mit einer ausgezeichneten Verwandtschaft. Mit Kali giebt er eine in Wasser schwerlösliche, weiße, pulverförmige Verbindung, die sich niederschlägt; wenn man eine nicht zu sehr verdünnte Gerbstoff-Auflösung mit Kalihydrat, mit kohlensaurem oder zweifach kohlensaurem Kali ver-

mischt. Wird die Verbindung aus reinem Gerbstoff dargestellt und nach dem Auswaschen ausgepresst, so bildet sie eine weiße, erdige, an der Luft sich nicht verändernde Masse. In der geringsten Menge kochendheißes Wassers aufgelöst, giebt sie eine klare, gelbe Flüssigkeit, die beim Erkalten zu einer weißen, körnig gelatinösen Masse geräth, welche nach freiwilligem Eintrocknen dieselbe weiße, erdige Substanz zurückläßt. Wird sie in mehr Wasser aufgelöst, so bleibt die Auflösung beim Erkalten klar. Sie reagirt und schmeckt nicht alkalisch, sondern rein zusammenziehend, und auf einem flachen Gefäße von selbst verdunsten gelassen, gelatinirt sie bei einer gewissen Concentration, und hinterläßt endlich das Aufgelöste in seiner vorigen Beschaffenheit. Dies ist ein neutrales Salz, welches man gerbstoffsaures Kali nennen kann. Seine Auflösung in Wasser fällt nicht eher die Leimauflösung, als bis das Kali mit einer Säure gesättigt worden ist; ein Umstand, welcher sehr die Kraft des Beweises vermindert, den man für die Zusammengesetztheit des Gerbstoffs aus einer Säure und Extract davon hernehmen wollte, daß die Infusionen gewisser Pflanzen, welche die Leimauflösung nicht fällen, diese Eigenschaft bei Zusatz einer Säure erlangen. Es ist nämlich möglich, daß diese Infusionen den Gerbstoff in Verbindung mit einer Basis enthalten. — Setzt man viel kaustisches oder kohlensaures Kali zu der neutralen Verbindung, so wird diese davon aufgelöst. Eine gewisse Menge Alkali bildet mit dem neutralen Salz eine gelbe Auflösung, die noch nicht bedeutend alkalisch, sondern zugleich bemerklich zusammenziehend schmeckt, und die nach dem Abdampfen ein gelbbraunes, durchsichtiges, gesprungenes, extractähnliches, in Wasser auflösliches basisches Salz hinterläßt. Ein dieses Verhältniß überschreitender Ueberschuß von Kali in der Flüssigkeit, verursacht Zersetzung beim Abdampfen in freier Luft, indem sich die Masse immer tiefer färbt. Wird das schwerlösliche neutrale Kalisalz mit einer Auflösung von Gerbstoff vermischt und mit Hülfe von Wärme darin aufgelöst, so setzt es sich wieder unverändert ab, und

nach dem Abdampfen findet man, daß sich der Gerbstoff nach Aufsen gezogen und die neutrale Verbindung *in der* Mitte der Masse gelassen hat. Sie ist wenig oder *nicht in* Alkohol auflöslich, und kann dadurch von überschüssigen Gerbstoff gereinigt werden. Mit Natron giebt der Gerbstoff eine weit leichter auflösliche Verbindung, die *noch* bei einer sehr starken Concentration der Gerbstoff-Auflösung Zeichen von Fällung verräth. So nahe wie möglich gesättigt und freiwillig verdunsten gelassen, hinterläßt sie eine grünlich graugelbe, halbkrySTALLINISCHE Masse, an deren Rändern sich deutliche gelbe Krystallblätter bilden. Wird sie nun mit ein wenig kaltem Wasser behandelt, so löst sich ein Theil auf, und es bleibt ein, dem Kalisalz ähnliches Salz unaufgelöst zurück. Wird dieses in kochendem Wasser aufgelöst und freiwillig verdunsten gelassen, so setzt es sich als ein weißes Pulver ab und ist vollkommen neutral. Das in kaltem Wasser auflösliche krystallinische Salz ist in Alkohol unauflöslich und schmilzt darin beim Erhitzen. Es reagirt schwach alkalisch und fällt nicht die Leimauflösung, selbst nachdem eine Säure zugesetzt ist. — Mit Ammoniak verbindet sich der Gerbstoff unter gleichen Erscheinungen, wie beim Kali, so daß alles vom Kalisalz Angeführte auch vom Ammoniaksalz gilt. Man kann daher auch zur Abscheidung des Gerbstoffes nach *b*) kohlensaures Ammoniak statt kohlensaures Kali anwenden.

Mit Baryterde bildet der Gerbstoff eine in kaltem Wasser sehr schwerlösliche Verbindung, die mit weißer Farbe niederfällt, wenn man eine warme Auflösung von gerbstoffsauerm Kali oder Ammoniak zu einer Auflösung von Chlorbaryum mischt. Von kochendheißem Wasser wird sie in größerer Menge aufgelöst. Wird das niedergeschlagene Salz mit einer zur Sättigung der Base unzureichenden Menge verdünnter Schwefelsäure vermischt, so löst sich in der Flüssigkeit eine, einem sauren Salz entsprechende Verbindung von Gerbstoff mit Baryterde auf. Die Auflösung ist gelb, schmeckt zusammenziehend und giebt dem Abdampfen einen extractähnlichen Rück-

stand. Sie wird sowohl von Schwefelsäure, als auch von Natron, in kleinen Mengen zugesetzt, gefällt, und in dem einen Fall ist der Niederschlag schwefelsaure, und in dem andern neutrale gerbstoffsäure Baryterde. Von Baryterdehydrat, mit einer Gerbstoff-Auflösung vermischt, wird der Gerbstoff als ein basisches Salz ausgefällt. Strontianerde verhält sich zum Gerbstoff wie die Baryterde. Mit Kalkerde, als Hydrat im Ueberschuß zugesetzt, wird der Gerbstoff aus seiner Auflösung fast gänzlich zu einem unauflöslichen basischen Salze niedergeschlagen. Wird dieses mit Wasser ausgewaschen und hierauf mit Oxalsäure in der zur Sättigung der überschüssigen Basis hinreichenden Menge versetzt, so löst sich neutrale gerbstoffsäure Kalkerde in der Flüssigkeit mit gelber Farbe auf. Abdampft, bleibt eine durchsichtige, gelbbraune, sowohl in Wasser als in Spiritus auflösliche Masse zurück. Wird eine, mit Ammoniak nahe neutralisirte, Galläpfelinfusion zu einer Auflösung eines neutralen Kalksalzes gemischt, so entsteht ein Niederschlag von neutralem Salz, der sich beim Waschen wieder auflöst. — Wird eine Auflösung von Gerbstoff mit Talkerdehydrat oder mit Magnesia alba digerirt, so färben sich diese gelb, indem sich eine basische schwer auflösliche Verbindung bildet, und die Flüssigkeit fast ganz ihren Gerbstoffgehalt verliert. Nimmt man hierzu Galläpfelinfusion, so wird die Flüssigkeit von galläpfelsaurer Talkerde, die sich durch Einwirkung der Luft zersetzt, grün. Mit den Hydraten der eigentlichen Erden verbindet sich der Gerbstoff leicht. Bei Gerbstoff im Ueberschuß bekommt man eine neutrale unauflösliche Verbindung und eine saure, die einen Antheil Erde aufgelöst enthält. Aus den neutralen und etwas concentrirten Auflösungen dieser Erden wird die Erde durch eine concentrirte Gerbstoff-Auflösung niedergezogen.

Mit allen Metalloxyden bildet der Gerbstoff schwer lösliche Verbindungen, die entstehen, wenn in Wasser gelöstes gerbstoffsäures Kali mit ihren Auflösungen vermischt wird; mehrere Metallsalze werden von freiem Gerb-

stoff gefällt, wie z. B. die Salze von Bleioxyd, Kupferoxyd, Zinnoxidul, Silberoxyd, Uranoxyd, Chromoxydul, den Quecksilberoxyden u. a., und die Hydrate aller dieser Oxyde nehmen, mit Auflösungen von Gerbstoff digerirt, denselben zu einer unauflöslichen Verbindung auf. Ich habe schon bei Abhandlung der meisten Metalle die Farbe genannt, mit der sie von Galläpfelinfusion gefällt werden, weil sie oft als ein Erkennungsmittel benutzt wird. Quecksilberchlorid wird von Gerbstoff nicht gefällt.

Am merkwürdigsten hierunter ist das Verhalten des Gerbstoffs zu den Oxyden des Eisens, des Bleies und Antimons.

Mit Eisenoxydulsalzen giebt der Gerbstoff keinen Niederschlag. Werden sie sehr concentrirt mit einander vermischt, so entsteht ein weißes, gelatinöses Magma, das durch Verdünnung flüssig wird. Mit Eisenoxyd giebt der Gerbstoff eine in Masse schwarze Verbindung, welche die färbende Substanz in unserer gewöhnlichen Dinte ist. Wird eine sehr verdünnte Auflösung eines Eisenoxydsalzes mit einer Auflösung von Gerbstoff vermischt, so entsteht eine durchsichtige, schön dunkelblaue Flüssigkeit, die nach einiger Zeit eine dunkle, flockige Materie absetzt und dann dunkelgrün wird. Durch starke Verdünnung mit Wasser wird sie sogleich dunkelgrün, ohne etwas zu fällen.

Mit Bleioxyd bildet der Gerbstoff mehrere Verbindungen; eine saure, welche sich durch Fällung einer Gerbstoff-Auflösung mit neutralem essigsauern Bleioxyd bildet. Der Niederschlag ist weiß, dunkelt aber an der Luft, und muß, wenn er weiß bleiben soll, nach dem Auspressen im luftleeren Raum getrocknet werden. Wird diese Verbindung mit Wasser gekocht, so löst sich völlig bleifreier Gerbstoff auf, mit Hinterlassung einer neutralen, durch Wasser nicht weiter zersetzbaren Verbindung. Mit kaustischem Ammoniak übergossen, wird sie schleimig und von Farbe dunkler, giebt aber, nach Verbrennung des abgeschiedenen Salzes, einen gleichen Rückstand von Bleioxyd, wie das neutrale Salz. Dieses enthält 34,21 Proc.

Bleioxyd, oder 100 Th. Gerbstoff verbinden sich mit 52 Th. Bleioxyd. Ein basisches Salz erhält man, wenn eine Auflösung von Gerbstoff, oder besser von gerbstoffsaurem Kali, mit basisch essigsaurem Bleioxyd gefällt wird. Der Niederschlag ist weiß und wird beim Waschen gelblich, in's Grüne ziehend. — Wird eine Infusion von Galläpfeln mit Mennige digerirt, so wird der Gerbstoff ausgefällt, und befindet sich dann dem größten Theile nach im Zustand von Extract-Absatz oder braungefärbtem Gerbstoff.

Die Verbindung mit Antimonoxyd erhält man, wenn eine Auflösung von Gerbstoff mit weinsaurem Antimonoxydkali vermischt wird, wodurch ein Niederschlag entsteht. Die Merkwürdigkeit bei diesem Niederschlage liegt eigentlich darin, daß nicht alle Gerbstoffarten die Eigenschaft haben, das Antimonoxydsalz zu fällen, was also ein Unterscheidungsmittel für dieselben abgiebt. Wird eine Auflösung von weinsaurem Antimonoxydkali mit Gerbstoff gefällt, so entsteht auf der einen Seite gerbstoffsaures Antimonoxyd, welches niederfällt, und auf der andern tritt der Gerbstoff in die Stelle des Antimonoxyds in Verbindung mit dem sauren weinsauren Kali, so daß sich kein *Cremor tartari*, sondern ein der Verbindung der Borsäure mit diesem sauren Salze analoges Salz bildet. Dieses Salz fällt die Leimauflösung, welche ihm seinen Gerbstoff entzieht, wie großen Ueberschuß es auch noch von unausgefälltem Antimonsalz enthält. Fällt man das Antimonsalz mit Galläpfelinfusion, so bleibt die Galläpfelsäure, statt eines Antheiles Gerbstoff, in Verbindung mit dem Kalisalz. Ist das Antimonsalz im Ueberschuß zugesetzt, so schlägt kohlensaures Kali gerbstoffsaures Antimonoxyd nieder, und die, jetzt weinsaures und galläpfelsaures Kali enthaltende, Flüssigkeit wird nach einigen Stunden dunkelgrün. Die Verbindung von Gerbstoff mit saurem weinsauren Kali hält einen Antheil Antimonoxyd zurück, den ein Ueberschuß von Gerbstoff nicht abzuschneiden vermag. Wird die schwach gelb gefärbte Auflösung abgedampft, so setzt sich ein Salz in schiefen rhom-

bischen Tafeln ab. Alkohol zersetzt dasselbe und scheidet ein Salz in glänzenden Schuppen ab, welches Weinsäure, Antimonoxyd und Kali, so wie auch Gerbstoff enthält; denn seine Auflösung trübt schwach die Leimauflösung. Dieses Salz ist in Wasser schwer auflöslich, woraus es beim Erkalten in kleinen, glänzenden Schuppen anschießt. Das vom Alkohol aufgelöste Salz macht die Hauptmenge aus. Es enthält kein Antimonoxyd, fällt die Leimauflösung stark, und giebt nach dem freiwilligen Abdampfen einen hellgelben Syrup, der nicht anschießt und ohne Rückstand verbrennt. Es ist eine Verbindung von Weinsäure mit Gerbstoff, welche, nach Ausfällung des Gerbstoffs durch nasses Goldschlägerhäutchen, eine Flüssigkeit hinterläßt, aus der nach dem Abdampfen und nach dem Zusatz von etwas kohlen saurem Kali Weinstein erhalten werden kann. Gerbstoffsäures Antimonoxyd wird in Gestalt eines weissen Magma's gefällt. Beim Waschen mischt es sich mit dem Wasser zu einer Milch und geht mit durch das Filtrum. Es löst sich dabei in geringem Grad in Wasser auf, die Auflösung ist schwach gelblich, klärt sich langsam und läßt beim Abdampfen einen halbdurchsichtigen Firniß auf dem Glase zurück. Der getrocknete Niederschlag ist weisgrau und pulverförmig. Wird gerbstoffsäures Antimonoxyd mit Schwefelwasserstoff behandelt, so wird der Gerbstoff frei, der sich mit dunkelgelber Farbe im Wasser auflöst, und es bleibt orangerothes Schwefelantimon zurück.

Der Gerbstoff verbindet sich mit allen bis jetzt bekannten vegetabilischen Salzbasen zu höchst schwer auflöslichen Verbindungen, die sich gewöhnlich mit weisser Farbe niederschlagen. Sie unterscheiden sich von vielen andern Niederschlägen des Gerbstoffs mit Pflanzenstoffen durch ihre Auflöslichkeit in Alkohol. Diese Basen können vom Gerbstoff befreit werden, wenn die Auflösung in Alkohol in eine wässrige Auflösung von essigsäurem Bleioxyd getropft wird, wobei sich der Gerbstoff mit dem Bleioxyd niederschlägt und die Essigsäure sich mit der Salzbase verbindet. Vielleicht wäre dies eine

leichte Methode, mehrere dieser Basen darzustellen, wenn man sie mit Galläpfelinfusion aus den Pflanzeninfusionen, worin sie enthalten sind, ausfällt, und sie hierauf mittelst essigsauren Bleioxyds auf die eben erwähnte Art vom Gerbstoff trennt.

Der Gerbstoff wird von verschiedenen Salzen aus seiner Auflösung niedergeschlagen. Kalisalze, z. B. schwefelsaures, salpetersaures und essigsaures Kali, schlagen dabei eine Portion gerbstoffsäures Kali nieder, aber der grössere Theil des Niederschlags ist aus der Auflösung durch das Salz bloß verdrängt. Kochsalz schlägt den Gerbstoff nur durch Verdrängen aus dem Auflösungsmittel nieder. Verschiedene kohlensaure Salze schlagen den Gerbstoff nieder, wenn sie damit vermischt oder digerirt werden. Dies geschieht gleichwohl meistens durch ihre Zersetzung, wobei sie wie Hydrate wirken.

Der Gerbstoff fällt die Auflösungen von Stärke, von Pflanzeneiweiß, von Pflanzenleim. Er fällt Eiweiß, Thierleim, und verbindet sich mit einem großen Theil von animalischen Stoffen, wie z. B. mit dem Gewebe der Haut, mit dem Zellgewebe, der Muskelfaser, den Membranen und allen Arten von Aponeurosen, welche ihn nach und nach aus seiner Auflösung aufnehmen, worin nachher nur die mit dem Gerbstoff vermischt gewesenen Stoffe zurückbleiben.

Die Verwandtschaften des Gerbstoffs als Säure sind sehr schwach; die in den Metallsalzen erzeugten Niederschläge hängen theils von ihrer Unauflöslichkeit, theils von der Eigenschaft des Gerbstoffes, sich sowohl mit der Säure als mit der Base zu verbinden, ab, indem dabei die saure Verbindung aufgelöst bleibt, während sich die mit der Base niederschlägt. Seine Sättigungscapazität ist geringe; nach der Zusammensetzung des neutralen Bleioxydes berechnet, ist sie 3,729. Bei einer Analyse, die ich mit dem Gerbstoff der Galläpfel durch Verbrennung von gerbstoffsäurem Bleioxyd von bekanntem Gerbstoffgehalt anstellte, fand ich den Gerbstoff zusammengesetzt aus:

Wasserstoff	3,86 bis 3,79
Kohlenstoff	52,69 — 52,49
Sauerstoff	43,45 — 43,72.

Diese Zahlen stimmen am nächsten mit einer Zusammensetzung aus $6\text{H} + 6\text{C} + 4\text{O}$ überein, welche nach der Rechnung giebt:

Wasserstoff	3,51
Kohlenstoff	51,65
Sauerstoff	44,84.

Da es nicht möglich ist, den Gerbstoff zur Analyse unverändert zu erhalten, so könnte es wohl der Fall sein, daß das Resultat der Analyse auf eine solche Zusammensetzung deutete, nach welcher Kohlenstoff und Wasserstoff in gleicher Proportion, wie in der Galläpfelsäure, verbunden sind, aber mit 4 Atomen Sauerstoff, statt daß sie in der Galläpfelsäure nur 3 Atome aufnehmen, und da die Sättigungscapacität des Gerbstoffs so geringe ist, so muß man annehmen, daß er auf ein At. $18\text{H} + 18\text{C} + 12\text{O}$ enthalte, wobei 3,729, der Ausdruck seiner Sättigungscapacität, mit 12 multiplicirt = 44,746 giebt. Man könnte sich dann vorstellen, daß der Gerbstoff, bei langsamer Zerstörung seiner Auflösung, die Hälfte seines Sauerstoffs mit $\frac{2}{3}$ vom Kohlenstoff und Wasserstoff zu Galläpfelsäure zusammentreten lasse, während die andere Hälfte des Sauerstoffs mit $\frac{1}{3}$ von Kohlenstoff und Wasserstoff andere Producte erzeuge, und so wäre dieses Erscheinen der Galläpfelsäure als Product leicht begreiflich.

Wird eine Galläpfelinfusion dem Schimmeln und der freiwilligen Zerstörung überlassen, so bilden sich braune Krystalle von Galläpfelsäure darin, die im Wasser oder Alkohol aufgelöst werden können. Sie lassen dann ein graues Pulver unaufgelöst, welches sich in einer schwachen Auflösung von kaustischem Kali größtentheils auflöst. Sich selbst überlassen, setzt diese Auflösung, in dem Maasse, als sich das Alkali mit Kohlensäure aus der Luft sättigt, kleine perlmutterglänzende Schuppen ab. Diese Schuppen bestehen aus einer Verbindung von Kali mit einer in den meisten Auflösungsmitteln unauflösliche Substanz, welche

raconnot *Acide ellagique* nannte, in welchem Namen das Wort *Galle*, (Galläpfel) rückwärts gelesen, enthalten ist. Wird dieser Niederschlag mit verdünnter Chlorwasserstoffsäure digerirt, so wird das Kali ausgezogen, und es bleibt ein gelbgraues Pulver zurück, welches weder von kaltem noch kochendheißem Wasser aufgelöst wird, keinen Geschmack besitzt, kaum die Farbe des Lackmuspapiers verändert, weder von Alkohol, noch von Aether aufgelöst wird, und welches nun die *Acide ellagique* ist. Bei der Destillation zersetzt sie sich ohne zu schmelzen, läßt Kohle zurück und giebt gelbgraue Dämpfe, die sich zu gelbgrünen, durchsichtigen, nadelförmigen Krystallen condensiren, die nicht näher untersucht worden sind und dieselbe Substanz, welche von Gerbstoff erhalten wird, sein möchte. Von Salpetersäure wird die Säure mit Entwicklung von Stickstoffoxydgas zu einer blutrothen Flüssigkeit aufgelöst, die sich bei fortgesetzter Erhitzung in Oxalsäure verwandelt. Von kohlen-saurem Kali wird sie nicht aufgelöst, und vermag selbst beim Kochen die Kohlensäure daraus nicht auszutreiben, aber dessen ungeachtet voll sie sich in kaustischem Alkali mit Wärme-Entwicklung auflösen, selbst wenn die Auflösung verdünnt ist. Von kaustischem Ammoniak wird sie nicht aufgelöst, sondern verbindet sich nur mit einem Antheil davon. — Diese Substanz als eine eigene Säure zu betrachten und sie als solche zu benennen, ist gewiß ihr mehr Merkwürdigkeit gegeben, als sie verdient. Sie ist weniger electronegativ als der Absatz des Gerbstoffs, und vielleicht ist sie nichts anderes, als Absatzmaterie, die durch den Einfluß der Luft von allen Gerbstoff-Verbindungen befreit ist.

Der Eichen-Gerbstoff wird zur Dinte und schwarzen Farbe in der Färberei, wozu man sich der Galläpfelinfusion bedient, so wie zum Gerben, wozu man ihn aus der Eichenrinde auszieht, allgemein angewendet. Man hat den Vorschlag gemacht, zu letzterem Endzweck Extract aus Eichenrinde anzuwenden, das an Ort und Stelle, wo die Rinde gewonnen wird, bereitet ist, wodurch der kost-

bare Transport einer voluminösen Waare vermieden werden könnte. Es ist indessen noch nicht ausgemacht, ob nicht durch Einmischung der Luft bei der Extract-Bereitung der so gewonnene Gerbstoff Eigenschaften bekomme, die auf die Beschaffenheit der damit gegerbten Häute einen nachtheiligen Einfluss haben. Der Gerbstoff wird auch in der Heilkunde als ein kräftig stärkendes und zusammenziehendes Mittel gebraucht.

Von eisenschwärenden Gerbstoffarten werden im Uebrigen sehr viele in den Künsten angewendet, wie z. B. von *Rhus coriaria*, Sumach genannt, von *Arbutus Uva ursi*, von Vogelkirschen-, Erlän- und Birken-Rinde; wobei sie in den meisten Fällen vollkommen so wie der Eichen-Gerbstoff wirken; aber in wiefern zwischen ihren chemischen Eigenschaften im Uebrigen Verschiedenheiten statt finden, ist noch nicht untersucht worden.

β) Gerbstoff, welcher die Eisenoxydsalze grün färbt.

Gerbstoff aus Chinarinde. Fast das ganze Geschlecht *Cinchona* enthält einen eigenen Gerbstoff, verbunden mit einem Theil der darin befindlichen vegetabilischen Salzbasen, welchem Gerbstoff die Infusion der Chinarinde die Eigenschaft verdankt, Auflösungen von Leim und von weinsaurem Antimonoxydkali zu fällen und die Auflösung der Eisenoxydsalze grün zu färben.

Dieser Gerbstoff kann auf mehrfache Weise gewonnen werden: a) Man digerirt zerstoßene Chinarinde mit Wasser, welches 1 bis 2 Procent freie Säure enthält, bei $+60^{\circ}$. Die Säure vereinigt sich mit dem Chinin und Cinchonin, der Gerbstoff wird frei und löst sich mit diesen Salzen in der Flüssigkeit auf, die man abfiltrirt. Mit kohlensaurem Kali vermischt, giebt sie einen weissen Niederschlag, welcher aus basisch gerbstoffsauerm Chinin und Cinchonin besteht, die man abfiltrirt und auswäscht. Der Niederschlag wird allmählich roth und zuletzt rothbraun. Diese Farben-Veränderung ist von einer Sauerstoff-Absorption aus der Luft begleitet, und es geht dabei ein Theil des Gerbstoffs in Absatz über. Der ausgewaschene

Niederschlag wird mit verdünnter Essigsäure übergossen, worin er sich auflöst, mit Hinterlassung einer rothen, flockigen Masse, die eine Verbindung der Säure mit dem Absatz des Gerbstoffs ist. Aus der filtrirten Auflösung wird der Gerbstoff durch Bleiessig gefällt *), der Niederschlag gewaschen und darauf durch Schwefelwasserstoffgas ersetzt.

Noch vollständiger erhält man den Gerbstoff der China, wenn die saure Infusion mit im Ueberschuß zuge-setztem Talkerdehydrat gekocht wird, wodurch der Gerbstoff und die Basen niederfallen. Man löst darauf den ausgewaschenen Niederschlag in Essigsäure auf, filtrirt die unauflösliche, rothe Substanz ab, schlägt mit Bleiessig nieder, und zersetzt den ausgewaschenen Niederschlag durch Schwefelwasserstoff.

Die so erhaltene Gerbstoff-Auflösung wird filtrirt und im luftleeren Raum über kohlen saurem Kali abgedampft. Die Auflösung ist gelblich, und giebt nach dem Eintrocknen eine dunkelgelbe, durchsichtige, harte Masse, die sich in der Luft nicht verändert und Gerbstoff ist, verunreinigt durch etwas Absatz, der bei nochmaliger Auflösung in einer geringeren Menge Wassers fast ganz unauflöst bleibt.

Der China-Gerbstoff hat, in so reinem Zustand, als er auf diese Weise erhalten werden konnte, eine hellgelbe Farbe, löst sich leicht, ohne Rückstand und mit olafsgelber Farbe, in Wasser auf, schmeckt rein zusammenziehend, ohne die geringste Spur von Bitterkeit, und ist in Alkohol und in Aether auflöslich. Die Auflösung in Aether ist fast farblos und hinterläßt nach dem Ver-lunsten den Gerbstoff, wahrscheinlich in seinem höchsten Grad von Reinheit, durchsichtig und von schwach gelblicher Farbe zurück.

Die Auflösung dieses Gerbstoffs in Wasser absorbirt

*) Die gefällte Flüssigkeit, mit Schwefelwasserstoff behandelt und filtrirt, ist eine farblose Auflösung von essigsauerm Chinin und Cinchonin, aus welcher diese Basen dann mit Vortheil gewonnen werden können.

aus der Luft leicht Sauerstoff, wird dunkler und nach und nach rothbraun. Nach dem Eintrocknen, durch Abdampfen in der Wärme, unter Zutritt der Luft, hinterläßt sie ein rothbraunes, hartes Extract, wovon ein großer Theil in Gestalt von Absatz unaufgelöst bleibt, wenn es von Neuem mit Wasser übergossen wird. Das Unaufgelöste ist eine Verbindung von Gerbstoff mit Absatz, und bildet eine dunkelrothe Substanz, welche Chinarothe genannt worden ist. Es löst sich in geringer Menge mit blaßgelber Farbe in kaltem; in größerer Menge in kochendheißem Wasser auf. Diese Auflösung fällt schwach die Leimauflösung und weinsaures Antimonoxydkali, und färbt die Auflösung der Eisenoxydsalze grün, zum Beweis, daß es Gerbstoff enthält, der sich vermittelst einer stärkeren Säure abscheiden läßt, indem sich dann die Säure mit dem Absatz verbindet. Nach einigen wiederholten Auflösungen und Abdampfungen, verwandelt sich der Gerbstoff ganz und gar in diese rothe, schwer auflöslche Verbindung. Dieser Gerbstoff-Absatz wird von concentrirter Essigsäure mit rother Farbe aufgelöst, durch Wasser aber daraus niederschlagen. Auch in Alkohol ist er etwas auflöslch. Von Alkali wird er leicht zu einer dunkelrothen Flüssigkeit aufgelöst, die in offener Luft noch dunkler wird. — Dieselbe Substanz wird auch erhalten, wenn man das bei der Reinigung des Gerbstoffs erhaltene Schwefelblei mit verdünntem kaustischen Ammoniak auszieht. In der Chinarinde selbst bleibt, nach dem Ausziehen mit Wasser, eine nicht unbedeutende Menge Absatz zurück, gebildet durch den Einfluß der Luft beim Trocknen der frischen Rinde, der sich durch kaustisches Ammoniak ausziehen läßt.

Der China-Gerbstoff bildet mit Säuren Verbindungen, die sich, wie der Gerbstoff der Galläpfel, aus concentrirten Auflösungen niederschlagen lassen; aber diese Verbindungen sind weit leichter auflöslch, als die des letzteren, so daß man vermittelst Schwefelsäure oder Chlorwasserstoffsäure aus einem gewöhnlichen Decoct oder einer Infusion von China den Gerbstoff nicht niederschlagen

nn. Sie sind noch nicht weiter untersucht worden. Nach zu Salzbasen hat dieser Gerbstoff eine große Verwandtschaft. Er bildet mit Kali in einem gewissen Verhältnisse eine schwerauflösliche Verbindung, die sich beim Vermischen einer concentrirten Gerbstoff-Auflösung mit etwas kohlensaurem Kali niederschlägt, aber nach kurzer Zeit roth wird. Alle Verbindungen dieses Gerbstoffs mit Salzbasen nehmen Sauerstoff auf und werden viel schneller roth, als der freie Gerbstoff, und wird dieser mit kohlensaurem Kali im Ueberschufs digerirt, so ist er bald gänzlich zerstört, daß er, nach der Sättigung des Alkali's mit einer Säure, nicht mehr die Leimauflösung fällt.

Zu den alkalischen und eigentlichen Erden, wie zu den Metalloxyden, verhält er sich wie der Gerbstoff der Galläpfel, mit dem Unterschiede, daß er die Eisenoxydsalze nicht schwärzt (was jedoch mit einigen Chinarinden statt findet). Er fällt weinsaures Antimonoxydkali stark und mit graugelber Farbe.

Zu den vegetabilischen Salzbasen hat er große Verwandtschaft und fällt ihre neutralen Salze, besonders die essigsäuren; aber dieser Niederschlag ist bei weitem nicht so schwerlöslich, wie der mit dem Galläpfel-Gerbstoff, und löst sich deshalb bei Zusatz von viel Wasser auf. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist ein großer Theil von den Salzbasen der Chinarinde mit diesem Gerbstoff verbunden, wodurch sich leicht erklären läßt, warum sie sich nur so schwierig mit Wasser ausziehen lassen, was doch nicht der Fall sein dürfte, wenn sie nur an Chinasuren gebunden wären. — Ich erwähnte bei diesen Salzbasen, daß sie, nach den Erfahrungen, die wir zu haben haben, den eigentlich wirksamen Bestandtheil der Chinarinde ausmachen; dessen ungeachtet scheint es keineswegs unwahrscheinlich zu sein, daß der Gerbstoff der Chinarinde sehr bedeutend an dieser Wirkung Theil habe, und es ist wahrscheinlich, daß z. B. gerbstoffsäures Chinin wirksamer befunden werden könnte, als schwefelsäures oder essigsäures Chinin. Die Veranlassung zu dieser Vermuthung nehme ich aus der wohlbewährten Erfahrung

ab, daß Chinarinde, deren Infusion wohl von Galläpfeln infundiert wird, und die also diese vegetabilischen Salzbasen enthält, die aber nicht die Leimauflösung und weinsaures Antimonoxydkali fällt, und folglich nicht diesen Gerbstoff enthält, gegen intermittirende Fieber unwirksam ist. Auch ist es in Schweden Gesetz, daß neu ankommende Chinarinde mit Galläpfelinfusion, schwefelsaurem Eisenoxyd, Leimauflösung und weinsaurem Antimonoxydkali geprüft werden soll, und eine, mehr als 16 jährige Erfahrung hat erwiesen, daß die kräftigste Chinarinde diejenige ist, welche am stärksten die Leimauflösung und das Antimonosalz fällt, d. h. diejenige, welche die größte Menge Gerbstoff enthält.

Der China-Gerbstoff verhält sich zu Stärke, Pflanzeneiweiß, Pflanzenleim, Eiweiß, Thierleim u. a., wie der Galläpfel-Gerbstoff. Seine Auflösung läßt sich ohne Niederschlag mit Gerbstoff aus Galläpfeln vermischen und trocknen zu einem durchsichtigen Extract zusammen. Seine Sättigungscapacität und Zusammensetzung sind nicht untersucht.

Er wird nur in der Medicin angewendet, wo er einen wesentlichen Bestandtheil des Chinaextracts ausmacht, welches eine zur Extractdicke abgedampfte warme Infusion von Chinarinde ist.

Catechu wird ein Extract genannt, welches in Ostindien von *Mimosa Catechu* bereitet wird, und unter diesem Namen oder als *Terra japonica* in den Handel kommt. Es wird in großen, schwarzbraunen Stücken uns gebracht, und hat auf frischem Bruch und als Pulver eine rothbraune Farbe. Es besteht hauptsächlich aus Gerbstoff, gemengt mit dessen Absatz. Den Gerbstoff daraus erhält man am besten auf folgende Art rein:

Das Catechu wird mit Wasser ausgezogen, die Auflösung filtrirt und das Unaufgelöste ausgepresst, woran man die klare Flüssigkeit mit etwas Schwefelsäure vermischt, die einen geringen Niederschlag bewirkt, den man abfiltrirt. Hierauf setzt man concentrirte Schwefelsäure zu, bis sich ein Niederschlag bildet, und fährt da

so lange fort, als sich dieser noch vermehrt. Der wird abfiltrirt und mit verdünnter Schwefelsäure gleichem Säuregehalt, wie die durchgelaufene Flüssigkeit, ausgewaschen, worauf man den Niederschlag auf papier bringt und auspresst. Alsdann löst man ihn in kochendem Wasser auf und läßt erkalten. Dabei schlägt eine Verbindung von Schwefelsäure mit Absatzmaterie nieder, die man abfiltrirt, worauf man die rothgelbe Flüssigkeit mit feingeriebenem kohleisäurem Bleioxyd in kleinen Theilen so lange vermischt, als noch Aufbrausen geschieht; man läßt dann noch einen geringen Ueberschuß davon, rührt sie damit um, bis daß eine herausgenommene Probe eine saure Auflösung von Chlorbaryum mehr fällt. Hierauf filtrirt man. Die durchgehende Flüssigkeit ist schwach gelblich oder fast farblos, und nach dem Abdampfen im luftleeren Raum, eine durchsichtige, zusammenhängende, nicht gesprungene Substanz, die sich wieder leicht und ohne Rückstand in Wasser auflöst. Sie ist der reine Gerbstoff.

Er schmeckt rein zusammenziehend und verhält sich in Pflanzen wie die schon abgehandelten Gerbstoffarten; bei der Destillation backt er in einen Klumpen zusammen, wie der Galläpfel-Gerbstoff, giebt eine ungefärbte Flüssigkeit und ein gelbes, brenzliches Oel. Die scharf schmeckende Flüssigkeit fällt die Eisenoxydsalze grüngrauer Farbe, und wird von kaustischem Kalium, ohne daß sich bemerkbar der Geruch nach Ammoniak entwickelt.

Wird eine, besonders etwas verdünnte Auflösung davor in Luft ausgesetzt, so wird sie nach und nach an der Oberfläche roth, was sich allmählich nach unten fortsetzt, zuletzt wird die Flüssigkeit, innerhalb weniger Stunden, durch und durch dunkelroth. Auch das Bleioxyd, womit die Schwefelsäure abgeschieden wurde, wird in Luft durch den aufgenommenen Gerbstoff roth. Bei der Auflösung in offener Luft abgedampft, so giebt es eine durchsichtige, gesprungene, dunkelrothe Substanz, die sich nicht mehr vollständig in Wasser auflöst. Das

Unaufgelöste ist von gleicher Natur mit dem, was des Catechu unaufgelöst zurückläßt. Wird das so erhaltene Extract mit Aether digerirt, so löst dieser einen rothgelben Gerbstoff auf, der nach der Verdunstung des Aethers durchsichtig und dunkelgelb zurückbleibt.

Dieser Gerbstoff verbindet sich mit Säuren, giebt aber eben so leicht auflöslche Verbindungen, wie der der Chinarinde, und erfordert daher zur Ausfällung einen großen Ueberschuß von Säure.

Auch mit Salzbasen verbindet er sich, bildet aber mit Kali keine unauflöslche Verbindung, sondern giebt, gerade neutralisirt, nach dem Eintrocknen ein dunkelbraunes, gesprungenes, durchscheinendes Extract, welches in Wasser auflöslch ist und bei Zusatz einer Säure die Leimauflösung fällt. Von überschüssigem Alkali wird er in der Digestion zersetzt. Zu den alkalischen Erden verhält er sich wie der Galläpfelgerbstoff, eben so auch zu den Erden und Metalloxyden, aber mit dem Unterschiede, daß sich seine neutralen Verbindungen mehr und schneller in der Luft verändern, als die vom Galläpfelgerbstoff, und die basischen zersetzen sich fast schneller, als sie trocknen können. Versucht man, diesen Gerbstoff mit essigsaurem Bleioxyd oder Kupferoxyd auszufällen und ihn dann mittelst Schwefelwasserstoffgas abzuscheiden, so erhält man eine, wie Seifenwasser schäumende Auflösung, die beim Fällen als Schaum überläuft, und sich nachher nur mit der größten Schwierigkeit von dem gebildeten Schwefelmetall abfiltriren läßt. Eisenoxydsalze werden von diesem Gerbstoff mit graugrüner Farbe gefällt. Weinsaures Antimonoxydkali wird davon nicht gefällt.

Das Catechu wird hauptsächlich in der Medicin gebraucht.

Kino oder Gummi Kino ist ein gerbstoffhaltiges Extract, welches von der auf Jamaica wachsenden *Coccoloba uvifera* bereitet wird. Es kommt in rothbraunen, harten Stücken, die sich leicht zu einem dunkelrothen Pulver zerreiben lassen, zu uns. Mit warmen Händen angefaßt, erweicht es, und in Wasser, zumal in lauem,

es sich mit rother Farbe auf. Es bleibt dabei ein stoffhaltiger Absatz unaufgelöst zurück. Um aus dem Gummie den Gerbstoff einigermaßen rein zu erhalten, löst man seine Auflösung mit Schwefelsäure nieder, wodurch ein blaßrother Niederschlag entsteht, den man abfiltrirt, und so lange mit kaltem Wasser wäscht, als das Wasser noch sauer schmeckt, worauf man ihn in kochendem Wasser auflöst. Nach dem Erkalten hat er

die Portion einer Verbindung von Schwefelsäure mit Abgang abgesetzt, die man abfiltrirt. Der hellrothen Lösung, welche nun die Verbindung des Kino-Gerbstoffs mit Schwefelsäure enthält, wird nach und nach Barytwasser zugesetzt, bis daß die Flüssigkeit eine saure Auflösung von Chlorbaryum nicht mehr fällt, worauf man sie filtrirt im luftleeren Raum abdampft. Hierbei erhält man

eine rothe, durchsichtige, gesprungene Substanz, die von dem Wasser schwierig, leichter von kochendem Wasser aufgenommen wird. In Alkohol ist sie auflöslich, aber nicht in Aether. Die Auflösung dieses Gerbstoffs in Wasser schmeckt rein zusammenziehend. In der Luft abgedampft, wird er in einem großen Theile in Wasser unauflöslich, und mehrere Tage für sich stehen gelassen, wird die Auflösung von einer hellrothen Substanz durch und durch getrübt.

Versucht man, schwefelsauren Kino-Gerbstoff durch Sauerstoff zu zersetzen, so bekommt man eine schwarze, halbklare Flüssigkeit, die rein adstringirend schmeckt, und beim Abdampfen im luftleeren Raum eine hartharte, fast metallglänzende Materie hinterläßt, die in dem Wasser unauflöslich ist und beim Verbrennen Blei zurückläßt. Auch wenn man diesen Gerbstoff mit

Sauerem Bleisauerstoff oder Kupferoxyd fällt, bekommt man durch Schwefelwasserstoffgas eine schwarze Flüssigkeit, die zum Klarwerden sehr lange Zeit bedarf, und dann noch so dunkelbraun ist, daß sie fast schwarz scheint. Die nach dem Eintrocknen zurückbleibende Substanz ist in kaltem Wasser unauflöslich und hinterläßt eine metallhaltige Asche.

596 Gerbstoff aus Tannen und Fichten.

Der Kino-Gerbstoff wird von den Säuren leicht gefällt, und die Verbindung damit ist in kaltem Wasser wenig auflöslich. Dagegen aber wird er nicht von kohlenstoffsaurem Kali und nicht von weinsaurem Antimonoxydkali gefällt.

Er wird hauptsächlich als inneres Mittel in der Heilkunde angewendet.

Gerbstoff aus Tannen und Fichten. Wenn die innere frische Rinde der Tannen oder Fichten mit Wasser ausgezogen und dieses dann mit essigsäurem Bleioxyd gefällt wird, so erhält man eine Gerbstoff-Verbindung, aus der ersterer mittelst Schwefelwasserstoff abgeschieden werden kann. Es entsteht dadurch eine farblose Flüssigkeit, die, nach dem Abdampfen im luftleeren Raum, einen schwach gelblichen, durchsichtigen Gerbstoff giebt, der in seinem Verhalten ganz dem aus der Chinarinde gleich kommt, mit dem Unterschiede, daß er weinsaures Antimonoxydkali nicht fällt. Er färbt die Eisenoxydsalze grün, wiewohl die frische Infusion zuerst einen schwarzblauen Niederschlag, und darauf eine schöne dunkelgrüne Flüssigkeit giebt. In der Luft wird er dunkelbraun, und bildet einen braunen, in Wasser unauflöslichen, gerbstoffhaltigen Absatz.

Dieser Gerbstoff wird mitunter zu Bereitung von schlechteren Lederarten benutzt.

C. Narcotische und giftige Extracte.

Verschiedene Pflanzen bringen bei Menschen und Thieren, wenn sie von diesen genossen werden, eigenthümliche, sehr heftige Wirkungen hervor, die, je nach der ungleichen Dosis, in Hitze, Schwindel, Raserei, Convulsionen, oder auch in Gefühllosigkeit und Schlaf bestehen; und in noch größerer Menge genossen, bewirken sie den Tod. Diese Wirkungen bezeichnet man mit dem gemeinschaftlichen Namen narcotische. Die Anzahl von narcotischen Pflanzen ist sehr groß; die gewöhnlicheren sind: *Aconitum*, *Atropa Belladonna*, *Sium latifolium*, *Aethusa officinalis*, *Conium maculatum*, *Cicuta virosa*,

Hyoscyamus niger, *Nicotiana Tabacum*, *Datura Stramonium*, *Digitalis purpurea*, *Lactuca virosa* etc. Man stellte sich vor, daß die ziemlich ähnlichen medicinischen Wirkungen bei diesen Pflanzen auch einen, denselben gemeinschaftlichen Bestandtheil, als Ursache dieser Wirkungen, voraussetzten, und nannte denselben *Principium narcoticum*. Man versuchte gleichwohl vergebens, einen solchen Stoff isolirt darzustellen. Als die vegetabilischen Salzbasen entdeckt wurden, und man mit Sicherheit fand, daß sie die Ursache der giftigen Wirkungen der Krähenaugen, der falschen Angustura u. s. w. seien, so fing man an, auch in jenen Pflanzen solche Salzbasen aufzusuchen; aber bis jetzt ist es nicht geglückt, weder solche Salzbasen, noch irgend einen bestimmt charakterisirten Stoff zu finden, welcher diese Wirkungen verursacht, und die Extracte von narcotischen Pflanzen haben in sofern mit den schon abgehandelten Aehnlichkeit, als die Luft ihre Wirksamkeit zerstört, während sich eine mit dem Absatz der Extracte gleichartige Materie darin erzeugt. Zugeseztes überschüssiges Alkali beschleunigt diese Zerstörung noch mehr.

Extracte von solchen Pflanzen, die in der Heilkunde angewendet werden, sind von *Aconitum Napellus*, *Atropa Belladonna*, *Conium maculatum*, *Helleborus niger*, *Hyoscyamus niger*, *Nicotiana Tabacum*, *Datura Stramonium*, *Strychnos Nux vomica*, und bisweilen auch von *Digitalis purpurea*. Hierzu kann man noch fügen das Upasgift, merkwürdig darum, weil es in Ostindien zur Vergiftung der Pfeile gebraucht wird. Was die Extracte von *Aconitum*, *Conium*, *Helleborus*, *Hyoscyamus* und *Stramonium* betrifft, so weiß man in chemischer Hinsicht nichts Merkwürdiges davon.

Im *Belladonna*-Extract hat man einen eigenen Stoff zu finden geglaubt, welcher seinen wirksamen Bestandtheil ausmachen soll. Diesen Stoff erhält man, nach Runge, auf folgende Art: Man vermischt schwefelsaure Talkerde mit einer, zur vollständigen Ausfällung der Talkerde unzureichenden Quantität kaustischen Kali's; mix

diesem Gemische vermischt man eine concentrirte Infusion von Belladonna-Wurzel oder -Blättern, dampft das Gemenge bei gelinder Wärme zur Trockne ab und zerreibt die trockne Masse zu Pulver. Dieses kocht man nun mit Alkohol von 0,817, und filtrirt diesen kochendheiß ab. Die Auflösung ist gelb und hinterläßt beim freiwilligen Verdampfen eine krystallisirte Substanz, die sich leicht in Wasser auflöst und schwach alkalisch reagiren soll. Eine charakteristische Eigenschaft der Belladonna ist, daß sie Erweiterung der Pupille bewirkt; wird eine Infusion davon in ein Auge getropft, so entsteht in diesem Auge Erweiterung der Pupille. Diese Wirkung besitzt jene krystallisirte Substanz, und verliert sie nicht bei Zusatz einer Säure. Man hat daher Grund, diese Substanz für den narcotisch wirksamen Bestandtheil der Belladonna zu halten. Runge hält sie für eine Salzbasis, hat sie aber im Uebrigen nicht weiter beschrieben. Man sieht aus seinen Versuchen, daß sie, wie die extractiven Stoffe, zerstört wird, wenn man die Infusion oder die Auflösung des Extracts mit kaustischem Kali, oder selbst mit Kalkerdehydrat im Ueberschuß zu vermischen versucht. Wird die Infusion von Belladonna mit essigsauerm Bleioxyd ausgefällt, so bleibt der wirksame Bestandtheil, nebst dem im Ueberschuß zugesetzten Bleisalz, in der Auflösung.

Ich erwähnte schon (pag. 292.), daß man in der Digitalis die Gegenwart einer Salzbasis vermuthet, und daß im Taback ein eigenthümlicher, flüchtiger Stoff, das Nicotian (pag. 507.), der wirksame Bestandtheil sei; da aber auch das Extract von Tabacksblättern narcotische Wirkungen besitzt, so scheint entweder dieser flüchtige Stoff nicht der einzige wirksame darin zu sein, oder er wird im Extract von anderen Stoffen, die seine Verflüchtigung verhindern, zurückgehalten.

Upasgift (Woorara), ist von Pelletier u. Caven-
 tou untersucht worden. Es ist ein Extract, welches aus
 einem auf Borneo wachsenden Baume, *Strychnos Upas*,
 oder, nach Leschenault, *Strychnos Tieute*, bereitet wird.
 Es ist hart und rothbraun, aber an dünnen Kanten roth-

gelb durchscheinend, und schmeckt, ohne alle Schärfe, äußerst bitter. In Wasser löst es sich, mit Zurücklassung eines ziegelrothen Absatzes, auf. Die Auflösung ist gelb und bildet beim Abdampfen noch mehr von dem ziegelrothen Absatz. Von Alkohol wird es vollständiger, als von Wasser, aufgelöst, aber von Aether wird es wenig, und von Oelen gar nicht aufgenommen. Es enthält, außer igasursaurem Strychnin, zwei extractive Stoffe, von denen der eine bei Behandlung mit concentrirten Säuren, vorzüglich Salpetersäure, grün, und der andere roth wird. — Der erstere derselben, welchen Pelletier und Caventou Strychnochromin nennen, wird bei Zusatz einer anderen Salzbasis mit Strychnin gefällt und nebst diesem von Säuren aufgelöst. Hiervon hat das so gewonnene Strychnin die Eigenschaft, von concentrirter Salpetersäure grün zu werden. Das Extract hat zu Kohle große Verwandtschaft, und wird vom Strychninsalze, so wie aus der Auflösung von Upas, abgeschieden, wenn sie mit gut gebrannter Knochenkohle digerirt werden. Von concentrirter Salpetersäure wird es gesättigt grün, aber diese Farbe verschwindet sowohl durch Verdünnung, als durch Zusatz von Alkali und einem desoxydirenden Salze, wie z. B. Zinnchlorür. Von Schwefelsäure wird es weniger stark grün, und noch weniger von Essigsäure. Chlorwasserstoffsäure verändert seine Farbe nicht. Sein unauflöslicher Absatz enthält ebenfalls einen Antheil von diesem Stoffe und wird von Salpetersäure grün. Pelletier und Caventou scheinen anzunehmen, daß der Absatz selbst (das oxydirte Extract) eben die grünegefärbte Substanz sei, was wahrscheinlich nicht richtig ist. Von Alkali wird es mit dunkler Farbe aufgelöst. Alkohol löst dasselbe auf und setzt es beim Erkalten in Schuppen ab, die sich nicht in Aether auflösen. Kurz, es hat diejenigen Charaktere, welche anzeigen, daß es von der Absatzmaterie der Extracte im Allgemeinen enthalte. — Der durch Salpetersäure grün gefärbt werdende Stoff, oder wenigstens ein damit sehr analoger, findet sich auch in *Strychnos Pseudochina*, *Brucea antidysenterica* u. a. — Der

andere Extractivstoff bleibt in der Flüssigkeit zurück, nachdem das Strychnin durch Talkerde, und der verdickende durch Kohlenpulver ausgefällt worden sind. Er ist noch nicht vollkommen rein erhalten werden können. Seine Auflösung ist gelb: abgedunstet, hinterläßt sie eine gelbe, extractartige Substanz, auflöslich sowohl in Alkohol, als in Wasser. Aus seiner Auflösung wird er weder durch essigsaures Eisenoxyd, noch durch Digestion mit thierischer Kohle gefällt. Mit Salpetersäure wird er roth, und bei Zusatz von schwächlicher Säure oder von Zinnchlorür verschwindet die rothe Farbe wieder. Diese Substanz ist es, welche dem aus Krähenaugen oder aus Ignatienwurzeln bereiteten Strychnin die Eigenschaft ertheilt, durch Salpetersäure roth zu werden (p. 262.), und dieser Extractivstoff kommt folglich auch in diesen Strychnosen vor. Daß man das Strychnin aus dem Upas leichter als aus den letztgenannten rein bekommt, beruht darauf, daß der grün werdende Stoff zum Strychnin größere Verwandtschaft hat und sich damit niederschlägt, während der roth werdende in der Flüssigkeit bleibt. Ersterer kann, wenn man das Strychnin dann mit einer Säure sättigt, vermittelst Kohle weggenommen werden, was mit letzterem nicht ausführbar ist.

Das Upasgift bringt alle Wirkungen hervor, welche den Strychninsalzen eigenthümlich sind. Seine beiden extractiven Stoffe haben keinen Theil daran und sind ganz unschädlich. Die Eingebornen auf Borneo und den benachbarten Inseln vergiften ihre Pfeil-Spitzen damit, die gewöhnlich aus spitzen Knochenstücken bestehen, indem sie dieselben mit einer concentrirten Auflösung von Upas überstreichen. Die geringste Verwundung damit tödtet mit den Symptomen des Starrkrampfes oft innerhalb $\frac{1}{4}$ oder $\frac{1}{2}$ Stunde.

Skelett der Pflanzen.

Unter Skelett der Pflanzen verstehe ich die Verwebung von festen und in den meisten Anflösungsmitteln vollkommen unauflöselichen Stoffen, welche einer jeden ganzen

Pf-
se-
de-
Kr-
da-
die-
we-
mü-
dra-
tet-
an-
de-
sei-
de-
ch-
hi-
ni-

m-
n-
t-
te-
d-
e-
s-
k-
e-
l-
l-
s-

Pflanze sowohl, als auch einem jeden einzelnen Theile derselben seine bestimmte Gestalt geben, und welche Stoffe bei den Pflanzen dieselben Verrichtungen vollziehen, wie die Knochen und die Haut bei den Thieren; sie dienen aber dabei auch als Wände für die Art von Gefäßen, welche die in den Pflanzen enthaltenen Flüssigkeiten führen, von welchen Gefäßen unsere Kenntnisse bis jetzt, aller Bemühungen ungeachtet, sehr unvollständig sind.

Im Allgemeinen kann das Pflanzenskelett als aus den drei Geweben: Mark, Holz und Rinde, bestehend betrachtet werden. Daß diese bei sehr vielen Pflanzen unter sich analog seien, ist gewiß höchst wahrscheinlich, aber auf der anderen Seite sind sie bei demselben Individuum in seinen ungleichen Theilen verschieden, welche Verschiedenheiten aber noch nicht der Gegenstand von Untersuchungen oder Vergleichen gewesen sind. Was ich hierüber zu sagen habe, ist also sehr wenig und unvollständig.

A. M a r k.

In der Axe einer jeden Pflanze, eines jeden Baumes oder Astes läuft ein eigenes Gewebe, das Mark genannt. Es ist bisweilen von sehr geringem Durchmesser, bisweilen aber macht es einen großen Theil vom Durchmesser des Durchschnittes aus, wie z. B. beim Hollunder und der Sonnenblume. Es ist bei diesen weiß, locker, etwas elastisch, leicht und voller Zellen, so daß es sich zu einem sehr geringen Theil seines ersten Volums zusammendrücken läßt. Gewöhnlich schwimmt es auf Alkohol. John giebt an, daß es bei der Destillation Ammoniak gebe, Link dagegen erhielt kein Ammoniak daraus. In der Lichtflamme entzündet es sich und brennt mit Flamme, aber herausgenommen glimmt es bloß und verlischt bald. Schwefelsäure schwärzt dasselbe und löst es auf; mit Wasser giebt die Auflösung einen schwarzen Niederschlag. Von Salpetersäure wird es zersetzt, aufgelöst und in Oxalsäure, ohne Spuren von Korksäure, umgewandelt. Kaustisches und kohlen-saures Alkali lösen dasselbe nicht auf.

Auch ist es in Alkohol, Aether und flüchtigen, so wie fetten Oelen, unauflöslich.

Das Hollundermark wird wegen seiner großen Leichtigkeit sehr oft zu elektrischen Spielereien und Electrometerkugeln angewendet.

B. Holz. Pflanzenfaser.

Zwischen dem Mark und der Rinde bestehen die Pflanzen aus einem porösen Gewebe, in welchem ein großer Theil ihrer Säfte von der Wurzel aus nach den Verzweigungen der Pflanze oder des Baumes geführt werden. Bei den Bäumen nennt man dasselbe Holz, und bei den weniger festen Pflanzen vegetabilischen Faserstoff, Pflanzenfaser. Sie setzt sich von dem Stamm durch die Aeste bis in die Blattstiele und die Blätter, und durch den Blütenstiel bis in die Befruchtungswerkzeuge, und nach deren Abfallen bis selbst in die Frucht fort. Welche Verschiedenheiten sie bei dem Uebergang von dem einen zu dem anderen Theil haben könne, ist nicht bekannt, und ich muß mich hier auf die Beschreibung des bis jetzt Untersuchten beschränken.

Das, was von einer Pflanze oder einem Theile derselben zurückbleibt, nachdem man die auflöselichen Materien durch Aether, Alkohol, Wasser, verdünnte Säuren und verdünntes kaustisches Alkali ausgezogen hat, hält man für Holz oder Pflanzenfaser.

a) Das eigentlich sogenannte Holz macht das Skelett der Stämme, Aeste und Zweige bei den Bäumen und Sträuchern aus. Es ist bei denselben sehr verschieden in Textur, Farbe, Härte, specifischem Gewicht u. a., und je nach diesen Ungleichheiten vermuthlich auch von ungleicher Zusammensetzung. Seine Textur ist immer porös, weil es longitudinale Gefäße einschließt, in deren Richtung es sich gewöhnlich leicht spalten läßt. In seinen Poren enthält es in frischem Zustand Säfte mit darin aufgelösten Materien; beim Trocknen des Holzes geht das Wasser weg, mit Zurücklassung des Aufgelösten, dadurch zieht sich das Holz in der Breite beim Trocknen zusammen,

wobei es nicht selten der Länge nach springt, behält aber dabei seine Länge. Man giebt an, daß in dem trocknen Holz unserer gewöhnlichen Bäume 96 Proc. Holz und 4 Proc. auflöslliche, durch die angeführten Auflösungsmittel ausziehbare Stoffe enthalten seien. Dieß ist jedoch nach den verschiedenen Jahreszeiten, in welchen der Baum gefällt wurde, verschieden, wie wir schon früher (p. 196.) gesehen haben. Von diesen zurückbleibenden Stoffen scheint auch die ungleiche Farbe der verschiedenen Holzarten im Allgemeinen herzurühren, indem sich dabei Farbstoff der Pflanze in dem Holze mit einer chemischen Affinität befestigt, gleichwie wir dieß beim Färben von Leinen künstlich nachmachen. Nach dem Ausrocknen in der Wärme ist das Holz ein Nichtleiter der Electricität, verliert aber diese Eigenschaft wieder, wenn es der Luft ausgesetzt wird, indem es aus derselben Feuchtigkeit absorbiert, wozu sowohl die Porosität, als auch die im Holze zurückgebliebenen zerfließlichen Substanzen beitragen; durch Ueberziehen des trocknen Holzes mit Firniß wird diesem vorgebeugt. Es ist eine bekannte Sache, daß Holz auf Wasser schwimmt; aber dessen ungeachtet ist das specifische Gewicht des Holzes größer, als das des Wassers, was man leicht dadurch findet, daß ein im luftleeren Raum in Wasser gebrachtes Stück Holz sogleich untersinkt. Die Ursache der scheinbar größeren Leichtigkeit des Holzes liegt in der großen Zahl seiner mit Luft gefüllten Poren, aus welchen die Luft nur erst nach sehr langer Zeit vom Wasser verdrängt wird. Das spec. Gewicht des luftfreien Holzes ist zwischen 1,46, dem Gewichte des Tannen- und Ahorn-Holzes, und 1,53, dem Gewichte des Eichen- und Buchen-Holzes.

Das Verhalten des Holzes im Feuer ist so allgemein bekannt, daß darüber nichts weiter zu bemerken ist, und die Verbrennung und Verbrennungs-Producte der Pflanzenstoffe werden außerdem noch weiter unten besonders abgehandelt. — Durch gemeinschaftliche Einwirkung der Luft, des Wassers und des Lichts, wird das Holz nach und nach zerstört. Es wird zuerst hellgrau, und dann fan-

trockner Luft und vor Regen geschützt, noch nach einer so langen Zeit sich erhalten, und so ziemlich gut seinen Zusammenhang behalten kann.

Von Chlor wird das Holz gebleicht und wird schneeweiß, aber nicht aufgelöst. Von concentrirter Schwefelsäure wird es in der Kälte in Gummi, und durch Verdünnen und Kochen mit Wasser in Traubenzucker umgewandelt, wie schon pag. 347. angeführt worden ist. Wird ein Gemenge von concentrirter Schwefelsäure mit Holz, in Form von Sägespännen, erhitzt, so entwickelt sich schweflichtsaures Gas, die Masse wird schwarz und geht zu einem Magma, welches nach dem Vermischen mit Wasser, nach Hatchett's Bestimmung, 0,438 seines Gewichts kohlige, schwierig verbrennbare Substanz unauflöst zurückläßt. Concentrirte Salpetersäure färbt das Holz gelb, und zerstört nach einiger Zeit seinen Zusammenhang, so daß es sich in eine pulverige Masse zertheilt, die sich zuletzt auflöst und Oxalsäure giebt. Kochen mit concentrirter Chlorwasserstoffsäure verändert das Holz, die Säure färbt sich zuerst roth, dann braun, und das Holz wird schwarz, ohne aber weder in der Säure noch in reinem Wasser auflöslich zu sein; nach dem Trocknen brennt es noch mit Flamme. Verdünnte kaustische Alkalien wirken wenig auf Holz; werden aber Sägespäne mit einer sehr concentrirten Auflösung von gleichen Theilen Kalihydrat zusammengeschmolzen und erhitzt, bis die ganze Masse zu einer Flüssigkeit geworden ist, wobei brenzlich riechendes Wasser mit Aufblähen weggeht, so erhält man nach dem Erkalten eine braunschwarze Auflösung, welche Essigsäure enthält, und woraus Säuren eine Substanz niederschlagen, die zunächst mit dem Dammerdéextract, oder mit der aus Ruß in Alkali auflöslichen Materie übereinstimmt. Auf diese Art löst sich das Holz fast ohne Rückstand auf. Geschieht das Zusammenschmelzen ohne Zutritt der Luft, z. B. in einer Retorte, so wird die Masse gelb, und bildet mit ausgekochtem Wasser eine gelbe Auflösung, welche in der Luft Sauerstoff absorbirt und braun wird.

Die Zusammensetzung des Holzes ist von Gay-Lussac und Thénard untersucht worden, sie haben sich aber nur mit zweien, einander sehr ähnlichen Holzarten, nämlich dem Buchen- und Eichenholze, beschäftigt, weshalb auch die analitischen Resultate sehr ähnlich ausfielen. Sie fanden in 100 Th., bei $+100^{\circ}$ getrockneten Holzes:

	Eichenholz.	Buchenholz.
Kohlenstoff	52,53	51,45
Wasserstoff	5,69	5,82
Sauerstoff	41,78	42,73.

Hieraus ein Resultat hinsichtlich der Anzahl von einfachen Atomen ziehen zu wollen, ist um so weniger möglich, da es wahrscheinlich ist, daß die Holzmasse, welche aus mehreren ungleichen Gefäßen besteht, mehrere ungleich zusammengesetzte, mit einander verwebte Holzarten enthalten könne.

Die Anwendung des Holzes ist allgemein bekannt. Die Zukunft wird lehren, ob sich daraus auch Zucker und Gummi mit Vortheil werden bereiten lassen. Autenrieth gab vor einigen Jahren an, daß fein zerkleinerte, mit ganz wenig Mehl zusammenhängend gemachte und zu Kuchen geformte Sägespäähne sich mit Vortheil als Futter für Schweine anwenden ließen, die er auch wirklich damit gemästet haben will. Die Richtigkeit dieser für die Landwirthschaft nicht unwichtigen Angabe ist noch nicht bestätigt worden. In diesem Falle sollte man vermuthen, daß die Verdauungsorgane des Thieres die Zusammensetzung des Holzes auf eine gleiche Art veränderten, wie sie durch Einwirkung von Schwefelsäure hervorgebracht wird.

b) Pflanzenfaser; sie entspricht bei den Kräutern dem Holze bei den Bäumen und Sträuchern. Sie ist theils spröde, so daß sie sich abbrechen läßt, theils zähe, so daß sie, ohne abzubrechen, Falten bildet, wenn man sie zu brechen versucht, und theils in allen Richtungen biegsam, und wird dann bei den Kräutern Faser, und bei den Bäumen Bast genannt. Sowohl die Faser als der Bast gehö-

ren gleichwohl mehr der Rinde als dem Holze an, und machen die dem Holze zunächst liegenden Theile der Rinde aus; so befindet sich die Faser beim Flachs, Hanf, der Brennessel, bei *Phormium tenax*, *Eupatorium cannabinum* u. a., in dem inneren, dem Splinte der Bäume entsprechenden Theil der Rinde; bei der Baumwolle macht sie dagegen eine Umhüllung der Saamen aus, wodurch ihre Verbreitung durch die Luft befördert wird.

Die Faser von Flachs und Hanf wird von der Rinde und der spröden Pflanzenfaser auf die Art getrennt, daß die reife Pflanze entweder sehr hart getrocknet wird, so daß alle weichen Theile erhärten und sich zerreiben lassen, was gewöhnlich zwischen gefurchten Walzen oder durch Schlagen geschieht, wobei jene von der Faser abfallen, oder daß man sie auf einen feuchten Rasen oder unter Wasser legt, bis sie eine Art von Fäulniß erlitten hat, welche den Zusammenhang der Rinde und der spröden Faser zerstört, worauf sie getrocknet und auf die erwähnte Art zermalmt wird. Nach dem Faulen hat sich eine, durch die Zerstörung gebildete Substanz an die Faser befestigt und ihr eine graugelbe Farbe ertheilt, welche sie nicht anders als durch abwechselnde Behandlung mit Lauge und den unmittelbaren Einfluß des Sonnenlichts, oder durch Eintauchen in Chlorwasser, oder eine Auflösung eines chlorichtsauen Salzes verliert, während dagegen die ohne Faulen gewonnene Faser schon durch bloßes Bleichen weiß wird.

Die Baumwollenfaser ist in der Pflanze selbst weiß. Sie ist dreikantig, und davon leitet man die scharfe Beschaffenheit derselben ab, welche bewirkt, daß man sich z. B. während des Schnupfens nicht gern eines baumwollenen Tuches bedient, daß man Baumwolle nicht als Charpie zu chirurgischem Behuf brauchen kann u. s. w.

In chemischer Hinsicht betrachtet, verhalten sich diese Faser-Substanzen, so viel man darüber weiß, zu Chlor, Säuren und Alkalien, gerade so, wie vom Holze erwähnt wurde.

Ihre Anwendung zu Geweben ist älter als die Ge-

schichte; die ägyptischen Mumien sind in Binden von Leinen eingewickelt, welches indessen, nach einer Existenz von 30 Jahrhunderten, ganz spröde geworden ist, und die nordischen Völkerschaften, welche das südliche Europa überschwemmten, trugen, von ihrem ersten Zusammentreffen mit den Römern an, leinene Kleider.

Von einer etwas veränderten Faser wird das Papier bereitet. Man läßt Leinen oder Baumwolle, mit Feuchtigkeit durchtränkt, in Haufen liegen, bis Fäulniß eintreten anfängt, und zerrührt dann das Ganze durch eine eigene Maschinerie zu einem Brei, welcher auf ein ausgespanntes Gewebe von Metalldrath genommen wird, wo er sein Wasser abfließen läßt, worauf die Fasern der zurückgebliebenen Masse beim Trocknen zusammenhaften, was man noch mehr durch starkes Pressen befördert. Zur Bereitung eines Papiere, worauf man schreiben kann, ohne daß es durchschlägt, ist es erforderlich, daß die Porosität zerstört werde, was dadurch bewirkt wird, daß man es mit einer gemischten Auflösung von Leim und Alaun benetzt, wodurch das Papier nach dem Trocknen für Flüssigkeiten undurchdringlich wird. — Die Kunst Papier zu verfertigen ist arabischen Ursprungs. Schon im Jahre 704 war den Arabern die Verfertigung von Baumwollenpapier bekannt. In der letzten Hälfte des 13. Jahrhunderts wurde die Bereitung des Papiers aus Leinen bekannt, und zwischen 1760—70 zeigte Schäfer, daß man aus Heu, Stroh, Sägspähnen und Blättern Papier machen könne; und später hat man gelernt, dasselbe auch aus Tannen- und Fichtennadeln, und anderen ähnlichen Substanzen zu machen.

c) Fasersubstanz der reifen Früchte, wie der Aepfel, Birnen, Citronen, Pomeranzen u. a., der saftigen Wurzeln, wie der Kartoffel, Runkelrüben, gelben Rüben u. a., welche nach Auspressung des Saftes und Behandlung des Ausgepreßten mit den zuvor erwähnten Auflösungsmiteln zurückbleibt, gehört ebenfalls zu dem vegetabilischen Faserstoff, ist aber bis jetzt noch nicht un-
 worden. In den Aepfeln beträgt er, mit Aus-
 nahme

nahme der Schale und des Kerngehäuses, keine 4 Proc. vom Gewicht der Aepfel. Einhof fand, daß Kartoffeln, aus denen man alle in Wasser auflösliehen, oder durch Reiben mechanisch ablösbaren Theile abgeschieden hatte, einen Faserstoff zurücklassen, der viele Charaktere der Stärke besitzt. Er bildet durchscheinende, zähe Fasern, die zu einer weißgrauen, gesprungenen, harten Masse eintrocknen, die durch anhaltendes Kochen in Wasser zuerst zu einem durchscheinenden Klumpen erweicht, und zuletzt einen ebenfalls durchscheinenden Kleister bildet. In ungekochtem Zustand mit Wasser angerührt, wird er schnell sauer und ist nach zwei Tagen in Essig verwandelt. Vauquelin hält diese Substanz für ein inniges Gemenge von Stärke und Pflanzenfaser. Das isländische Moos, durch Kochen von der Stärke befreit, hinterläßt ebenfalls ein Skelett, welches, außer seiner Auflöslichkeit, in kochendem Wasser oder in kochenden verdünnten Säuren, noch viele andere Eigenschaften der Stärke hat; aber durch Kochen wird es in eine weiche, halb schleimige Materie verwandelt, welche durch Digestion mit basisch-essigsauerm Bleioxyd oder mit Galläpfelinfusion erhärtet, indem sie im ersteren Falle Bleioxyd, und in letzterem Gerbstoff aufnimmt.

Proust fand in der Gerste (*Hordeum vulgare*) eine Substanz, die sich mit der Stärke ausscheidet, und die, nach der Auflösung dieser letzteren in mit etwas Säure versetztem Wasser, als ein gelbliches, sägespähnartiges Pulver zurückbleibt, das bei der Destillation kein Ammoniak gab, mit Salpetersäure aber Oxalsäure, Essigsäure und eine Spur von bitterem Stoff bildete. Er nannte dieselbe Hordein, und gab an, dasselbe werde beim Keimen der Gerste in Stärke umgewandelt.

d) Fungin (Schwammskelett). Unter diesem Namen hat Braconnot die nach Auspressung und Behandlung der Schwämme mit Wasser, Alkohol und verdünnten Alkalien zurückbleibende Substanz beschrieben. Es ist weiß oder weißgelb, faserig, in feuchtem Zustand weich, wenig elastisch und von fadem Geschmack.

In trockenem Zustand brennt es, ohne zu schmelzen oder sich aufzublähen, mit ziemlich lebhafter Flamme, mit dem Geruch nach gebranntem Brod und Zurücklassung einer weißen Asche. Bei der trocknen Destillation giebt es 0,303 einer, Ammoniak und Essigsäure enthaltenden Flüssigkeit, 0,21 eines dicken braunen Oels und 0,263 Kohle, nach deren Verbrennung 0,079 Asche, phosphorsauren Kalk enthaltend, zurückbleiben. In Wasser aufgeweicht und in der Luft gelassen, wird es weicher und fault, anfangs mit fadem, hernach mit faulem thierischen Geruch. Das Wasser reagirt weder sauer noch alkalisch, enthält etwas Schwefelwasserstoff und giebt mit Essigsäure einen schleimigen Niederschlag. Von Schwefelsäure wird das Fungin verkohlt. Salpetersäure löst dasselbe mit Gasentwicklung auf; es wird erst gelb, erweicht dann, schwillt auf und verwandelt sich in bitteren Stoff, Gerbstoff, Oxalsäure und Cyanwasserstoffsäure. Durch Kochen mit Chlorwasserstoffsäure verwandelt es sich in eine gallertartige, sich auflösende, und durch Alkali wieder fällbare Substanz. Eine concentrirte Auflösung von kaustischem Kali löst dasselbe im Kochen langsam zu einer seifeähnlichen, durch Säuren in Flocken fällbaren Masse auf. In feuchtem Zustand nimmt das Fungin aus der Galläpfelinctur Gerbstoff auf und färbt sich braungrau.

C. R i n d e.

Sie bildet die äußerste Bedeckung der Pflanzen. Sie besteht, gleich wie die Haut der Thiere, aus einem Oberhäutchen (Epidermis) und einer lebenden Rinden-Substanz, welche bei den kleineren Stämmen und Aesten eine grüne, mit Säften erfüllte Masse bildet, die oft Stoffe von großer Wichtigkeit zu medicinischem und ökonomischem Behufe enthält. Beim Wachsen des Stammes bilden sich Oberhaut und saftige Rinde nicht in gleichem Verhältniß, sondern die äußere Schicht der ersteren berstet und stirbt ab und bleibt dann als eine an Dicke beständig zunehmende Bekleidung, voller unregelmäßiger Längensrisse, diese Art bildet sie z. B. bei dem Korkbaum

(*Quercus Suber*) den allgemein angewandten Kork. Als Gegenstand chemischer Untersuchung haben wir demnach sie zu betrachten *a*) die lebende Rinde, *b*) die todtte Rinde und Kork, und *c*) das alle Theile der Pflanzen umgebende Oberhäutchen.

a) Die lebende Rinde, wie das Holz mit Aether, Alkohol, verdünnten Säuren und verdünnten Alkalien behandelt, läßt eine in diesen Reagentien unlösliche Substanz zurück, die man gewöhnlich für Pflanzenfaser und für analog mit dem Holz zu halten pflegt, was gleichwohl nicht der Fall ist. Die eigene Masse der Rinde hat ihre, von denen des Holzes bestimmt unterschiedenen Charaktere. Ihr Aussehen, Zusammenhang, die Art zu brennen u. s. w., sind alle anders, wie beim Holze, und zeigen verschiedene Zusammensetzung und anders beschaffene chemische Eigenschaften an; bis jetzt ist sie indessen noch nicht der Gegenstand einer zur Erforschung ihrer Natur besonders angestellten Untersuchung gewesen.

b) Die todtte Rinde scheint nichts Anderes, als dieselbe Substanz zu sein, die aber durch natürliche Prozesse, durch den Einfluß des Regens, der Luft und des Lichts von den auflöselichen Stoffen befreit ist, und deren zu äußerst gelegene Theile zugleich selbst durch den Einfluß derselben Prozesse etwas verändert worden sind.

Sie ist ebenfalls noch nicht weiter untersucht worden, ausgenommen in Gestalt von derjenigen Art, welche als Kork bekannt ist, der indessen in vielen seiner Charaktere so wesentlich von der todtten Rinde unserer gewöhnlichen Bäume abweicht, daß man mit Unrecht von den bekannten chemischen Eigenschaften des Korkes auf die von jener schließen würde.

Der Kork ist eine elastische Masse von bekannten äußeren Eigenschaften und einer zelligen Textur, der in seinen Zwischenräumen noch einige fremde Stoffe enthält, die sich durch Auflösungsmittel aus geraspeltem Kork ausziehen lassen. Mit dem ganzen glückt dieß nur auf der Oberfläche. Nach Chevreul's Versuchen bleiben vom Korke, nach der Behandlung mit Auflösungsmitteln, nur

0,7 in letzteren unauflösliche Substanz zurück, die er Suberin nennt. Dasselbe hat noch unverändert das Ansehen des Korkes, ist leicht entzündlich, brennt unter Aufblähen mit klarer, leuchtender Flamme, und hinterläßt eine lockere Kohle. Bei der Destillation giebt es Wasser, zuerst ein farbloses und darauf ein gelbes Oel, welche beide, so wie das Wasser, sauer sind; ferner ein braunes Oel, etwas Ammoniak, eine krystallinische fette, in kaustischer Lauge unauflösliche Substanz, brennbare Gase und eine poröse Kohle, $\frac{1}{4}$ vom Gewicht des Korkes betragend. Der Kork wird von Schwefelsäure geschwärzt. Mit Salpetersäure liefert er merkwürdige Producte, und darunter eine eigene Säure, deren Bereitung und Eigenschaften weiter unten beschrieben werden. Chevreul erhielt durch Einwirkung der Salpetersäure auf Kork folgende Produkte:

	In gew. Zustand.	Mit Wasser gewaschen.	Suberin.
Weißer unauflöslicher Faserstoff	0,18	0,90	1,0
Harz	14,72	17,50	10,0
Oxalsäure	16,00	10,60	7,6
Korksäure	14,40	19,6	22,4.

Was hier an 100 fehlt, ist eine gelbe, bittere, in der Mutterlauge aufgelöste Substanz, so wie Kohlensäuregas und Wasser, die auf Kosten der Säure aus den Bestandtheilen des Korkes gebildet wurden.

Chevreul führt an, daß er aus der Rinde (*le tissu de l'épiderme*) von Birken-, Kirschen- und Pflaumen-Bäumen mittelst Salpetersäure eine um so größere Menge Korksäure erhalten habe, je reiner die Rinde gewesen wäre, woraus also zu folgen scheint, daß wenigstens die noch junge, nicht zersprungene Rinden-Substanz mit dem Korke eine ähnliche Zusammensetzung habe. Zuvor mit Wasser und Alkohol behandelte junge Birkenrinde gab unauflösliche holzartige Substanz 0,8, Harz 13,6, Korksäure 26,6, und das Uebrige war eine zähe, bittere, gelbliche Substanz, die keine Oxalsäure enthielt. Indessen

unterscheidet sich die Substanz der jungen Birkenrinde, nach John, darin vom Kork, daß sie im Kochen von kaustischem Kali mit brauner Farbe aufgelöst und daraus durch Säuren in gelben, beim Trocknen braun werdenden Flocken gefällt wird. Diese lösen sich etwas in kochendem Alkohol auf, woraus sie sich beim Erkalten größtentheils wieder niederschlagen.

c) Das Oberhäutchen (*Epidermis*) umgibt äußerlich die Rinde, bekleidet die Blätter und ihre Stiele, und endlich die Frucht selbst. Man erhält es am leichtesten in seiner Reinheit von fleischigen Früchten oder Wurzeln, von denen es sich ganz ablösen läßt, wie z. B. von gekochten Kartoffeln. Es ist für Luft und Wasser ganz undurchdringlich, und schützt dadurch die Pflanzen vor dem Einflusse einer Menge fremder Stoffe, mit denen sie in Berührung kommen können. Diese Oberhäutchen sind, nach Ausziehung der darin enthaltenen auflöselichen Stoffe, wie z. B. des Farbstoffs in den Schalen der rothen Weintrauben, in den gewöhnlichen Auflösungsmittein unauflöselich; sie sind durchsichtig und oft wie eine thierische Haut gleichförmig und zusammenhängend. Bisweilen sind sie weich und biegsam, mit Flüssigkeiten erfüllt, bisweilen trocken und elastisch, wie die Hülsen, womit trockene Saamen, wie z. B. die Getreidearten, umgeben sind; bisweilen sind sie hart, fest und unbiegsam, wie z. B. die Schalen der Nüsse und der Kerne der Steinfrüchte; aber welche chemische Eigenschaften diese Schalen haben, ob sie denen des Holzes oder Korks, oder keinen von beiden ähnlich sind, ob sie unter sich eine analoge Zusammensetzung haben oder nicht, ist bis jetzt noch gar nicht untersucht.

Das Oberhäutchen der Gräser bietet, nach Humphry Davy's Untersuchungen, die Eigenheit dar, daß es eine große Menge Kieselerde enthält, die darin abgesetzt ist, und sich oft vermittelst des Microscops als ein glänzendes, glasartiges Netzwerk entdecken läßt, wodurch die Rinde jene Rauheit und Schärfe bekommt, daß z. B. das gewöhnliche spanische Rohr (*Calamus Rotang*) nicht selten

am Stahl Funken giebt, und daß sich der Schachtelhalm (*Equisetum hyemale*) zum Schleifen von Holzarbeiten benutzen läßt. Davy fand in der äußeren Rinde von dickem spanischen Rohr (*Chamaerops excelsa*) 90 Proc. Kieselerde, in der des Bambusrohres 71,4 Proc., in der vom gewöhnlichen dünnen spanischen Rohr 48,1 Proc, und in den Halmen unserer gewöhnlichen Getreidearten ungefähr 5 Procent.

Synoptische Tabelle

über
die Atomgewichte der einfachen Körper.

Name.	Formel.	O=100.	H=1.
Sauerstoff	O	100,000	16,026
Wasserstoff	H	6,2398	1,000
	H	12,4796	2,000
Stickstoff	N	88,518	14,186
	N	177,036	28,372
Schwefel	S	201,165	32,239
	S	402,330	64,478
Phosphor	P	196,155	31,436
	P	392,310	62,872
Chlor	Cl	221,325	35,470
	Cl	442,650	70,940
Jod	J	768,781	123,206
	J	1537,562	246,412
Fluor	F	116,900	18,734
	F	233,800	37,469
Kohlenstoff	C	76,437	12,250
	C	152,875	24,500
Bor	B	135,983	21,793
	B	271,966	43,586
Kiesel	Si	277,478	44,469
Selen	Se	494,582	79,263
Arsenik	As	470,042	75,329
	As	940,084	150,659
Chrom	Cr	351,819	56,383
	Cr	703,638	112,766
Molybdän	Mo	598,525	95,920
Wolfram	W	1183,200	189,621

Name.	Formel.	O=100.	H=1.
Antimon	Sb	806,452	129,243
	Sb	1612,904	258,486
Tellur	Te	806,452	129,243
Tantal	Ta	1153,715	184,896
	Ta	2307,430	369,792
Titan	Ti	389,092	62,356
Gold	Au	1243,013	199,207
	Au	2486,026	398,415
Platin	Pt	1215,220	194,753
Rhodium	R	750,680	120,305
	R	1501,390	240,610
Palladium	Pd	714,618	114,526
Silber	Ag	1351,607	216,611
Quecksilber	Hg	1265,822	202,863
	Hg	2531,645	405,725
Kupfer	Cu	395,695	63,415
	Cu	791,390	126,829
Uran	U	2711,360	434,527
	U	5422,720	869,154
Wismuth	Bi	1330,376	213,208
	Bi	2660,752	426,416
Zinn	Sn	735,294	117,839
Blei	Pb	1294,498	207,458
	Pb	2588,996	414,917
Cadmium	Cd	696,767	111,665
Zink	Zn	403,226	64,621
Nickel	Ni	369,675	59,245
Kobalt	Co	368,991	59,135
	Co	737,982	118,270
Eisen	Fe	339,213	54,363
	Fe	678,426	108,725
Mangan	Mn	355,787	57,019
	Mn	711,575	114,038
Cerium	Ce	574,718	92,105
	Ce	1149,436	184,210
Zirconium	Zr	420,238	67,348
	Zr	840,476	134,696
Yttrium	Y	401,840	64,395
	Be	331,479	53,123


Be-

Name.	Formel.	O=100.	H=1.
Beryllium	Be	662,958	106,247
Aluminium	Al	171,167	27,431
	Al	342,334	54,863
Magnesium	Mg	158,353	25,378
Calcium	Ca	256,019	41,030
Strontium	Sr	547,285	87,709
Baryum	Ba	856,88	137,325
Lithium	L	127,757	20,474
Natrium	Na	290,897	46,620
	Na	581,794	93,239
Kalium	K	489,916	78,515

*)

*) Die Differenzen zwischen den Zahlen dieser Tabelle, welche die richtigeren sind, und den oben im Text angegebenen, sind in Folge der Berichtigung von Rechnungsfehlern entstanden.

Gedruckt bei A. W. Schade in Berlin.



Name.	Formel.	O=100.	H=1.
Antimon	Sb	806,452	129,243
	Sb	1612,904	258,486
Tellur	Te	806,452	129,243
Tantal	Ta	1153,715	184,896
	Ta	2307,430	369,792
Titan	Ti	389,092	62,356
Gold	Au	1243,013	199,207
	Au	2486,026	398,415
Platin	Pt	1215,220	194,753
Rhodium	R	750,680	120,305
	R	1501,390	240,610
Palladium	Pd	714,618	114,526
Silber	Ag	1351,607	216,611
Quecksilber	Hg	1265,822	202,863
	Hg	2531,645	405,725
Kupfer	Cu	395,695	63,415
	Cu	791,390	126,829
Uran	U	2711,360	434,527
	U	5422,720	869,154
Wismuth	Bi	1330,376	213,208
	Bi	2660,752	426,416
Zinn	Sn	735,294	117,839
Blei	Pb	1294,498	207,458
	Pb	2588,996	414,917
Cadmium	Cd	696,767	111,665
Zink	Zn	403,226	64,621
Nickel	Ni	369,675	59,245
Kobalt	Co	368,991	59,135
	Co	737,982	118,270
Eisen	Fe	339,213	54,363
	Fe	678,426	108,725
Mangan	Mn	355,787	57,019
	Mn	711,575	114,038
Cerium	Ce	574,718	92,105
	Ce	1149,436	184,210
Zirconium	Zr	420,238	67,348
	Zr	840,476	134,696
Yttrium	Y	401,840	64,395
Beryllium	Be	331,479	53,123
			Be

Name.	Formel.	O=100.	H=1.
Beryllium	Be	662,958	106,247
Aluminium	Al	171,167	27,431
	Al	342,334	54,863
Magnesium	Mg	158,353	25,378
Calcium	Ca	256,019	41,030
Strontium	Sr	547,285	87,709
Baryum	Ba	856,88	137,325
Lithium	L	127,757	20,474
Natrium	Na	290,897	46,620
	Na	581,794	93,239
Kalium	K	489,916	78,515

*)

*) Die Differenzen zwischen den Zahlen dieser Tabelle, welche die richtigeren sind, und den oben im Text angegebenen, sind in Folge der Berichtigung von Rechnungsfehlern entstanden.

al

ad




Fig. 4.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 3.





26



Alt - 1325